This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Hamburger

Garten- und Blumenzeitung.

Eine

Zeitschrift für Garten- und Blumenkunde,
für Kunst- und Handelsgärtner.

Herausgegeben und redigirt

von

Eduard Otto,

botanischer Gärtner und Inspector des botanischen Gartens zu Hamburg, mehrerer naturwissenschaftlichen und Gartenbau-Gesellschaften Mitglied.

Funfzehnter Jahrgang.

Hamburg.
Verlag von Robert Kittler.
1859.

Colt, 1908
18803

Druck von J. G. A. Krüdenbach, J. B. Appel's Nachfolger.

Inhalts-Verzeichniß zum 15. Jahrgange.

I. Verzeichniß der Abhandlungen.

Seite

Aconitum Napellus, über daſſelbe 94
Anchusa tinctoria, über dieſelbe. Vom Dr. Landerer 334
Aprikoſen, Benutzung derſelben. Vom Dr. Landerer 331

Bäume, immergrüne, mit Erfolg zu verpflanzen 331
Bäume und Sträucher, die bei Petersburg hart ſind 246
Balſamine, die 231
Bambusa 244
Baſtarde und Formen bei Befruchtungen von Begonien verſchiedener Arten. Vom Oberg. F. Stange 97
Batatas edulis, ſüße Bataten. Vom Garteninſpector Jühlke 85
Baumwunden und deren Heilung 560
Begonien-Baſtarde 477
Begonien-Sämlinge 431
Bereiſung der Hochebene von Curitiba, Provinz Parana, Braſilien. Von G. Wallis 394
Betula 430
Blumenliebhaberei der Griechen. Vom Dr. Landerer 524
Botaniſche Excurſion auf den Berg Ida, Entdeckung von Muscari latifol. durch Dr. Kirck. Von Naudin, aus dem Franzöſiſchen vom Hofg. Roeſe . 177
Brunswigia Josephinae β **minor**, blühend 526

Cactusliebhaberei 431
Camellie, Fortune's gelbe. Vom Dr. Seemann 562
Camellien, abgebildete in der Nouvelles Iconographie des Herrn A. Verſchaffelt . . . . . 38 . 229 . 375 . 510 . 566
Chrysanthemum indicum 76
Cocos-Palme, Kultur derſelben auf Ceylon 381
Collodium, Anwendung deſſelben 575
Coniferen, darf man dieſe düngen. Von Naudin, aus dem Franz. vom Hofg. Roeſe 173
Cornus mascula, über denſelben. Vom Dr. Landerer 334
Corylus Colurna, Notiz über. Von E. Otto 335
Correſpondenz über:
- **Aesculus californica**. Vom Director Schnittſpahn 126
- **Cupressus disticha**. Vom Director Schnittſpahn 125
- **Clianthus Dampieri**. Von Homeyer 415
- **Fragaria Grayana**. Vom Director Schnittſpahn 124
- " **lucida**. Von Th. v. Spreckelſen 28

Seite

Reisende Appun und Horn 418
Sanssouci's Gärten. Von G. M. 420
Wilhelm Maak's Handelsgärtnerei. Von a constant Reader. . 471
Cyanophyllum magnificum des Herrn Retemeyer 43
Cycas revoluta bei Herrn Geitner 288
„ „ mas, blühend 382

Dalbergien, die Familie derselben 340
Dioscorea Batatas, über deren Acclimatisirung 44
„ „ Beitrag zur Kultur derselben. Vom Garten-Inspector W. Sinning 80
Doryanthes excelsa, blühend. Von S. 186
Drosera, Bemerkungen über einige Arten Australiens. Von Ausfeld . . . 529
Dünensand, Verwüstung durch denselben 236

Edeltanne von Pawlowsk. Vom Dr. Ruprecht 251
Einfluß des Sommerschnittes an Spalierbäumen, Stein- und Kernobst. Vom Gartenmeister Heike 408
Einige Tage in Buitenzorg. Aus dem Franz. von W. Klatt 342
Epheu, einige merkwürdige und denselben als Gartenschmuck anzuwenden. Von Martins. Aus dem Franz. von W. Klatt 371
Erbsenlinse . . . . . 236 . 365
Erdbeeren-Verzeichniß des Herrn Gloede . . . . . 431 . 433
Erdflöhe, Mittel dagegen . . . . . 95 . 336
Erdorchideen, die größten und prächtigsten 114
Eugenia Ugni, Früchte derselben 45

Farrn, Kultur derselben . . . . . 127 . 158
Frucht- und Gemüsegarten:
Birne, General Totleben 136
„ große Oregon 137
Champignons, große 504
Chinesischer Rettig 136
Erdbeeren, die beiden schönsten. Von Th. v. Spreckelsen . . . 500
„ neue 172
„ Carolina superba 500
„ Oscar 503
„ Sir Harry 502
Melone, große 504
Pêche Docteur Kraus 136
Pfirsich, Baron Peers 138

Garcinia mangostana mit Früchten bei Herrn Geitner 288
Gartenbau-Vereine:
Berlin, Frühjahrs-Ausstellung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues 228
„ 37. Jahresfest 356
Bremen, Preisaufgaben für die Ausstellung am 9.—11. April . 132
Ausstellung, Preisvertheilung und Programm 262

Seite

Christiania, Bericht über die vom 20.—25. October 1858 daselbst abgehaltene Ausstellung zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gartenbaues in Norwegen. Von Fr. Chr. Schübeler 450
Cöln, Bildung eines Gartenbau-Vereins 130
„ Programm zur Ausstellung im Frühjahre 1860 513
Eldena, Programm zur Ausstellung 413
Erfurt, Frühjahrs-Ausstellung, berichtet von Döring & Sohn 298
Frankfurt a. M., Programm, Verhandlungen . . . . . 354 . 559
Hamburg, Programm zur Mai-Ausstellung 33
„ Pflanzen- und Blumen-Ausstellung am 5. und 6. Mai, berichtet von E. Otto 265
Hildesheim, Ausstellungen . . . . . 407 . 514 . 547
„ Programm 412
Kiel, über die Thätigkeit des Gartenbau-Vereins für Schleswig, Holstein und Lauenburg 225
„ Programm zur Ausstellung am 4.—6. Juli 226
„ Ausstellung am 4.—6. Juli, berichtet von E. Otto 359
London, Blumen- und Frucht-Ausstellung am 17. Novbr. v. J., berichtet von Franz Kramer 80
„ Horticultural-Society . . . . . 300 . 415
„ Ausstellung in Sydenham 301
Magdeburg, Programm für 1860 553
München, neuer Gartenbau-Verein 229
Pesth, neuer Gartenbau-Verein für Ungarn 82
„ zweite Ausstellung 227
Petersburg, Pflanzen-Ausstellungen . . . . . 227 . 471
Prag, böhmische Gartenbau-Gesellschaft 363
Würzburg, Programm zur Ausstellung am 10.-13. April . . 130

Garten-Notizen:

Baumschulen der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne 423
Blaß'scher Garten in Elberfeld 201
Botanischer Garten in Melbourne 188
Etablissement der Herren J. Booth & Söhne 349
„ des Herrn A. Verschaffelt 310
Flottbecker Park 423
Garten des Herrn Retemeyer in Bremen 183
Gärtnerei der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne 179
„ des Herrn von Potemkin zu Abrotschne, berichtet von C. Claussen 59
Kew-Garten . . . . . 142 . 311 . 423
Orchideenhäuser des Herrn Consul Schiller 134
Orchideensammlung des Herrn Reed 348
Residenz des Herrn von Hornuzacki 135
Samengarten der Herren P. Smith & Co. 312
Wilhelm Maak's Handelsgärtnerei 471
Gärten Breslau's, ein Spaziergang durch dieselben. Vom Institutsgärtner Hannemann 443
„ Dresden's, Notizen und Mittheilungen über. Von Gulden . . . 531
Gärtnerei in China. Von Rodigas, aus dem Französischen von Klatt . . 536

Seite

Gärtnereien, die vorzüglichſten Oberſchleſiens. Vom Inſtitutsgärtner Hanne-
mann 490
Georginen, Sammlung des Herrn Kircher 44
Geruch der Pflanzen 382
Getreide-Arten, Verzeichniß derſelben. Vom Garteninſpector Jühlke, berichtet
von E. Otto 406
Gras-, Mäh- und Walz-Maſchinen 142
Gurkenreichthum 575

Hannoverſche Sitten und Gebräuche in ihrer Beziehung zur Pflanzenwelt.
Vom Dr. B. Seemann 316
Heliotrop 328
Hesperidenfrüchte, über dieſelben. Vom Dr. Lanberer 46
Himbeeren, eine ergiebige Kultur-Methode und empfehlenswerthe Sorten . . 207
Hydra, vegetabiliſche 572

Imantophyllum miniatum 287

Kaiſerl. Leopoldiniſch-Caroliniſche Akademie betreffend 241
Kapuzinerkreſſe, die Familie der, ein monographiſcher Verſuch. Von
W. Klatt 212
Keimkraft, Dauer derſelben 478
Kew-Garten, Verwaltung deſſelben 379
Kohlenmangel in Griechenland. Vom Dr. Lanberer 95
Kohlraupen vom Kohl abzuhalten 191

Lapageria rosea, blühend 477
Leopoldina Pissaba, über dieſelbe 381
Linden's neueſte Einführungen 149
Liquidambar Altingiana, über denſelben. Aus dem Franz. von W. Klatt . 79
Livistona chinensis, blühend bei Herren Booth & Söhne 187

Magnolia grandiflora, über dieſelbe. Vom Dr. Lanberer 45
Mammuthbaum Ober-Californiens (Sequoia Wellingtonia). Vom Dr. B.
Seemann 12
Mandarinenfrüchte. Vom Dr. Lanberer 333
Melonen im Freien unter Glaskaſten zu ziehen. Von L. Schroeter 445

Nelke, die, Notizen eines reiſenden Nelkenfreundes 438
Nelken-Sorten. Verzeichniß der vorzüglichen. Vom Paſtor Samuel und
H. W. Palandt 102
Nymphäen 430

Obſt-Cabinette, Arnoldi's 44. 138
Obſt-Kultur in Norwegen. Von E. Otto 49
Oelzweig-, Gras- und andere Kronen. Vom Dr. Lanberer 525
Officinelle und andere Gewächſe im bot. Garten in Breslau 308
Orchideen- und Farrn-Auction 237
Orchideen, über einige Garten-. Vom Prof. Dr. H. G. Reichenbach fil. . 51

Seite

Orchideen Madagascar's. Aus dem Engl. von W. Klatt 176
„ Winke zur Kultur derſelben 585
Orchidographiſche Streitfragen. Vom Prof. Dr. H. G. Reichenbach fil. . 67

Paradisea Vindobonensis 145
Paulownia imperialis 142
Pelargonien zu Gruppen 478
Pentstemon, über die Gattung. Von W. Klatt, nebſt Kultur-Bemerkungen, von E. Otto . . . . . 336 . 424
Petunien, neue, über dieſelben. Von Ch. Deegen 25
Pflanzen-Auctionen in London 526
Pflanzen-Ausſtellungen, Verfall derſelben. Von E. Otto 481
Pflanzen, Bemerkungen über ſeltene oder neue, die im bot. Garten zu Hamburg geblüht haben. Von E. Otto . . . . . 4 . 249 . 338 . 437
Pflanzen, beſchrieben im Samen Verzeichniß des bot. Gartens zu Petersburg. 404
„ einige, die ſich zu Einzelexemplare zur Zierde auf Raſenplätzen verwenden laſſen. Von E. Otto 1
„ zu Einfaſſungen. Von E. Otto 292
„ Etiquetten 142
„ fürs Kalthaus. Von E. Otto 242
„ neue 333
„ neue und empfehlenswerthe, abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften 35. 69. 163. 257. 302. 365. 472. 504. 556
„ Hybride und Floriſten-Vereine. Von E. Otto 337
„ Kataloge 522
„ „ und Samenverzeichniß des Herrn C. Appelius 92
„ „ „ des Herrn G. Geitner 139
„ „ „ des Herrn Haage jun. 96
„ „ „ des Herrn Heinemann 93
„ „ „ der Herren Neubert & Reitenbach . . 522
„ „ „ der Herren P. Smith & Co. . . 189 . 140
„ „ „ des Herrn A. Verſchaffelt 523
„ Sammlung-Verkauf 187
„ über einige vom Verein für Schleswig, Holſtein und Lauenburg zum Verſuche angebauten 309
Pförten, ein Blick um hundert Jahre zurück. Von Os. Teichert 195

Reiſeſkizze. Von Os. Teichert 462
Rhododendron-Hybride 73
„ Kultur derſelben. Aus dem Franz. von W. Klatt 211
Robinia Pseudo-Acacia pyramidalis, über dieſelbe. Von E. Otto 188
Roſen-Bouquet 193
Roſenkohl 575
Roſen-Kultur. Von P. Lottré 11
Roſenöl, orientaliſches. Vom Dr. Lauberer 524
Ruſſiſche Gärtnerei. Von C. Clauſſen 289

Salep, Gewinnung und Benutzung deſſelben. Vom Dr. Lauberer 332
Schlingpflanzen im bot. Garten zu Buitenzorg 283

Seite

Schwarze Malve, über dieselbe. Vom Institutsgärtner Hannemann . . . 151
„ „ „ „ Von F. J. Dochnahl 428
Sequoia gigantea . . . . . 12. 478 . 575
Sonerilla margaritacea, über dieselbe 44
Sonnenblumen, Wirkung derselben 191
Sonnenuhr, Schickler's 289
Spergula pilifera, über dieselbe 385
Stachelbeeren, Maurer's englische, öffentlich ausgestellt zu Magdeburg. Von Immisch 515
Stauden, Beiträge zur Kultur der schönblühenden. Vom Garteninspector F. Jühlke 8
Syringa chinensis, eigenthümliche Erscheinung an derselben 396

Theophrasta imperialis bei Herren Booth & Söhne 188
Thomson's Retorten-Kessel 189
Traubenblüthe, zweite, im Jahre 1859. Vom Med.-Rath Dr. Mohr . . . 564
Tropaeoleae, ein monographischer Versuch. Von W. Klatt 212
Tulpen, die, Italiens. Vom Professor Dr. von Schlechtendal 154

Versammlung der deutschen Obst- und Weinproducenten zu Wiesbaden am 5. bis 11. October 1858. Vom Gartenmeister Borchers 109
Victoria regia, über dieselbe. Von E. Otto 385
Viola odorata, Lieblingsblume der Griechen. Vom Dr. Landerer 45
Volks-Palast in London 189

Webestoffe aus Pflanzentheilen. Vom Prof. Dr. Göppert 351
Weinkrankheit, über dieselbe. Von F. F. Stange 65
Wellingtonia gigantea in Früchten 575
Wirkung des tropischen Klimas auf Pflanzen der gemäßigten Zonen. Von Sir Richard Schomburgk. Aus dem Franz. vom Hofg. Roese . . 294
Wörlitzer Garten mit seinen bemerkenswerthen Bäumen und Gebäuden. Von L. Schroeter 448

II. Literatur.

Bosse, J. F. W., Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei 520
Geiger, J. H., Anlage von Feldwegen und Güterzusammenlegung 235
Göppert, Prof. Dr., die Droguen-Aufstellung im bot. Garten in Breslau . 377
Hoffacker, Fr. B., Hausgarten in Stadt und Land . . . . . 233 . 286
Hoffmann, Fr., Signaturen für das Herbarium 474
Hortus Lindenianus 285
Jäger, H., illustrirte Bibliothek des landwirthschaftlichen Gartenbaues, III. Abth. Apotheker-Garten 42
Jühlke, F., über einige praktische Gesichtspunkte bei der Samenprobe . . . 571
Koch, Prof. Dr. K., Hülfs- und Schreibkalender 89
„ „ die bildende Gartenkunst und Pflanzen-Physiognomik . . 185
Kotschy, Dr. Theod., die Eichen Europas und des Orients 40
Kühn's Buch über die Krankheiten der Pflanzen 181
Leopoldina 377
Lindley, Prof. J., Folia Orchidacea . . . . . 185 . 379
Löbe, Dr. Wil., Jahrbuch für die deutschen Haus- und Landwirthe 186

Seite

Lucas, E., Abbildungen württembergischer Obstsorten 91
Meyer, J. G., rationeller Pflanzenbau. V. Theil, Nutz- und Handelspflanzen 286
Meyer, G., Lehrbuch der schönen Gartenkunst . . . . . 520 . 569
Obstbuch für Schleswig, Holstein und Lauenburg 475
Primitiae florae Amurensis 377
Rauch, Dr. A., Anbau-Versuche 184
Regel, Dr. E., die Parthenogenesis im Pflanzenreiche 429
Reichenbach, Prof. H. G., Xenia Orchidacea 90
Schrenk, Dr. Leop., Reisen und Forschungen im Amurlande 377
Schübeler, Fr. Chr., Gartenzeitung für Norwegen 476
„ „ Havebog for Almuen (Gartenbuch für das Volk) . . 476
Van Houtte, Flore des serres 571
Wredow's Gartenfreund . . . . . 184 . 286 . 330

III. Personal-Notizen:

Beförderungen, Ehrenbezeugungen, Reisende, Todesfälle ꝛc.

Agardh, Dr. C. A. † 142
Appelius, C. 527
Appun, C. F. . . . . 237 . 418
Ansfeld, J. G., Handelsgärtner 479
Barter, Ch. † 576
Bayer, Hofgärtner † 48
Benary, E., Handelsgärtner 527
Brasch, L., Obergehülfe 576
Caspary, Dr. und Professor 143
De Candolle, Alph. 384
Erblich, Hofgartenmeister 336
Eyles 336
Fintelmann, J. A. F., Oberhofgärtner 286
„ H., Hofgärtner 288
Fortune, R. 336
Günther, Obergärtner 95
Haage, F. A., Handelsgärtner 527
Heinemann, Handelsgärtner 527
Held, Gartendirector 479
Humboldt, Alexander von, (Necrolog) 272
Jensen, H. 384
Kellner, Hofgärtner 479
Körnicke, Dr. Fr. 479
Kolb, M. 479
Krausnick, Hofgärtner † 576
Kühne, Hofgärtner 576
Kunicke, C. G., Hofgärtner, † 95
„ „ (Necrolog) 96
Lauche, W., Obergärtner 95
Lehmann, H., Obergärtner 95
Liepe, C. F. 432
Lovell † 384

	Seite
Lowegren, H. G.	432
Lucas, E., Garteninſpector	527
Mann, G.	576
Mayer, Hofgärtner	576
Meyer, G., Hofgärtner	527
Michaelis, Obergehülfe	479
Montagne	384
Morren, Prof. Charles, †	95
Nietner, Ed., Hofgärtner †	432
Nietner, Th.	576
Nietner, Hofgärtner	479
Otto, E., Garteninſpector	527
Rach, L. †	432
Scharrer	288
Schlagintweit, A.	238
Schmidt, J. C., Handelsgärtner	527
Schnittſpahn, Hofgartendirector	238
Schrocter, L.	287
Siebold, Dr., Freiherr v.	238
Siemers, C. L.	143
Weinmann, Garteninſpector †	95
Wendland, H., Hofgärtner	336
Zeyher, Carl	143

IV. Pflanzen- und Samenofferten, Handelsverzeichniſſe ꝛc.

Von H. H. C. Appelius in Erfurt, 96. — E. Benary, Erfurt, 96. 432. — Decker, Berlin, 192. — Chr. Deegen, Köſtritz, 143. — Doubletten-Verzeichniß des bot. Gartens zu Hamburg, 288. — Geitner, Planitz, 144. 336. — F. A. Haage jun., Erfurt, 48. 96. 143. 192. 240. — Heinemann, Erfurt, Umſchlag des 1., 2., 3. u. 9. Heftes und pag. 96. — Kircher, Hildesheim, 576. — G. Kühlewein, Umſchlag 3. Heft und pag. 96. — C. Kühne, Altona, 480. — Koop, Göttingen, 144. — Lehmann, 144. — G. Liebig Sohn. 480. 528. 576. — J. Linden, Brüſſel, 192. — H. Mette, Quedlinburg, 192. — J. Rüpnell, Altona, 144. — F. Schlegel, 144. — J. Sieckmann, 528. — P. Smith & Co., Hamburg. 96. 144. — Tube, Umſchlag 8. Heft. — Villain, Erfurt, 96. — Ziegler & Brämer, Stralſund, 96.

V. Verzeichniß der Pflanzen,
welche in dieſem Bande beſchrieben oder beſprochen ſind.

	Seite
Acer polymorphum palmatum atropurpureum	169
Aconitum Napellus	94
Aerides testaceum	510
„ Wrightianum	510
Aesculus californica	126
„ livida	307
Aeschynanthus cordifolius	507
Agave Jacquiniana	167
„ lurida	167
„ maculosa	307
Allium chloranthum	404
„ Lallemantii	404
Alstroemeria argenteo-vittata	165
Anchusa tinctoria	324
Anemone thalictroides	478

	Seite
Angraecum monodon	58
„ sesquipedale	865
Aphelandra tenuiflora	406
Apteranthes Gussoniana	70
Arachnothria rosea	150
Aralia spinosa	1
Areca Banksii	510
„ Nenga	170
„ pumila	170
„ Sapida	510
Argyrophanes Behrii	340
Arisema ringens	104
Arum hederaceum	70
„ ringens	164
„ triphyllum	164
Asterostelma asperum	69
Aucuba himalaica	165
Azalea ind. Alexander H.	36
„ Gloire de Belgique	262
„ Etendarde de Flandre	262
„ le Géant	262
„ magnifica	368
„ Van Houttei fl. pl.	261
Bambusae spec.	244
Bazyleophyta Frederici Augusti	70
Batatas edulis	85
Begonia amabilis	149
„ argentea	149
„ Charles Wagner	557
„ Leopoldii	307
„ picta	258
„ Queen Victoria	368
„ Victoria	149
„ xanthina Lasuli	303
„ „ pictifolia	258
Beloperone violacea	150
Berberis Hookeri	308
„ Jamesonii	257
Betula alba	430
Bifrenaria leucorhoda	54
Bignonia tulipifera	259
Billbergia Liboniana	71
„ macrocalyx	306
Bolbophyllum umbellatum β Bergemanni	405
Bouvardia Oviana	164
Brachychiton Bidwilli	508
Brassavola Cebolleta	55
Bromelia Commeliniana	257

	Seite
Brunavigia Josephinae	526
Burlingtonia venusta	72
Cacalia bicolor	367
Calathea fasciata	369
„ micans	405
Calceolaria Pavoni	2
Calla Dracontium	70
„ pertusa	70
Callicarpa purpurea	170 . 304
Callirhoea pedata	10
Calycophyllum tubulosum	308
Camellia jap. Amelia Benucci	511
„ Archiduchesse Marie	511
„ Baronesse Colli	512
„ Bella Toscana	375
„ Bonomiana	261
„ Boromeo	229
„ Calypso nova	230
„ Carolina Franzini	512
„ Comte de Flandre	38
„ compacta alba	568
„ Comtesse du Hainaut	230
„ Conte di Soranzo	512
„ Cosmopolitana	568
„ Duc de Caraman	375
„ Duca di Genova	511
„ Duchesse de Brabant	231
„ Dupont de l'Eure	511
„ Ernata Visconti	511
„ Ettore Fieramosca	230
„ Federici	568
„ Fortune's yellow	562
„ Gaspara Stampa	376
„ Geri	376
„ Giovanni Rostan	376
„ Gloria del Verbano	229
„ gracilis miniata	39
„ grand Tamerlan	39
„ Humboldtii	40
„ imbricata Guicciardini	512
„ Laura	49
„ La Speranza	230
„ Luisa Bussola	376
„ Marchese Garbaroni	40
„ Martha (Buist)	510
„ Mistriss Cope	39
„ myrtiflora elegans	375
„ Paolina Maggi	511
„ perfecta (Chelmer)	38

	Seite
Camellia jap. Pietro Corsini	39
" Pirzio secondo	567
" Prince de Salerno	568
" Polinto	39
" Prince Eugène Napoléon	512
" Princesse Frédéric William	169
" " des Asturias	38
" Rose la Reine	511
" Rosamunda	376
" Scipione l'Africano	567
" Sofia Chisrugi	510
" Spineo var. rosea	568
" Storeyii	511
" Trackir	568
" tricolor nova (Mathot)	40
" " plenissima	512
" Triomphe de Lombardie	230
" Ugo Foscolo	230
" Vincento Carducci	231
" Virgine Calubini	229
" Virgine de Colle Beato	36
" Vittoria Pisani	231
Campanumaea javanica	163
Catteya Isabella	559
" marginata	165
" Pinelli	165
" pumila β major	165
Ceanothus Veitchianus	370
Centradenia grandiflora	150
Cereus lumbricoides	509
Chamaebates foliolosa	505
Chelone centranthifolia	556
Cheirostemon platanoides	508
Chelidonium japonum	71
" uniflorum	71
Chrysanthemum carinatum v. pictum	261
" indicum	76
" tricolor	261
Clianthus Dampieri	415
Cochliostema odoratissimum	557
Codonopsis javanica	163
Coelogyne cristata	170
Columnea rotundifolia	365
" scandens	365
" speciosa	365
Cordyline indivisa	559
" longifolia	168
" violascens	404
Cornus mascula	343
Correa Backhousiana	406
Corylus Colurna	335
Cuphea ocymoides	150
Cupressus disticha	125
Cyanophyllum magnificum	43
Cycas revoluta	238
Cymbidium eburneum	370
" giganteum	473
" hirsutum	556
" iridioides	473
Cytisus genistoides	406
Dasylirium Hartwegianum	168
Datura chlorantha pl. fl.	371
" metelloides	164
" Wrightii	437
Delphinium elatum fl. pl. var.	171
" Pompon de Tirlemot	171
Dendrobium albosanguineum	507
" cremenatum	55
" heterostigma	51
" secundum	55
" thyrsodes	51
Dendromecon rigidum	508
Dianthus caryophyllus Souvenir de Malmaison	37
" Verschaffeltii	558
Dioscorea Batatas 44	80
Diplacus glatinosus grandiflora	339
Dipteracanthus calvescens	259
Doryanthes excelsa	186
Dracontium pertusum	70
Drosera cirrhosa	529
" phoenicea	530
" stolonifera 6	529
" Wittakerii 6	529
Elaeagnus ferruginea	7
Epacris miniata splendens	166
Epidendrum bahiense	53
" bifidum	52
" glumaceum	58
" prismatocarpum	57
" Sceptrum	59
Epigynium leucobotrys	358
Eria eburnea	56
Erica cerinthoides coronata	72
Escallonia pterocladon	339
Eugenia Ugni	45
Evelyna Caravata	556

	Seite
Evelyna lepida	56. 556
Ferdinanda eminens	2
Fieldia australis	70
Fragaria Grayana	124
„ lucida	28
Fuchsia simplicicaulis	167 . 368
Garcinia Mangostana	288
Gesneria Douglasii v. verticillata	306
„ purpurea	306
Gireoudia Ottoniana	166
Gladiolus Arlequin	37
„ Gandavensis var.	37
„ Madame Pelé	37
„ Vesta	37
Goldfussia Thomsoni	365
Grevillea alpestris helianthemifol.	368
„ alpina	368
„ Dallachiana	368
Gynerium argenteum	3
Gynura bicolor	367
Hexacentris coccinea	369
Hibiscus radiatus fl. purp.	168
Hodgsonia heteroclita	71
Howardia caracasensis	308
Hoya macrophylla	170
Hunnemannia fumariaefolia	9
Hypericum aegyptiacum	486
„ Uralum	4
Jambosa Korthalsi	305
„ lanceolata	305
Imantophyllum miniatum	287
Iochroma coccinea	71
Iridorchis gigantea	473
Ismelia versicolor	261
Juanulloa eximia	260
Juniperus Bregeoni	404
„ caesia	404
Koeleria multiflora	404
Laelia Casperiana	556
„ irrorata	57
„ maxima	556
„ purpurata	59
Lapageria rosea	477
Larix Griffithii	164
Lechenaultia biloba Huntsii	72
Leopoldina Pissaba	381
Lindenia rivalis	150
Linum decoloratum	308
„ hirsutum	308
„ piliferum	308
„ pubescens β Sibthorpianum	308
Liquidambar Altingiana	74
Lisianthus carinatus	260
Livistona chinensis	187
„ humilis	307
Lobelia trigonocaulis	70
Lockhartia verrucosa	53
Lomaria coriacea	366
„ eriopus	366
Lychnis Haageana	166
Lycopersicum pyriforme	486
Lygodium polystachyum	506
Macodes Petola	68
Magnolia Campbellii	171
„ grandiflora	45
Maranta noctiflora	405
„ Porteana	151
Maxillaria cylindrobulba	405
„ pentura	55
„ plebeja	57
„ venusta	58
Melastoma asperum	69
Momordica cochinchinensis	557
„ mixta	557
Monochaetum ensiferum	507
Monstera Adansoni	70
Mormodes histrio	54
Murica cochinchinensis	557
Muscari latifolium	177
Myosotidium nobile	509
Naegelia amabilis	5
Nepenthes ampullaria	302
Nolana paradoxa violacea	261
Oetomeria graminifolia	405
„ petulans	59
Odontoglossum laeve	504
„ Lindleyanum	54
„ maxillare	257
„ nebulosum	257
„ Reichenheimii	504
Oncidium armillare	73
„ dichromaticum	53
„ pentecostale	50

	Seite
Oncidium varicosum	58
Osbeckia aspera	69
Paeonia Mout. Gloire de Belges	35
„ „ Souvenir de Gand	35
Papyrus Antiquorum	8
Paulownia imperialis	142
Pentapterygium serpens	168
Pentstemon acuminatus	388
„ attenuatus	391
„ baccharifolius	392
„ barbatus	392
„ breviflorus	392
„ campanulatus	390
„ centranthifolius 389	556
„ Cobaea	390
„ confertus	391
„ cordifolius	425
„ deustus	391
„ diffusus	392
„ Digitalis	390
„ Douglasii	388
„ erianthera	389
„ Fendleri	424
„ gentianoides	388
„ giganteus	388
„ gracilis	390
„ Hartwegii	389
„ heterandrum	425
„ heterophyllus	392
„ microphyllus	424
„ miniatus	389
„ Murrayanus	388
„ ovatus	391
„ perfoliatus	390
„ procerus	391
„ pruinosus	391
„ pubescens	390
„ Richardsoni	392
„ Scouleri	387
„ speciosus	388
„ spectabilis	424
„ staticefolius	392
„ Torreyi	389
„ triphyllus	392
„ venustus	392
„ Wrightii	389
Phalaenopsis violacea	73
Phlox Triumphe de Twickel	87
Phyllocactus anguliger	168
Pilocarpus pennatifolius	558
Pinanga Nenga	170
Pinckneya ionantha	303
Pinus pumila	404
Plectocomia assamica	259
Pleurothallis foetens	52
„ Hoffmannseggiana	53
Pothos argyraea	505
Pteris argyraea	505
Ranunculus numerosus	473
Rhipsalis sarmentacea	509
Rhododendron Brookeanum	36
„ Clowesianum	304
„ Fortunei	559
„ hybrid. max. Othello	169
„ Kendrickii v. latifol.	507
„ Nuttallii	367
„ Shepherdii	370
„ Smithii	366
„ Wilsonii	307
Rhodoleia Teysmanni	72
Richardia albo-maculata	555
Robinia pseudoacacia pyramidalis	188
Rosa Fortuneana	340
„ Imperatrice Eugénie	557
Saccolabium trichromum	51
Sanseviera Angolensis	260
„ cylindrica	260
Selaginella atroviridis	506
„ Lobbi	506
Senecio Farfugium	3
„ Petasites	2
Sequoia Wellingtonia 12. 478	575
Serapias Caravata	556
Sobralia Caravata	556
Solanum capsicastrum	36
Sonerilla margaritacea 44.	258
„ „ superba	44
Spathodea campanulata	259
„ tulipifera	259
Spergula pilifera	335
Spiraea Reevesiana fl. pl.	338
„ sorbifol. ♂ Lindleyana	437
Spraguea umbellata 506	556
Stackhousia monogyna	259
Stangeria paradoxa	366

	Seite
Stapelia europaea	70
„ Gussoniana	70
Stephanophysum Baikiei	303
Strelitzia Nicolai	405
Syringa chinensis	336
Tachiadenus carinatus	260
Thalictrum anemonoides	473
Theophrasta imperialis	188
Thunbergia coccinea	369
„ pendula	369
Torenia pulcherrima . . . 165	257
Tradescantia odoratissima	557
Trichosanthes grandiflora	71
„ heteroclita	71
Trigonidium turbinatum	52
Tropaeolum aduncum	220
„ albiflorum	221
„ azureum	221
„ Benthii	222
„ bicolor	218
„ brachyceras	223
„ brasiliense	220
„ Bridgesii	223
„ ciliatum	223
„ cirrhipes	221
„ crenatiflorum	221
„ Deckerianum	218
„ digitatum	219
„ edule	222
„ elegans	221
„ Fintelmanni	219
„ Haynianum	218
„ Hookerianum	224
„ leptophyllum	224
„ Lobbianum	217
„ majus	220
„ minus	220
„ Moritzianum	217
„ Morreanum	219
Tropaeolum orthoceras	218
„ oxalianthum	222
„ pendulum	219
„ polyphyllum	223
„ rhomboideum	221
„ sessilifolium	222
„ Smithii	218
„ speciosum	223
„ tricolor	222
„ tuberosum	220
„ umbellatum	219
„ Wagenerianum	218
Tulipa biflora	78
„ cornuta	250
„ spec. pl.	155
Tydaea hybrida plur.	169
Uroskinneria spectabilis	249
Urostigma atrovirens	406
„ benghalense v. cordifol.	406
„ magnificum . . 369	405
„ simile	405
Vaccinium serpens	168
Vanda Cathcarti	37
„ parviflora	510
„ Stangeana	38
Vanilla lutescens	304
Viburnum macrophyllum	35
Victoria regia	385
Viola adorata	45
Voyria uniflora	6
Vriesia psittacina var. rubro punctata	302
Wellingtonia gigantea 12. 478	575
Xanthorrhea hastilis	4
Yucca aspera	404
Zalacca assamica	259

VI. Namen-Liste

derjenigen Autoren, a) welche Original-Aufsätze geliefert, und b) deren Schriften in Auszügen oder Uebersetzungen gegeben wurden.

	Seite
b. A. B.	569
a. A constant Reader	471
a. Appun, C. F., Reisender	418
a. Arnoldi, H.	138
a. Ausfeld, J. G.	529
a. Borchers, Hofgartenmeister	109

Seite

a. Clauſſen, C., Gärtner . . . 59. 269
a. Deegen, Th., Handelsgärtner . . 25
a. Dochnahl, F. J. 418
a. Döhring & Sohn, Handelsg. . 300
a. Ein Freund der Gartenzeitung . 198
a. G. 515
b. Göppert, Geh. Med.-Rath, Prof. Dr. 308 . 351
a. Gulden, Gärtner 531
a. H. M. 420
a. Hannemann, Inſtitutsg. 151. 443. 490
b. Heicke, Gartenmeiſter 408
b. Helmholdt, Dr. 478
a. Homeyer, W. L. 415
a. Immiſch 515
a. Jühlke, F., Gartenſpector . . 8
a. Klatt, W. 74. 176. 189. 211. 212. 342 371. 386. 424. 538
a. Kramer, Franz, Gärtner 30
b. Landerer, Dr. 45. 46. 94. 331. 332 338. 384. 524. 525
a. Lottré, P., Hofgärtner 11
b. Martins, Ch. 371
b. Mohr, Med.-Rath Dr. 568
b. Naudin, Profeſſor . . . 173 . 177
a. Nelkenfreund 438

Seite

a. Otto, C., Gartenſpector 1 4 35 38 40. 44. 49. 69. 89. 92 134. 139. 145 149. 163. 179. 184. 186, 187. 188 189 233 242 244. 249. 257. 265 287. 292. 302. 310. 312. 330. 335 336. 337. 338 349. 359. 364. 365 385. 398. 406. 422. 429. 430. 431 433 436 472. 475. 476. 477. 481 504. 522. 523
a. und b. Palandt, H. W. . 102. 479
a. Reichenbach, Prof. Dr., H. G. 51. 67
b. Roeſe, H., Hofgärtner 173. 177. 294
b. Ruprecht, Dr. 251
a. Samuel, Paſtor 102
a. v. Schlechtendal, Prof. Dr. 154. 181
a. Schnittſpahn, Gartendirector 124. 125
a. Schroeter, L., Handelsg. . 445. 448
a. Schübeler, Ch. Fr. 450
a. Seemann, Dr., Berth. 12. 316. 562
a. Sinning, W., Gartenſpector . 80
a. Sporleder 86
a. v. Spreckelſen, Th., Handelsg. 25. 500
a. Stange, F. F., Obergärtner 65. 97. 127
a. Teichert, O., Obergärtner 195. 482
b. Teysmann, Gartenſpector . . 74
a. Wach, C. 272
a. Wallis, G., Naturforſcher . . . 394

Correspondenz-Notizen.

Seite 48. 239. 288. 384. 432. 480. 576.

Berichtigungen.

Seite 48 . 144 . 528.

Einige Pflanzen,

welche sich als Einzelexemplare zur Zierde auf Rasenplätzen verwenden lassen.

Rasenplätze gehören bekanntlich zu den unentbehrlichsten Bestandtheilen einer jeden Gartenanlage, sie sind für Anlagen von landschaftlichen Gärten eine Hauptbedingung und für die kleinsten Hausgärten zierender als manches Blumenbeet, aber auch jede Strauch-Gruppe, jedes Blumen-Bosquet, ohne von einer Rasenfläche umgeben zu sein, macht bei weitem nicht den Eindruck, als wenn sich solche Gruppen auf Rasenplätzen befinden.

Bei einer früheren Gelegenheit empfahlen wir in diesen Blättern den Lesern eine ziemlich große Anzahl Staudengewächse, die sich durch große, auffällige Blattformen oder durch ihren Habitus überhaupt, wie durch ihre Blüthen auszeichnen und sich besonders zur Verzierung der Rasenplätze empfehlen. Diesmal wollen wir den Pflanzenfreunden einige Gewächse namhaft machen, die sich besonders durch ihre Blattformen auszeichnen und als einzeln stehende Exemplare auf Rasenplätzen eine schöne Wirkung hervorbringen. Da die nachfolgend genannten Arten meist den wärmeren, selbst tropischen Himmelsstrichen angehören, mithin bei uns nicht während des Winters im Freien aushalten, so ist es nothwendig die Exemplare vor Eintritt des Frostes herauszunehmen und in Töpfe zu pflanzen, wenn man sie zu überwintern beabsichtigt. Die meisten der im Frühjahr ausgepflanzten derartigen Gewächse erreichen jedoch eine sehr bedeutende Größe und nur selten hat man Gelegenheit sie dann für den Winter unterzubringen. Um nun die Arten nicht zu verlieren, wenn man keine Vermehrung davon besitzt, macht man am besten im Monat August Stecklinge davon, die noch bis Herbst sich leicht bewurzeln und mit Leichtigkeit sich überwintern lassen, um im Frühjahre wieder ausgepflanzt werden zu können. Hat man hinlänglich Gelaß die alten Pflanzen zu überwintern, so pflanze man sie vor Eintritt des Frostes in angemessene Töpfe. Zur Ueberwinterung bedürfen diese Gewächse ein warmes oder auch nur halb warmes Gewächshaus, in dem man ihnen einen hellen und luftigen Standort geben muß, denn die meistens nicht ausgereiften jungen Zweige stocken bei anhaltender trüber und feuchter Witterung sehr leicht ab, und da die Pflanzen selbst noch keine neuen Wurzeln gemacht haben, so treiben sie sehr schwer neue Triebe und Blätter und gehen im Laufe des Winters nicht selten ganz ein.

Die sich zu dem oben genannten Zweck mit Vortheil zu verwenden lassenden Gewächse sind etwa folgende:

Aralia spinosa L., fälschlich unter dem Namen **A. japonica** in den Gärten verbreitet. In No. 43 der Wochenschrift setzt Herr Pro-

fessor Koch ausführlich den Unterschied zwischen der A. spinosa L. und japonica Thbg. auseinander. Letztere Art ist noch sehr selten, obgleich sie bereits 1838 durch von Siebold eingeführt wurde, ging sie dennoch wohl wieder verloren und erst in neuester Zeit wurde sie wieder eingeführt. Sie hat mit der Aralia spinosa wenig Aehnlichkeit, denn die Blätter sind keineswegs mehrfach zusammengesetzt, wie bei der A. spinosa, sondern handförmig getheilt. Diese gleichen daher mehr den Paratropien und Gastonien. Die A. spinosa L. hat sehr große mehrfach zusammengesetzte Blätter, die oft eine Länge von 3 – 4 Fuß erreichen. Ihr Wachsthum ist ungemein schnell, im Frühjahr auf guten, nahrhaften Boden ausgepflanzte kaum 1 Fuß hohe Exemplare erreichten in einem Sommer eine Höhe von 5—6 Fuß und waren von unten auf mit ihren herrlichen Blättern bedeckt. Diese Prachtpflanze sollte in keinem Garten fehlen, denn sie ist eine große Zierde sowohl auf Rabatten als auf Rasen. Unter einer guten trocknen Bedeckung überwintert diese Art auch im Freien, obgleich in den meisten Fällen der Stamm bis auf die Erde abfault, was jedoch nicht hindert, daß der Wurzelstock mit erneuter Kraft von unten austreibt und häufig sich dann mehr als ein Stengel bildet.

Calceolaria Pavoni Benth. empfiehlt sich durch ihre hübschen großen Blätter sehr als Einzelpflanze auf Rasen und nicht selten bringt sie auch im Herbste ihre hübschen großen, hellgelben Blüthen zur Schau. Gegen Herbst pflanzt man die Exemplare ein, die sich dann leicht überwintern lassen.

Ferdinanda eminens Lay. Im Jahre 1848 erzogen wir im hiesigen botanischen Garten diese Prachtpflanze aus Samen, und da sie schon in ihrer Jugend einen starken Wachsthum verrieth und sehr große Blätter zu machen schien, so wurden einige Exemplare im Frühjahr 1849 ins Freie gepflanzt, wo diese bis zum Herbste eine Höhe von 18 Fuß erreichten und die größten Blätter einen Durchmesser von 1½ Fuß hatten. Herr Hofgärtner Selle aus Potsdam, der sich im Herbste 1849 zum Besuche hier befand, wurde von der Schönheit dieser noch unbenannten Pflanze so eingenommen, daß er die hier vorhandenen jungen Exemplare derselben kaufte und mit nach Potsdam nahm. Bei unserer Anwesenheit in Potsdam im Sommer 1850 sahen wir junge Stecklingspflanzen dieser Pflanze in Blüthe und erfuhren, daß sie eine Polymnie sein soll, und so wurde sie später als Polymnia eminens von hier abgegeben. Später beschrieben Koch und Bouché diese Pflanze im Appendix zum Samen-Verzeichnisse des botanischen Gartens zu Berlin als Cosmophyllum cacaliaefolium und nach genauerer Untersuchung hat Professor Koch jetzt gefunden, daß es die Ferdinanda eminens Lay. sei und ist sie auch unter diesem Namen in Nr. 23 Tab. I der Berliner Allgem. Gartenzeitung abgebildet. Auf Rasen wie auf Rabatten nimmt sich diese Pflanze ungemein vortheilhaft aus und verdient weit mehr verwandt zu werden. Gleich dieser Art dürften auch die anderen Arten dieser Gattung, wie die der Gattungen Polymnia und Schistocarpha zu verwenden sein.

Senecio Petasites DC., S. Ghiesbrechtii Mart., S. Cineraria DC. und andere baumartige Arten sind sehr zierend als Einzelpflanzen, sie erreichen gewöhnlich nur eine Höhe von einigen Fuß

Senecio Farfugium K. Koch (**Farfugium grande Lindl.**) die allbekannte Neuheit, ist vielleicht zierender im Freien auf Rasen als im Topfe. Diese soviel besprochene und oft angepriesene Pflanze findet trotz ihrer hübschen buntgefleckten Blätter doch nur sehr getheilten Beifall unter den Pflanzenfreunden. In mehreren Exemplaren beisammen oder als Einfassung einer grünen Blattpflanzengruppe dürfte sie einen guten Effekt machen.

Gynerium argentium N. ab E., das berühmte Pampasgras, kommt mit vollem Rechte immer mehr in Aufnahme, es ist nur zu bedauern, daß dieses Ziergras bei uns nur selten gut durchwintert. In vorigem Jahre hat es, namentlich in England, an vielen Orten sehr reichlich geblüht. In hiesiger Gegend blühte es im Garten der Herren James Booth & Söhne, jedoch nur mit wenigen Rispen. Nach den Berichten in englischen Gartenschriften haben einzelne Exemplare sehr reich geblüht, so z. B. erzeugte eine Pflanze auf Torfboden 35, eine andere 27 Blüthenrispen von 10—12 Fuß Höhe. In einem andern Garten hatte eine Pflanze 50 Rispen. Zu bemerken ist, daß die Blüthenrispen mit männlichen Blüthen nur unansehnlich sind, während aber die mit weiblichen Blüthen das so schöne silberglänzende Aussehen haben. Die männlichen Blüthenrispen sind dagegen schmutzig braun, und wer daher das Unglück hatte, ein männliches Exemplar in Blüthe zu erhalten, fand sich in seinen Erwartungen sehr getäuscht.

Solanum. Die Gattung Solanum hat eine Menge von Arten aufzuweisen, die sich zur Decoration auf Rasenplätzen eignen, so z. B. S. Quitense H. B. K., S. discolor, laciniatum Ait., vernicatum, Hall. hyporrhodium A. Br., marginatum L. u. a. mehr. Die meisten erreichen nur eine geringe Höhe, machen aber mit ihren meistens stark gefarmten und auch mehr oder wenig bunt schillernden Blättern einen schönen Effekt.

Nicotiana hat ebenfalls mehrere Arten aufzuweisen, die sich als Einzelpflanzen mit Vortheil verwenden lassen, schon mehrere einjährige Arten sind zu empfehlen, namentlich die Varietäten von N. Tabaccum L. Besonders schön aber ist die schon früher von uns erwähnte neue Nicotiana wigandioides K. Koch, deren prachtvolle Blätter eine bedeutende Größe erreichen. Auch N. glauca Grah. empfiehlt sich als baumartige Tabacksstaude mit ihren zwar nur kleinen, aber glänzend grünen Blättern sehr vortheilhaft.

Abutilon venosum Hort., A. insigne Planch., strictum Lind. u. a. sind hübsche Pflanzen einzeln auf Rasen, sie verlangen, um einen üppigen Wachsthum zu zeigen, recht guten Boden.

Papyrus antiquorum oder **Cyperus Papyrus** macht sich ganz vorzüglich auf Rasen, namentlich, wenn irgend möglich, an feuchten Stellen.

Wir könnten noch eine Menge von tropischen Gewächsen namhaft machen, wie Aroideen, Begonien, Ficus, Scitamineen etc., allein die Arten dieser Familien oder Gattungen gedeihen nicht überall gleich gut und muß es jedem Pflanzenfreund überlassen bleiben, mit zarteren Gewächsen Versuche anzustellen. Cannaceen, Scitamineen und Aroideen eignen sich besser zu Gruppen als zu Einzelpflanzen, weshalb wir auch sie nicht speciell aufführten, wie es überhaupt nur unsere Absicht

war, einige wenige aber wirklich zu empfehlende Pflanzen zur Verzierung auf Rasenplätzen zu nennen.

Bemerkungen
über schön oder selten blühende Pflanzen,
welche im botanischen Garten zu Hamburg geblüht haben.

Hypericum Uralum Don. prodr. fl. nep. 218. Ein sehr niedliche empfehlenswerther Strauch aus Nepal, den Koch zur Gattung Norysca Spach, N. Urala, gebracht hat (Koch Hortus Dendrologicus pag. 66) Ob aber das als Synonym hinzugezogene Hyp. oblongifolium Choi wirklich synonym ist, scheint uns noch zweifelhaft, wenigstens ist di Pflanze welche wir unter diesem Namen aus England erhalten haben sehr verschieden von dem H. Uralum.

Hypericum Uralum bildet einen kleinen aufrechten, verästelten Strauch von 1—3 Fuß Höhe, Stengel rund, bedeckt mit einer braunen Rinde, Zweige oder Aeste zahlreich, ausgebreitet, die jüngern purpurn. Blätter oval oder länglich, gegenüberstehend, ausgebreitet, sitzend, stachelspitzig, weich, grün auf beiden Flächen, glänzend, auf der oberen 1 oder mehrere Zoll lang und meist ½ – 1 Zoll breit, Blüthenstengel cylindrisch 1blumig, 3 oder 5 zusammen an den Endspitzen der Zweige, unterstützt mit einer oder mehreren lanzettlichen, zugespitzten Bracteen, Blume gr goldgelb, 2 Zoll im Durchm. Kelchblätter oval, ganz, oben abgerun Blumenblätter fast kreisrund, stumpf an der Basis, zweimal so lang als der Kelch. Staubfäden zahlreich, fast so lang als die Blumenblätter Griffel fünf, kürzer als die Staubfäden.

Dr. Francis Hamilton entdeckte diese zierliche Art in Nep später wurde sie auch von Wallich's Sammler gefunden. Der Na Uralum ist abgeleitet von Urala Swa, unter welcher Bezeichnung d Pflanze bei den Nawars oder Urbewohnern in Nepal bekannt ist. D Wort Swa bedeutet Blume.

Dieser kleine Strauch dürfte wahrscheinlich, wenigstens unter leic Bedeckung, bei uns aushalten. Wir erhielten denselben unter dem g unrichtigen Namen Hypericum nepaulense, welches eine Staude ist.

Xanthorrhoea hastile Br. zu den eigenthümlichsten Pflanzenfor gehören die Gummi- oder auch Gummi-Gras-Bäume Australiens, denen jedoch nur wenige Arten sich in den botanischen Gärten vorfi Der hiesige botanische Garten besitzt nur die hier angeführte Art, die Laufe des Sommers zur Blüthe gelangt war und sich auch schon im Bo Magazin Vol. 79, Tab. 4722 abgebildet befindet (Siehe Hambu Gartenztg. IX, p. 401.) Die schönste Art dieser Gattung soll die

arborea sein, die einen hohen meist sich verästelnden Stamm bildet. Alle Arten liefern einen Gummiharz, das, wenn auf Kohlenfeuer erwärmt, einen Wohlgeruch verbreitet, ähnlich wie Tolubalsam und Benzoin und zum Räuchern in den Katholischen Kirchen in Australien gebraucht werden soll. X. hastile liefert einen gelben Harz. Diese Art wurde nach London bereits 1803 in England eingeführt, ging jedoch bald wieder verloren, bis sie durch spätere Einführungen ersetzt wurde. Unsere Pflanze ist bis jetzt noch ohne Stamm über der Erde, die Blätter sind 3 bis 4 Fuß lang, linien-pfriemförmig, etwas zurückgekrümmt spitzig auslaufend, scharf anzufühlen; der Blüthensaft erhob sich an unserer Pflanze nur 2 Fuß hoch, während er im Vaterlande 18 bis 20 Fuß hoch werden soll, er ist ganz grade, fest, an der Spitze einen 9 Zoll bis 1 Fuß langen Blüthen-Kolben tragend, dieser ist cylindrisch, stumpf, kürzer als der Schaft und besteht aus einer Menge schuppenartiger linienförmiger, an der Spitze sich erweiternder Bracteen, dicht mit einem braunen Flaum überzogen. Die Blumen sind zwischen den Bracteen, spiralförmig um die Achse gruppirt, sitzend, klein.

Die Vermehrung der Pflanze geschieht durch Samen oder vielleicht auch durch Stecklinge, da sich unsere Pflanze nach Erzeugung des Blüthenschaftes zu theilen scheint. Zum Gedeihen der Xanthorrhoea Arten ist ein Kalthaus erforderlich, obgleich sie auch während des Sommers sehr gut im Freien stehen können. Ein schwerer nahrhafter Boden sagt ihnen am besten zu.

Naegelia amabilis Dcne. Wir erwähnten diese hübsche Pflanze schon früher einmal unter dem Namen Achimenes amabilis nach der Abbildung in der flore des serres Tab. 1092 (Hamb. Gartenztg. XIII, S. 410.) Die Naegelia zebrina, mit ihren herrlichen sammtartigen, dunkel braunen Blättern und roth und gelben Blumen war bisher die einzige Art, der von Regel aufgestellten Gattung Naegelia (früher Gesneria), zu der nun noch die Naegelia cinnabarina und die hier genannte N. amabilis hinzugekommen ist, welche durch Van Houtte aus Mexico eingeführt wurde. Sie steht im Habitus der N. zebrina nahe, zeichnet sich aber sehr vortheilhaft durch die rein weißen, im Schlunde gelben Blüthen und die einfarbigen weichhaarigen filzigen Blätter aus. Die Blumen stehen in einer reichblüthigen, pyramidalen, aufrechten Traube, haben einen breiten, flachen Saum mit abgerundeten Lappen. Kultur und Vermehrung wie bei N. zebrina.

Drosera, Sonnenthau.

Zu den niedlichsten, zierlichsten und interessantesten Gewächsen gehören die verschiedenen Arten der Gattung Drosera. Wer kennt nicht die in Deutschland wildwachsenden Dr. rotundifolia, longifolia und anglica, bei denen die Ränder ihrer Blätter mit gestielten Drüsen besetzt sind, was auch bei allen ausländischen Arten der Fall ist. Viele Arten sind nur einjährig, andere perennirend und kleine Knollen habend; einige dieser sind stengellos, andere stengeltreibend, bei vielen stehen die Blätter rosettenartig, bei anderen einzeln zerstreut oder zu dreien am Stengel.

Die Blüthen sind meist weiß, hellrosa oder violett gefärbt und öffnen sich gewöhnlich nur auf kurze Zeit, gegen Mittag an sonnenhellen Tagen. Außer den einheimischen Arten, die sich auch für während des Sommers in Töpfen kultiviren lassen, dürften nur wenige Arten in den Gärten zu finden sein. Der botanische Garten zu Hamburg hatte das Glück in vorigem Jahre durch direkten Verkehr die Wurzelknöllchen zweier Arten aus Neuholland zu erhalten, die bald nach ihrer Einführung nicht nur anwuchsen und austrieben, sondern auch Blüthen erzeugten, so daß sie bestimmt werden konnten. Es sind:

1) **Drosera stolonifera** Endl. (D. porrecta Lehm.) Der Stengel wird 4—6 Zoll hoch, die Blätter sind halbkreisrund, gestielt. Die kleinen Blüthen stehen in endständigen Rispen, sie sind röthlich weiß. Aus den Knollen bilden sich oft Ausläufer, die dann in einiger Entfernung von der Mutterpflanze aus der Erde kommen. Nach Dr. Preiss kommt diese Art in schattigen, sandigen Gegenden bei der Halbinsel Perth in Australien vor, namentlich beim Berge Eiza.

2. **Drosera Wittakerii** Planch. Eine wunderniedliche Art, stengellos, die Blätter in Rosetten beisammen stehend. Dieselben sind spatelförmig-eirund und ihre Ränder mit großen röthlichen Drüsen dicht besetzt. Der nur 2—3 Zoll lange Blüthenstengel trägt 1—2 große weiße Blumen. Auch diese Art trägt Knollen und stammt wie die vorige aus Neuholland, woselbst sie bei Port Philipp vorkommt.

Planchon führt in seiner Monographie der Droseraceen (Sur la famille des Droseracées par M. J. E. Planchon, Annales des Sciences natur. IX, pag. 79) achtundachtzig Arten auf, und ist die D. Wittakerii eine neue, vorher nicht beschriebene gewesene Art.

Da beide hier angeführte Arten Knollen tragen, so ist wohl anzunehmen, daß sie sich erhalten werden. Als wir die Knöllchen erhielten, (Ende Mai d. J.) waren diese ganz zusammengeschrumpft, trieben dann, nachdem sie eingepflanzt, sehr bald Blätter und bereits im Juli zeigten sie die ersten Blumen, die sie unaufhörlich bis jetzt (Anfang November) hervorbrachten. Die Pflanzen stehen in Töpfen in einer leichten Erdmischung aus gleichen Theilen Laub-, Haide- und Rasenerde und um die Erde beständig gleichmäßig feucht zu erhalten, stehen die Töpfe in Untersetznäpfen. Während des ganzen Sommers befanden sich die Pflanzen in einem kalten, jedem Luftzug und der Sonne ausgesetzten Kasten, wo sie vortrefflich gediehen. — Jedenfalls werden sie nach einiger Zeit absterben und dann einige Monate der Ruhe bedürfen. —

Voyria uniflora Lam. In De Candolle's Prodromus IX., p. 83 sind 13 Arten dieser Pflanzengattung beschrieben, aber es gehört gewiß zu den Seltenheiten, daß eine dieser Arten in von Gärten lebend in Blüthe gesehen worden ist. Der Gattung Voyria Aubl. (Leiphaimos Schlecht. et Cham.) gehört zu den Gentianaceen, deren Arten parasitisch auf alten Baumstämmen des tropischen Amerikas, namentlich in Guiana, Mexico, auf den westindischen Inseln wachsen u. Unsere Pflanze erschien urplötzlich an einem Baumfarn, der im Jahre 1846 von Venezuela direct hierher eingeführt worden ist. Das Pflänzchen

wird 4—9 Zoll lang, hat einen einfachen Stengel und trägt (wie mehrere Arten) am obern Ende eine Blume. Die schuppenartigen Blätter sind eirund, wechselständig, der Kelch ist fünftheilig, die Blumenkrone nankingelb, 1 Zoll lang, am obern und untern Ende etwas eingeschnürt, trichterförmig, die Einschnitte sind eirund, spitz, das Ovarium gestielt. Staubfäden 5, in der Blumenkrone eingefügt.

Unser Pflänzchen bemerkten wir Anfangs September, ob noch mehrere zum Vorschein kommen werden, muß die Zeit lehren, Wurzelrudimente sind an dem Stamme des Baumfarrn nicht zu finden.

Nach De Candolle kommt diese Art in den feuchten Wäldern von Cuba, Martinique, S. Vincent, in Guiana auf dem Serra May nach Schomburgk vor, in Brasilien bei Tocaya nach Schott. Beschrieben ist die Pflanze auch als Gentiana aphylla Jacq., Exacum aphyllum Willd., Lisa aphylla Dietr. u. Voyra aphyllum Pers.

Der Name uniflora ist jedenfalls unglücklich gewählt, indem auch die Arten V. nuda, flavescens, tenuiflora und tenella einblumig sind.

Elaeagnus ferruginea A. Rich.

In dem vor einiger Zeit erschienenen XIV. Bande von De Candolle's Prodromus sind 27 Arten von Elaeagnus beschrieben, von denen 11 jedoch noch nicht genügend genug untersucht worden sind. — Diese letzteren sind größtentheils japanesische Arten, die bei uns auch wohl schwerlich im Freien aushalten dürften. Die übrigen bekannten Arten stammen aus Canada, dem südlichen Europa (Spanien, Griechenland), von der Insel Ceylon, Java, Nepal, China und andern Theilen Ostindiens und sind es nur die aus dem südlichen Europa und Nordamerika stammenden Arten, die unsere Winter im freien Lande ertragen und unseren Anpflanzungen, in Folge ihrer meistentheils hübschen silbergrauen, glänzenden Blätter zur Zierde gereichen, wie z. B. Elaeagnus argentea Pursh., hortensis Marsch. nebst den Varietäten α. angustifolia, β. songarica Bhdri. u. γ. orientalis. —

Elaeagnus ferruginea erhielt der hiesige bot. Garten vor mehreren Jahren unter der Bezeichnung E. japonica. Die Pflanze bildet einen etwa 5 Fuß hohen Strauch, die Zweige sind stachellos, die Rinde der jüngeren sind mit rostbraunen Schülfern überkleidet oder grau bestäubt. Die Blätter sind 3—4 Zoll lang, 2 Zoll breit, am obern und untern Ende mehr oder weniger kurz oder lang zugespitzt, die Oberseite ist glatt, glänzend dunkelsaftgrün, die Unterseite rostbraun. Die 3/4 Zoll langen Blüthen sind achselständig und erscheinen zu 3—4, sie sind ebenfalls mit hellen silberbraunen Schülfern bedeckt. Das Vaterland dieser Art ist Java. — Es ist ein sehr zu empfehlender Strauch, der mit seinen oberhalb glänzend grünen, unterhalb rostfarbenen Blättern einen hübschen Effekt macht. Die älteren, 6—8 Jahr alten, 4 Fuß hohen Exemplaren haben noch nicht geblüht, während junge, kaum 1/2 Fuß hohe Pflänzchen in diesem Herbste (October) sehr dankbar blühten. Im Freien hält diese Art nicht aus, jedoch genügt ein frostfreier Ort zur Ueberwinterung derselben.

Beiträge
zur Kultur der schönblühenden Stauden.

Vom Garten-Inspektor F. Jühlke, Firma: Carl Appelius in Erfurt.

Die Vorliebe für Stauden-Sammlungen ist bei den Handelsgärtnern vielleicht deshalb so selten, weil zu ihrer Kultur nicht bloß sehr viel Zeit, Sorgfalt und Mühe erforderlich ist, sondern hauptsächlich auch wohl deshalb, weil der daraus zu ziehende materielle Gewinn nicht immer im Verhältniß steht zu der räumlichen Ausdehnung der Garten-Quartiere, die offenbar dazu erforderlich ist, wenn ihre Kultur wirklich Freude gewähren soll. Dazu kommt noch, daß die Liebhaberei für seltene und schöne Stauden nicht Jedermanns Sache ist, weil sich gar viele seltene Arten nicht zu jener effektvollen Gruppirung eignen, wodurch sich für größere Anlagen, die ganz gewöhnliche Sorten aus der Gruppe der Ritterspornen (Delphinium), Carthäuser-Nelken (Dianthus), Glockenblumen (Campanula), Flammenblumen (Phlox), Rhabarber (Rheum), ꝛc. unentbehrlich machen, weil diese letzteren mit einer geringeren Sorgfalt in der Pflege vorlieb nehmen. Dadurch, daß wir den Stauden besondere Quartiere einräumen, kann erst eine vollkommene Kultur ermöglicht werden, welche letztere uns dann den Anblick jener zahllosen Menge von schönen Arten verschafft, die wir in unsere deutschen Gärten sonst nie zu sehen bekommen würden.

Ob die Stauden nun als Alpenpflanzen ihre Blüthen frei entwickeln, oder ob sie als Pflanzen der Ebene mit dem Aroma der wärmeren Zone oder mit dem Salz des Meeresstrandes oder mit den elementaren reinen Farben des Hochgebirges gesättigt sein mögen; überall ist der Duft, die Farbe und Form nur aus den Bedingungen ihres Vaterlandes und dieses aus jenen zu erklären. Die große Mannigfaltigkeit der Blumen, die durch Kreuzung alljährlich entsteht, und die in der Hauptsache den Handelsgärtnern ihren Ursprung verdankt, würde ohne die Bestrebung der Kultur gar nicht existiren. Eine vollkommene Kultur ist deshalb auch als das erste und wichtigste Beförderungsmittel für die Natur einer jeden Pflanze zu bezeichnen, wenn sich diese in ihrer vollendeten Schönheit repräsentiren soll. Die Georginen, Rosen, Pensées ꝛc. beweisen dies sehr laut und offenkundig, nicht zu gedenken der vielen Kultur-Producte, die zum nothwendigen Lebensunterhalt der Menschen dienen und die dem Gartenbau ihren Ursprung verdanken.

Das Streben nach dem Neuen im Gebiete des Pflanzenreiches ist dem Gärtner eigenthümlich und wir dürfen diese Lichtseite in der höheren Gärtnerei als einen wesentlich integrirenden Theil derselben bezeichnen, die sich nur dann verdunkelt, wenn die Erfolge hinter den angeregten Hoffnungen auf ihre verbesserte Nützlichkeit oder auf ihren größeren Schönheitswerth ausbleiben. Dieses letztere gilt besonders auch von den schönblühenden Stauden, die gewissermaßen ein Mittelglied zwischen den grünen Rasenflächen und den Baum- und Strauchgruppen

des Gartens bilden, welchen letzteren offenbar noch mit einer weit größeren Artenzahl von Stauden, als die oben genannten, durch die Umkantung mit denselben, ein weit höherer Grad von Schönheit verliehen werden kann, vorausgesetzt, daß ihnen auch hier, wie auf den für sie bestimmten besonderen Quartieren, die kulturlichen Bedingungen zu ihrem vollkommenen Gedeihen gewährt werden.

Bei der Uebernahme der hiesigen Gärtnerei hat mir mein Vorgänger, Herr Carl Appelius, in seiner wirklich sehr reichen Stauden-Sammlung ein Vermächtniß hinterlassen, welches zu pflegen und zu vervollkommnen eine um so angenehmere Pflicht für mich bildet, als die Kultur derselben von jeher zu meinen Lieblingsneigungen gehörte, indem ich ihnen stets ein besonderes Quartier einräumte, wenn auch meine Sammlung viel weniger reichhaltig wie die hiesige war. Bei der in ihrer einzig dastehenden Reichhaltigkeit der hiesigen Sammlung die in Privatgärten wohl schwerlich ihres Gleichen in Deutschland finden dürfte, will ich deßhalb unter dem obigen Titel von Zeit zu Zeit Mittheilungen über solche schönblühenden Stauden in diesen Blättern machen, die sich entweder durch Neuheit auszeichnen, oder ihrer Schönheit wegen eine Verbreitung verdienen, oder die vor vielen Jahren irgendwo einmal cometenartig auftauchten und dann wieder verschwanden. Für diese letzteren hoffe ich durch eine solche Besprechung der Vergangenheit bei den Blumenfreunden auf eine neue Theilnahme und Verbreitung, wobei mir die decorativen und schönblühenden Eigenschaften vorläufig höher, als die wissenschaftlichen stehen. Zunächst habe ich es hier nur mit zwei Pflanzen zu thun, die ich in der Blüthe beobachtete und für welche ich diesmal die Aufmerksamkeit der verehrlichen Leser dieser Blätter mir in Anspruch zu nehmen erlaube.

1. **Hunnemannia fumariaefolia Sweet.** Erdrauchblättrige Hunnemannie (Papaveraceae). Die hübsche Staude ist bereits vor 22 Jahren durch Hrn. Carl Appelius verbreitet, indem in dessen Verzeichnissen aus jener Zeit Samen davon offerirt wurde. Trotzdem aber, daß nun diese Staude wirklich schön blüht und bei richtiger Behandlung 5—6 Jahre ausdauert, hat dieselbe doch nur eine sehr geringe Verbreitung gefunden. Der Same der Hunnemannia wird Anfangs April in Töpfe gesäet; die Pflanzen werden mit der vierten Blattentwicklung behufsam und einzeln in kleine Töpfe pikirt und im Mai zur Bordirung von Herbstflorbeeten in zweifüßiger Entfernung ins Freie versetzt, wo sie mit Salvien etc. gleichzeitig und bis zum Eintritt des Frostes blühen. Die September-Aussaaten werden im November pikirt, im kalten Hause durchwintert und im Frühling zur Anpflanzung verwendet. Die Blüthezeit dieser Aussaat dauert länger und liefern solche Pflanzen auch schon im ersten Sommer guten keimfähigen Samen.

Die Hunnemannia treibt 2—2½ Fuß hohe Blüthenstiele, die sich mit einer goldgelben Blume krönen, welche letztere eine ziemlich tiefe schalenförmige Krone bildet und durch ihre leuchtende Farbe und Größe sehr bemerkenswerth ist. In einer kräftigen, nahrhaften Gartenerde gedeiht die Pflanze sehr üppig. Obgleich diese schönblühende Staude den kälteren Theilen von Mexico angehört, so verlangt sie in unserm Klima zum Schutz vor Winterkälte eine sorgfältige Bedeckung.

(Anmerkung der Redact. Wir, wie gewiß viele Pflanzenfreunde sind Herrn Jühlke sehr dankbar für die Notiz über die Verwendung der Hunnemannia fumariaefolia. Aus Pietät für unsern verstorbenen Freund Herrn Hunnemann suchten wir diese niedliche Pflanze sehr häufig anzuziehen und da sie aus Mexico stammt; haben wir nie gewagt sie im Freien zu überwintern, auch hatten wir nie geahnt, daß sie selbst im Freien während des Sommers freudig gedeihen könnte, da sie uns immer als eine sehr zärtliche Pflanze geschildert worden ist. Die Pflanze scheint wie viele Papaveraceen nur zweijährig zu sein, es ist daher jedenfalls am besten, den Samen gegen Ende des Sommers zu säen, wo dann die Pflanzen gewiß im nächsten Jahre blühen. Pflanzen im Frühjahr erzogen, blühen selten und in den meisten Fällen gehen diese im nächsten Winter in Folge zu großer Feuchtigkeit wieder ein.)

2. Callirhoe pedata Nutt. (Nuttallia pedata Hook.) Fußförmige Callirhoe (Malvaceae.)

Aus dem wenig verzweigten und mit einer Pfahlwurzel versehenen Wurzelstock erhebt sich ein 3—3½ Fuß hoher Stengel, der sich von unten nach oben pyramidalisch verästelt und von fußförmigen, dreitheiligen Stengelblättern begleitet wird. Die nahe an 8 bis 10 Zoll langen Blüthenstiele bedecken die Pflanzen mit ihren glänzend carmoisinrothen Blüthen pyramidenförmig von unten bis oben und ist der einfache Kelch derselben in der Mitte mit einem ½ Zoll breiten, blendend weißen Ringe umgeben.

Diese reichblühende Staude war bereits vor 20 Jahren in mehreren belgischen Gärten (besonders auch im botanischen Garten zu Lüttich) vielfach verbreitet; sie gehört aber jetzt dort so wohl wie in Deutschland wieder zu den Seltenheiten trotz ihren wirklich schönen decorativen Eigenschaften und ihrer leichten Kultur. Der Same wird entweder im April in einen kalten Kasten oder auf den Umschlag eines Mißbeetes gesäet; die Pflanzen werden mit der vierten Blattentwickelung einzeln pikirt — wodurch der Wurzelstock zu größerer Saugwurzelbildung veranlaßt wird — um später an ihren Bestimmungsort versetzt zu werden.

Die fußförmige Callirhoe verlangt fast mit den Malven eine gleiche Behandlung und giebt für die höheren Sorten von Malven, wenn diese letzteren in besonderen Gruppen zusammen gepflanzt werden, — welche Methode ich ihrer effectvollen Wirkung in Parkanlagen nicht dringend genug empfehlen kann — eine herrliche Einfassung, indem dann die Dichtigkeit der Blatt-, Stengel- und Blüthenbildung von der Callirhoe, die etwa entblätterten Blüthenstielen der Malven deckt und einen eben so seltenen, als blüthenreichen Anblick gewährt. Die September Aussaaten gerathen ebenfalls sehr leicht, wenn die jungen Pflanzen wie die Hunnemannien behandelt und durchwintert werden.

Die Callirhoe stammt aus Arkansas in Nordamerika und verlangt bei uns eine Bedeckung im Winter; sie gedeiht in jedem kräftigen Gartenboden und wird am besten durch Aussaat vermehrt.

Zur Rosenkultur.

Obgleich dieser Kulturzweig schon erschöpfend genug behandelt worden ist, so erlaube ich mir doch in dieser Gartenzeitschrift einige Erfahrungen hierüber zu veröffentlichen, indem ich der Meinung bin, daß dieselben von andern Rosenzüchtern, so viel mir bekannt, noch nicht gemacht worden sind und daher Vielen willkommen sein möchten.

Ich schließe Letzteres daraus, weil ich selbst vor einiger Zeit Zeuge der schmerzlichen Empfindungen eines Kollegen und tüchtigen Rosenkultivateurs war, welcher eine Menge mit schwerem Gelde aus sehr weiter Ferne bezogener Rosen beim Auspacken vertrocknet fand und als nicht mehr lebensfähig und unbrauchbar weggeworfen hatte.

Nach Lesung dieser Zeilen dürfte Letzteres nicht mehr vorkommen.

Da nun wieder eine große Vorliebe für Rosen, besonders für neue Prachtsorten herrscht, welche oft weit versandt werden, so wird es wohl auch jetzt noch vorkommen, daß Rosenstöcke bei einem weiten Transport durch Trockenheit gelitten haben. Auch kann es vorkommen, daß die Kronen durch Einbruch nach einiger Zeit vertrocknen. Vielen wird es nun erfreulich sein, zu erfahren, daß solche vertrocknete Rosen nicht todt, sondern nur scheintodt sind und ganz sicher wieder ins Leben gerufen und zum Wachsen gebracht werden können. Ich spreche hier aus eigner Erfahrung.

So habe ich vor mehreren Jahren auf einer Stelle, wo im April wurzelechte Rosen abgeladen und eingepflanzt wurden, nach zwei Monaten einen Rosenstock gefunden, der zu pflanzen vergessen worden und nun ganz vertrocknet war. Ich steckte nun denselben an einem schattigen Orte ins Wasser, wo er nach ungefähr sechs Wochen anfing zu grünen und neue weiße Würzelchen zu machen, worauf ich ihn einpflanzte und tüchtig anschlemmte, darnach wuchs derselbe auch freudig fort.

Ein anderer Fall kam dieses Jahr (1858) bei mir vor. Im Juli brach der Wind die Krone einer hochstämmigen Remontant-Rose ab, welche drei Wochen in der Luft lag und ganz vertrocknet war. Ich steckte nun die ganze große Krone (es blühten an ihr 30—40 Blumen) im Schatten ganz unters Wasser, worin dieselbe drei volle Wochen liegen blieb, bis die verschrumpften Zweige wieder voll und aufgequollen waren. Dann schnitt ich alle Triebe, nicht allein das junge sondern auch das zwei- und dreijährige Holz in Stücke, und steckte sie in ein kaltes Mistbeet, wo sie fast alle so freudig wuchsen, daß selbst von frisch abgeschnittenen und sofort gesteckten Trieben ein besseres Gelingen kaum zu erwarten war. Die Klage vieler Gärtner, daß die Remontant-Rosen so schwer wachsen, dürfte nun durch eine der obigen Verfahrungsart ähnliche Behandlung, beseitigt werden.

Darüber habe ich in einer Generalversammlung des hiesigen Gärtner-Vereins im October v. J. Mittheilung gemacht und als Beweis den Vereinsmitgliedern bewurzelte Stecklinge der oben erwähnten verunglückten hochstämmigen Remontant-Rose vertheilt.

Bemerken muß ich noch, daß das dreijährige Holz mitunter eher Wurzeln machte, als das einjährige. Es ist anzunehmen, daß die Steck-

linge von Roſen, wenn dieſe abgetrocknet und durch Waſſer wieder aufgeſchwollen ſind, ein neues und kräftigeres Leben erhalten und vielen böſen Einflüſſen beſſer widerſtehen, als Stecklinge von friſchen in vollem Safte ſtehenden Trieben.

Es wäre nun noch nachzuweiſen, warum dies ſo iſt. Ich ſchließe jedoch hiermit, um dieſen Artikel nicht zu weit auszudehnen.

Möchten die hier mitgetheilten Erfahrungen nun ſo manchem Verluſte an Roſen vorbeugen.

Schloß Reiſen. P. Lottré,
Fürſtl. Sulkowski'ſcher Hofgärtner.

Der Mammuth-Baum Ober-Californiens (Sequoia Wellingtonia, Seem. *)

Als beim Friedensſchluſſe des Mexikaniſchen Krieges Ober-Californien den Vereinigten Staaten von Nordamerika abgetreten war, ver-

---

*) Ueber die Sequoia Wellingtonia hat Herr Dr. Berthold Seemann in der Bonplandia VI, Nr. 19 eine Zuſammenſtellung deſſen, was über dieſen Baum bekannt iſt, veröffentlicht und da dieſer Baum ein ſo allgemeines Intereſſe gewährt, ſo dürfte dieſe vollſtändige Zuſammenſtellung unſern Leſern nicht unwillkommen ſein und zugleich die vielen irrigen Anſichten berichtigen, welche über dieſe Rieſenpflanze nicht allein in volksthümlichen, ſondern auch wiſſenſchaftlichen Schriften leider Eingang gefunden haben. Wir ſtehen deshalb nicht an, dieſe mit ſehr großer Mühe gearbeitete Zuſammenſtellung unſern Leſern mitzutheilen. Der Güte des Herrn Dr. Seemann verdanken wir auch den dieſem Aufſatze beigegebenen Holzſchnitt des Mammuth-Baumes.

Außer den vom Verfaſſer ſelbſt gemachten Beobachtungen benutzte derſelbe dazu folgende Quellen:

American Journal of Science and Arts (Second Series) XVII. p. 440; XVIII. p. 150, 286; XX. p. 281; XXIV. p. 440.

Bonplandia II. p. 238; III. p. 27.

Botanical Magazine t. 4777, 4778 (1854).

Bulletin de la Soc. Botan. de France I. p. 72 (1854.)

Flore des Serres et des Jardins IX. p. 93 t. 892, 893, p. 121 t. 903.

Gardener's Chronicle for 1853, p. 1819, 823; for 1854 p. 22, 40, 118, 134, 373; for 1855 p. 7. 69, 83, 838; for 1856 p. 260, 502, 518, 534, 567, 580, 631, 643, 694, 726, 742, 774, 790, 805; for 1857 p. 517, 534, 550, 629, 643, 678.

Hamburger Garten- und Blumenzeitung X. p. 61, 189, 239, 423, 439; XI. p. 120; XII. p. 235, 489; XIII. p. 93, 158.

Hooker's Journal of Botany and Kew Gard. Misc. VII. p. 26; VIII. p. 106, 150.

Mammoth Tree from California by George L. Trask. M. A. 4to. 4 p. (Zwei Brochüren, welche dem beſuchenden Publikum, als die Rinde des Mammuth-Baumes in den Philharmonic Rooms und der Adelaide Gallery zu London ausgeſtellt war, übergeben wurden, und viele Auszüge aus New-Yorker und Londoner Zeitungen in Betreff des Baumes enthalten.)

Report on the Botany of Whipple's Expedition. By John Torrey p. 84 (140). Washington 1857.

breitete sich eine Kunde, die, wie durch Zauberschlag, einsame Urwälder in lebhafte Bergwerks-Gegenden verwandelte. Das neuerlangte Land, so hieß es, strotze von Gold, und sei das so lang gesuchte El Dorado. Abenteurer aus allen Theilen der Welt durchzogen bald ganz Californien und manche Thäler und Schluchten, niemals vom Fuße des Weißen betreten, wurden in der Hoffnung besucht, dort eine ergiebige Gold-Erndte zu finden. Schilderungen der wunderbarsten Entdeckungen füllten nun jede Zeitung, die freilich sich in manchen Fällen als erdichtet ergaben, in anderen jedoch den schlagendsten Beweis lieferten: nüchterne Thatsachen übertreffen oft die kühnsten Phantasiegemälde. Doch wie so oft, ward Dichtung mit Wahrheit, Wahrheit mit Dichtung verwechselt. Unter den Nachrichten, welche letzteres Schicksal traf, war die, daß ein kühner Californier, der weiter in die Sierra Nevada, gegen die Quellen der Stanislaus- und San Antonia-Flüsse zu gedrungen war, einen Wald angetroffen, dessen Bäume die höchsten Gebäude der Erde, wenn nicht geradezu überragten, doch an Höhe mit ihnen um den Rang stritten. So wenig wurde dies jedoch geglaubt, daß selbst der Name des Entdeckers unbekannt ist, wenn wir nicht den des J. M. Wooster annehmen, welchen uns eine Californische Ueberlieferung bezeichnet, die dadurch eine gewisse Bestätigung erhält, daß an der Rinde eines, jetzt vom Volke „Herkules“ genannten Baumes, die Inschrift: „J. M. Wooster, Jn. 1850“ sich vorfindet. Bald nachher ward dieser merkwürdige Ort, der fortan nach den Riesenbäumen den Namen „Mammuth-Hain“ erhielt, von Verschiedenen besucht und die Richtigkeit der verworfenen Nachricht über jeden Zweifel erhoben. Fremde von allen Theilen des Landes strömten jetzt herbei, machten den Ort zu einem der besuchtesten Californiens, und bestimmten Herrn Wm. W. Lapham, schon im Juli 1858 ein Gasthaus einzurichten, so bequem, wie es nur die Natur des Landes zulassen wollte. Um etwa dieselbe Zeit besuchte auch Herr William Lobb, der botanische Sammler der Handelsgärtner Veitch in Exeter und Chelsea, den Hain, und verfehlte nicht, Blätter, Zapfen und Proben des Holzes, so wie eine Skizze eines der Riesenbäume (von Herrn W. W. Lapham entworfen, und im beiliegenden Holzschnitte wiedergegeben) an sich bringen. Dieses Material, nach England übersandt, ward Dr. Lindley übergeben, welcher darin eine neue Coniferen-Gattung zu erkennen glaubte, der er zum Andenken an den Herzog von Wellington und in Erwägung des riesenhaften Baues der Bäume, den Namen Wellingtonia gigantea gab.

Zur Zeit, als die ersten wissenschaftlichen Berichte über diese Pflanze veröffentlicht wurden, glaubte man, der Baum könne möglicher Weise mit einem von dem unglücklichen Douglas in einem seiner Briefe an Sir William J. Hooker (Botan. Mag. Comp. II. p. 150) beschriebenen Taxodium, das den Bergen Californiens ein finsteres Aussehn verleihen und die Höhe von 300 Fuß *) erreichen sollte, identisch sein. Douglas hatte nämlich mit seiner Beschreibung keine Exemplare eingeschickt; aber einen unfruchtbaren Zweig von Pinus (Abies) bracteata, Don. hielt W. J. Hooker für einen Theil der er-

*) Hier, wie im ganzen Artikel ist englisches Maaß angegeben. B. S.

wähnten Pflanze und bildete ihn auch in seinen Icones Plantarum t. 379 als Taxodium sempervirens ab. Dieser Fehler ward später von dem Urheber selbst berichtigt, unglücklicher Weise jedoch nicht bevor Endlicher (Synopsis Coniferarum p. 198) eine neue Art Sequoia (S. gigantea, Endl.) auf diese Abbildung gegründet hatte, zu welcher er Douglas' Beschreibung citirte. Das Verweisen von Hooker's Abbildung an die richtige Art (nämlich Pinus (Abies) bracteata, Don) machte es wieder fraglich, zu welcher Pflanze Douglas Beschreibung zu ziehen sei, und rechtfertigte gewissermaßen die Vermuthung Lindley's und Anderer, daß sie möglicherweise dem neuentdeckten Mammuth-Baume angehöre. Diese Vermuthung hat sich jedoch nicht bestätigt. Indem Douglas sagt: „Die größte Schönheit der californischen Pflanzenwelt macht eine Taxodium-Art aus, welche den Bergen ein höchst eigenthümliches, ich möchte fast sagen, schreckliches Ansehn verleiht, — etwas, das uns deutlich zeigt, wir seien nicht in Europa," — bezieht sich unzweifelhaft auf eine verbreitete Pflanze, wie es das Redwood (Taxodium oder jetzt Sequoia sempervirens, in den Bergen Ober-Californiens ist; er kann unmöglich den Mammuth-Baum meinen, da dieser, wenn er auch nicht auf den nach ihm benannten Hain beschränkt, wenigstens sehr local ist. Wir besitzen außerdem noch einen historischen Beweis, daß Douglas Beschreibung sich nur auf das Redwood (Sequoia sempervirens, Endl.) beziehen kann. W. Lobb, der sich mit der von Douglas verfolgten Route als genau bekannt zeigt, hat (Gardener's Chronicle für 1854 p. 22) nachgewiesen, daß der kühne Reisende dem Mammuth-Haine nicht bis auf 120 engl. Meilen nahe kam, und in anderen Orten, wo der Baum bis jetzt entdeckt ist, besitzt er nicht die von Douglas angegebene Höhe. Wir dürfen daher wohl annehmen, Douglas habe die Mammuth-Bäume nicht gesehn, und diese Monstra der Pflanzenwelt seien bis zum Jahre 1850 den Europäern gänzlich unbekannt gewesen.

Der Gattungsname „Wellingtonia" ward in den Vereinigten Staaten mit keinem besonderen Beifall aufgenommen; die Amerikaner würden sich mehr gefreut haben, wenn der Vater ihrer großen Republik, Georg Washington, in der Nomenclatur desselben verherrlicht worden wäre, und sie fingen auch wirklich in ihren Zeitungen eine Agitation gegen die Annahme des Namens „Wellingtonia" an, ganz vergessend, daß die Gelehrten ihres Landes demselben Codex wissenschaftlicher Gesetze sich beugen, welcher die Handlungsweise ihrer Collegen in Europa bestimmt, und daß kein noch so stürmischer Anlauf von Seiten des Volks das hier im Spiele seiende Prioritätsrecht aufheben könne. Als daher Dr. Winslow seine Landsleute in pomphafter Weise aufforderte, den Mammuth-Baum, falls er ein Taxodium sei, T. Washingtonianum, falls er aber eine neue Gattung bilde, Washingtonia Californica zu nennen, that er nur der ganzen Welt kund, daß er durchaus nichts von den Gesetzen wisse, welche Systematiker anerkennen. Die Gattung Wellingtonia würde von diesen und ähnlichen Angriffen nichts gelitten haben, wenn sie sonst nur fest begründet gewesen wäre. Das war jedoch nicht der Fall. Nachdem vollständigere Exemplare, als 1853 Lindley zu Gebote standen, verbreitet wurden, stellte sich heraus, daß der Mammuth-Baum (Wellingtonia gigantea, Lindl.) dieselben generischen Charaktere besitze, als das Redwood (Sequoia semper-

rens, Endl.) und daß folglich die Wellingtonie bloß als eine zweite Art von Sequoia angesehen werden müsse. So weit mir bekannt, haben nur drei Botaniker die Unhaltbarkeit der Gattung Wellingtonia im Druck vertreten, Torrey, Decaisne und ich. Torrey scheint einer der Ersten gewesen zu sein, welche Exemplare des Baumes empfingen, und zu der Ueberzeugung, eine neue Art von Sequoia vor sich zu haben, gelangte. Aber er enthielt sich dieselbe zu veröffentlichen; auch machte er sie nach der Publication von Wellingtonia nicht allgemein bekannt, theilte sie jedoch verschiedenen seiner Freunde, unter ihnen Asa Gray mit, und es war der Letztere, welcher zuerst in dem „American Journal of Science and Arts (II. Series) Vol. XVIII. p. 286 anzeigte, Torrey habe den Mammuth-Baum mit dem Namen: Sequoia gigantea belegt, während Torrey selbst der Amerikanischen Association zur Förderung der Wissenschaft mündlich die gleiche Mittheilung machte. Diese Bemerkung ist hier um so nothwendiger einzuschalten, da Torrey in dem Report on the Botany of Whipple's Expedition (Washington, 1857) p. 84 (140) sich auf einen Aufsatz über den Gegenstand aus seiner Feder in Silliman's Journal bezieht, was uns glauben machen sollte, der Name sei von ihm dort veröffentlicht; Daß dem nicht so sei, lehrt ein aufmerksames Durchblättern jener Zeitschrift, sowie ein Gespräch, das ich während meines zweiten Besuches in New-York mit Dr. Torrey im Herbst 1857 hatte. Zum ersten Male kommt der Name Sequoia gigantea in Torrey's eigenen Schriften in dem obenerwähnten „Report" vor, wo er sich auf Dr. Bigelow's Bericht (der bis jetzt Europa noch nicht erreicht hat) beziehend, sagt: „Wir haben gezeigt, daß bei diesem Baume die Blätter, wie bei vielen Juniperus-Arten, zweierlei Gestalten tragen; wir haben ebenfalls bewiesen, daß kein generischer Unterschied zwischen den beiden Bäumen (nämlich S. gigantea Torrey und S. sempervirens, Endl. B. S.) besteht. Die männlichen Kätzchen der S. gigantea, die Lindley und Hooker unbekannt waren, erweisen sich in jeder Hinsicht denen von S. sempervirens gleich." — Torreys Ansichten wurden durch Decaisne in einer Mittheilung an die botanische Gesellschaft Frankreichs (Bullet. de la Soc. Bot. de France I. p. 72 (1854) bestätigt. Endlich zeigte ich (Bonplandia III. p. 27. in adnot., Jan. 15, 1855), nach Untersuchung von Exemplaren im Museum zu Kew, sowie von solchen, die in meinen Besitz gelangt waren, daß die Wellingtonie eine Gattungsverwandte von Sequoia sempervirens sei, und änderte den Namen derselben in Sequoia Wellingtonia um.

Die Zeit ist jetzt da, wo es entschieden werden muß, welcher der drei Namen: Wellingtonia gigantea, Sequoia Wellingtonia und S. gigantea anzunehmen sei. Nachdem jeder Zweifel über die generische Identität des Redwood und Mammuth-Baumes gehoben ist, dürften über die Beibehaltung des Namens Wellingtonia gigantea keine zwei Meinungen obwalten; er ist zu beseitigen, und einer der beiden anderen muß an seine Stelle treten. Mein Grund für das Beiseiteschieben des Special-Namens: „gigantea" war, einer möglichen Verwechslung mit jenem sonderbaren Compositum, der Sequoia gigantea von Endlicher, das als Synonym theils zu S. sempervirens Endl., theils zu Pinus (Abies) bracteata Don gehört, vorzubeugen. Torrey nahm auf

dieſe Gefahr keine Rückſicht, und behielt daher Lindley's Special-Namen bei, was unter anderen Umſtänden gewiß der einzig richtige Weg geweſen ſein würde. Auch weiß ich, daß dadurch, daß man ſetzt: S. gigantea Torr. (nec. Endl.!) und S. gigantea Endl. (nec Torr.!) der Gefahr bis zu einem gewiſſen Grade vorgebeugt werden kann, wie es ja in zahlreichen Fällen geſchieht, — und das mein Name (Wellingtonia), ganz abgeſehen davon, daß er bereits vom allgemeinen Publikum angenommen, deßwegen durchaus keine Hoffnung auf Anerkennung haben würde. Allein er genießt außerdem noch die Empfehlung des Prioritäts-Rechtes, denn obgleich Dr. Torrey ohne Zweifel der Erſte war, welcher die wahre ſyſtematiſche Stellung des Mammuth-Baumes erkannte, ſo veröffentlichte er doch den Namen nicht vor 1857, während der von mir gegebene im Januar 1855 publicirt ward. Die Synonymie des Redwood und ſeines Verwandten der Wellingtonie geſtaltet ſich daher folgendermaßen:

Sequoia, Endl.

Endl. Synop. Conif. p. 197. (1847). Gen. Plant. Suppl. IV. Pars II. p. 7. n. 1808 (1847). — Condylocarpus, Salisb. Mss. — Taxodii spec. Lamb.

I. S. sempervirens, Endl. Synop. Conif. p. 198 (1847). — Taxodium sempervirens, Lamb. Pin. Edit II. t. 64. — T. Nutkaense, Lamb. Herb. — T. spec. Dougl. in Bot. Mag. Comp. II. p. 150 (1836). — S. gigantea, Endl. Synop. Conif. p. 150 (1847) nec Torr. exclud. Icon. Hook.! — Nomen vernacul. „Redwood."

II. S. Wellingtonia, Seem. Bonpl. III. p. 27 in adnot. (1855). — Wellingtonia gigantea, Lindl. in Gardn. Chronicle pro 1853. p. 823 (1853). — Hook. Bot. Mag. t. 4777, 4778. (1854). — Van Houtte Flor. des Ser. IX. p. 93. t. 892—893; p. 121 t. 903 (1853—54). — Washingtonia Californica, Winslow in California Farmer pro 1854. Hook. Journ. of Bot. and Kew Misc. VII. p. 29 (1855). — Taxodium Washingtonianum, Winsl. ibid. Hook. l. c. — Sequoia gigantea, Torr. (nec. Endl.!) in Report on Bot. of Wipple's Exped. p. 84 (140). (1857). — Nomina vernacul.: „Mammothtree, Bigtree, Wellingtonie.

Die Wellingtonie hat eine beſchränkte geographiſche Verbreitung. Freilich ſagt Carrière, ein Officier der franzöſiſchen Flotte habe aus einer Gegend etwa 10 Grad nördlich von derjenigen, wo ſie zuerſt entdeckt wurde, Zapfen mitgebracht, die ſich mit denen der Wellingtonie identiſch erwieſen, doch da zwiſchen den Zapfen von S. sempervirens (in jener Gegend ein häufig vorkommender Baum!) und S. Wellingtonia bis jetzt kein ſtichhaltiger Unterſchied nachgewieſen, ſo iſt das Zeugniß verwerflich. Wahrſcheinlicher klingt die Nachricht, der Mammuth-Baum ſei im Carſon Creek, einige Meilen nördlich vom Mammuth-Haine, und ſonſt noch in verſchiedenen anderen Theilen der Sierra Nevada aufgefunden, wo er jedoch nach dem übereinſtimmenden Zeugniß der Berichte keineswegs jene rieſenhaften Dimenſionen beſitzt, welche wir mit ihm verbinden. Seine größte Vollkommenheit erreicht er im



Der Mammuth-Baum Ober-Californiens

(Sequoia Wellingtonia Seem.)

Nach einer Original-Zeichnung des Herrn W. W. Laybam.

Mammuth-Haine, der bei den Quellen der Stanislaus- und San-Antonio-Flüsse, in der Landschaft Calaverals, 38° N. Breite, 120° 10" W. Länge, 4—5000 Fuß über dem Meere, und etwa 15 engl. Meilen von Murphy Camp, der auf der Poststraße nächsten Goldgräberei, 95 von Sacramento City und 85 von Stockton liegt. Wer den Hain besuchen will, findet Wagen und Pferde in Murphy Camp, und begibt sich nach dem Orte seiner Bestimmung auf einer Fahrstraße, die allmählich aufsteigend durch einen prächtigen Wald von Tannen, Cedern und Fichten, und hier und da mit schönen Eichen geschmückt, sich windet. Das Thal, in welchem der Hain liegt, umfaßt etwa 160 Acker Land, und ist, nach Winslow, eine aus grober Kieselerde gebildete Vertiefung, von Sienit umgeben, der an manchen Stellen sich über die Oberfläche erhebt. Das Klima ist prächtig, im Sommer frei von der drückenden Hitze des niedern Landes; die Pflanzendecke bleibt frisch und grün, während das Wasser so rein wie Krystall und fast so kalt wie Eis ist. Die Umgegend, so wird versichert, hat für den Jäger viel Einladendes, da viel Wild vorkommt; die Bäche sind von herrlichen Forellen bevölkert. Angenehme Spazierritte können nach den San Antonio-Fällen, den Basalt-Klippen an den nördlichen Zusammenflüssen des Stanislaus und anderen schönen Stellen und Gegenständen unternommen werden.

Dinge lassen sich am leichtesten durch Vergleichung mit anderen beurtheilen, und was die ungeheuren Verhältnisse unseres Riesen ganz besonders hervortreten läßt, ist der Umstand, daß er in einem Lande wächst, das sich durch seinen hohen Baumwuchs ebenso auszeichnet, als Kentucky und Virginien durch ihre großen Männer. Bateman hat noch speciellere Vergleichungen versucht, und zwar vermittelst einer Reihe von Zeichnungen, welche er in einem, in Congleton gehaltenen Vortrage über den Gegenstand und später in den Gemächern der Gartenbau-Gesellschaft zu London ausstellte. Eine dieser Zeichnungen, nach dem Verhältnisse von 1 zu 20, stellte einen 300 Fuß hohen Mammuth-Baum vor, an den eine Leiter von gewöhnlicher Länge, auf deren Mitte ein Mensch sich befand, angelehnt war; durch Vergleich nahm die Leiter die Dimensionen eines Spazierstöckchens, der Mensch die eines Käfers an. Um die außerordentlichen Verhältnisse noch deutlicher zu erläutern, hatte er Skizzen der höchsten Gebäude unserer Erde anfertigen lassen, der Pyramiden Egyptens, der Peters-Kirche in Rom, der Kathedrale zu Salisbury und der St. Pauls-Kirche zu London. Hierbei stellte es sich heraus, daß der Mammuth-Baum mit der Peters-Kirche um den Rang stritt, und nur eine kurze Strecke hinter den Pyramiden zurückblieb. Im Vergleiche mit anderen Bäumen blieb dem Californischen Riesen ebenfalls der Sieg: die höchste Palme nahm das Aussehn eines Zuckerrohrs, die Tanne das eines Wachholderstrauches an, ja selbst die weitberühmte Ceder des Libanon schien nur ein bloßer Busch zu sein.

Die Angaben der absoluten Höhe der Wellingtonie sind ebenfalls geeignet, uns mit Bewunderung zu erfüllen. Die meisten jetzt noch im Mammuth-Haine stehenden Exemplare sind durchschnittlich 300 Fuß hoch, aber eins von ihnen, als die „Mutter des Waldes" bekannt, und bis zu der Höhe von 116 Fuß der Rinde zu Ausstellungszwecken beraubt, ist in der That 327 Fuß hoch und 90 Fuß im Umfange, oder wenn

wir den Angaben Glauben ſchenken, welche uns die Ausſteller der Rinde in New-York und London mittheilten, ſo beträgt die Höhe 363 Fuß, der Durchmeſſer der Baſis 31 Fuß, und der Durchmeſſer 100 Fuß über der Baſis 15 Fuß. So ungeheuer auch dieſe Verhältniſſe ſein mögen, ſo werden ſie doch noch gleichſam durch die verdunkelt, welche ein anderer Baum beſeſſen haben muß, als er noch in voller Kraft daſtand. Dieſer „Vater des Waldes“, wie man das Exemplar treffend genannt, mißt an der Baſis 112 Fuß im Umfange, und man kann den Stamm bis zu der Höhe von 300 Fuß verfolgen, wo er durch Fallen an einen andern Baum plötzlich abgebrochen iſt: an jener Stelle mißt der Stamm noch 18 Fuß im Durchmeſſer, und nach der durchſchnittlichen Verdünnung der anderen Bäume berechnet, muß dieſer Rieſe etwa 450 Fuß hoch und zweifellos das höchſte Pflanzengebilde gegenwärtiger Schöpfung geweſen ſein. Andere Zapfenbäume erreichen auch oft eine ungeheure Höhe, z. B. das Redwood (300 Fuß) oder Pinus Lambertiana Dougl. (150—200 Fuß und darüber); auch giebt es in Van Diemens Land Eucalyptus-Stämme bis zu 215 Fuß Höhe, doch werden ſie alle überragt von einer ausgewachſenen Wellingtonie. Unwillkührlich fragt man ſich: wie viele Jahre wahren erforderlich, um dieſe Berge von Zellen aufzuthürmen, und wie groß iſt das Alter dieſer Ungeheuer. Als der Mammuth-Baum zuerſt bekannt wurde, ſchätzte man ihn auf 3000 Jahre, oder in der Leitartikel-Sprache von Gardeners' Chronicle: „er muß ein kleines Pflänzchen geweſen ſein, als Simſon die Philiſter erſchlug, Paris die ſchöne Helena entführte und Aeneas ſeinen Vater Anchiſes auf den Schultern davontrug“. — Spätere Forſchungen haben jedoch ergeben, daß dieſe Annahme falſch ſei. Die hier beſprochene Sequoia iſt augenſcheinlich eine raſch wachſende Art, die nach den genauen Beobachtungen von J. Reed in Peterborough, zwiſchen ſechs Uhr Abends und ſechs Uhr Morgens wächſt, und im Wachsthume, je nach der Wärme der Nacht fortſchreitet oder zurückbleibt. Pflanzen, welche aus den Ende, 1853 nach England gebrachten Samen erzogen waren, hatten ſchon in 1857 ſechs Fuß Höhe erreicht, waren alſo alljährlich 1½ Fuß gewachſen. Wenn ſie daher fortführen, in dieſem Verhältniſſe zuzunehmen, ſo würden 200 Jahre erforderlich ſein, um einen Baum 300 Fuß Höhe zu ſchaffen. Aber bekanntlich wachſen Pflanzen nicht ſo gleichförmig, und um das Alter dieſer Bäume zu ermitteln, bleibt kein anderer Weg als Zählung der Jahresringe. Aſa Gray hat in einer der Boſtoner Akademie übergebenen Abhandlung über das Alter der größten bekannten Bäume dies zu thun verſucht, unglücklicher Weiſe aber war ein in Philadelphia ausgeſtellter Stamm, der ihm die Hauptdaten dazu lieferte, nicht der der Wellingtonie, wie zur Zeit geglaubt ward, ſondern der der Sequoia sempervirens *), und es iſt wahrſcheinlich dieſem Irrthum zuzuſchreiben,

*) Indem man wohl beachtet, daß der in Philadelphia ausgeſtellte Stamm der Sequoia sempervirens und nicht der S. Wellingtonia angehörte, läßt ſich A. Gray's Abhandlung, geſäubert von Allem, was durch Verwechslung der beiden Arten entſtanden, noch indirect zur Beſtimmung des fraglichen Alters des Mammuth-Baumes anwenden, und dies habe ich in Folgendem zu thun verſucht: Gray ſagt: — „Die Größe dieſes Rieſen iſt der Art, daß ſie dem Baume ein ſcheinbares Anrecht giebt, als einer der älteſten Bewohner unſeres Erdballs angeſehen zu werden;

daß das wissenschaftliche Publicum noch immer wähnt das ursprünglich dem Baume durch oberflächlichen Ueberschlag zuerkannte Alter von 3000 Jahren sei noch immer als das richtige zu betrachten, dabei ganz übersehend, daß Dr. Torrey die Jahresringe eines vollkommenen Radius eines Stammes der Wellingtonie, über dessen Aechtheit kein Zweifel obwaltete, gezählt, und folgende Data geliefert hat:

---

er ist (nach Angabe des Eigenthümers des ausgestellten Theiles) 322 Fuß hoch. *** Dieser Theil war 25 Fuß hoch über der Wurzel entnommen, und nach Messungen meines Freundes, Herrn Thomas P. James in Philadelphia, ist er (mit Einschluß der Rinde) etwa 12½ Fuß im Durchmesser." Die anderen von jenem Herrn gemessenen Diameter betrugen resp. 9 Fuß 6 Zoll, 10 Fuß 4 Zoll und 10 Fuß 10½ Zoll; der Diameter des Stammes 25 Fuß hoch über der Wurzel beträgt also durchschnittlich etwas mehr als 10 Fuß 3 Zoll. *** Den in Philadelphia ausgestellten Theil Stamm hat man durch Feuer und andere Mittel zu einer 3 oder 4½ Zoll dicken Schale ausgehöhlt; von dieser habe ich durch die Güte des Eigenthümers und des Herrn James ein fast drei Zoll großes Stück erhalten. Was jedoch jetzt noch mangelt, und was ich leider nicht besitze, sind ein oder zwei Fuß der Central-Theile des Baumes, ein Desideratum, das ohne Zweifel später einmal zur Hand kommen wird. Die uns jetzt zu Gebote stehenden Data sind hinreichend, um ein Alter zu bestimmen, das der Baum nicht übersteigen kann, außer wenn man annimmt, er sei während der ersteren $^9/_{10}$ seiner Existenz langsamer gewachsen als in späteren Jahren, was indeß ermittelten Thatsachen hinsichtlich der Bäume im Allgemeinen zuwider ist. Nun aber finden sich in dem in meinen Händen befindlichen Stücke Holz 48 Jahresringe per Zoll. Der Semi-diameter des Stammes, auf der Stelle, wo er gemessen, beträgt ungefähr 5 Fuß 2 Zoll. Wenn daher der Baum im Durchmesser durchweg in demselben Ratio zunahm, so müßten 2976 Jahresringe vorhanden gewesen sein, und demnach, wenn Wir 24 Jahre annehmen, die der Baum brauchte, um die Höhe von 25 Fuß zu erreichen, würde er von der Keimung an 3000 Jahre alt sein. Dies stimmt so genau mit dem von Dr. Lindley (über Squoia Wellingtonia!! B. S.) gemachten Anschlag, daß wir vermuthen dürfen, er habe equivalente Data auf ähnliche Weise benützt. Wie groß ist die Deduction, welche wir in Erwägung der größeren Dicke der Jahresringe an einem jüngeren Baume machen müssen? Meine einzigen directen Daten, welche auf diesen Punkt sich beziehen, entnehme ich einem 3½ Zoll dicken Stücke eines Querdurchschnittes, einer Latte (rail), die, wie der Eigenthümer versicherte, dem Stamme in der Höhe von 275 Fuß über der Wurzel entnommen wurde. Da die Jahresringe bei einer Breite von fast $^7/_8$ eines Zolls nur eine schwache Curvatur zeigen, so muß es einem Theil des Stammes angehören, der noch mehrere Fuß im Durchmesser hält. An diesem Stücke zählt der äußere Zoll (fast ganz Alburnum) 20 Jahresringe; der folgende 60, der dann folgende 45, der andere halbe Zoll 16, was 32 auf den ganzen Zoll beträgt. Daß die äußeren Jahresringe in dieser Höhe schmäler sind, als die mehr an der Basis befindlichen, ist gerade, was man hätte erwarten sollen. Wenn wir dieses Verhältniß des Zunehmens der Zahl der Jahresringe, in jedem Zoll nach innen gehend, auf das 25 Fuß über der Wurzel entnommene Stück anwendeten, so würden 4 Zoll von dem Theil des von mir untersuchten Umfanges nur 17 Jahresringe auf den Zoll haben, die zur durchschnittlichen Breite angenommen, dem Baume nur ein Alter von 1034 + 24 = 1058 Jahren geben würde. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die Breite der Jahresringe so rasch zunimmt. Data, welche wir über andere Bäume besitzen, beweisen, daß im Allgemeinen ein Baum, nachdem er sein 4- oder 500stes Lebensjahr zurückgelegt, seinen Durchmesser in ziemlich gleichförmigem Verhältnisse für jede 20 hinzukommenden Jahre vermehrt, obgleich der Unterschied in der Breite der Jahresringe von irgend zwei oder mehreren, oder ein und demselben Jahresringe an verschiedenen Stellen oft sehr groß ist. Wenn wir jedoch erwägen, wie viel breiter die Jahresringe bei einem kräftigen jungen Baume als bei einem alten sind, so dürften wir vielleicht nicht berechtigt sein, für das ganze Stück mehr als durchschnittlich 17 Jahresringe per Zoll anzunehmen. — Einige brauchbare Thatsachen liefert uns auch ein Baum, der näher als jeder andere mit dem Californiens verwandt ist, wenngleich er einer anderen Gattung angehört, nämlich

Die ersten	100	Jahresringe	waren	17½	Zoll breit.
" zweiten	"	"	"	14	" "
" dritten	"	"	"	12½	" "
" vierten	"	"	"	13	" "
" fünften	"	"	"	16¼	" "
" sechsten	"	"	"	8¾	" "
" siebten	"	"	"	7¾	" "
" achten	"	"	"	11	" "
" neunten	"	"	"	10	" "
" zehnten	"	"	"	11	" "
" elften	"	"	"	11¼	" "

Die übrigen 20 Jahresringe nahmen über 1 Zoll ein. 1120 Jahresringe in den Semidiameter von 135 Zoll, oder 11 Fuß 3 Zoll. Wir haben es gewagt, die Annahme oder den Anschlag, daß dieser Baum 3000 Jahre alt sei, um mehr als ein Drittel zu beschränken. Die Thatsachen beweisen, daß dem Baume fast drei Jahrhunderte fehlen, um nur halb so alt zu sein, als angenommen ward! Seine unheuere Größe ist eher seinem raschen Wachsthum, als einem außergewöhnlichen Alter zuzuschreiben." — Der Mammuth-Baum ist daher, anstatt ein Zeitgenosse jener unhistorischen Personen zu sein, die Homer's unsterbliches Lied verherrlicht, in einer durchaus historischen Zeit, einige Jahrhunderte nach Christi Geburt entsproßt, und außerdem wird er in seinem immerhin hohen Alter von dem des Redwood (Sequoia sempervirens) übertroffen.

Die Lebenszähheit des Baumes hält mit seiner Lebensfähigkeit gleichen Schritt. Ein Exemplar ist bis zur Höhe von 116 Fuß seiner Rinde gänzlich entblößt, und dennoch versichert man es grüne fröhlich weiter. Die meisten anderen im Mammuth-Haine stehenden Exemplare sind durch Waldbrände oder vielleicht durch die angelegten Feuer der Indianer so verbrannt, daß sich in manchen Stämmen förmliche Höhlen gebildet haben, von denen einzelne so groß sind, daß sie einem Reiter zu Pferde den Eintritt gestatten und an 40 Fuß Tiefe besitzen, aber anscheinend ohne dadurch besonders gelitten zu haben. Bei abgestorbenen, umgefallenen Bäumen gewahrt man (durch Alter entstandene?)

---

die sogenannte Cypresse unserer südlichen Staaten (Taxodium distichum, Rich.) Ich besitze 3 Sectionen von verschiedenen Bäumen des Taxodium, die vom Centrum bis auf die Außenseite gehen. Eine derselben, die durchschnittlich einen Radius von 22 Zoll hat, zeigt 670 Jahresringe, eine zweite, bei welcher der Radius 22 Zoll mißt, 534 Jahresringe. Durchschnittlich sind also 576 Jahresringe im Semidiameter von 26 Zoll, oder etwa 22 Jahresringe per Zoll. Die Hälfte dieses Wuchses (13 Zoll Radius) ward beim Schlusse des ersten Jahrhunderts vollendet; während die äußeren Jahresringe des ältesten Exemplars nur den 15. oder 16. Theil eines Zolles breit waren. * * * In Ermangelung anderer Thatsachen dürften wir wohl sicher annehmen, daß, als der in Frage stehende Baum die Größe von 26 Zoll im Semidiameter erreicht hatte, er nur 576 Jahr alt war. Wenn wir deshalb annehmen, er habe nach dem in der Mitte liegenden Verhältnisse von 35 Jahresringen auf den Zoll bei nächsten 26 Zoll, und nach dem wirklichen Verhältnisse des letzten Jahrhunderts (wie wir es mit Augen sehen), nämlich 18 Jahresringe per Zoll, bei den übrigen 10 Zoll, zugenommen, so würden wir ihm 2066 Jahre als sein höchstes Alter zuerkennen. Ich glaube, es wird sich sogar herausstellen, wenn wir erst die fehlenden Thatsachen erlangt haben, daß der Baum nicht aus vorchristlicher Zeit herstammt. [Asa Gray im American Journal of Arts and Science, Second Series, Vol. XVII. p. 440. (1854)].

Höhlungen von 200 Fuß Länge. Der große, von Speculanten gefällte Stamm trieb, nachdem er bereits längere Zeit abgehauen, aus dem alten Holze junge Sprößlinge (siehe Bonpl. II, p. 238). Eine solche, fast weidenartige Lebenszähheit treffen wir nur bei wenigen Coniferen, und darf ihr Vorhandensein mit Recht zu den hervorragendsten Eigenthümlichkeiten der Wellingtonie gezählt werden.

Die großartigen Erfindungen und Entdeckungen unserer Zeit haben schon mehr als einmal den kühnsten Flug dichterischer Phantasie eingeholt. Vermöge des electrischen Telegraphen stehen wir auf dem Punkte, Puck's im Sommernachtstraum gegebenes Versprechen einzulösen:

„— to put a girdle about the earth
In forty minutes",

und unser Riese in Californien ist gewiß mehr als ein Nebenbuhler des von Milton in des Satans Hände als Lanze gegebenen Baumes:

„— to equal which
The tallest pine hewn on Norwegian shores
To be the mast of some great admiral
Were but a wand."

Doch diese Thatsache, die Verwirklichung von so Manchem, was nur als erdacht galt, hat ein Gefühl erzeugt und genährt, mit eigenen Augen zu sehen, was in diese Kategorie gehört. Es gab wohl kaum je eine Zeit, wo die Schaulust verbreiteter war, oder wärmere Vertheidiger fand, als die unsrige. Speculanten waren daher auch nicht unthätig, dieses Gefühl, auf den Mammuth-Baum angewandt, auszubeuten. Große Menschenmassen nach dem Haine selbst hinzuschaffen war unmöglich, aber Theile wenigstens jener Riesenbäume in die Mittelpunkte unserer großen Städte zu bringen, ausführbar. Das Letztere geschah denn auch, und die ersten Berichte über die Wellingtonie, welche Europa erreichten, waren von der betrübenden Nachricht begleitet, ein Vandalen-Act sei in Ober-Californien geschehen, der in unseren aufgeklärten Tagen ganz unerwartet war. Einer der schönsten Bäume des Haines, hieß es, sei gefällt, um öffentlich ausgestellt zu werden. Dieser Baum war an der Basis 96 Fuß im Umfange, und kerngesund. Das Zerstörungswerk begann mit Durchlöcherung des Stammes vermittelst großer Bohrer und durch Zersägen der dazwischen liegenden Stellen, eine Arbeit, die 25 Leute fünf Tage lang beschäftigte. Aber nachdem dieses geschehen, fand man, daß der Baum fast so senkrecht stand, daß er nicht umfallen wollte, und nur durch Anwendung von Keilen und Mauerbrechern gelang es, während eines heftigen Windwehens den Stamm endlich umzuwerfen. Im Fallen wühlte er den Boden auf, trieb die Erde unter sich weg (so daß er jetzt in einer Mulde liegt) und schleuderte Mudde und Steine fast 100 Fuß hoch, wo sie ihre Spur an den benachbarten Bäumen zurückließen. Der abgehauene Stamm dient jetzt als Kegelbahn. Eine 2 Fuß lange Section des Stumpfes, sowie ein Theil der Rinde wurden später ausgestellt. Die letztere hatte man in ihre natürliche Lage wieder zusammengefügt, und sie bildete ein geräumiges, mit Teppich ausgelegtes, ein Pianoforte und Sitze für 40 Personen enthaltendes Zimmer. Bei einer gelegenen Zeit hatte man 140 Kinder ohne Unbequemlichkeit hineingelassen. Die Oberfläche des noch in der Erde stehenden Stumpfes ist eben und bietet hinreichenden Tanz-Raum für

32 Personen; sie ist 75 Fuß im Umfange; theatralische Vorstellungen hat man ebenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten darauf gegeben. Sie ist überdacht und steht durch einen Gang mit dem Gasthause „Zum Mammuth-Baume“ (das von demselben Herrn Layham gegründet ward, dem wir so viele gediegene Mittheilungen über die Wellingtonie verdanken) in Verbindung. Der Erfolg, mit welchem die öffentlichen Ausstellungen dieser Exemplare in San Francisco, Newyork und Paris begleitet gewesen, bestimmten in 1854 einen anderen Speculanten, einen zweiten herrlichen Baum, die „Mutter des Waldes“ genannt, bis zur Höhe von 116 Fuß seiner Rinde zu berauben, glücklicherweise ohne durch dieses barbarische Verfahren das Leben desselben zu gefährden. Fünf Leute arbeiteten 90 Tage daran. Während dieser Zeit fiel einer derselben 100 Fuß hoch von dem Gerüste, aber merkwürdiger Weise ohne sich dabei mehr als eine Gliedmaße zu zerbrechen. Die Rinde wurde in Stücken von 8 Fuß Länge abgeschält, und jedes einzelne Stück verzeichnet und numerirt, so daß es in ebendieselbe Lage, welche es am Stamme selbst einnahm, sich wieder aufstellen ließ. Die Rinde ward dann, nachdem sie 80 engl. Meilen über Land geschafft, den Fluß nach San Francisco hinab, und von dort durch ein kleines Schiff um Kap Horn nach Newyork transportirt, wo sie, nachdem sie im dortigen Krystall-Palaste während einer Saison ausgestellt gewesen, nach London gesandt wurde, und dort zuerst im April 1857 in den Philharmonic Rooms (14, Newmann Street, Oxford Street) und später in der Adelaide Gallerie (Strand) zu sehen war. Da jedoch letztgenannte beiden Säle zu niedrig waren, um das Aufstellen der ganzen Rindenmasse zu erlauben, so ergriffen die Eigenthümer derselben das Anerbieten, sie in dem Krystall-Pallaste zu Sydenham aufzustellen, wo die nöthige Höhe sich vorfand, und seit Herbst 1856 ist sie zu einer Höhe von 116 Fuß dort ausgestellt gewesen. Der innere Raum, welchen sie bildet, ist mit einem Tische, Stühlen und anderm Hausgeräth versehen, und macht ein geräumiges Visitenzimmer aus. Daguerreotypen und Photographien des Baumes und Haines, sowie lebende Pflanzen der Wellingtonie sind ebenfalls zu sehen, und wenn diese Ausstellung einerseits uns mit Bedauren über den Vandalismus dieser Geldmenschen erfüllt, so führt sie andererseits uns ein Beispiel der großartigen Kraft amerikanischer Vegetation vor.

Zu einer Zeit ward gefürchtet, daß nicht viele Jahre hingehen würden, ehe die letzte Spur des Mammuth-Haines verschwunden sein würde. Der „New-York Herald“ war die erste Zeitung, welche am 17. December 1854 sich seiner annahm. „Wir sagen“, schrieb der Herald, „daß es die Pflicht unserer Bundesregierung ist, sich aus dem Grunde dieser Bäume anzunehmen, weil sie auf den Ländereien des Staates Californien sich befanden, und weil der Bund bereits dazwischen getreten ist, um die Live-oak-(Quercus virens) Wälder das Staates Florida vor der Raubsucht gewissenloser Speculanten sicher zu stellen. Wir wiederholen, — fuhr er fort — es ist die Pflicht des Staates Californien, der Bundesregierung und aller guten Bürger, diese Californischen Zeugen der Fähigkeiten unseres amerikanischen Bodens zu schützen und zu erhalten.“ In Europa ward die Gefahr, in welcher die Bäume schwebten, ebenfalls erkannt, und ein Correspondent der

Gardeners' Chronicle schlug sogar eine Gelehrten-Petition an die Amerikanische Regierung vor, um dieses achte Wunder der Welt sicher zu stellen. Glücklicherweise waren die Behörden sich ihrer Pflicht bewußt; sie verboten auf's Strengste das Fortschaffen oder Verletzen irgend eines Baumes, und indem sie so den Schutz des Gesetzes diesem heiligen Haine angedeihen ließen, erhielten sie Amerika eine Sehenswürdigkeit, ebenso großartig wie die natürliche Brücke Virginiens, die Mammuth-Höhle Kentuckys, und die Wasserfälle des Niagara.

Die Zahl der jetzt noch im Mammuth-Haine stehenden Exemplare beläuft sich auf 92, denen fast allen vom Volke romantische oder poetische Namen verliehen worden sind. Es mochte nicht uninteressant sein, einige der vorzüglichsten hier anzuführen. Nachdem wir das Gasthaus verlassen und auf dem oberen Wege in den Wald gedrungen, werden wir sogleich von der Größe der Bäume überrascht, und nachdem wir einigen ungeheuren Exemplaren vorbei gegangen, stehen wir bei der „Bergmanns-Hütte," 80 Fuß im Umfange und 300 Fuß Höhe erreichend. Die „Hütte" oder ausgebrannte Höhle mißt 17 Fuß am Eingange, und hat über 40 Fuß Tiefe. Unsere Wanderung fortsetzend, und das üppige Wachsthum des aus Tannen, Cedern, Ahorn und Haselsträuchern bestehenden Unterholzes bewundernd, gelangen wir zu den „Drei Grazien". Diese prächtigen Bäume scheinen zu wachsen, oder wachsen vielleicht auch aus einer Wurzel, und bilden die schönste Gruppe des Waldes, indem sie neben einander zu der Höhe von 290 Fuß sich erheben, von unten bis oben symmetrisch sich verdünnen, und zusammen den Umfang von 92 Fuß besitzen, während der mittlere Baum sich 200 Fuß hoch erhebt, ehe er sich verästelt. Die „Pionierhütte" nimmt jetzt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch; sie ist 150 Fuß hoch, da die Spitze abgebrochen ist, und 33 Fuß im Durchmesser. Unsern Gang fortsetzend, stoßen wir auf ein ganz verlassenes Wesen, das in der Rinde viele Risse zeigt, und von allen Bäumen des Waldes am schoflichsten aussieht. Dies ist der „Alte Hagestolz"; er ist etwa 300 Fuß und 80 Fuß im Umfange. Der nächste Baum, die „Mutter des Waldes", ist bereits erwähnt worden; sie ward in 1854 theilweise ihrer Rinde durch Speculanten beraubt. Wir befinden uns jetzt mitten in der „Familien-Gruppe" und stehen neben der ausgerissenen Wurzel des „Vaters des Waldes". Der Anblick ist über die Beschreibung großartig und schön. Der ehrwürdige „Vater" hat schon lange sein Haupt in den Staub gesenkt. Doch wie erstaunenswerth sind selbst seine Ruinen! Er mißt an der Basis 112 Fuß im Umfange, und man kann ihn bis zu der Höhe von 300 Fuß verfolgen, wo sein Stamm durch Fallen gegen einen andern Baum abgebrochen ist. Ein leeres Gemach oder besser eine ausgebrannte Höhle geht 200 Fuß lang in den Stamm hinein, und ist groß genug, um einen Reiter zu Pferde den Durchritt zu gestatten. An der Wurzel entspringt eine Quelle. Wenn man auf dem Stamme geht, und ihn von seiner ausgerissenen Wurzel an verfolgt, so kann man die ungeheuren Verhältnisse fassen, während an beiden Seiten sich seine riesigen Söhne und Töchter erheben. Im Weitergehen begegnen wir „Mann und Frau", sich liebend aneinander lehnend; sie sind 60 Fuß im Umfange und 250 Fuß hoch. „Herkules", eins der gigantischsten Exemplare des Waldes, steht an unsern Pfad

gelehnt, ist, wie viele andere Bäume, an der Basis verbrannt, 325 Fuß hoch und 97 im Umfange. Der „Eremit“, einsam und allein stehend, fällt uns zunächst in die Augen. Dieser gerade und gut proportionirte Baum mißt 320 Fuß Höhe bei einem Umfange von 60 Fuß. Nach dem Gasthause auf dem unteren Wege wieder zurückkehrend, passiren wir „Mutter und Sohn“, die zusammen 93 Fuß im Umfange messen; die „Mutter“ ist 320 Fuß hoch, der „Sohn“ ein hoffnungsvoller Jüngling von 300 Fuß Höhe. Die „Siamesischen Zwillinge“ und ihr „Vormund“ bilden die nächste Gruppe; die „Zwillinge“ entspringen aus einem Stamme, trennen sich in der Höhe von 40 Fuß, und messen 300 Fuß Höhe; ihr „Vormund“ ist 80 Fuß im Umfange und 325 Fuß hoch. Weiterhin steht die „Alte Jungfer“, kummervoll ihr Haupt neigend; sie mißt 60 Fuß im Umfange und ist 260 Fuß hoch. Zwei sehr schöne Bäume, „Addie und Mary“ genannt, fallen uns jetzt auf; jeder von ihnen hält 65 Fuß im Umfange und ist fast 300 Fuß hoch. Wir sind nun bei der „Reitbahn“ angelangt, einem alten umgefallenen Stamme von 150 Fuß Länge, der durch Waldbrände, welche in früheren Zeiten hier wütheten, ausgehöhlt ist. Die Höhle ist am engsten Theile des Innern 12 Fuß, und man kann zu Pferde eine Strecke von 75 Fuß Länge hineinreiten. „Onkel Tom's Hütte“ erregt hier unsere Bewunderung; ein Baum, 300 Fuß hoch und 75 Fuß im Umfange. Die Hütte besitzt eine eingebrannte Thür von 2½ Fuß im Durchmesser, doch ist die Hütte selbst groß genug, um 15 Leuten Sitzplatz zu gewähren. Wir müssen noch zweier anderer Bäume gedenken, wovon der eine, der „Stolz des Waldes“ *) genannt, sich durch seine glatte Rinde auszeichnen und bei einer Höhe von 280 Fuß einen Umfang von 60 Fuß aufweist. Die „Gebrannte Höhle“ (40 Fuß 9 Zoll über der Wurzel messend) ist ebenfalls, und zwar deßhalb merkwürdig, weil sich eine 40 Fuß tiefe Höhlung darin findet, in die ein Reiter zu Pferde hineinreiten, sich darin umdrehen und zurückkehren kann. Wir gelangen nun zur „Zierde des Waldes“, einen 65 Fuß im Umfange, 300 Fuß hohen Baum, von symmetrischer Form und mit einer herrlichen Laubkrone versehen. Nachdem wir den Fahrweg wieder erreicht haben und uns dem Hause zuwenden, kommen wir bei den „Zwei Wächtern“ vorbei, die, sich zu der Höhe von 300 Fuß erhebend und resp. 65 und 70 Fuß im Umfange ein würdiges Thor zu diesem wunderbaren Walde bilden.

Der Stamm des Mammuth-Baumes ist sehr gerade, und mit einer Rinde bedeckt, die im äußern Ansehn der des Redwood ähnelt; sie ist hoch zimmethraun, und 18—22 Zoll dick! Das Holz, wenn es erst abgeschlagen, ist weiß, doch wird es bald röthlich, und dadurch, daß es länger dem Wind und Wetter ausgesetzt ist, dunkel wie Mahagoni. Trotzdem es weich, fault es doch langsam und ist mit einem rothen sich im Wasser auflösenden Farbstoff (von welchem Redwood seinen Namen hat) erfüllt. Die jungen Zweige sind rund, etwas herabhängend und ähneln denen der Cypresse oder denen eines Wachholders. Wie es bei den meisten Coniferen in mehr oder minder auffallender Weise der Fall

*) „Pride of the Forest“; in einigen Berichten „Bride of the Forest“ (Waldesbraut) geschrieben; ich halte erstere Schreibweise für die richtigere. B. S.

iſt, ſelbſt Sequoia sempervirens nicht ausgenommen, kommen zwei Blattformen vor, derſelbe Zweig producirt oft ſowohl imbricative als zweizeilige Blätter. Die Blätter ſelbſt ſind abwechſelnd, ausdauernd, bei jungen Pflanzen länglich pfriemenförmig, apiculate oder mit einer Weichſpitze, semi-amplexicaul auf dem Rücken gekielt, oben eben, aber mit einer wenig erhöhten Centralrippe verſehn; bei älteren Pflanzen ſind ſie kleiner, kürzer, compacter und mehr zuſammengedrängt, eirund-lanzett und ſpitz. Sowohl die männlichen als weiblichen Blüthen bieten dieſelben Gattungscharaktere als die der Sequoia sempervirens; dasſelbe gilt auch von den Zapfen; die der Wellingtonie ſind jedoch gewöhnlich etwas größer als die des Redwood.

Der Mammuth-Baum ward in Europäiſchen Gärten zuerſt durch William Lobb in 1853 eingeführt, und in 1854 verkaufte Veitch's Handelsgärtnerei einzelne Pflanzen deſſelben zu 2 Guineen (14 Thlr.); ſeit jener Zeit ſind die Samen in größerer Anzahl zu uns gekommen, ſo daß jetzt kaum irgend eine gärtneriſche Anſtalt ohne einen oder mehrere Vertreter dieſes merkwürdigen immergrünen Gewächſes iſt. In England ſcheint es den Winter gut aushalten zu können, aber auch in Deutſchland und anderen Theilen des nördlichen Europas dürfte es des Schutzes von Glashäuſern nicht erfordern, ſo daß es auch in letzteren Ländern als Waldbaum, der Bauholz liefert, angeſehen werden kann. Im Juli 1856 vernahm man Klagen, daß, trotz ſorgfältiger Pflege, die Wellingtonia von einer Krankheit befallen ſei, als deren Folge die jungen Zweige in der Art und Weiſe wie bei Cryptomeria Japonica abſtarben. Die Gartenwelt war in Aufregung und fürchtete, ihre neue Acquiſation ſei unwiederruflich verloren, doch bald ſtellte es ſich heraus, daß, obgleich die jungen Zweige abſtarben, der Hauptſtamm und die Hauptzweige kräftig fortwuchſen, und daß die ſogenannte Krankheit conſtitutionell ſei (Lindley!) und weder als ein Zeichen ſchlechter Geſundheit noch nachläſſiger Pflege angeſehn werden können. Möge der Mammuth-Baum fortfahren, fröhlich fortzugrünen, und in den Gärten Europas dieſelben rieſigen Verhältniße entwickeln, welche ihn zum Gegenſtande des Wunders und Erſtaunens in ſeinen heimathlichen Thälern machen.

Berthold Seemann, Dr.

Petunien.

Wenn wir den Gang der Entwickelung unſrer beliebteſten Florblumen verfolgen, ſo werden wir wahrnehmen, daß dieſelben je nach ihrer Individualität immer einen ziemlichen Zeitraum erforderten, bevor ſie den Gipfel ihrer Formenſchönheit erreichten, bevor ſie ſich im Bereich ihrer Färbungen bis zu den feinſten Zeichnungen ausbilden ließen.

Die Nelke ist eine unsrer ältesten Florblumen, es haben sich tüchtige Züchter um sie bemüht, sie hat Glanzperioden gehabt und meines Erachtens ist sie immer noch weiterer Ausbildung fähig.

Seit den 44 Jahren, in welchen ich die Georgine als gefüllt kenne, hat sie in ihrer Form zwar schon manche Veränderung gezeigt, bevor aber die schöne Zellenform und die noch edlere Rosenform erzielt wurde, verstrichen beinahe 30 Jahre.

Heiterer und ermunternder dagegen, scheint sich die Petunia unsern Culturbestrebungen zu bequemen. Kaum vor 2 Jahren ist die erste gefüllte von ihr erschienen, so haben wir auch schon hochgefüllte Riesen und Liliputen und diese zugleich auch in reinfarbigen, bunten, geaderten, gestreiften, grüngeränderten, geflammten, und diese letzteren wieder in bunten, bleichenden, verschwimmenden Farbenabstufungen, also alle die Färbungen, welche wir zeither an den einfachen bewundert haben.

Der riesige Habitus, überhaupt der gefüllten, ist meist compacter und gedrungener im Wuchse, die größeren saftgrünen Blätter erhalten sich länger und decken besser. Die großen Blumen erscheinen ebenso reichlich und die gefüllten blühen länger, da sie schon zu ihrer vollkommenen Entwickelung mehr Zeit brauchen. Mit diesen Vorzügen verbindet die gefüllte Petunia eine Annehmlichkeit von nicht geringer Bedeutung, nämlich daß der, der Petunia eigne Duft, in den meisten gefüllten Sorten bedeutend stärker wird, und sich je nach den verschiedenen Färbungen in Nelken-, Veilchen- und Heliotropium-Duft verfeinert.

Alle diese neuen Erscheinungen waren in der That überraschend. Der gute Eindruck sprach sich bei Allen aus, die diese Riesen-Blumen in so prächtigen Farben in Flor sahen und die verschiedenen Düfte wahrnahmen. Bei mir sah man diese Neuheiten einzeln zerstreut auf den Sämlingsbeeten. Wie ungleich imposanter werden sie sich ausnehmen und bewundert werden, wenn sie nun kunstgerecht angepflanzt und behandelt werden, wo sich dann ihre vollkommene Schönheit am besten präsentirt und zur Anschauung kommt.

Vermöge ihres kräftigen Wuchses, ihres Verjüngungstriebes und ihrer saftgrünen Belaubung ist die Petunia vorzugsweise geeignet zu allerhand schönen Verzierungen. Sind ganze Gruppen schon in ihrer naturgemäßen Ausbildung imponirend, so steigert sich aber der Effect, wenn man z. B. die Zweige über, mit Ruthen gespannte Bogen zieht, oder die Geländer der Altane damit bepflanzt, und einzelne Zweige nach unten hängend, die andern nach oben gezogen und das Geländer damit bedecken läßt, auch ein mit weitem Draht- oder Bindfaden-Geflecht geordnetes Spalier, welches vielleicht eine Lieblingsstelle im Halbkreise umschließen oder bedecken soll, damit bepflanzt und wandähnlich herangezogen und dergleichen ähnliche Pflanzungen davon, werden die guten Wirkungen nicht verfehlen, da diese großen gluthfarbnen Blumen sich auf dem saftgrünen Laube wunderhübsch ausnehmen.

Für die Topfkultur sind diese Varietäten von besonderem Vortheil, da man mit der Topfpflanze leichter sein Lieblingsplätzchen, selbst Fenster ꝛc. schmücken kann. Ein im Topfe schön gezogenes Büschchen mit 5—12 großen im prächtigsten Rosa oder Purpur oder Gestreift ꝛc. prangenden Blumen, gewährt ein Bild wahren Entzückens. Nicht minder schön werden andere Formen im Topfe sich ausnehmen, wenn die

kundige Hand zu Fächer-, Kranz-, Säulen-, Teller-, Halbbogen- und hängende Formen heranziehen wird, und welche Veränderungen, Contraste können, außerdem durch die große Verschiedenheit der Färbungen nicht erreicht werden!

Ich halte mich überzeugt, daß die neuen und prächtigen Varietäten, die ich erzog mit ihren großen hoch- und compact-gefüllten Blumen, mit ihrer Farbenpracht und Verschiedenheit, in den angenehmen Düften, jeder Petunien-Partie Glanz und Anmuth geben, ja, das bescheidene Plätzchen des Fensters ꝛc. durch Blüthenpracht und Duft erquicklich machen werden. Sie sind das günstige Ergebniß einer sorgfältigen Cultur aus 10,000 Sämlingen. Ich konnte aus vielen Hundert von gefüllten Sämlingen das Allerbeste auswählen und abbilden lassen. Bei den Abbildungen war ich durch Zeit und Verhältnisse beschränkt, nur einige wenige Varietäten malen lassen zu können, die eben zur Zeit in Flor waren. Von diesen Abbildungen werden die „Gartenflora“ und das Neubert'sche „Garten-Magazin“ einige bringen. Die nicht abgebildeten sind eben so schön, ja, einige noch schöner. Das ausgegebene Verzeichniß enthält nähere Angabe dieser Neuheiten.

So gebe ich mich auch der Hoffnung hin, alle Blumenfreunde, welche die Blumen mit Liebe und Aufopferung pflegen, die Zueignung meiner reizvollen Zöglingen mit Wohlwollen und Güte aufnehmen werden.

Mein Haupt-Verzeichniß mit seinem Reichthum von neuesten und älteren Florblumen, sowie mit allen Sämereien steht gern franco zu Diensten.

Christian Deegen,
Handelsgärtner und Blumist.

Herrn Christian Deegen in Köstritz verdanken wir schon eine große Menge herrlicher Florblumen, die meisten von ihm erzogenen Georginen stehen bekanntlich mit den englischen oder französischen hinsichtlich der Form und Farbenzeichnung nicht nur auf gleicher Stufe, viele der Deegen'schen Georginen übertreffen selbst manche hochangepriesene englische Sorte. In dem so eben ausgegebenen Verzeichnisse der neuesten und prächtigsten Georginen, Petunien und Phlox bietet Herr Deegen den Blumenfreunden wiederum viele auserlesene Neuheiten dar, die vom Mai ab per Stück zu 1 Ngr abgegeben werden, ein gewiß billiger Preis gegen die englischen Preise für neue Sorten, die, wie bemerkt, oft von geringerer Schönheit sind.

Als ganz etwas besonders Schönes wurde uns schon im Sommer die von Herrn Deegen in den Handel kommenden und von ihm gezüchteten Petunien, namentlich die Riesen-Petunie, geschildert. Mehrere dieser neuen Prachtsorten werden abgebildet in dem „Deutschen Magazin“, in der „Gartenflora“ und in der „Illustrirten Zeitung“ ehestens erscheinen.

Nicht jedem Gärtner ist es wohl gestattet, alljährlich Hunderte von Sämlingspflanzen der beliebtesten Florblumen aus Samen anzuziehen, um unter diesen eine nur geringe Zahl zu finden, die allen Ansprüchen, die

man jetzt an eine Neuheit macht, genügt, es ist deshalb gleichsam eine Pflicht der Blumenfreunde, die deutschen Züchter durch Abnahme ihrer Züchtungen für die viele damit verbundene Arbeit und Mühe zu belohnen und sie dadurch zugleich auch zu neuen Züchtungen anzueifern. Dank dem Eifer und der Ausdauer vieler deutschen Blumisten, die in Deutschland erzogenen Florblumen können mit wenigen Ausnahmen mit den in England und Frankreich alljährlich neu erscheinenden jetzt jederzeit in die Schranken treten, sie werden gleich den ausländischen dieselbe Beachtung finden. Ganz besonders gilt dies von den Georginen, Petunien, Phlox, Pelargonien, Potentillen, Bellis, Delphinien, Pensées ꝛc., von denen wir ganz vorzügliche deutsche Producte gesehen haben.

E. D—y.

Correspondenz.

Fragaria lucida.

Dem Redacteur der hamburger Gartenzeitung.

Hoheluft bei Hamburg, den 1. Decbr. 1858.

In Folge meines Aufsatzes über die Fragaria lucida im 9. Hefte S. 390 v. J., erhielt ich von einem meiner Correspondenten in Frankreich, Herrn Ferd. Gloede, aux Sablons près Moret (Seine et Marne) ein Schreiben, aus dem ich mir erlaube, Ihnen im Interesse dieser Erdbeere einen Auszug zur Benutzung für die hamburger Gartenzeitung mitzutheilen, und bemerke ich zugleich auch noch, daß Herr Gloede im Besitze einer der reichsten und vorzüglichsten Erdbeersortimente ist.

Herr Gloede schreibt mir wie folgt:

„Den von Ihnen im September-Heft der hamburger Gartenzeitung mitgetheilten Aufsatz über die „neue californische Erdbeere“ habe ich, als leidenschaftlicher Liebhaber dieser interessanten Frucht, mit vielem Interesse gelesen. Ich erlaube mir daher, noch einige Bemerkungen in Bezug auf jene Sorte zu machen.

Persönlich mit Madame Vilmorin befreundet, wurden mir im Herbste 1856 einige Pflanzen der Fragaria lucida von dieser achtungswerthen Dame mitgetheilt. Dieselben erhielten während des Winters 1856—57 die nöthige Pflege und gaben mir im Juli 1857 mehrere Früchte von nur mittelmäßiger Größe, rundlicher Form, dunkelrother etwas ins Violett spielender Farbe, die Samen tief einliegend, aber von sehr feinem weinigen Geschmack und dadurch gänzlich von allen anderen bekannten Sorten verschieden! Wie Sie sehr richtig bemerkten, ist das hauptsächliche Verdienst dieser Erdbeere ihre späte Reife; die Früchte reiften hier während der beiden letzten Jahre erst gegen Ende Juli, während

wir bis jetzt keine einzige Sorte kannten, deren Reifzeit über die Mitte Juli hinausgeht! Gleich Ihnen versprach ich mir von vorn herein von dieser neuen Acquisition viel Gutes für die Zukunft, zwar nicht von der Sorte selbst, wie Herr Van Houtte sie ausgegeben, da deren Frucht etwas gar zu unbedeutend ist und sich der Erde gar zu nahe befindet, wohl aber von später daraus zu gewinnenden Neuheiten. Es war mir daher von besonderer Freude, als ich im Sommer 1857 im Garten der Mad. Vilmorin an einem der stärksten Stöcke eine ziemlich große Frucht entdeckte. Mad. Vilmorin war so gütig, mir die Frucht zu offeriren und faete ich den Samen im Laufe des August Monats 1857 aus. Derselbe keimte sehr bald und hatte ich die Genugthuung, davon ungefähr 70 junge Pflanzen zu erziehen. Ich überwinterte diese in kleinen Töpfen unter Glas und pflanzte sie erst im Laufe dieses Sommers ins freie Land, wo sie sehr gut gediehen, und mir fürs kommende Jahr wenigstens zum größten Theil Früchte versprechen. Ich bemerke darunter verschiedene, welche sich durch ihre Blätter bedeutend von der Mutterpflanze entfernen. Die Zeit wird uns lehren, ob etwas gutes darunter ist oder nicht, inzwischen habe ich meine Versuche dieses Jahr fortgesetzt und zwar mit den Samen von Früchten, welche mit dem Pollen der schönen Eleonor (Myatt) befruchtet worden sind.

Sehr erstaunt war ich, in Ihrem Artikel zu lesen, daß die Ausläufer von Ihren Pflanzen Blüthenknospen gezeigt haben, hier bin ich nicht so glücklich gewesen, ebenso wenig ist solches bei Mad. Vilmorin der Fall und auch nicht bei mehreren Freunden in England, welche die Fragaria lucida kultiviren . . . ."

Herr Gloede besitzt eine sehr große Sammlung Erdbeeren, vielleicht die vollständigste, welche existirt, und ist bemüht durch seine fortgesetzten Verbindungen alle Neuheiten sofort bei ihrem Erscheinen sich zu verschaffen.

Auf den Passus meines Artikels „freilich haben französische Wundergärtner es oft versucht uns mit dem Appendices „perpetuelle oder 4 saisons" Erdbeersorten aufgedrungen und so weiter, erwiedert mir Herr Gloede: Wenn Sie darunter die groß-früchtigen Varietäten meinen, so haben Sie freilich Recht, aber auch nur in Bezug auf die Crémont. Im entgegengesetzten Falle jedoch besitzen wir in Frankreich allerdings mehrere Sorten, welche das ganze Jahr hindurch Früchte gaben, solche sind:

des Alpes ou 4 saisons à fruit rouge
" " " à fruit blanc
des Alpes Gaillon à fruit rouge ohne Ranken,
" " à fruit blanc " "
" à gros fruit brun de Gilbert,
" var. Le Moudonnière à feuilles de Laitue.

Ihr ꝛc.

Theodor v. Spreckelsen.

Gartenbau - Vereine.

London. Die von der Gartenbau-Gesellschaft in London am 17. November v. J. abgehaltene große Frucht- und Blumenausstellung in St. James-Hall, wird nicht nur in den englischen Gartenzeitungen als eine ganz vorzügliche und reichhaltige bezeichnet, sondern auch mehrere Briefe unserer englischen Correspondenten sprechen sich ungemein lobend über diese Ausstellung aus.

Einem Schreiben des Herrn **Franz Kramer**, zur Zeit im Garten des Herrn Dr. **Rücker**, an seinen Vater, den Obergärtner im Flottbecker Park, welchen derselbe die Güte hatte uns mitzutheilen, entnehmen wir folgende Details über diese Ausstellung.

..... Die Fruchtausstellung in St. James-Hall war sowohl in Hinsicht der Zahl, als der Güte der ausgestellten Gegenstände eine ganz überraschend schöne.

Von Weintrauben waren besonders die Black Hamburgh- und Muskat-Sorten stark vertreten. Von anderen Sorten waren die folgenden bemerkenswerth:

Barbarossa, 2 Trauben resp. 4 Pfund 22 Loth und 4 Pfund 26 Loth schwer. Eine herrliche Traube!

Black Champion, dem Black Hamburgh ähnlich, und soll diese Sorte noch 9 – 10 Tage früher reifen.

Black Prince, eine lange, schmale Traube, fast ohne Schultern, der Trentham black ähnlich.

Old Tokay, eine Traube von 7¼ Pfund Schwere, dem Muscat of Alexandria ähnlich.

Ananas waren recht schöne, freilich nicht ganz so gut, wie im Sommer. Die Früchte aus dem königl. Garten zu Frogmore (Herr Ingram) waren vorzüglich, die Cayenne-Früchte wogen 8, 9 und 10 Pfund und waren 15 Zoll hoch. Die Queen wogen 5 Pfund 8 Loth und die Providence 8 Pfund 8 Loth. — Außer diesen Sorten waren noch ausgestellt: Ripley's Queen, Black Prince, roth, Comte de Paris und Blood Pipe, dunkelroth.

Die Birnen und Aepfel waren sehr schön. — Herr Kramer führt die vorzüglichsten Sorten namhaft auf, jedoch nur dem Namen nach, da er zu wenig Pomologe ist, um die einzelnen Früchte charakteristisch beschreiben zu können. Es sind:

Birnen, a Tafelbirnen: Seckel, klein, Winter Nelis, Glou-Morceau, synonym mit Beurré d'Aremberg, Beurré Diel, Beurré Kanee, Knight's Monarch, Passe Colman, Easter Beurré (= Doyenne d'Hiver), Marie Louise, Beurré Bosc, Beurré Clairgeau, Forelle, Huyshe's Victoria, Huyshe's Bergamot, Chaumontel, Delices d'Hardenpont, Beurré Capiaumont, Van Mons's Léon Leclerc, Bergamot Crapaune, Calabasse, große, Duchesse d'Angoulème, 4 Stück von diesen Früchten wogen 4 Pfund 20 Loth.

b. Kochbirnen. Diese waren weniger zahlreich vorhanden, ausgezeichnet waren Cattilac (Verulan) und Uvedale's St. Germain, von der letzteren Sorte wogen 4 Stück 7 Pfund 8 Loth!! Uvedale's St. Germain geht auch unter dem Namen Belle Auvergine.

Aepfel. a. Tafeläpfel: King of the Pippins, Ribston Pippin, Golden Reinette, Pearson's Plate, Golden Harvey, Old Nonpareil, Boston Russel, Court-pendu plat, Calville blanc, Reinette blanche, Emperor Alexander, Gloria Mundi, Downton Pippin, Fearne's Pippin, Pomme de Neige, Pomme d'Apis, (Lady's Apple), Tower of Glammis, Cornish Gilliflower, Holland Pippin, Golden Pippin, Golden Knob, Pomme Roi, Golden Parmain, Blenheim Orange, von dieser Sorte wogen 6 Stück 5 Pfund 12 Loth!

b. Kochäpfel: Blenheim Pippin, Beauty of Kent, Dumelows Seedling, Reinette du Canada, Norfolk Beaufin, Yorkshire Greening, Hawthornden, Waltham Abbey Seedling, Mank's Codlins, Broad Crown Pippin, Newington Pippin und Alfriston.

Von Pflaumen waren: Impératrice, blau, Coe's late Red und Coe's Golden Drop, letztere war noch ziemlich gut, die ersteren Sorten waren etwas zusammengeschrumpft.

Von tropischen Früchten wären zu bemerken: Passiflora edulis, Physalis edulis (Cape Gooseberry), Eugenie Ugni und Bananen.

Auch einige Orangen, Apfelsinen und Granaten (eingeführte) waren eingeliefert worden.

Von Melonen sah man nur Trentham Hybrid, eine kleine und neue Sorte, Gargeb?, welche schon seit August geschnitten war.

Von Batatas Dioscorea, für welche ein besonderer Preis ausgesetzt war, war eine Menge schöner Knollen, zum Theil über 2 Fuß lang, eingesandt worden.

Decorations- und Blattpflanzen waren von mehreren Handelsgärtnern geliefert. Sie bestanden aus Dracänen, Aralien, Rhopalen, enthielten jedoch keine neue Arten. Farrn und Lycopodien waren schön, namentlich letztere vorzüglich kultivirt.

Ganz neu war nur Callicarpa purpurea, eine Pflanze mit nur unscheinenden rothen Blumen, aber desto schöneren rothen Früchten, womit die Pflanze im Winter bedeckt ist, ähnlich wie bei Ardisia crenulata.

Wie reichhaltig die Ausstellung beschickt war, beweisen folgende Zahlen:

Fruchtsammlungen waren eingegangen von 2; Ananas von 35; Weintrauben von 50; Birnen von 196; Aepfel von 106; Orangen von 8; Melonen von 5; Pflaumen von 16; Erdbeeren von 15; Johannisbeeren von 5; Himmbeeren von 4; tropische Früchte von 3; Eugenia Ugni von 9; diverse Früchte von 10; Dioscorea Batatas von 5; Chrysanthemum von 10; diverse Pflanzen von 23. Im Ganzen hatten mithin zu dieser Ausstellung beigesteuert 489.

Wie wir schon oben erwähnt haben, waren die auf dieser Ausstellung ausgestellt gewesenen Chrysanthemum ganz vorzüglich. Dasselbe schreibt Herr Kramer im gedachten Briefe, zugleich erwähnt derselbe auch noch, daß die Chrysanthemum-Ausstellung im Crystal Palace gleich schön war und bezeichnet die nachfolgenden Sorten als die schönsten

a. Zwerg- (Pompones) Sorten:

Autumn, hellbraun; Adonis, lilla; Triomphe, dunkelgelb; Aigle d'or, groß, gelb; Cedo Nulli, weiß; Golden Cedo Nulli, hellgelb, (neu;) Bob, braun; Trophée, rosa; Général Canrobert, hellgelb; Brilliant, hellbraun, sehr schön; Mrs. Dix, helllilla. —

b. Großblühende:

*Queen of England, weiß; Themis, lilla; * formosum, weiß; *Yellow formosum, hellgelb; Leon le Guay, dunkellilla; * Annie Salter, goldgelb; Nonparell, helllilla; Pio Nono, braun; Dupont de l'Eure, hellbraun; Mad. Lebois, hellrosa, * Plutus, strohgelb; * Rosa Mystica, rosa; Christophe Colomb, hellbraun; * Antigone, weiß; Versailles Defiance, dunkelrosa; Vesta, weiß; Arigena, dunkelviolett; * Mount Etna, rothbraun; * Mad. Poggi, dunkelbraun; Christine, hellrosa.

Die Zwerg-Chrysanthemum sind sämmtlich schön, von den großblumigen sind die mit einem * bezeichneten, die vorzüglichsten.

Pesth. Der von uns im 12. Hefte des vorig. Jahrg. der hamb. Gartenzeitung gedachte neue Gartenbau-Verein für Ungarn hielt am 13. December seine constituirende Versammlung, in der der zeitweilige Präsident Herr Baron Gabriel von Pronay zum Präsidenten, die Herrn Josef v. Eötvös, Oberlands-Gerichts Vice-Präsid. und Ignaz Perger zum Vice-Präsidenten und Herr Alexander Lucazsy zum Sekretair, wie Herr F. v. Nagy zum Cassirer erwählt wurden.

Der Verein zählte bei Eröffnung der General-Versammlung bereits über 1000 Mitglieder, und die allgemeine Theilnahme, deren sich diese populäre Lebensfrage für Ungarn erfreut, berechtigt zur Erwartung, daß binnen kurzer Zeit der schon im Keime seines Entstehens mit allgemeiner Freude begrüßte junge Gartenbau-Verein zu einer Corporation anwachsen werde, deren Würde und hochwichtige Mission auch die Aufmerksamkeit der ausländischen Vereine verdienen wird.

Imposant und höchst gelungen war die, zur Feier der Gründung des Vereins — auch in dieser späten Jahreszeit — improvisirte Obst- und Pflanzen-Ausstellung. Unstreitig hat jedoch zur Hebung dieser Ausstellung die Theilnahme der Herrn Ausländer viel beitragen, denn die von Auswärts eingehenden Gegenstände erfreuten sich der allgemeinsten Beachtung.

In Folge eines Beschlusses der General-Versammlung wird der leitende Ausschuß eine Vereins-Halle ins Leben rufen, deren Aufgabe sein wird, unter der Leitung des Sekretairs und Mitwirkung des Cassirers gewissermaßen eine permanente Ausstellung zu bilden, und eigentlich zur leichten Beschaffung oder Veräußerung von Gartenerzeugnissen, Sämereien ꝛc. Dem Käufer und Verkäufer als eine authentische Quelle zu dienen und zugleich thätig dahin zu wirken, daß den unreellen Charlatanen die Gelegenheit benommen werde, unächte Pflanzen und Sämereien auf den Markt zu bringen und dadurch das Vertrauen des Publikums zu mißbrauchen. Ein näheres über die Errichtung dieser Verkaufshalle werden wir später Gelegenheit haben, mittheilen zu können.

Hamburg. Die Administration des Garten- und Blumenbau-Vereins für Hamburg, Altona und Umgebung, hat nachstehende Preisaufgaben zu der im Mai d. J. abzuhaltenden Blumen- und Pflanzenausstellung gestellt.

Für Pflanzen.

Eine Prämie von 30 ℔.

1) Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection Orchideen in mindestens 25 Species.

2) Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von Schaupflanzen des Warmhauses in zwölf verschiedenen Arten.

3) Für eine solche Collection Schaupflanzen des Kalthauses in zwölf verschiedenen Arten (Azaleen ausgeschlossen).

Eine Prämie von 25 ℔.

4) Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 25 indischen Azaleen in 26 Varietäten.

5) Für eine Collection Neuholländischer und Capenser Gewächse im besten Kultur- und Blüthenzustande und zwar in 25 verschiedenen Arten.

6) Für eine Collection von 12 in schönem Kultur- und Blüthenzustande befindlichen Rhododendron arboreum und Sikkim-Rhododendron.

7) Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 40 blühenden Roses remontantes in Töpfen und mindestens in 20 Sorten.

Eine Prämie von 15 ℔.

8) Für eine Collection schöner Blattpflanzen des Warm- und Kalthauses in 20 verschiedenen Species.

9) Für eine Collection von 20 buntblättrigen, von einander verschiedenen Pflanzen im besten Kulturzustande.

10) Für eine Collection schön gezogener, blühender Roses remontantes in 20 Exemplaren und mindestens 12 Sorten.

11) Für eine Collection von 15 schön blühenden Thee-, Bourbon- und Roisette-Rosen in mindestens 12 Sorten.

Eine Prämie von 10 ℔.

12) Für eine Collection blühender Neuholländischer und Capenser Pflanzen in 10 Arten.

13) Für 6 schön und reichlich blühende Orangebäumchen.

14) Für eine Collection von 12 blühenden Fancy- und Odier'schen Pelargonien in eben so vielen Sorten.

15) Für eine Collection von 10 verschiedenen, blühenden Zwiebelgewächsen (Amaryllen und Tulpen).

Eine Prämie von 8 ℔.

16) Für eine Collection von schön blühenden Cinerarien in 12 Sorten.

17) Für eine Collection von schönen Calceolarien in 12 Sorten.

Eine Prämie von 5 ℔.

18) Für eine Collection schön gezogener, blühender Verbenen in 12 Sorten.

Für Früchte und Gemüse.

Eine Prämie von 20 ℔.

19) Für die vorzüglichsten reifen Weintrauben.

20) Für vorzügliche hier gezogene Ananas (mindestens 2 Stück.)

Eine Prämie von 8 ℔.

21) Für 12 Töpfe mit schönen reifen Erdbeeren.

Eine Prämie von 5 ℔.

22) Für treffliche Bohnen (mindestens ½ Spint.)

23) Für wohlgezogene Gurken.

Die concurrirenden Pflanzen müssen rechtzeitig, d. h. am Tage vor der Ausstellung, eingesandt werden.

Ueber die bei der Preisvertheilung concurrirenden Gegenstände müssen genaue Listen eingereicht werden, die von dem Gärtner, der sie producirt, unterzeichnet sind und an den Secretair des Vereins, Hrn. Dr. Steetz, Kehrwieder No. 30, am Tage vor der Ausstellung in duplo eingesandt werden müssen.

Eine jede Pflanze kann nur um einen Preis concurriren; sie sowohl, wie Collectionen müssen strenge die Bedingungen des Programmes erfüllen, wenn sie auf Berücksichtigung Anspruch machen wollen.

Erfüllt eine Collection ꝛc. genau die Bedingungen des Progrommes so erhält jede derselben für sich den dafür ausgesetzten Preis, so daß auch mehrere gleichartige Einsendungen gleichartig prämiirt werden können. Eine Bevorzugung der einen Einsendung vor einer andern findet nicht Statt.

Das Schiedsrichteramt übernimmt die Administration in pleno. Sie entscheidet durch Stimmenmehrheit.

Hamburg, December 1858.

Die Administration
des Garten- u. Blumenbau-Vereins für Hamburg.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften.

Viburnum macrophyllum *Thbg.*

Ein hübſcher immergrüner Strauch, deſſen glatten, elleptiſchen, zugeſpitzten, gelblichgrünen Blätter auf der oberen Fläche dunkler ſind als auf der unteren. Die Blattſtiele wie die Hauptnerven der Blätter ſind röthlich, die kleinen Blumen, in Dolden beiſammen ſtehend, ſind weiß. Der bot. Garten zu Leiden, im Beſitze dieſer Art, erhielt ſie vor einiger Zeit von Hrn. Teysmann in Buitenzorg auf Java. Nachdem ſie im genannten Garten in Blüthe gekommen war, hat es ſich gezeigt, daß ſie die in Japan heimiſche Art macrophyllum iſt, wo ſie an den Ufern des Fluſſes Seta Gawa und Tſikugo Gawa auf der Inſel Kin Sin wächſt und wo ſie von den Eingeborenen Hakſan-Bock genannt wird.

Die Kultur dieſer Art bietet keine Schwierigkeiten, ſie wächſt eben ſo leicht und unter denſelben Bedingungen wie Viburnum Tinus. Lin. Die Pflanze wird ziemlich groß, blüht leicht und dankbar und läßt ſich leicht durch Stecklinge vermehren. Eine Abbildung und Beſchreibung derſelben befindet ſich in der „Flore des jardins du Royaume des Pays-Bas im II. Bde. 7. Livr. pag. 97.

Paeonia Moutan Gloire des Belges und Souvenir de Gand.

Bisher ſtand die baumartige Päonie unter dem Namen P. Moutan Gloire des Belges noch als die größte und ſchönſte da, von der Herr Goethals in Gent der alleinige Beſitzer iſt. In dieſem Frühjahr blühte an der Seite dieſer prächtigſten aller Päonien noch eine andere Varietät von gleicher Schönheit, die als P. Moutan Souvenir de Gand getauft worden iſt. Dieſelbe zeichnet ſich aus durch einen kräftigen baumartigen Wuchs, durch große Blätter, durch zahlreiche ungemein große gefüllte Blumen, die in der Färbung vom zarteſten Roſa bis ins lebhafteſte carmin ſchattiren und zugleich einen lieblichen Duft verbreiten. Da Herr Goethals beabſichtigt dieſe beiden Varietäten nebſt der ganzen Vermehrung käuflich abzugeben, ſo dürfte der, welcher das Glück hat, dieſelben an ſich zu bringen, ein gutes Geſchäft damit machen. (Journ. de l'Acad. d'Hortc. de Gand.)

Von der „Flore des Serres," die ſeit Juli 1857 in dem Erſcheinen ihrer Lieferungen im Rückſtande war, ſind uns ſo eben einige Hefte zugegangen, nämlich Lieferung VII., Juli 1857 (ausgegeben am 20. November), Liferung VIII. (ausgegeben am 25. November 1858), und ſollen nun alle noch rückſtändigen Lieferungen

bis zum März 1859 nachgeliefert werden. Von den in diesen Heften abgebildeten empfehlenswerthen Pflanzen, mit Hinweglassung aller derjenigen die kürzlich erst in anderen Werken abgebildet und von uns angeführt worden sind, bemerken wir:

Rhododendron Brookeanum *Low.*

Diese Art wurde von Hrn. Low im Innern von Borneo bei Sawarak und später auch von Herrn Th. Lobb entdeckt. Sie wächst epiphytisch auf großen Bäumen in feuchten Waldungen, oder seltener auf mit Moos bedeckten Kalkfelsen.

Die Blumen dieser Art sind nach Aussagen des Herrn Low brillant goldgelb, die Blätter groß und prächtig, wie sich die ganze Pflanze durch einen gefälligen Habitus empfiehlt. Es ist eine ausgezeichnete Art und verdient die größte Beachtung.

(Flore des serres tab. 1238—1239).

Solanum Capsicastrum *Lk.*

Diese alte aber hübsche Pflanze brachte Herr Ryfkogel vor einigen Jahren als Solanum humile in den Handel, jedoch zeigte es sich bald, daß es das S. Capsicastrum Lk. ist, eine sich durch ihren niedrigen Wuchs, ihre hübschen grünen Blätter und ihre rothen Früchte sehr empfehlende Art, die jedoch viel Aehnlichkeit hat mit dem allgemeinen bekannten Sol. Pseudocapsicum. Obgleich aus Brasilien stammend, läßt sie sich bei uns im Kalthause überwintern, zu welcher Jahreszeit die Pflanze mit ihren rothen Früchten geschmückt sind. Die Vermehrung geschieht sehr leicht durch Stecklinge oder Samen.

(Flore des serres tab. 1242.)

Azalea indica Alexandre II.

Herr Van Houtte erklärt diese Azalee als die schönste, die er je gesehen hat und wir pflichten ihm nach Ansicht der Abbildung auf tab. 1243 in seiner flore des serres vollkommen bei.

Hübscher Habitus und ungeheurer Blüthenreichthum zeichnet sie aus. Die Form der Blüthen ist ohne Fehler, die Blumenblätter sind dick, der Rand derselben gekräuselt. Die Grundfarbe der Blumen ist weiß, einzelne Blätter mit rosa-, carmoisinfarbenen oder rothen Streifen geziert und die drei oberen Blumenblätter in der Mitte goldgelb gezeichnet.

Camellia Vergine di Colle Beato, *Pietro Torre.*

Von dieser sich durch ihre bizarre Form auszeichnende, auf tab. 1244 der Flore des serres abgebildeten Camellie, erhielt Herr Van Houtte zuerst eine Zeichnung von Herrn Dr. Ant. Grioni zu Leoben in Steiermark. Die eigenthümliche Form der Blume machte den Herausgeber der Flore stutzig, ob dieselbe wirklich so sei; allein fast zur selben Zeit erhielt Herr Van Houtte diese Camellie von andern Or-

ten, bald unter dem Namen Vergine di Colle beato, bald als C. Vergine Calubini. Im Frühjahre v. J. blühten einige Exemplare im Etabliſſement Van Houtte und zeigten ſich die Blumen wie ſie gezeichnet und beſchrieben waren, nämlich rein weiß, die Blumenblätter dachziegelförmig, in ſieben, deutlich abgeſetzten, in vom Centrum nach der Peripherie hin geſchwungenen ſanften bogenförmigen Parthien geordnet. —

Es iſt wohl kein Zweifel, daß dieſe Camellie Vergine di Colle beato oder Vergine Calubini dieſelbe iſt, welche Herr A. Topf in Erfurt aus Italien eingeführt und im Jahre 1856 als „Cam. Prinzessin von Preussen“ auf Subſcription ausgegeben hat, abgebildet in Neuberts deutſchen Magazin, Jahrgang 1857, pag. 33, in der Illustrat. Hortic., 1857. 8 Liv. Taf. 1.

Gladiolus Gandavensis *var.* Mr. Vinchon, Vesta, Arlequin, le chamois und Mad. Pelé.

Es ſind dies fünf ausgezeichnet ſchöne Varietäten des Gladiolus Gandavensis, abgebildet in der flore des serres tab. 1246, die Herr Souchet zu Fontainebleau unter vielen anderen aus Samen gewonnen hat.

Plox Triomphe de Twickel, *Sandberg.*

Eine ſehr ſchöne Varietät der Phlox acuminata Pursh. (P. decussata Hort.) Dieſe Varietät erhebt ſich ein wenig höher als die übrigen des P. decussata, auch blüht ſie etwas ſpäter. Die Blüthen bilden einen ungemein großen Strauß, die Blumen ſind lebhaft carminroth und jedes Blumenblatt iſt mit einem breiten weißen Rande eingefaßt. Herr Sandberg, Gärtner des Herrn Baron Van Heeckeren van Waſſemaar hatte das Glück dieſe ſchöne Acquiſition erzogen zu haben. (Flore des serres tab. 1248—49.)

Dianthus caryophyllus fl pl. Souvenir de la Malmaison *Laisné.*

Herr Laisné, Gärtner zu Levallois (Seine), hat dieſe Neuheit erzogen, deren Blumen in Form und Farbe der bekannten ſchönen Roſe gleichen Namens ſehr ähneln. Die Pflanze iſt von robuſtem Wuchſe, die Blätter ſind groß und ſtehen in Harmonie mit den Blumen, die von ganz ungewöhnlicher Größe ſind, ſie haben gut 4 Zoll im Durchm. und ſind remontirend. Eine empfehlenswerthe Blume. (Flores des serres tab. 1250.)

Vanda Cathcarti *Lindl.*

Von dieſer ausgezeichnet ſchönen, von uns bereits früher erwähnten Art, giebt die Flore des serres auf Taf. 1251—52 eine ſehr gute Abbildung.

Vanda Stangeana *Rchb. fil.*

Eine überraſchende Neuigkeit. Die erſte Vanda, die zuerſt auf dem Continent blühte, führte Herr Conſul Schiller von Aſſam ein. Sie iſt deſſen trefflichen Obergärtner, Herrn Stange zugeeignet.

Die Blüthe iſt äußerlich weiß; Sepalen und Tepalen innerlich gelbgrün mit ſchön kaſtanienbrauner Schachbrettzeichnung. Lippe und Säule weiß, Lippe vorn leicht violett, einige rothe Punktſtreifen ſeitlich am Eingange des Sporns. Unter der Säule, da, wo die Oehrchen zuſammentreten, eine Furche. — Sie ſteht der Vanda fuscoviridis am nächſten. (Bot. Ztg. No. 47. 1858.)

Abgebildete Camellien

in Amb. Verſchaffelt's Nouvelle Iconographie des Camellias.

Liv. 8. (Auguſt 1858.)

Taf. 1. Cam. perfecta (Chalmer). Obgleich dies keine neue Camellie iſt, denn ſie befindet ſich bereits über 12 Jahren in den auserleſendſten Sammlungen, ſo iſt ſie doch ſo ſchön und gehört mit zu den am regelmäßigſten gebauten, als daß ſie nicht in die Iconographie mit aufgenommen werden ſollte.

Sie wurde in den Vereinigten Staaten aus Samen gewonnen, und iſt bereits im Jahre 1846 in der Flore des serres abgebildet, vermuthlich aber nach einem Exemplar, das ſich nicht in beſter Ueppigkeit befand. Die Blumen ſind ſehr groß und von prächtiger roſa Färbung. Die nach der Peripherie der Blume zu ſtehenden Blumenblätter liegen regelmäßig dachziegelförmig, während die im Centrum der Blume befindlichen ein hübſches roſenförmiges Herz bilden.

Es iſt eine Varietät die in keiner Sammlung fehlen ſollte.

Taf. 2. Cam. Comte des Flandre. Sowohl hinſichtlich ihrer regelmäßigen Form als hinſichtlich ihrer zweifachen Färbung gehört dieſe Camellie zu den ſchönſten aller bis jetzt bekannten Varietäten. Sie iſt auf der Cam. Valerio entſtanden und ſofort abgepfropft, hat ſie ſich als beſtändig bleibend erwieſen.

Die Blumen halten fünf Zoll und mehr im Durchmeſſer, ſie beſtehen aus großen faſt gleichen, abgerundeten Blumenblättern, die regelmäßig dachziegelförmig geordnet ſind. Die Grundfarbe derſelben iſt ſchön weiß, am Grunde roſa gefärbt und außerdem fein roſa geadert und geſtreift.

Taf. 3. Cam. Princesse des Asturias. Herr Verſchaffelt verdankt dieſe hübſche Form dem Herrn Van Hoobrouck-ten-Hulle in Gent. Es iſt eine leicht und dankbar blühende Varietät, ihr Habitus iſt elegant, die Blätter ſchön. Die Blumen, obgleich klein,

sind von hübscher Form, äußerst regelmäßig gebaut und von lebhaft rother Färbung, jedes Blumenblatt mit einem weißen Längsstreifen gezeichnet.

Taf. 4. Cam. Grand Tamarlan. Herr Van Geersdaele in Gent erhielt diese hübsche Form vor drei Jahren aus Italien. Die Blumen von mittler Größe, sind schön lebhaft rosa, weiß gestreift und gepfleckt. Die Blumenblätter sind groß und liegen ganz regelmäßig dachziegelförmig. — Leichtes und reichliches Blühen empfiehlt diese Varietät auch noch ganz besonders.

Liv. 9. 1858.

Taf. 1. Cam. Palinto. Herr Verschaffelt empfing diese Camellie von Hrn. Luzzati in Florenz vor 3 oder 4 Jahren. Es ist eine der schönsten regelmäßig geformten. Die Blumen sind mittelgroß und von lebhaft carminrother Färbung. Blüthenerzeugung leicht und in reichem Maaße.

Taf. 2. Cam. Mistriss Cope. Die Herren Henderson in London haben diese Varietät aus den Vereinigten Staaten erhalten, wo sie aus Samen gewonnen worden ist. Es ist eine herrliche und zugleich zierliche Blume. Die Blüthen sind sehr groß, weiß, mit rosa und carmin fein gestreift. Die Blumenblätter sind zahlreich, oval oder abgerundet und liegen vollkommen regelmäßig dachziegelförmig. Im Frühjahre 1857 und 1858 blühte sie in schönster Pracht bei dem Herausgeber der Iconographie der Camellien.

Taf. 3. Cam. gracilis minlata. Eine sehr liebliche Camellie, in Belgien aus Samen gewonnen, hat sie bereits drei oder mehrere Jahre hinter einander in schönster Fülle bei Herrn Verschaffelt geblüht. Die Blumen sind mittelgroß, lebhaft carminroth, mattroth oder weißlich bandirt. Die im Centrum der Blume stehenden Blumenblätter sind kleiner als die der Peripherie, mehr eiförmig oder lanzettlich, während die anderen groß und abgerundet sind, sämmtlich liegen jedoch regelmäßig dachziegelförmig.

Taf. 4. Cam. Pietro Corsini. Eine durch ihre Form wie durch ihre frische Färbung ganz ausgezeichnete neue Blume, Herr Verschaffelt hat sie erst vor einem Jahre aus Italien erhalten.

Die Blumen, die im Frühjahre 1858 zum ersten Male an der Mutterpflanze bei Herrn Verschaffelt in Masse und mit einer Leichtigkeit sich entwickelten, sind mittelgroß, bestehend aus einer großen Anzahl gleich großer, ovaler, abgerundeter, regelmäßig dachziegelförmig gestellter Blumenblätter, sämmtlich von einer schönen rosa Färbung.

Liv. 10. 1858.

Taf. 1. Cam. Laura. Herr Verschaffelt verdankt diese Neuheit dem Hrn. Delimon-Papeleu, dem großen Camellien-Freunde in Gent. Es ist eine Camellie die sich neben der Schönheit ihrer Blumen, durch ein sehr reiches Blühen auszeichnet. Die sich sehr leicht öffnenden Blumen sind erster Größe und gehören zu den am regelmäßigsten gebauten. Sie sind von zarter rosa Farbe, dunkler im Centrum

und an der Peripherie. Die zahlreichen Blumenblätter sind klein, namentlich die im Centrum der Blume, die mehr nach der Peripherie zu stehenden größer, abgerundet und leicht ausgekerbt.

Taf. 2. Cam. Marchese Garbaroni. Eine mittelgroße Blume, bestehend aus sehr zahlreichen großen, abgerundeten, am Rande gelappten Blumenblättern, die sternförmig geordnet stehen und von schöner lebhaft dunkelrosa Farbe sind. Diese Camellie stammt aus Italien, vonwo sie Herr Verschaffelt vor zwei Jahren erhielt. Die Blumen erscheinen zahlreich und öffnen sich leicht.

Taf. 3. Cam. (tricolor (nova) Mathot. Ein Erzeugniß des verstorbenen Herrn Mathot in Gent; Herr Miellez zu Lille erhielt die ganze Auflage dieser Camellie und brachte sie vor 4 Jahren in den Handel. Es ist eine sehr schöne und sehr distinkte Varietät, welche die alte tricolor gänzlich in den Hintergrund drängt. Die Blumen dieser sind viel größer, die Farben bei weitem brillanter. Die Blumenblätter sind weniger zahlreich, dagegen sehr groß, abgerundet, mit etwas aufgerollten Rändern und regelmäßig dachziegelförmig gestellt. Die Grundfarbe äußerst mattrosa, fast weiß, sehr fein mit carmoisin gestrichelt neben den auf den Blumenblättern befindlichen breiten carminrothen Streifen und Flecken. Eine sehr anziehende Blume.

Taf. 4. Cam. Humboldtii. Ist italienischen Ursprungs und bereits 5 oder 6 Jahre bei Herrn Verschaffelt. Die niedlichen Blumen sind mittelgroß, lebhaft rosa, schön geformt, geschmückt mit weißen Streifen. Die Laubblätter sind nur klein und harmoniren in der Größe mit den Blumen. Sehr zu empfehlen.

Literatur.

Die Eichen Europa's und des Orient's. Gesammelt, zum Theil neu entdeckt und mit Hinweisung auf ihre Kulturfähigkeit für Mittel-Europa ꝛc. beschrieben von Dr. Theodor Kotschy. In 10 Lieferungen, jede mit 5 Tafeln Abbildungen nebst erklärendem Text in lateinischer, deutscher, französischer und englischer Sprache. Wien und Olmütz. 1858.

Der Subscriptions-Preis für eine Lieferung dieses botanisch-forstlichen Prachtwerkes ist 4 Thaler. — Die erste Lieferung liegt zur Ansicht vor, die übrigen sollen von 2 zu 2 Monaten erscheinen, so daß das Werk Ende 1859 vollendet ist.

Eine genaue wissenschaftliche Bearbeitung der schon bekannten und zum Theil unter einander vermischten Eichen ist schon lange ein gefühltes Bedürfniß gewesen, es wird daher mit Freuden anerkannt werden, daß der rühmlichst bekannte Verfasser, Herr Dr. Kotschy, der sich schon seit einer Reihe von Jahren dem Studium der „Eichen" unermüdet gewidmet, sich dieser Arbeit unterzogen hat. Es sind aber außer den bekannten noch eine Menge neuer Arten bekannt geworden, welche nicht blos ein wissenschaftliches Interesse gewähren, sondern auch in ökonomischer und insbesondere forstlicher Beziehung vom größten Nutzen sein

dürften, weil die meisten derselben zur Acclimatisirung für Mitteleuropa sich ganz vorzüglich eignen. Alle diese neuen Arten sind von dem Verfasser in diesem Werke zuerst beschrieben und abgebildet, und da sich viele derselben schon lebend im kaiserl. Hofpflanzengarten zu Schönbrunn befinden, so war der Pflanzenmaler Herr Oberer, unter Aufsicht des Verfassers dieses Prachtwerkes, im Stande die Ausführung der Tafeln in Farbendruck nach den lebenden Exemplaren auszuführen.

In der 1. Lieferung sind folgende Arten abgebildet:

1. **Quercus syriaca Kotsch.** Diese Art wurde bisher mit Q. infectoria Oliv. verwechselt. An der südlichen Ausmündung der ciliciſchen Engpässe unterhalb Güllek stehen nur einige Bäume 3500 Fuß über Meer, tiefer am Dorfe Karauli findet man diese Eichenart als Baum noch seltener, aber häufig als hohen Strauch.

Auf der Westseite des Libanon über Tripolis unter Anobin, wie über Beirut bei Bukfaya erscheint sie nicht selten, auf der Ostseite zwischen Sachle und dem See Limoni bilden dagegen alte Bäume dieser Art den Wald. Durch Insektenstiche erzeugte kleinere Auswüchse kommen auf dieser Art vor, aber Galläpfel wurden darauf nicht gefunden.

Das Klima der adriatischen Küstenländer, der Lombardei, Nord-Italiens, Süd-Frankreichs ist zum Gedeihen dieser kreidigen Kalkboden liebenden Eiche geeignet. Das Holz hat eine weichere Consistenz, ist aber zäher und wird zu feinerer Verarbeitung vielfach benutzt.

2. **Quercus Haas Kotsch.** Diese durch die Größe der Blätter und Früchte sich auszeichnende Art ist am nächsten mit Q. pedunculiflora C. Koch verwandt.

Auf dem südlichen Abhange des ciliciſchen Taurus über Tarsus wächst dieser Baum im anmuthigen Cydnusthale gegen den Ort Nimrum zu, so auch bei Güllek 5000 Fuß über Meer vereinzelt und zerstreut. Wegen seines Schattens ist er beliebt und man findet ihn mehrfach in der Nähe von Wohnungen zu mächtigen Stämmen herangewachsen.

In Mitteleuropa kann der Baum ohne Zweifel überall auf trocknen Standorten cultivirt werden Das Holz ist sehr dauerhaft und fest.

3. **Quercus Pyrami Kotsch.** Diese durch die große Verschiedenheit der Blattform bemerkenswerthe Art ist neben Q. Ithaburensis Decaisne einzureihen.

In der westlich von Adana sich ausbreitenden Ebene Ciliciens bildet diese Eiche einen, im Oriente selten so ausgebreiteten, Waldbestand. Dort, vom Pyramus durchströmt, finden sich uralte Baumstämme.

Im nördlichen Italien und südlichen Europa kann diese ausgezeichnet gezogen werden.

Die Eicheln dieser Art werden öffentlich, z. B. im Bazar von Adana, verkauft; geröstet gewähren sie in Zeiten des Mangels einen sehr geschätzten Ersatz für Brot.

4. **Quercus aurea Wierzb.** Diese Eichenart steht der Q. conferta Kit. einerseits und andererseits der Q. sessiliflora Smith nahe. In den bergigen Wäldern Siebenbürgens und der wallachisch-illyrischen Militärgrenze wächst dieser Baum nicht selten, und wird in ganz Mitteleuropa gedeihen.

Sein Holz ist nicht sehr dauerhaft; die Stämme werden schneller hohl als bei Q. sessiliflora Smith.

5. Quercus Libani Oliv. β callicarpos Kotsch. In der Gattung der Eichen bildet dieſe Art eine eigene Unterabtheilung, in die auch Q. regia Liudl., Q. Kurdachorum C. Koch und noch andere gehören.

Der franzöſiſche Reiſende Olivier entdeckte dieſe Eiche vor mehr als 60 Jahren im nördlichen Syrien bei Latakia. Sie trägt dort kleinere Früchte als im ciliciſchen Taurus, wo ſie von 3000—5000 Fuß über Meer vorkommt und ſtellenweiſe ganze Berglehnen als mächtiger Waldbaum überwächſt, wie dies in der Landſchaft von Güllek über dem Dorfe Gaenſin und ſüdöſtlich von Nimrum der Fall iſt.

Dieſe mit ihrem Blatt ſo abweichende, in ihrem Wuchs aber zugleich zierliche Eiche wird im ſüdlichen Theil von Mitteleuropa ſehr gut gedeihen und muß beſonders für Parkanlagen empfohlen werden.

Das Holz iſt bräunlich, hart und dauerhaft.

Illuſtrirte Bibliothek des landwirthſchaftlichen Gartenbaues. III. Abthl. 3. der Apothekergarten. Kultur und Behandlung der in Deutſchland zu ziehenden mediciniſchen Pflanzen. Für Apotheker und Gärtner, Land- und Gartenbeſitzer bearbeitet von H. Jäger, mit 33 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig, Otto Spamer, 1859. gr. 12. XX und 176 S.

Von der mit ſo vielem Beifall aufgenommenen „Illuſtrirten Bibliothek des landwirthſchaftlichen Gartenbaues“, von dem in der Gartenwelt ſo rühmlichſt bekannten Verfaſſer, Herrn Hofgärtner H. Jäger, iſt abermals ein Band erſchienen, nämlich der 3. der III. Abtheilung, der Apothekergarten.

Das ganze vortreffliche Werk erſcheint in 3 Abtheilungen.

I. Abth. 1. Band: der prakt. Obſtgärtner (mit 180 Abbild.) in 3 Theilen: 1. die Baumſchule, 2. der Obſtbau und 3. der Obſtbaumſchnitt (ſämmtlich erſchienen).

I. Abth. 2. Band: der prakt. Gemüſegärtner (mit 100 Abbild.) in 3 Theilen: 1. die Lehre vom Gemüſebau (erſchienen), 2. ſpezielle Kultur der einzelnen Gemüſe (erſchienen), 3. der Gemüſebau in Miſtbeeten und Treibhäuſern ꝛc. (erſchienen).

II. Abth. Vorſchule des landwirthſch. Gartenbaues. Boden, Dünger und Entwäſſerungskunde. — Gartenkalender.

III. Abth. 1. der Spargelgärtner (erſchienen), 2. das Winzerbuch (erſchienen) und 3. der Apothekergarten, der jetzt uns vor liegt.

Es iſt dieß ein ſehr nützliches Buch, es behandelt die naturgemäße Kultur der in Deutſchland zu ziehenden mediciniſchen Pflanzen, beſonders diejenigen, die am häufigſten gebraucht werden, ſolche die den meiſten Vortheil bringen und ſolche, die wegen ihres ſeltenen Vorkommens im wilden Zuſtande und wegen Verwechſelung und Verfälſchung angebaut zu werden verdienen. Ganz gemeine Pflanzen, bei welchen keine Verwechſelung möglich iſt, und jene, welche ſtets in hinreichender Menge wildwachſend geſammelt werden können, hat der Verfaſſer ganz ausgeſchloſſen oder nur kurz erwähnt. Dies geſchah auch mit ſolchen, welche ſich nicht mit Vortheil kultiviren laſſen oder deren Kultur nicht möglich iſt. Da dies kleine Werk nur eine praktiſche Kulturanweiſung der

medicinischen Gewächse sein soll, so hielt der Verfasser auch die botanischen Beschreibungen der in dem Buche vorkommenden Pflanzen für überflüssig. Bei jeder Pflanze ist dahingegen der lateinische Name mit Autor und erforderlichen Synonymen, der deutsche Name, die Familie, zu der die Pflanze gehört, gegeben, und um das Aufsuchen und die Kenntniß der betreffenden Pflanzen zu erleichtern, hat der Verfasser bei den meisten auf ihre Abbildung in zwei bekannten, sehr verbreiteten Kupferwerken hingewiesen, nämlich auf Hayne's „Naturgetreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse", und Plenk's „Icones plantarum medicin. etc." Im Texte selbst sind, da nicht alle Pflanzen abgebildet werden konnten, vornehmlich die Giftpflanzen berücksichtigt und abgebildet worden. — Die Kulturangaben stützen sich theils auf eigene Erfahrungen des Verfassers oder auf sichere Angaben Anderer. Der Herr Verfasser hat sich die Kenntnisse der Kultur der meisten Arzneipflanzen in botanischen Gärten, in denen er beschäftigt war, angeeignet und können wir seinen Angaben den größten Glauben schenken.

Nach einer interessanten Einleitung über den Nutzen bringenden Anbau der medizinischen Kräuter folgt in alphabetischer Ordnung die Aufzählung der in Deutschland zu ziehenden Arten, die der Verfasser in drei Abtheilungen getheilt hat, nämlich 1. in ein- und zweijährige, 2. in ausdauernde oder perennirende und 3. in holzartige. Ein Register der lateinischen und ein Register der deutschen Namen erleichtert das Aufsuchen der Arten, von denen im Ganzen 349 verschiedene Arten besprochen worden sind.

Wir empfehlen dieses ungemein nützliche Buch allen Gärtnern, Land- und Gartenbesitzern und namentlich den Apothekern.

E. O – o.

Feuilleton.

Cyanophyllum magnificum. Es freut uns mittheilen zu können, daß noch eine zweite renommirte Privatgärtnerei solch ein Prachtexemplar des herrlichen Cyanophyllum magnificum aufzuweisen hat, wie das in den Gewächshäusern des Herrn Consul Schiller befindliche. (Siehe Hamburg. Gartenztg. Heft 11, S. 481 vorigen Jahrg.). Dies zweite zur gleichen Cultur-Vollkommenheit gebrachte Exemplar befindet sich in der, sich durch viele seltene Gewächse auszeichnenden Gärtnerei des Herrn A. Retemeyer in Bremen. Die Pflanze in dem Gewächshause des Herrn Retemeyer hat 12 ganz makellose ausgebildete Blätter, die an ihrer breitesten Stelle eine Breite von 13 Zoll haben *). Die Pflanze bei Herrn Retemeyer ist von gedrungenem Habitus und hat eine Höhe von 3½ Fuß. Der Topf,

*) Anmerk. Wir bedauern, nicht die Länge der Blätter erfahren zu haben. An der Pflanze bei Herrn Schiller haben sie eine Länge von über 3 Fuß, so daß, wenn zwei der sich gegenüber stehenden Blätter horizontal ausgebreitet liegen, beide eine Länge von 7 Fuß haben.
Die Redaction.

in dem die Pflanze wächst, ist nur 10 Zoll breit und kaum so hoch, um so mehr ist die Ueppigkeit dieser Prachtpflanze zu bewundern, und liefert einen neuen Beweis von der Tüchtigkeit ihres Cultivateurs.

Sonerilla margaritacea und deren Varietät S marg. superba sind zwei andere Pflanzen, die sich durch ihre Größe und Ueppigkeit bei Herrn Retemeyer auszeichnen. Die Exemplare sind etwa 1 Fuß hoch bei einem Durchmesser von 2½ Fuß. Die Pflanzen bedecken mit ihren Zweigelchen und Blättern die Schalen, in denen sie stehen, vollkommen und gewähren so einen ungemein reizenden und lieblichen Anblick, namentlich während des Monats November, zu welcher Zeit die Pflanzen mit nahe an Tausend rosafarbenen Blumen bedeckt waren.

Von **Arnoldi's** Beschreibungen der naturgetreuen **Obst-Cabinette** aus Porcellainmasse ist die V. Lief. ausgegeben und die VI. Lief. liegt zum Versandt fertig. Erstere enthält Nr. 12, Danziger Tantapfel (M. paradisiaca); Nr. 13 Cludius früher Spitzapfel (M. Cludiana); Nr. 14. der Prinzenapfel (M. princeps); Birne Nr. 12, gute Graue (P. Renetta); Birne Nr. 13, v. Dachenhausens Butterbirne (P. Dachenhusenii) und Birne Nr. 14, Sommer-Dechantsbirne (P. alba variegata). — Um die Anschaffung dieser äußerst naturgetreu nachgebildeten Früchte aus Porcellainmasse noch zu erleichtern, hat der Herausgeber den Preis von der VI. Lief. an, auf 2⅙ ℛ per Lieferung ermäßigt und giebt außerdem noch einen Rabatt von 20% bei direkter Bestellung darauf, so daß sich der Preis hierdurch auf 1 ℛ 20 Sgr. künftig stellt. Durch diese Preisermiederung hofft der Herausgeber noch mehr Abnehmer zu erhalten und die Früchte dem größeren Publikum zugängig zu machen.

Alle von dem pomologischen Vereine in Gotha empfohlenen Birnensorten werden nach und nach in den Cabinetten erscheinen, wodurch diese für die Herren Pomologen von besonderem Werthe werden dürften.

Herr Aug. Idahl in Hamburg hat die Agentur für die hiesige Gegend für den Herausgeber übernommen und ist beauftragt, Aufträge so gut als direkt an den Herausgeber erfolgt, in Empfang zu nehmen. E. D—o.

Georginen-Sammlung. Bei Erwähnung der berühmten Georginensammlung des Herrn **Kircher** in Hildesheim im 11. Hefte S. 527 unserer Zeitung ist ein arger Druckfehler übersehen worden. Das beachtenswerthe Sortiment besteht nicht aus etwa 40, sondern aus etwa 740 bis 750 der neuesten und besten Sorten. Der Katalog pro 1859 dieser vorzüglichen Sammlung ist bereits im Druck und wird auf frankirtes Abfordern frankirt von dem Besitzer zugesandt.

Dioscorea Batatas. Die Acclimatisirung dieser Pflanze ist in England als gesichert anzunehmen, und daß sie sich unter geschickten Händen mit Nutzen wird kultiviren lassen, erleidet keinen Zweifel, wovon schon die auf der am 18. Novbr. v. J. stattgefundene Fruchtausstellung ausgestellten Wurzeln einen Beweis lieferten. Eine Menge Knollen waren eingesandt; die ein Jahr alten Knollen kamen von Herrn Ivery zu Dor-

kung. Die Knollen waren 2 Fuß lang und wog jede 2 Pfund. Andere Knollen waren größer, jedoch auch älter als ein Jahr. Zur Erlangung guter, groß ausgebildeter Wurzeln, iſt ein leichter, tief umgegrabener Boden nöthig.

Eugenia Ugni. In Folge mehrerer ausgeſetzten Preiſe für Früchte dieſer Pflanze waren bei der großen Herbſtausſtellung von Früchten und Blumen in London am 18. Novbr. v. J. aus einigen Gärten Früchte ausgeſtellt. Die am beſten ſchmeckenden, jedoch am unanſehnlichſten ausſehenden, waren von Harrington zu Acton Green eingeſandt. Dieſe Früchte ſtammten von einem Exemplar, das am Fuße einer warmen, nach Südweſt gelegenen Mauer wächſt. Sie waren von ausgezeichneter Qualität und es ſteht zu erwarten, daß die Cultur dieſes Fruchtſtrauches, in England wenigſtens, immer allgemeiner werden wird. Die Pflanze ſelbſt iſt härter, als eine Myrthe und der Geſchmack der Früchte iſt faſt gleich dem einer Muskattraube. Im Gewächshauſe gereifte Früchte haben keinen Werth.

Magnolia grandiflora. Ein immergrüner, 60—70 Fuß hoher Baum des ſüdlichen Amerika, der ſchönſte Baum der amerikaniſchen Wälder, kommt auf den joniſchen Inſeln, beſonders auf Corfu auch im Freien vor, und iſt eine Zierde der Gärten der reichen Engländer auf dieſen Inſeln. Die ſchönen und großen Blumen ſind 10—12 Zoll groß, weiß und höchſt wohlriechend, ſchade nur, daß ſie kurze Zeit nach dem Abpflücken verwelken und die ſchöne weiße Farbe in Braun umgewandelt wird. Dieſe ſchönen Blüthen können auch zur Bereitung eines wohlriechenden fetten Oels verwendet werden und auf den joniſchen Inſeln wird von einigen Leuten, die von den Gärtnern die friſchen Blumen einhandeln, ein ſolches wohlriechendes Oel, dem man auch zu gleicher Zeit eine wohlthätige Wirkung gegen das Ausfallen der Haare zuſchreibt und deßwegen ſehr theuer bezahlt, bereitet. Daß ſich dieſe Oele und Magnolienpomaden durch Infuſion der friſchen Blüthen mittelſt Mandelöl oder eines geruchloſen Fettes bereiten laſſen, dürfte Jedem bekannt ſein, der Geruch derſelben iſt jedoch äußerſt angenehm und fein zu nennen. Die Magnolienpomade, die ich zu ſehen Gelegenheit fand, hatte eine röthliche Farbe und den feinſten eigenthümlichen Geruch der Magnolia-Blüthen. Einen ſchönen Anblick gewähren auch die an langen, weißen Nabelſchnüren hängenden rothen Saamen, die nach dem Aufſpringen der Früchte an den ſilberweißen Fäden hängend im Winde hin- und herſchaukeln.

(Dr. Lauderer in der Flora.)

Viola odorata. Das Veilchen iſt eine Lieblingsblume der Griechen und noch mehr der Türken. In allen Gärten finden ſich dieſe ſchönen, wohlduftenden Blüthen, die jedoch viel wohlriechender ſind, als bei uns in Deutſchland, denn einige Veilchen ſind hinreichend, um ein großes Zimmer mit Veilchengeruch zu erfüllen. In Griechenland ſind ſie die erſten Blüthen, die uns den Frühling verkünden, denn in guten, nicht kalten Jahren beginnen ſchon im Januar Veilchen zu blühen und blühen fort bis zum März und April. Jeder, der in der Nähe der Hauptſtadt einen Garten hat, verſäumt nicht, in demſel-

ben Veilchen zu pflanzen und täglich in die Stadt zu senden, indem jeder Mensch dieselben mit Freuden kauft. Gewöhnlich werden 5 Veilchen in ein kleines Bouquet gebunden und ein solches Veilchenbouquet mit 5 Lepta bezahlt*). Tausende solcher kleiner Veilchenbouquete werden täglich verkauft, sei es nur, daß sich selbe finden. In Griechenland bereiten sich die Leute auch einen Veilchensyrup als hustenvertreibendes Mittel. Noch mehr lieben die Türken diese Blüthen und in allen Gärten der reichen Paschas ist ein großer Theil des Gartens mit Veilchen bepflanzt, denn die Türken lieben dieselben ganz vorzüglich und bereiten sich aus denselben sehr wohlriechende Confituren und Scherbets. Die Harems duften vom Veilchengeruch, indem der Eunuchus den Damen jeden Tag Veilchen zum Geschenke darbringt. Die Farbe der Veilchen ist den Türkinnen so angenehm, daß sie Kleider mit Veilchenfarbe allen andern vorziehen und solche Kleider nennen sie nach dem türkischen Namen des Veilchens Menexes-Menexitica. Die Alt-Griechen nannten diese Blume Ἴον und Hermolaos erzählt, daß gewisse jonische Nymphen diese Blumen dem Jupiter zuerst geschenkt haben. Andere leiten den Namen Ἴον davon ab: als Jo, Jupiters Geliebte in eine Kuh verwandelt wurde, habe die Erde ihr Veilchen zum Futter hervorsprießen lassen. Nach Theophrast, Dioscorides unterschieden die Alten nach der Farbe Ἴον πορφυρῶν, Ἴον μέλαν und μελάνων. Aus den Veilchen bereiteten sich die Alten ein Vinum violaceum — Conditum violaceum — und Horatius sagt: tinctus viola pallor amantium.

*) Anmerk. 100 Lepta = 7 Sgr. 3 Pfennige.

Gleichwie die heutigen Damen die Veilchenfarbe lieben, so liebten auch die Alten dieselbe; dies erhellt daraus, daß man in den alten Zeiten eigene Färber hatte, die sich mit der Hervorbringung der Veilchenfarbe beschäftigten und man nannte diese Färber Violarius infector. Der Name Viola ist das veränderte Ἴον der Griechen.

Das Veilchen, V. odorata, findet sich in Griechenland im wilden Zustand am Fuße des Parnaß, am heiligen Berge Athos und auch in Arkadien, und an diesen Stellen fand sich diese bioletta, wie sie die heutigen Griechen nennen, schon in vergangenen Zeiten, denn auch Sibthorp bemerkt: In umbrosis humidis ad montium radices, ut Parnassi et Athenis et in Arcadia. Das Veilchen war Symbol des jährlichen Wiederauflebens der Erde und bezeichnete wegen seiner dunklen Farbe und zur Erde geneigten Blume den Tod. Das Veilchen war daher im Dienste der Sybille bei den Dendrophoreen und mit dem Raube der Persephone verwebt. Ja die Tochter des Atlas wurde, als sie vor dem Apollo floh, in ein Veilchen verwandelt. Demüthig und sittsam verbirgt noch jetzt die liebliche Blume sich unter den Blättern, nicht gleich ist sie zu finden, man muß sie suchen. Athen hieß sonst das Veilchenduftende.

(Dr. Landerer in der „Flora“.)

Ueber die **Hesperiden-Früchte.** Die Mythe ließ die goldenen Früchte der Hesperiden durch Herkules nach Griechenland bringen. Das südliche Griechenland nebst den Inseln des Archipels ist für die Cultur dieser edlen Bäume sehr geeignet, sie wachsen überall und außer der Bewässerung hat man keine andere Sorge mehr, als ihre Früchte einzusammeln. Hesperiden-Früchte war-

den von den Alten mit Wein gegen Schlangengift genoſſen und zu dieſer Todesart Verurtheilte dadurch gerettet, dies findet ſich bei Athenäus.

Vor Allen ſind die Orangen, Citrus Aurantium, bei den Griechen beliebt. Es iſt in Griechenland Sitte, wenn man Jemand auszeichnen will, zum Abſchied bei einem Beſuch oder bei der Abreiſe ihm womöglich eine Orange, nur im Nothfall einen Apfel, niemals eine Citrone mitzugeben. Dieſes freundliche Geſchenk dient oft genug zum Zeichen wie man aufgenommen worden, oder geſchieden iſt, man achtet darauf, ob man mit der Goldfrucht in der Hand aus dem Hauſe kommt und darf dieſelbe nicht früher in die Taſche ſtecken. Mit Ausnahme der im Lande verbrauchten Millionen von Orangen und Citronen werden in günſtigen Jahren gegen 40—50 Millionen dieſer Früchte ausgeführt und zwar nach Konſtantinopel und anderen Plätzen Kleinaſiens. Die unreifen Früchte werden eingeſotten und als Glüko zu Scherbets verwendet. Die Pomeranzenſchalen bleiben unberückſichtigt, kein Menſch ſammelt dieſelben, ſo daß man genöthigt iſt, ſich die zum mediciniſchen Gebrauche beſtimmten Pomeranzenſchalen aus dem Auslande kommen zu laſſen.

Die bittere Pomeranze, C. Bigardia, findet ſich in Griechenland und auf den Inſeln, bleibt jedoch noch mehr unberückſichtigt, nur hie und da bereitet man daraus ein Glüko.

C. Bergamia, C. Lumma, die ſüße Limonie, findet ſich in den Hesperiden-Gärten der Inſel Naxos.

Der gemeinſte Baum unter den Hesperiden-Bäumen iſt der Citronenbaum, C. Limonium. Eine Citrone in der Hand zu tragen, bei dem Gange zum Tode oder um Todte zu begleiten, iſt bei den meiſten Völkern, wo Citronen zu bekommen ſind, ſeit den älteſten Zeiten gebräuchlich und dieſe Sitte erwähnt auch Athenäus. Selten findet ſich ebenfalls auf Naxos und auch auf der Inſel Poros C. decumana.

Die Schale von C. decumana nebſt einer Tinctur aus Maſtix gilt zur Zeit der Cholera bei den Hebräern als Specificum gegen dieſe Krankheit und zwar wird der aus den Schalen erhaltene mit dem ätheriſchen Oele vermiſchte Saft der Tinct. Mastichis beigemiſcht und dem Cholerakranken beigebracht, ein Hülfsmittel, das jedoch geheim gehalten wird. Um ſolches auszumitteln, mußte ich einem ſolchen Geheimnißkrämer, als ich mich während einer ſolchen Cholera-Epoche in Smyrna und Konſtantinopel befand, ein bedeutendes Bachſis, Geldgeſchenk, ſpringen laſſen. Sehr intereſſant iſt es, daß dieſes Heilmittel nur bei den Juden im Ruf ſteht und von ihren Cholera-Aerzten, größtentheils Empirikern, und zwar mit dem günſtigſten Erfolge zur Zeit der Cholera angewendet wurde. Es iſt bekannt, daß man dieſe Frucht in den älteſten Zeiten den Mediſchen, ſpäter den Aſſyriſchen Apfel und auch *Κίδρειον* nannte, woraus Citrone gebildet wurde. In Deutſchland nannte man ſie Judenäpfel, weil ſie die Juden zum Laubhüttenfeſte gebrauchten, dazu oft für ungeheure Preiſe erkauften. — Dieſe Früchte, die aus Naxos gebracht werden, zeigen oft die Größe eines kleinen Kindskopfes und deren Schale einen oder mehrere Eindrücke, als ob hineingebiſſen wäre, weßhalb ſie die Juden für die Frucht halten, in welche Adam gebiſſen hat, und deßhalb wird dieſe Frucht auch Adams- oder Paradiesapfel, Malus Assyria Plinius genannt.

(Dr. Landerer in der „Flora“.)

Personal-Notizen.

† Die Gärtnerei hat wiederum einen harten Verlust erlitten. Am 12. December v. J. starb der Hofgarten-Inspector Herr Bayer, Vorstand des Königl. Großen Gartens und der Obsttreibereien zu Herrenhausen bei Hannover. Der Verstorbene hatte ein Alter von 69 Jahren und 9 Monaten erreicht.

Correspondenz-Notizen.

Hrn. F. Sy. in Hildesheim. Die mir zur Bestimmung eingesandte Pflanze ist, wie Ihnen schon mitgetheilt, richtig das seltene Dasylirium Hartwegianum Zucc.

Hrn. J. F. C. K—r in Hildesheim. Die Berichtigung kam für's 12. Heft zu spät, erfolgt in diesem.

Hrn. L. in Reisen. Dank für das Uebersandte. Sobald sich etwas Passendes finden sollte, werde ich Ihnen Mittheilung machen.

Hrn. C. B. in Bremen. Dank für Ihre Mittheilungen über Cyanophyllum und soll es mich freuen mehr dergleichen Notizen zu erhalten. Ich habe auch keinen Augenblick gezweifelt, daß auch andere Kultivateure gleich schöne Exemplare erziehen können, wir hatten aber von gedachter Pflanze noch kein besseres Exemplar gesehen und wurde es von einem der ersten englischen Kultivateure als das schönste Exemplar bezeichnet, welches er auf seiner großen Reise durch Deutschland, Belgien ꝛc. gesehen hatte. —

Beiträge für die Hamburger Gartenzeitung werden auf Verlangen honorirt und können entweder dem Verleger, Herrn R. Kittler, oder der Redaction eingesandt worden. Diejenigen der geehrten Mitarbeiter, welche Extraabdrücke ihrer Aufsätze zu haben wünschen, werden gebeten ihren Wunsch bei Einsendung des Manuscripts uns anzuzeigen, da er später nicht berücksichtigt werden kann. Anonyme Einsendungen finden keine Aufnahme.

Preis-Courant für 1859
über Blumen-, Feld- und Wald-Samen
von **Friedrich Adolph Haage jun. Erfurt (Preußen),**

jetzt im Druck begriffen, wird zur gewohnten Zeit, mit Beginn des neuen Jahres zur Ausgabe bereit sein.

Es ist das Verzeichniß des umfassendsten Lagers von allen im Handel vorkommenden Samen, welche zum großen Theil, in's besondere die feineren Blumen- und Gemüse-Samen, selbst gebaut und die in einigen Gegenden, im In- und Auslande, als eigenthümlich vorkommenden Sorten direct von den zuverlässigsten Züchtern bezogen werden.

Specielle Verzeichnisse über meine ca. 500 Sorten umfassende Sammlung von Pelargonien, sowie über Cacteen, von welchen ich gegenwärtig vielleicht die vollständigste Sammlung in Europa besitze, liegt zur Ausgabe bereit.

Den mir bekannten Geschäftsfreunden wird derselbe wie früher ohne weitere Aufforderung zugehen, und steht derselbe mir noch unbekannten Gartenliebhabern und Landwirthen gratis und franco zu Dienst.

Erfurt, 1. December 1858.

Berichtigungen.

Im letzten Jahrgange der Hamb. Gartenztg. sind einige üble Druckfehler stehen geblieben, die wir nicht unberichtigt lassen können, so lese man:

S. 498, Z. 8 und 9 von Unten: so daß im Herbst die Reben heraus, und wenn im Frühjahr das Erdreich wieder erwärmt wird, wieder hinein geleitet werden.

S. 529, Z. 18 von Oben: oder es nicht verstehe, statt: verständen.

S. 581, Z. 2 von Oben: bestimmenden Platzes, statt: bestimmten.

Obſtkultur in Norwegen.

Herr Fr. Chr. Schübeler hat bekanntlich im XIII. Jahrg. der hamburg. Gartenzeitung, nach Vorausſchickung ſehr ausführlicher Bemerkungen über die Lage und das Klima Norwegens, eine ſehr ſchätzenswerthe Abhandlung über die „nördlich geographiſche Verbreitung der Obſtbäume und beerentragenden Geſträuche in Norwegen“ gegeben, aus der man erſah, daß ſich in Norwegen Obſtbäume aller Art mit großem Vortheil bauen laſſen, und wie uns früher eingeſandte Berichte über die vom Herrn Schübeler veranſtalteten Ausſtellungen zur Beförderung des Gartenbaues und der Landwirthſchaft in Norwegen belehrten (vergl. hambg. Gartenzeitung XII. S. 145), waren auch ſchon auf dieſen Ausſtellungen die verſchiedenſten Fruchtarten in vorzüglicher Qualität ausgeſtellt geweſen. Die früher geringe Obſtkultur in Norwegen erklärt ſich wohl nur durch die Meinung, daß die Anzucht der Bäume nicht von ſo gutem Erfolge gekrönt ſein würde, und durch den Mangel an Männern, welche die Obſtbaum-Kultur in die Hand nahmen und den Leuten zeigten, wie Norwegens Lage und klimatiſchen Verhältniſſe geeignet ſind, faſt jede Art von Obſt und ſonſtige landwirthſchaftliche Produkte zu erzeugen. Durch die von Hrn. Schübeler alljährlich veranſtalteten Ausſtellungen in Chriſtiania hat der Gartenbau und die Landwirthſchaft einen ungemein großen Aufſchwung genommen und wie weit jetzt ſchon der Obſtbau in Norwegen gediehen und wie ſehr man bemüht iſt, die Obſtbaumzucht auch wiſſenſchaftlich zu betreiben, erſehen wir am beſten aus einer uns aus Potsdam gewordenen Mittheilung, in der es heißt:

Vor einigen Wochen erhielt der als kenntnißreicher Pomologe anerkannte Hr. Hofgärtner Carl Fintelmann beim Neuen Palais von Herrn Fr. Chr. Schübeler aus Chriſtiania die Anfrage, ob er ſich wohl der Mühe unterziehen möchte, eine Sammlung von Aepfeln und Birnen, welche als norwegiſche Erzeugniſſe auf einer Fruchtausſtellung in genannter Stadt — die in regelmäßiger Folge dieſes Jahr zum ſechsten Male wiederkehrte — geweſen, zu beſtimmen. Gleiches hatte ſchon früher Hr. Garteninſpector Eduard Lucas in Hohenheim bei Stuttgart gethan, doch war der Weg dorthin gar zu weit, und viele Früchte verdarben ehe ſie anlangten. Auf gegebene Zuſage des Hrn. Fintelmann trafen bald darauf zwei Kiſten, 6½ Ctr. an Gewicht ein, die nicht weniger als 1011 verſchiedene Nummern, bis auf etwa 90 Birnen, lauter Aepfel und in der Mehrzahl wohlconſervirte enthielten, mit deren Claſſification und Benennung Herr Fintelmann noch gegenwärtig auf das eifrigſte beſchäftigt iſt. Da die Sammlung aus den Einſendungen von vielleicht 40—50 Obſtzüchtern gebildet wurde, wiederholten ſich natürlich beliebtere Sorten öfters, dennoch iſt ſchon jetzt zu

überſehen, daß in allem 6—700 verſchiedene Aepfel und 70—80 verſchiedene Birnen vorhanden ſind, ein Reichthum, der bei einem Lande, das ſo weit nördlich liegt, wie Norwegen, wahrhaft in Erſtaunen ſetzen muß. Dieſe Verwunderung wächſt noch bedeutend, wenn man die einzelnen Früchte näher betrachtet. Dieſelben ſind durchweg von einer Schönheit, Fülle, Größe und Fehlerloſigkeit, daß ſie ſogar hier gewonnene, gleichartige Exemplare, die wir daneben ſahen, bei weitem übertrafen. Insbeſondere ſind es die Reinetten, Calvillen und Pigeons oder Taubenäpfel, die man ſonſt vorzugsweiſe nur im ſüdlichen Deutſchland gut vorfindet, welche ſich hier durch den ſchönſten Wuchs auszeichnen und auffällig wenig Roſtflecke auf der kräftig gefärbten Haut zeigen. Der Rambour-Apfel hatte in einzelnen Exemplaren mehr als 1 Pfund Schwere, Gravenſteiner und Calville wogen bis 14 Loth. Vortreffliche rothe Herbſt-Calville, ſo rein und kräftig im Anſehen, als wären ſie in Wachs gegoſſen, reiften auf dem Pfarrhofe Krinden, einige Meilen hinter Drontheim, unter 63½° n. Br. Groß und ſchön waren auch die Birnen. Den brieflichen Mittheilungen des Hrn. Schübeler zufolge, mit welchen die von ihm in der „hamb. Garten- und Blumen-Ztg." (XIII. S. 289) und in einem daraus beſonders abgedruckten Aufſatze „Ueber die geographiſche Verbreitung der Obſtbäume und beerentragenden Geſträuche in Norwegen, enthaltenen Angaben übereinſtimmen, hat man bei Chriſtiania auch in dieſem Jahre im freien Lande, neben einem bedeutenden Sortiment von höchſt vollkommenen und großen Maiskolben, die auch mit überſendet wurden, reife ächte Kaſtanien, Wallnüſſe, Feigen, Trauben, Mandeln, Liebesäpfel (Solanum lycopersicum), Quitten und Mispeln gewonnen, alles Früchte die wir gewohnt ſind, nur tiefer im Süden zu erwarten und nicht in jenem Lande, das neben ſeiner nördlichen Lage noch durch eine hohe und weitgedehnte Gebirgsmaſſe aller Kultur verſchloſſen zu ſein ſchien. In der That ſind von den 5800 geographiſchen Quadratmeilen, welche ganz Norwegen umfaßt, nicht mehr als 50 unter Kultur geſetzt, wenn aber auf dieſen ſo mannichfaltige Früchte zu einer durch ihre Vollkommenheit in Ausbildung und Reife überraſchenden Entwickelung kommen, dann muß dieſes in eigenthümlichen klimatiſchen Verhältniſſen begründet ſein. Herr Schübeler weiſ't ſolche in Bezug auf Norwegens Weſtküſte nach. Einmal übt das Meer an ſich einen temperirenden Einfluß, da z. B. Bergen keine kältere Winter als das 12° ſüdlicher gelegene Oſen hat, und das Meer an der ganzen Weſt- und Nordküſte nicht zufriert. Dann zeitigt die Länge der Sommertage die Früchte ſchneller, indem z. B. in Chriſtiana die Sonne am längſten Tage von 2 Uhr 39 Min. früh bis 9 Uhr 23 Min. Abends über dem Horizonte iſt und des Nachts die beſtändige Dämmerung vom 22ſten April bis 22ſten Auguſt währt. Gerſte wächſt in Alten unter 70° n. B., wo die Sonne vom 24. Mai bis 19. Juni nicht untergeht in 24 Stunden um 2½ Zoll, Erbſen um volle 3 Zoll und obwohl der Nachtfröſte wegen vor dem 20—24. Juni keine Gerſte geſäet wird, kann man ſie doch ſchon unter gewöhnlichen Verhältniſſen Ende Auguſt einfahren und ſie liefert noch 6—7fältigen Ertrag. Der Hauptgrund indeß, daß Norwegen ein ſo mildes Klima hat, wie kein anderes Land auf Erden, welches mit ihm gleich weit vom Aequator entfernt liegt, und daß es alſo

einen so ungewöhnlichen Reichthum an edlem Wirthschafts- und Tafelobst zu erzeugen vermag, liegt in der Einwirkung des von Amerikas Küsten hier herüberreichenden merkwürdigen Golfstromes, der an Norwegens Gestade, die er unterm 62° n. Br. trifft und von da bis 68° bespült, während ein Theil südlich bis 59° geht, fortwährend einen Strom warmen Wassers führt und dadurch eine warme und feuchte Luft hervorbringt, durch welche die Früchte zur Reife gebracht werden.

Ueber einige Garten-Orchideen.

Von Professor Dr. H. G. Reichenbach fil.

(Fortsetzung von Seite 21 des vorigen Jahrganges.)

IV.

31. **Dendrobium (Pedilonum) heterostigma.**

Aff. Dendrobio secundo: calcari spurio medio inflato, dorso angulato; labello lineari spatulato, apice obtusiusculo carneso marginibus involuto, membrana angulato incisa ante basin; in calcaris medio adnato; gynostemii cornubus (angulis) acutis simplicibus; fovea rotunda.

Flores illis Dendrobii secundi majores, pulchre amethystini, calcari albido. Stigmata quaterna (!).

Eine sehr hübsche Art, gegen die selbst die schönsten Abarten des Dendrobium secundum weit zurückstehen. Die Amethystfarbe der Blüthe ist brennend.

Aus Java von Herrn Consul Schiller eingeführt, von Herrn Stange kultivirt.

32. **Dendrobium (Pedilonum) thyrsodes.**

Aff. Dendrobio secundo: spicis abbreviatis numerosis, labello lineari apice rhombeo plano.

Dendrobium Kublii Lindl. (minime Bl!!!) Bot. Reg. 1847. tab. 47.

33. **Saccolabium trichromum.**

Aff. Saccol. ruhro et paniculato: racemo brevi folio duplo breviore, calcari subcylindraceo ovarium pedicellatum subaequante, lobis lateralibus erectis semiovatis, lobo medio triangulo brevissimo, lamina triloba sub basi lobi medii.

Planta axeltata pluripedalis. Folia spithamaea linearia apice aequi- seu inaequi-biloba. Racemus densiflorus. Bracteae abbreviatae. Sepala oblongo ligulata. Tepala ovata ligulata. Omnia albido flavida. Calcar ejusdem coloris striolis purpureis, quae et in labello intus et sepalis extus reperiendae.

Eine wenig ausgezeichnet gefärbte Art, deren langspornige Blüthen,

dicht nebeneinander geſtellt, ſehr an die des viel graciöſeren Saccolabium Wightianum erinnern. Ich fürchte, die Pflanze wird nicht viele Verehrer finden.

Aus Oſtindien von Herrn Conſul Schiller eingeführt, von Herrn Stange kultivirt.

34. Trigonidium turbinatum.

Pseudobulbis; turbinatis octocostatis brevibus, approximatis folio oblongo-lanceolato basi lata sessili; sepalis oblongo-lanceolatis acutis apice reflexis, tepalis oblongis acutis trinerviis, labello ligulato basi angustato, antice trilobulo, lobo medio semiovato, incrassato, carinis geminis a basi in medium, ibi subito incurvis.

Wenn auch nicht eben hübſch von Blüthe, iſt dieſe Art dennoch ihrer Bulben wegen eine große Merkwürdigkeit in einer Gattung, deren Arten durch flache, zweiſchneidige, von einander weit entfernte Bulben ſich auszeichnen.

Von Rio eingeführt durch Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Hrn. Stange.

35. Epidendrum bifidum Lindl.

Sepala oblongo ligulata, flava, ante apicem purpureo signata. Tepala lineari spatulata, aequicoloria. Labellum basi cum gynostemio connatum, tripartitum, partitiones laterales rhombeae concavae, cucullatae gynostemium amplexae, partitio media cuneata, oblonga, apice exciso biloba, limbus crenulatus, carinae angulatae extrorsae geminae a basi partitionum lateralium in basin partitionis mediae, carina verrucosa interjecta a basi partitionis mediae. Labellum flavum, partitiones laterales brunneo striatae, maculae purpureae antico ante sinum labelli; striae quaedam purpureae in medio labello supra carinas.

Herr Conſul Schiller führte dieſe Form von St. Domingo ein. Sie war von Sir R. Schomburgk geſendet und blühte unter Herrn Stanges Kultur. Es iſt eine nette Pflanze, die reichblüthig nicht ohne Effekt bleiben wird.

Eine andere Form erhielt ich aus dem Garten des Herrn R. de Petiteville au Chateau de Petiteville. Sie ſtammte gleichfalls von St. Domingo und wurde die Notiz mitgetheilt, der Blüthenſtiel bleibe mehrere Jahre nach einander nach der Art der Phalaenopsis. Dieſe Abart war ungleich lebhafter gefärbt und machte einen höchſt erfreulichen Eindruck durch die außerordentlich großen, tiefpurpurnen Flecken auf einem gelben und weißen Grunde. Ueber ſie wurde folgendes bemerkt:

Sepala et tepala extus rosea, intus flava, apice atropurpurea. Labellum basin columnae, amplectens, trifidum, auriculae posticae semiligulatae, segmentum medium cuneatum, apice abrupto reniformi bilobum, linea elevata carnosa a basi apicem usque; carinae acutangulae geminae in basi abbreviatae, duae extus elevatae longiores, lineae extimae carinatae. — Color labelli albus, auriculae atropurpureo venosae; discus roseopurpureo aspersus. Gynostemium apice abrupte tridentatum, sub dente extus utrinque ampliatum, flavum. — „Pedunculus perennis“.

36. Pleurothallis foetens Lindl.

Caulis secundarius firmus triqueter; antice longitudinaliter im-

pressus. Folium carnosissimum, cuneato-oblongum, medio latissimum, apice attenuatum, bilobo emarginatum. Spatha brunnea straminea, sicca nervosa, abbreviata. Racemi brevissimi gemini. Axis crassus. Bracteae vaginiformes retusae cum apiculo. Ovaria et perigonia extus velutina. Sepala ovata acuta, lateralia mento bene prominulo; omnia margine ciliata intus verrucosa. Tepala ligulata, acuta, columnam aequantia, brevissima. Labellum cuneato oblongum acutum, lateribus a basi in medium carnoso elevatis. Columna brevis, semiteres, androclinio membranaceo marginato, margine ciliato.

Flores extus pallide flavi, basin versus atropurpurei. Sepala intus aurantiaca, lateralia basin versus atropurpurea. Sepalum impar atropurpureo trilineatum, a basi in medium; paginae internae verruculosae. Tepala albida, linea media atropurpurea. Labellum atropurpureum.

b. Hoffmannseggiana: folio longiori, angustiori, optime cuneato. Pl. Hoffmannseggiana Rchb. fil. Linnaea 1848.

Die Stammart aus dem Garten des Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Herrn Stange. Nach Kenntniß der Originale bleibt gar kein Zweifel, daß beide Formen unbedingt zuſammenfallen.

37. Epidendrum bahiense

juxta Epidendrum longicolle. Flores prope Epidendri cornuti. Sepalis ligulatis, acutis, tepalis linearibus acutis, labello tripartito, partitionibus lateralibus rhombeis, partitione media lancea, callis semiovato ancipitibus in basi, carina obscura interjecta, androclinio denticulato.

Blätter 2½ Zoll lang, ½ Zoll breit. Blüthen halb ſo groß, wie die des E. longicolle, geſtellt wie bei ihm, gelbgrün, außen röthlich angeflogen. Lippe weiß-gelb.

Von Bahia durch Hrn. Conſul Schiller eingeführt, kultivirt von Hrn. Stange.

38. Oncidium dichromaticum Rchb. fil.

Panicula depauperata ramis arcuatis paucifloris. Sepala cuneato ovata, lateralia undulata, divaricata. Tepala cuneato ovata obtusae acuta, undulata; omnia brunnea limbo pallido. Labellum elongatum, basi ima humeratum, dein utrinque obtuse auriculatum, isthmus latus, subaequalis, extrorsum subcurvatus, portio antica transversa, subreniformis, emarginata. Callus ligulatus velutinus, apice trilobus, utrinque dentes duo, posticus major. Gynostemium subgracile. Tabulae limbi membranacei arguti proni; alae utrinque angustae acutae, elongatae. Labellum xanthinum; discus isthmi castaneus, maculae quaedam adjectae.

Eine Art von zierlichem netten Anſehen, die nach längerer Zeit endlich einmal wieder, und zwar von Herrn Commerzienrath Linau in Frankfurt a. O., einging. Von Oncidium ensatum, mit dem ſie Lindley vergleicht, unterſcheidet ſie ſich durch deutliche Macrotepalie, den langen Isthmus, die Schwielen und Flügel und die dünnen Hautränder der Tabula infrastigmatica ganz ausgezeichnet.

39. Lockhartia verrucosa.

Aff. L. luniferae: labelli quinquepartiti callo basilari non lunari, sed hexangulo depresso, antrorsum gyroso, callo inter lobos media-

nos magno multipapuloso quadrisulci. Fernandezia verrucosa Lindl. Herb. Mss!

Folia angusta attenuata, apice obtusata, nunc cum apiculo. Racemus terminalis multibracteatus. Bracteae ovatae acutae basi cordatae. Ovarium pedicellatum bractea sua multo longius. Sepala ovata apiculata deflexa. Tepala oblonga cum apiculo. Labelli partitiones posticae semifalcatae retusae, mediae triangulae porrectae, partitio antica cuneato dilatata, undulata, bifida. Gynostemium humillimum. Alae triangulae magnae hinc lobatae.

Blüthen rankiggelb. Lippe auf Grund und Mitte vielfach purpur gepfleckt und geſtreift. Säulenflügel fein purpurfleckig.

Von Joinville eingeführt durch Hrn. Conſul Schiller, kultivirt von Hrn. Stange.

40. Mormodes histrio Lind. Rchb. fil.

Aff. Mormodi lineato Lindl. (Warscewiczii Klotzsch.) sepalis tepalisque non undulatis, labelli laevis trifidi laciniis lateralibus falcatis tortis, lacinia media lineari acuta.

Pedunculus subpedalis. Spica pluriflora. Sepala ac tepala lanceo-acuminata, atropurpurea. Labellum aureum. (Columna alba?) Flores illis Mormodis lineati aequales.

Schöne Art, indem die goldgelbe Lippe ſehr nett von der ſchwarzpurpurnen übrigen Blüthe abſticht.

In Tabasco von Hrn. Ghiesbreght geſammelt, blühte die Art bei Herrn Director Linden.

V.

41. Bifrenaria leucorrhoda

Aff. Bifrenariae vitellinae Lindl. labelli callo depresso utrinque adnato nec libero, basin versus labelli, nec intra lobos, labello cuneato dilatato, medio utrinque obtusangulo, lobo porrecto ligulato retuso.

Bifrenaria vittellina leucorrhoda Rchb. fil. olim. Racemosa. Flores candidi. Radii labelli antici purpurei. Pubes circumsperna.

Eine ſehr nette Blüthe: weiß mit roſa Strahlen.

Zuerſt blühte ſie im hamburger botaniſchen Garten, kultivirt von Herrn Inſpector Otto. Neulich erhielt ich ſie von Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Hrn. Stange.

42. Gongora truncata Donkelaarii.

Dieſe unterſcheidet ſich von der Stammform durch überaus blaſſe Färbung. Die Lippe iſt elfenbeinweiß und hat an der Baſis einige roſenfarbige Streifchen.

In Herrn Conſul Schiller's Garten kultivirt von Hrn. Stange.

43. Odontoglossum Lindleyanum Rchb. fil.

Odontoglossum epidendroides Lindl. nec H. B. Kth.

Neulich blühte dieſe Pflanze im Garten des Herrn Director Linden zu Brüſſel und bei Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Herrn Stange. Allerdings war eine zierliche Erſcheinung zu erwarten. Das ſternförmig geſprezte Perigon iſt von vollem Hochgelb mit einigen zimmtbraunen Flecken. Die ſchlanke Säule iſt mit dem rinnigen Nagel der Lippe bis zur Hälfte verwachſen. Von der Spitze beiderſeits eckig, ver-

schmälert sie sich und läuft nach oben in zwei feine Fäden aus, die wie die Fühlhörner eines Insekts neben der nach vorn rüsselförmigen Anthere auslaufen. Die Lippe selbst ist weiß und roth gefleckt, die vordere umgeschlagene Hälfte ist gelbbraun, die Spitze hochgelb; über dem braunen Felde stehen zwei große, auf der Rückseite gesägte Hörner.

Herr Director Linden muß noch eine wunderschöne Abart dieser Art von Herrn Wagener besitzen, die zwei- bis dreimal größer ist und beim Aufbrechen der Blüthe olivengrüne Töne hat.

44. **Brassavola Cebolleta Rchb. fil.**

Nächst Brassavola Pumilio Rchb. fil. die kleinblüthigste Art, von der Tracht der B. tuberculata, der sie höchst nahe steht und mit der sie den Kiel auf dem Lippengrunde theilt und in der Farbe übereinstimmt. Sie ist aber sehr viel kleiner, hat ein viel dickeres Blatt, fettere, plötzlich gespitzte Sepalen und viel schmälere Tepalen. Die Flügel der Säule sind weniger vorragend und die Lippe ist stumpf rautenförmig, vorn rundlich spitz und nicht breit gerandet mit Spitzchen!

Recht nahe steht Brassavola retusa Lindl. von Maracaibo. Aber diese ist zweimal so groß und die Lippe vorn gestutzt.

45. **Dendrobium crumenatum Sw.**

Eine Anzahl Blüthen — von Herrn Jagor in Singapore gesammelten Pflanzen angehörig, auf der Wildparkstation von meinem Freunde Hrn. Lauche kultivirt — zeigten deutlich sechs Narben.

46. **Dendrobium secundum Lindl.**

Mehrere Blüthenstände — genau von derselben Quelle — hatten auffällig weißlich rosenrothe Blüthen.

47. **Maxillaria pentura Lindl.**

Pseudobulbus ovoideus anceps, rugosus. Folium cuneato ligulatum acutum ultra pedale. Pedunculus subspithamaeus trivaginatus rufus. Vaginae arctae apice acutae, infra purpureae, supra virides purpureo punctulatae. Bractea aequalis convoluta ovarium aequans. Mentum parvum. Sepala et tepala ligulato acuminata; ultra duos pollices longa. Labellum breve unguiculatum cordato oblongum acutum; limbi postici erecti, pars antica excavata cochleata; tumor carnosus a basi usque ad apicem partis quartae labelli, antice proclivis, color pallide ochraceus, callus sulphureus, antice ruber; lineae rubro-violaceae obscurae radiatae utrinque in latere. Gynostemium semiteres incurvum; rostellum pronum, retusum, excisum. Fovea rotunda. Androclinii limbus minutissimus; carina in medio. Pollinia 4, per paria incumbentia in glandula obtusa oblonga sessilia. Anthera galeata.

Eine sehr eigenthümliche Form, ausgezeichnet durch die sternförmig ausgebreiteten, lang ausgezogenen, fast dreizölligen Sepalen und Tepalen von der Farbe eines recht guten Portweins. Die Lippe ist eilänglich, gegen den Grund stehen die Ränder aufrecht, vorn ist sie ausgehöhlt; Farbe hellbraun; die Schwiele am Hintergrunde citronengelb, links und rechts einige purpurbraune dunkel verzweigte Adern; durch die Mitte hindurch ein brauner in lichtpurpur gehender Streif. Säule weiß, am äußersten Grunde unten mit gelben Streif.

Diese von Linden entdeckte Art erhielt ich zuerst lebend aus dem

hamburger botaniſchen Garten von Herrn Inſpector Otto, von dem ich früher die M. nigrescens zuerſt erhielt.

48. Eria eburnea.

Aff. E. hyacinthoidi Lindl. racemo densiflore, grandiflore, labello trilobo, lobis lateralibus semifalcatis obtusis, lobo medio semiovato limbo involuto, disco laminae late ligularis utrinque calloso, linea callosa verruculosa introrsa utraque canalem per lineam mediam permittente, antrorsum in triangulum exsiliente, callositatem supra lobos laterales extens, basi lobi medii callosa.

„Ceratium eburneum.“

Caulis paucipollicaris, cylindraceus, vaginis fuscis nitidis dense vestitus. Folia lineariligulata plus quam pedalia, basi canaliculata; sat carnosula. Racemi ex axillis squamarum summarum solitarii, axi puberuli. Bracteae squamaeformes minutae. Ovaria tomentosula brevia. Mentum valde obtusangulum. Sepalum summum oblongoligulatum. Tepala lineariligulata. Labellum gynostemio appressum, lobis lateralibus erectis, lobo medio deorsum refracto. Gynostemii pars libera semiteres. Fovea subcordiformis. Androclinium impressum, pronum inter auriculas Rostellum acutum. Anthera mitraeformis, pollinia haud omnino tegens.

Die dicht und großblüthige Traube mit ſchneeweißen, vorn an der Lippe etwas gelblichen Blüthen iſt äußerſt nett. Von Herrn Conſul Schiller eingeführt, kultivirt von Herrn Stange.

49. Evelyna lepida.

Aff. Evelynae cephalophorae Rchb. fil. bracteis lanceo-acuminatis, flores sulphureos longe excedentibus, labello obovato fimbriolato serrulato, callis baseos geminis contiguis.

Caulis atrofusco pilosus. Foliorum vaginae hispido setosae pilis de basi verrucosa deciduis. Laminae a basi rotundata oblongae acuminatae plicatae; utrinque, praesertim infra hinc pilosulae, summae bracteaeformes. Bracteae anthesi roseopurpureae.

Eine Sobralia-artige Orchidee mit an Artiſchocken erinnernden Köpfen von roſig angehauchten Deckblättern, welche die gelben Blüthen verſtecken.

Aus den Gärten der Herren Senator Jeniſch, Conſul Schiller und Booth erhalten, kultivirt von den Herren Kramer, Stange, Boyſen.

50. Oncidium pentecostale.

Aff. O. Kapplerii: labelli disco utrinque ante auriculas macula velutina tecto, callo baseos ex lamellis geminis oblongis lobulatis, antepositis dactylis collateralibus quinis, geminis aliis utrinque ante sinus dactylorum medii et lateralium; gynostemii fovea utrinque sub rostello subrostrato angulo utrinque insiliente, foveae basi dentibus duobus insilientibus, tabula utrinque angulo minore excedente supra majorem, alis oblongis acutis lobulatis.

Habitus Oncidii sphacelati. Panicula octopedalis. Ramus adest bipedalis brachycladus. Ramuli 2—3 flori. Bracteae spathaceae acutae ovario pedicellato ter breviores. Flores viridiflavi. Tepala et sepala dense castaneo tecta. Labellum flavum; disco brunneum,

lobo medio omnino replicatum in cucullum. Alae flavae maculis castaneis.

Von Rio durch Hrn. Consul Schiller eingeführt, kultivirt von Hrn. Stange.

VI.

51. **Laelia irrorata.**

Aff. Laeliae Schillerianae tepalis oblongo lanceis, labelli laevis trilobi lobo antico ovali crispo basi utrinque semicordato, lobis lateralibus obtusangulis magnis.

Die Schillersche Sammlung, überreich an Cattleyoiden, brachte diese Pflanze, die ebenso wenig zu einer bereits bekannten Art zu ziehen ist, als sie andrerseits wesentlich auffällig sich zeigt. Läßt sie sich künstlich leicht durch oben angegebene Merkmale von Laelia Schilleriana trennen, so gehört sie doch ihrem ganzen Gewebe nach weit ab und nähert sich mehr der Cattleya intermedia, der sie überhaupt sehr ähnlich sieht. Die ganz glatte Lippe, die vorn ganz glatte Säule und die Anthere lassen sie leicht von dieser unterscheiden. — Bastard?

52. **Epidendrum prismatocarpum Rchb. fil. 1852.**

Sepala ligulata acuta, prasina, atropurpureo maculata, maculae magnae uniseriatae, transversae, margine lobosae; sepala lateralia extus subcarinata. Tepala falcata acuta, prasina, minus maculata. Labellum infra dimidium gynostemio adnatum (Aulizeum!) unguiculatum, utrinque minute auriculatum, antice longe trulliforme; callus depressus a basi in basin trullae, antice bilobus, omnino biligulatus, limbis prominulis, inde utrinque medios impressus, basi luteus, antice purpureus; trullae discus elevatus. Gynostemium flavum, basi atropurpureum clavatum, apice trifidum; laciniae laterales ovato falcatae, postica lacinia linearis tridentata; rostellum semiovatum medio elevatum, fovea obtusangula. Antherae depressae. Pollinia longa, ligulata compressa, supra caudiculam communem.

Eine prächtige Art. Blüthen groß, lauchgrün mit schwarzpurpurnen Flecken. Lippe gelb und purpurn. „Tracht des Epidendrum cochleatum.“

Dieß ist das „Epidendrum maculatum of Mr. Reichenbach“ der Steven'schen Auction von Bridges Pflanzen. In Herrn Consul Schillers Sammlung von Herrn Stange gezogen.

53. **Maxillaria plebeja**

nulli affinis, caulescens, vaginis sub bulbo fuscis aridis, lanceotriangulis, arcte imbricantibus, bulbo ligulato (utrinque bis impresso), folio ligulato, bene acuto, ovario pedicellato brevi, basi imbricatim plurivaginato, bractea triangula ovarium superante, sepalis ovatis acutis, tepalis ligulatis acutis, labello oblongo medio obscure trilobato, circa limbum minutissimum ciliato denticulato, callo oblongo a basi in medium abrupto, vernixio.

Pseudobulbus vix pollicem longus. Folium ultra pollicare, vix tres lineas latum, basi complicatum, sub apice extus carinatum. Anthera carinata: carina serrata. Flos ochroleucoluteus, labello densius, sepalis tepalisque rarius atropurpureo punctatis.

Aus Brasilien von Herrn Consul Schiller eingeführt, von Herrn Stange kultivirt.

54. **Epidendrum glumaceum** Lindl. (Epidendrum fragrans roseum Hort.)

Eine überraschend hübsche Pflanze, obschon verwandt mit E. fragrans Lindl. (nec. Sw. !!) Die Blüthen mit den welligen, vielfach gekrümmten Sepalen und Tepalen tragen die Lippe nach oben und stehen in dichter walziger Traube.

Herr Stange, der die Pflanze bei Herrn Consul Schiller in Blüthe hatte, bemerkt: „blüht blasrosa auf und färbt sich dann dunkler. Ansehen und Geruch einer rothen Hyacinthe. Blüht schon 6 Wochen, zuletzt wurde sie blasser. Bulben und Blätter zwischen denen der E. cochleatum und lancifolium."

55. **Maxillaria venusta** Lind. Rchb. fil.

Orchideen, welche im November bis Januar blühen, sind alle besonders werthvoll. So hat auch Maxillaria venusta ein gutes Anrecht, berücksichtigt zu werden. Die sehr wohlriechende Blüthe ist schneeweiß, die Hüllblätter sind lang zugespitzt. Von einer Spitze eines seitlichen Sepalums bis zum anderen vier Zoll Breite. Die Lippe ist mit hellgelbem Mehlstaub (zerbrochenen Gliederhaaren) bedeckt, und die Ränder und Seitenlappen sind purpurfarbig.

Diese schöne Art von Ocaña steht nächst Maxillaria anatomorum Rchb. fil. und splendens Endl. Poepp. Ich erhielt sie aus den Gärten der Herren Pescatore, Linden, Booth, Keferstein, Schiller.

56. **Angrecum monodon** Lindl.

Racemi abbreviati. Axis quasi moniliformis. Internodia altero latere apicem versus clavato incrassata, altero foveata. Bracteae hyalinae, superiores brevissimae, infimae amplexicaules. Perigonium tenue hyalinum. Sepala ligulata obtuse acuta, tepala angustiora. Labellum ovatum, a basi latiori rotundatum, antice retusum, nunc trilobulum, limbo crenulatum; callo dentiformi retrorso retuso in basi, calcar conico cylindraceum, arceps, ovario longius. Gynostemium clavatum, androclinium semirotundum, utrinque angulatum, antice medio in processum rostriformem expansum; fovea rotunda. Caudiculae geminae, clavatae; glandula una; pollinia depressa, margine interno perforata.

In Herrn Consul Schillers Sammlung kultivirt von Hrn. Stange.

57. **Oncidium varicosum** Lindl.

Sepala ac tepala subaequalia oblongo undulata obtuse acuta, pallide viridula, maculis fasciisque atropurpureis. Labelli auriculae cuneato flabellatae undulatae supra isthmum ciliolatae, isthmus angustus brevissimus, portio antica transverse reniformis, antice fissa, ceterum lobata, callus rostriformis majusculus inter auriculas, utrinque extrorsum bidentatus, lineae callulis parvis tectae extrorsum radiantes. Gynostemium breve. Foveae limbus utrinque angulatus, juxta rostellum parvum; alae semiovatae subdentatae apice erecto acuto; tabula supra basin utrinque prono obtusangula. — Labellum supra basin angulatum. — Caudicula antice apice acuto intra pollinia.

Eine höchst stattliche Orchidee! Die Sepalen und Tepalen gelblich mit dunkelbraunen Fleckchen. Die Lippe am Grunde mit rothbraun

nen Flecken, ſchön goldgelb. Nachdem die Art meines Wiſſens bisher nur bei Herren de Jonghe in Brüſſel geblüht, erhielt ich ſie dieſer Tage aus der Sammlung der Herren Booth & Söhne in Flottbeck, kultivirt von Herrn Boyſen.

58. Laelia purpurata Lindl.

Dieſe herrliche Art hat auffallende Spielarten z. B. aurorea: mit roth angeflogenen Tepalen; hesperea mit ganz bleicher, faſt weißer Lippe. Letztere blühte bei Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Herrn Stange. Von der Hauptart empfing ich die prächtigſte Blüthe von Herren Booth und Söhne, kultivirt von Herrn Boyſen.

59. Octomeria petulans.

Aff. O. tridentatae Lindl. folio cuneato oblongo acuto, floribus fasciculatis, labello lato, ante unguem humerato, utrinque plicato insidente, trilobo, lobis lateralibus semiovatis semirhombeisve, lobo medio oblongo, ovato rhombeove apice minute tridentatulo, carina obliqua utrinque ante sinum lobarum lateralium et medii lobi, lineis elevatis supra nervos.

Folium in basi infra violaceum. Flores flavi. Labium non pictum.

Eine blaßgelb blühende unerhebliche Art. Vormals in Dresden kultivirt, kam ſie mir jetzt aus dem jardin de l'école de Medicine von Paris zu.

60. Epidendrum Sceptrum Lind.

Dieſe berühmte Art blühte neuerlich bei Frau Senatorin Jeniſch und in Herrn Conſul Schiller's Garten, kultivirt von Herrn Kramer und Stange. Sie gehört zu denen, welche bei kleinen Blüthen durch die Maſſe derſelben Effekt machen, wie die Amphiglottien, Calanthen. Die honiggelbe oder grünliche Hülle trägt ſchwarz purpurne Flecke. Die kampfrautenförmige Lippe (bis kurz vor dem Grunde frei) iſt weiß, mit Purpurflecken überſäet.

Die Gärtnerei des Herrn von Potemkin zu Abrotſchne.

Theils Schickſalsfügung, theils mein eigner Wille hat mich in's nord-öſtliche Rußland geführt; in einen Theil dieſes großen Reiches der uns Deutſchen im Ganzen zu fern liegt, um unſere genaue Aufmerkſamkeit zu feſſeln, und der dies in der That auch weniger verdient als z. B. das ſüdliche Rußland, deſſen mildere Lüfte und reichere Vegetation dieſes Land zu einem weit angenehmeren Aufenthalt, zu einem fruchtbareren Kulturgegenſtande macht, wie manche Theile des übrigen Europas. Und doch, wie denn in den letzten Jahren die Künſte und Wiſſenſchaften einen ganz beſonderen Aufſchwung in Rußland genommen haben, ſo iſt auch ſchon in dieſe nördliche Gegend Flora, die lieb-

liche, reiche, mit ihren zarten Schützlingen vorgedrungen und hat der Kälte und dem langen Winter Trotz geboten, um dem fühlenden und denkenden Menschen in der Einsamkeit seines Winters ihre stillen Freuden zu bereiten, um ihn einigermaßen für die Entbehrungen zu entschädigen, die dieser rauhe Himmelsstrich mit sich bringt.

Mein augenblicklicher Aufenthalt: Abrotschne, das Stammgut des Herrn von Potemkin, liegt unweit der kleineren Stadt Potschinki, circa 260 Werst (32 deutsche Meilen) in süd-süd-östlicher Richtung von Nischni-Nowgorod, also ungefähr auf dem 55° nördlicher Breite und dem 63° östlicher Länge, und ist es nicht so sehr die nördliche wie vielmehr die stark östliche Lage, die dem Klima diesen rauhen Charakter verleiht. Nichts desto weniger habe ich hier eine Gärtnerei gefunden, die selbst in Deutschland mit zu den besten gezählt werden würde, und es wird vielleicht den geehrten Lesern nicht ganz ohne Interesse sein, etwas Näheres über dieselbe zu hören.

Die Ideen, die man sich in Deutschland über russische Gärtnereien macht und die ich meistens habe aussprechen hören, lauten gewöhnlich dahin, daß die Edelleute allerdings große Geldopfer bringen, um eine reiche Pflanzensammlung zu haben, aber die so nördlich gelegenen Etablissements böten dem Gärtner so große Schwierigkeiten und von einer ordentlichen Kultur könne gar keine Rede sein, da man sich nur darauf beschränken müßte, seine Pflanzen nothdürftig am Leben zu erhalten. Hierin liegt allerdings einiges Wahre und es giebt hier Gärtnereien, die in schlechtem Zustande sind, doch ist der Grund davon nicht immer derselbe. Der russische Edelmann wendet sich an einen deutschen Handelsgärtner mit der Bitte, ihm einen tüchtigen Gärtner zu empfehlen. Diese senden aber in der That manchmal Individuen, die den Namen „Gärtner“ wahrlich nicht verdienen, die aber glauben, die Russen seien in Bezug auf Gärtnerei noch so weit zurück, daß es leicht sei sie zufrieden zu stellen. Nun stoßen sie hier auf eine solche Menge Schwierigkeiten, daß ihre bescheidenen Kenntnisse, oft auch ihr Mangel an Denkvermögen nicht ausreichen, diese zu überwinden. Und groß sind die Schwierigkeiten, die sich dem Gärtner hier bieten. Betrachten wir diese etwas näher, um dann desto besser das Verdienst desjenigen würdigen zu können, der ihrer ungeachtet seine Pflanzen in bewunderungswürdigem Zustande von Gesundheit und Ueppigkeit erhält. —

Noch bevor man in den Besitz der im Auslande gekauften Pflanzen gelangt, erkranken sie meistens in Folge des langen Transportes und besonders der weiten Landreise, die sie durch Rußland zu machen haben. Es ist also die erste Aufgabe diese Pflanzen wieder zu gesunden Exemplaren zu schaffen. Wie schwer dies in vielen, wie unmöglich es in manchen Fällen ist, weiß jeder Gärtner, zumal da die Sendungen häufig erst im Spätherbst hier eintreffen können, und die kranken Pflanzen dann den 7 Monate langen Winter zu erdulden haben.*) Was

*) Wie theuer ein solcher Transport kommt, wollen wir unerwähnt lassen, da der russische Edelmann keine Kosten scheut, um nur in den Besitz guter Pflanzen zu gelangen, doch mag beiläufig angeführt werden, daß eine Kiste mit Pflanzen von ca. 300 Fr. Werth mit dem Post-Transport auf 1000 Fr. kommt.

nicht unterwegs gestorben oder erkrankt war, hat nun selbst in den Gewächshäusern noch die größte Gefahr zu bestehen und es erfordert die ganze Geschicklichkeit des Gärtners, nur einige Ueberbleibsel der Sendung zu retten. — Die starke Kälte im Winter macht Doppelfenster unentbehrlich und müssen diese volle 7 Monate auf den Häusern bleiben; Schimmel, Schwamm, Fäulniß, besonders aber bei den an sich schon so kurzen Tagen, — der empfindlichste Mangel an Licht, dies sind die unausbleiblichen Folgen davon. Dichte Schneemassen lagern sich oft auf die Gewächshäuser und verhindern für ganze Tage das Eindringen der Lichtstrahlen. Dann klärt sich der Himmel wieder auf, das Quecksilber fällt bis auf 25—30° R. und schneidende Winde dringen mit eisiger Kälte durch die unbedeutendsten Fugen und Ritzen. Wasserheizungen sind deßhalb durchaus nicht anwendbar und würden diese außerdem durch den Transport hierher auch allzu theuer werden. Die Pflanzen müssen also 7 Monate hindurch die trockene Luft der Canalheizung erdulden, ohne daß man während dieser ganzen Zeit nur ein einziges Mal Luft geben könnte. Kommt dann endlich der ersehnte Sommer, so tritt die Hitze so plötzlich ein, daß das Frühjahr eigentlich nur einige Wochen dauert und oft, wenn in den nach Süden gedeckten Schluchten der Schnee noch Fuß hoch liegt, entwickeln Bäume und Sträucher schon ihre Blüthen und Blätter. Bei alledem ist der Gärtner auf sich allein angewiesen; ihm stehen nicht, wie in deutschen Gärtnereien, selbstständig denkende junge Leute zur Seite, sondern die Russen, die an Zahl allerdings reichlich genug vertreten, sind eben nur Maschinen, die bei jeder Kleinigkeit geleitet werden wollen und denen man auch nicht das Geringste allein überlassen kann. Ueberall muß der Gärtner selbst sein, jede Kleinigkeit selbst anordnen und überwachen, da Maurer-, Zimmer-, Tischler- und Schmiede-Arbeit muß er beaufsichtigen und leiten. Um so anerkennungswerther ist es aber gewiß, wenn trotz aller dieser Schwierigkeiten die Pflanzen im besten Zustande sind und hierzu sind gewiß viel größere Erfahrungen, eine vielseitigere Bildung und ein weit ängstlicheres Ueberwachen nöthig, wie dies in Deutschland der Fall ist. —

Herrn von Potemkin's Gärtnerei steht ein Deutscher, Herr H. Schneeberg vor, über den wir uns jedes weiteren Urtheils enthalten, da die Beschreibung des Etablissements, zu der wir jetzt im Einzelnen übergehen, hinreichend zeigen wird, wie groß die Erfahrungen und die Ausdauer dieses Mannes sein müssen; nur fügen wir hinzu, daß es derselbe ist, der früher mit so glücklichem Erfolg den k. k. russischen Baumschulen in Nikita vorstand, diese Gegend aber seiner Gesundheit wegen verlassen mußte.

Man wird erstaunt sein zu hören, daß die meisten Einführungen von Herrn J. Linden in Brüssel schon die hiesigen Warmhäuser hier zieren und führen wir unter diesen Cyanophyllum magnificum, Begonia Rex und Lazuli, Maranta fasciata und pulchella, Aristolochia leuconeura, Bochmeria argentea und Campylotrys argyroneura als besonders schöne Pflanzen an. Die große Sammlung enthält ferner Prachtexemplare von Medinilla magnifica, Brownea grandiceps *), princeps

*) Beide erst vor nicht langer Zeit aus den berühmten Gewächshäusern der Hrn. James Booth & Söhne, Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen, eingeführt.

und erecta, Banisterien, Gardenien und Theophrasten, die großen Bäume von Ficus pendula, ovata, nitida, infectoria (venosa), Murrayana und subpanduraeformis, von Astrapaea Wallichii, Brexia madagascariensis und chrysophylla zu rechnen. Unter den Araliaceen, sind Aralia Sieboldii, leptophylla und reticulata, farinifera und elegans, Oreopanax Lindenii, Gilibertia und Gastonia palmata und Carolinea fastuosa als besonders schön hervorzuheben. An kleineren Warmhauspflanzen finden wir ferner die herrliche, ganz neue Cossignea borbonica, Maranta albo- und roseo-lineata, Magnolia Plumierii, Begonia Prince Trubetzkoy, Miranda, Madame Wagener und margaritacea, Medinilla Sieboldii, Pandanus furcatus, Zamia Potemkini, Giesbreghtii, Miqueliana und linearis, Dianela australis, Rhopala Jonghii, Skinneri, corcovadensis, glabra und pamplonensis. Stadmannia Jonghii, Theophrasta imperialis und viele andere schöne Pflanzen, doch ist es nicht allein die ausgesuchte Sammlung, sondern vielmehr die üppige Kultur, der reiche Farbenschmuck der Blätter und das von Gesundheit strotzende Aeußere der Gewächse, das wir bewundern müssen. Vorzüglich schön aber ist das große Palmenhaus, das von den edelsten Individuen dieser Aristokratie der Pflanzen-Welt bewohnt wird. Den Mittelpunkt bildet ein herrliches Exemplar von Latania borbonica mit 20 üppigen entfalteten Wedeln, an denen auch nicht eine einzigste Spitze vergelbt ist und welches erst vor 8 Jahren als fußhohes Pflänzchen aus Belgien hieher gebracht wurde, jetzt aber schon eine Pflanze von 15′ Höhe und 20′ Breite ist, und hierin allein kann man die kräftige Kultur in den hiesigen Gewächshäusern erkennen. Um diese herum gruppiren sich große Chamaedoreen, Chamaerops, Cocos, Caryota, Bactris, Areca, Rhapis, Phoenix, Maximiliana, Sabal und andere, doch den schönsten Effekt machen die ausgezeichneten Cycadeen, die in der üppigsten Fülle von Gesundheit ihre 13—15′ langen Wedel entwickeln und der ganzen Gruppe einen äußerst graciösen und zugleich majestätischen Ausdruck geben. Als die besten haben wir Prachtexemplare von Cycas circinalis, Dioon edule, Ceratozamia mexicana, Cycas revoluta und Encephalartos horridus hervor. Das ganze bildet eine große, äußerst geschmackvolle Gruppe, die hin und wieder von ungeheurem Dracaenen, Yucca, Rhopala und derartigen Decorations-Pflanzen überragt und von Crinum, großen Pandanus, Farrn, Scitamineen, Dasylirium, Pinceneetitien und leuchtenden Amaryllis aufs angenehmste unterbrochen wird. Man denke sich nun alle diese Pflanzen in der vollsten Gesundheit, mit kräftig dunkelgrünen Blättern, an denen auch kein Stäubchen, nicht das geringste Ungeziefer zu entdecken ist, und man wird ein schwaches Bild von diesem herrlichen Wintergarten haben. Auch die bizarre Familie der Orchideen ist, wenn eben nicht sehr reichhaltig, doch in ausgesuchten Sorten aus kräftigen Exemplaren vertreten, und bilden diese auf sinnige Weise mit Farrn und Lycopodiaceen vereinigt, eine recht hübsche Gruppe. Unter den Farrn führen wir als besonders schöne Pflanzen Gymnogramma chrysophylla, chrysophylla macrophylla und peruviana, Pteris asperiaulis, Polypodium lanatum, Notochlaena chrysophylla und Cibotium Schiedei auf. —

Doch verlassen wir die tropischen Gewächse, um uns den weniger graciösen, aber deßhalb nicht weniger schönen Kalthaus-Pflanzen zuzuwenden. Hier sind es ganz besonders die Camellien und die Rhododendron, die unsere

Aufmerksamkeit auf's lebhafteste fesseln, denn weder in Deutschland noch im Auslande sahen wir je eine so üppige Kultur, wie diese Pflanzen sie aufweisen. Man könnte diese große Gruppe von 3—35′ hohen Camellien in der That einen Wald nennen, so buschig und dicht belaubt, so üppig und dunkelgrün steht ein Baum neben dem andern. Breit und verzweigt von unten auf tragen die Pyramiden-Bäume ihre Fülle von Knospen zur Schau; majestätisch ragen aus ihrer Mitte die herrlichen Kronenbäume mit 10′ hohen Stämmen und 5′ breiten Kronen hervor, und ihre kräftigen bis 2′ langen Triebe, die an ihrer Spitze einen Büschel von Knospen entwickelt haben, zeigen ein freudiges Wachsthum, eine Kraft und eine Ueppigkeit, wie man es in der That nur selten findet. Vor allem aber nimmt ein prachtvoller Fächerbaum von Camellia alba plena unsere Aufmerksamkeit in Anspruch; 15′ hoch und 12′ breit, ist sie von oben bis unten wie übersäet mit Knospen, jeder kleine Trieb trägt deren wenigstens 2, mancher sogar 5 an seiner Spitze; schon jetzt, in der Mitte des Monats November sind mehrere Knospen dem Aufblühen nahe und es wird nicht lange währen, dann werden einige der Blumen ihr schneeiges Weiß zwischen den dunkelgrünen Blättern entfalten. Nur die besten Sorten von Camellien sind hier vertreten und werden jedes Jahr alle Neuheiten aus erster Quelle bezogen, so daß auch jetzt schon kleine prächtige Pflanzen von C. Princesse de Prusse, Regina dei Giganti, Duc de Jenova, Miniature, Commerzienrath Linau, Dante, Auguste Delfosse, Mrs. Picouline etc. die Aussicht auf eine herrliche Blüthenpracht eröffnen.

Nicht weniger schön wie die Camellien sind die Rhododendron kultivirt; auch sie füllen ein großes, breites Haus, und Knospe auf Knospe ragen aus dem üppigen Blätterschmuck hervor. Die Gruppe, die sie bilden, besteht größtentheils aus 6—8′ breiten Büschen, hin und wieder überragt von einem Kronenbaum, der auf schlank gezogenem Stamme seine kräftige, reich belaubte Krone trägt. Was die Neuheiten in dieser Familie betrifft, so finden wir alle Rhododendron vom Himalaya-Gebirge, von Assam und Botan in kleinen kräftigen Exemplaren vertreten, und unter denen mit gelber Corolle erregt besonders ein herrliches Exemplar von Rh. javanicum unsere Bewunderung. Bevor wir dieses Haus verlassen, wenden wir unsern Blick noch einer Fenstertablette zu, auf der wir die reichste Auswahl von allen neuen Pelargonien, Fuchsien, Rosen und derartigen Pflanzen finden; besonders die letzteren sind sehr reichlich vertreten und besteht das Sortiment aus mehr wie 200 Varietäten, und nur die wirklich schönen und entschieden unter sich abweichenden Sorten werden hier kultivirt. Dann betreten wir das für die aus Australien eingeführten Pflanzen ausschließlich bestimmte Gewächshaus, deren Beschreibung im Einzelnen wir übergehen, um den Leser nicht zu ermüden, doch möge nur erwähnt werden, daß auch sie in üppiger Gesundheit prangen und besonders die Familie der Acacien sehr reichlich in herrlichen Exemplaren vertreten ist. Von hier gelangen wir in ein für kleine Camellien bestimmtes Gewächshaus, aus welchem die Pflanzen nach und nach, wenn sie die gehörige Größe erlangt haben, in oben erwähntes großes Camellienhaus wandern. Das Azaleen-Haus, wohin wir uns jetzt wenden, enthält eine reiche Auswahl der besten Varietäten und finden wir unter diesen ebenfalls schon alle neuen Er-

zeugniſſe der ſo glücklich gelungenen Hybridation der letzten Jahre. Was die Kultur der Azaleen anbetrifft, ſo geben die Pflanzen den berühmten belgiſchen Exemplaren wenig an Ueppigkeit nach.

So ſind wir endlich zum höchſten und umfangreichſten der Gewächshäuſer gelangt, und ſei es uns vergönnt bei dieſem noch einige Augenblicke zu verweilen. Den Mittelpunkt nimmt eine herrliche Araucaria excelsa ein, eine Pflanze von wenigſtens 22′ Höhe, die ihre breiten, fächerartigen Zweige auf's regelmäßigſte nach allen Seiten ausſtreckt; um ſie herum gruppiren ſich zunächſt in allmähliger Abdachung große Cryptomerien, Araucaria Cunninghami, Bidwilli, imbricata und Cookii, ein Prachtexemplar von Pinus australis, Dacrydium elatum und cupressinum und eine Menge anderer ſchöner Coniferen, die alle einzeln zu nennen uns zu weit führen würde; dann erhebt ſich die Gruppe wieder zu beiden Seiten und bildet auf der einen eine herrliche Pflanze von Araucaria brasiliensis, auf der andern Seite die ſchöne Cunonia capensis den Mittelpunkt; ihnen zur Seite ſtehen gewaltige Bäume von Acacia Paulokowskiana, platycentra, elata glaucescens, latifolia floribunda und andern ſchönen Species; zu dieſen geſellen ſich ungeheure Podocarpus wie angustifolia, marginata und latifolia und die Außenwand iſt wieder von ſchönen Coniferen von Pinus Nordmanniana, leiophylla und abschasica, Abies Jezoensis, Libocedrus chilensis, Wellingtonia gigantea, Chamaecyparis nutkaensis, Fitzroya patagonica etc. gebildet. Die Seitengruppen beſtehen größtentheils aus prächtigen Pittosporen, Acacien, Eugenien, Olea, Myrten, Laurus und anderen, von denen jede Pflanze an und für ſich ihrer Ueppigkeit und ihres herrlichen Wuchſes wegen der Bewunderung werth iſt. Der trotz der Größe des Hauſes noch zu geringe Raum geſtattet nur ſchmale Wege zwiſchen den einzelnen Gruppen und man befindet ſich auf dieſer Weiſe wirklich wie in einem immergrünen Walde. Nichts iſt erfreulicher, als wenn man aus den hohen Schneebergen, aus der eiſigen Kälte, die ſtürmende Nordwinde noch empfindlicher machen, plötzlich in dieſen freudig grünen Hain eintritt, und da ſind es beſonders die Coniferen, die ſo entſchieden den Eindruck des Immergrünen, des Beſtändigen, der Ruhe und des Friedens auf jeden fühlenden Menſchen machen. Die größte Reinlichkeit herrſcht außerdem in allen Häuſern, kein vergelbtes Blatt, kein Stäubchen, kein Schwamm iſt zu entdecken und bei dem friſchen kräftigen Ausſehen der Pflanzen vergißt man in der That, daß man ſich in einem Klima befindet, in welchem kein Birnbaum, keine Buche im Freien aushält und wo die Roßkaſtanien und die weiße Akazie ſorgſam bedeckt werden müſſen.

Doch nicht allein auf die Zierpflanzen beſchränkt ſich die hieſige Gärtnerei; Baumſchulen, ſo viel das Klima es eben erlaubt, Stauden, Gemüſegarten, und eine herrliche engliſche Parkanlage verdienen einer ſehr lobenswerthen Erwähnung; doch beſonders ſtaunenerregend iſt die ausgezeichnete Fruchttreiberei, deren Producte in keiner Weiſe den beſten Erzeugniſſen deutſcher und belgiſcher Obſtgärten nachſtehen. Zwar hört man gewöhnlich ausſprechen getriebenes oder überhaupt in Häuſern gezogenes Obſt ſei nie ſo ſchmackhaft, wie das im Freien gereifte, doch haben wir hier Kirſchen, Aepfel, Apricoſen, Pflaumen, Pfirſiche und Birnen gehabt, wie man ſie entſchieden in Deutſchland nicht beſſer

findet. Natürlich sind hierzu bedeutende Räumlichkeiten nöthig und besteht die Obsttreiberei in 4 großen Gewächshäusern, die zusammen wenigstens einen Flächenraum von 12—14000 □Fuß inne haben und mit herrlichen, theils Spalier- theils Kron-Bäumen gefüllt sind. Das Sortiment ist nicht allein sehr reich, sondern es besteht aus den vorzüglichsten Sorten und sind diese so reichlich vermehrt, daß alle Edelleute in der Umgegend von hieraus mit jungen Obstbäumen versorgt werden. Spargel-, Champignon- und Erdbeer-Treiberei ist ebenfalls im üppigsten Gedeihen und sind erstere jetzt so reichlich vorhanden, daß sie bei 10 Ⓐ Weise verschenkt werden, und die Erdbeeren bringen jedes Jahr schon im Monat Februar eine reichliche Menge Früchte.

So haben wir ein schwaches Bild von der hiesigen Gärtnerei entworfen und sind überzeugt, daß man sich im Auslande gewiß keine Idee von der Existenz eines so schönen Etablissements unter diesem rauhen Himmelsstriche machte, aber auch nur die große Pflanzenliebe, das warme Interesse und die unermüdliche Ausdauer des russischen Edelmannes und des deutschen Gärtners sind im Stande die ungeheuren Schwierigkeiten zu überwinden.

Möchte ein ebenso lebhaftes Interesse unter den Pflanzenliebhabern in Deutschland herrschen, dann würden, in dem bei weitem günstigeren Klima, gewiß noch glänzendere Resultate erzielt werden.

C. Claussen.

Die Weinkrankheit.

Trotzdem, daß ein langer Aufsatz über „die Vernichtung der Weinkrankheit“ im 5. Hefte, XIV. Jahrganges dieser Zeitung enthalten ist, hört man dennoch von vielen Seiten, daß ohngeachtet der Anwendung der in diesem Aufsatze angeführten Mittel sich die Weinkrankheit nicht hat wollen schrecken lassen, sondern ohne Gnade um sich griff, die jährige Erndte entweder theilweise verdarb oder gänzlich zu Grunde richtete, und auch die Tragreben für das nächste Jahr nicht zu der Vollkommenheit gedeihen ließ, um auf eine gute Erndte rechnen zu dürfen.

Man wird mir hierauf antworten, daß in solchen Fällen die Schwefelblüthe nicht gehörig angewandt oder daß die Anwendung derselben nicht frühzeitig genug geschehen sei.

Was nun das gehörige Anwenden anbelangt, so wird jeder wissen, der das Schwefeln mit trockner Schwefelblüthe, sei es mit der sogenannten Schwefelfackel, sei es auf andere Art, versucht hat, wieviel Zeit dazu gehört und was dies für ein Stück Arbeit ist, enge Weinhäuser oder Kästen von beträchtlicher Länge, wo sich die Blätter nahe dem Glase befinden, so zu schwefeln, daß es von Nutzen sein kann.

Zweitens in Bezug auf das frühzeitige Schwefeln setze ich den

Fall, daß die Krankheit in ihrem erſten Stadium, ſei es aus Unwiſſenheit, ſei es aus einem andern Grunde nicht ſogleich bemerkt worden iſt. Da das Schwefeln dann nicht mehr hilft, wäre der Wein für dies Jahr rettungs verloren.

Drittens wird Niemand abläugnen können, daß geſchwefelte Trauben mehr oder weniger einen unangenehmen Nachgeſchmack behalten und die Schönheit der Traube bei dem Entfernen der Schwefelblüthe leiden muß.

In meinem Weinkaſten von 9 Fenſter Länge, der gerade in dieſem Jahre etwas ſehr reichlich mit Trauben verſehen war, wuchſen dieſe zu meiner Zufriedenheit aus und fingen an ſich zu färben als ich Ende Auguſt auf einige Zeit verreiſen mußte. Da in dieſem Weinkaſten ſich nie eine Spur der Weinkrankheit gezeigt hatte, ſo rechnete ich auch in dieſem Jahre nicht auf ihren Beſuch und machte deßhalb in Bezug darauf keine Anordnungen.

Bei meiner Rückkehr war das Unglück groß. Der ganze Wein war von der Krankheit befallen, Blätter, Stengel, Alles was grün war, hatte einen weißen mehlartigen Ueberzug und an mehreren Trauben waren die Spitzen und beſonders ſolche Beeren, die noch am weiteſten zurück waren, ſchon welk geworden, kurz die Weinkrankheit war in ihrer größten Ueppigkeit zu ſehen, ſie mußte mit unglaublicher Schnelligkeit um ſich gegriffen haben, wobei ihr noch der günſtige Umſtand zu Gute kam, daß die Erde, worin der Weinſtock ſtand, zu trocken geworden war.

Mochte es helfen oder nicht, Schwefelblüthe und die ſogenannte Schwefelfackel wurden zur Hand genommen. Nachdem ich mit ziemlicher Anſtrengung zwei Fenſter geſchwefelt hatte, bemerkte ich, daß ich ſelbſt mehr von der Schwefelblüthe abbekommen hatte, als der Wein, da ich von oben bis unten gelb war; während dem Wein oder dem Pilz an vielen Stellen nicht anzukommen geweſen war. Die fernere Operation wurde daher unterlaſſen. Gegen Abend dagegen, nachdem die Luftfenſter des Kaſtens geſchloſſen waren, machte ich Holzkohlen glühend, nahm eine kleine Ofenſchaufel voll davon in das Haus und ſtreute eine halbe Handvoll Schwefelblüthe nach und nach auf die glühenden Kohlen, im Hauſe mit denſelben auf- und abgehend, bis mir der Qualm unangenehm wurde, wo dann der Kaſten mit einem matten bläulichen Rauch angefüllt war. Den folgenden Morgen roch das Haus noch unbedeutend nach Schwefel, aber nach ein Paar Stunden Lüften war der Geruch gänzlich verſchwunden, der Pilz wurde unterſucht, die Farbe deſſelben war grauer geworden, die einzelnen Stielchen zuſammengeknickt, alle Anzeichen des Mißbehagens mit dieſer Operation waren an ihm wahrzunehmen, ohne daß die Blätter des Weins mehr gelitten hätten, als ihnen ſchon durch die Krankheit angethan war. Abends wurde das Experiment wiederholt, worauf ich den folgenden Morgen ein öfteres Wiederholen für unnöthig hielt, da ich mich durch das förmliche Zuſammenziehen des Pilzes von deſſen Dahinſcheiden überzeugt hatte. Die Trauben, welche vor meiner Reiſe bald ebenſo weit, als bei meiner Rückkehr waren, wurden noch bis auf ſolche, die ſchon ſehr gelitten hatten reif und ſüß, jedoch kamen ſie 3 Wochen ſpäter als ſonſt und färbten ſich die letzten Trauben nicht gehörig, was ich jedoch nicht dem

Räuchern mit Schwefel Schuld gebe, sondern was wohl daher gekommen ist, daß sie zu spät reiften und der Kasten dann nur von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr Sonne hatte. Wie gut das Verdampfen des Schwefels gegen die rothe Spinne bei der Treiberei von Bohnen, Erdbeeren, Gurken, Pfirsichen hilft, ist eine bekannte Sache und wo es nicht hilft oder die Pflanzen beschädigt, liegt es nur an unvernünftige Handhabung, oder die Pflanzen haben eine ihren Anforderungen ganz contraire Behandlung erhalten. Will natürlich Jemand kranke Pflanzen, die am leichtesten mit der rothen Spinne befallen werden, wo jedoch die Ursache der Krankheit an der falschen Behandlung der Pflanzen liegt, durch Schwefeln wieder gesund machen, so ist es kein Wunder, wenn der Erfolg nicht seinen Erwartungen entspricht. Allerdings hat man vorsichtig damit umzugehen. In Häusern mit Wasserheizung mische man den Schwefel mit Wasser, tauche einen Lappen ein und bestreiche die Röhren mit demselben, je heißer die Röhren werden, desto weniger Schwefel, damit sich nicht auf ein Mal zu viel Dampf entwickele. Bei Kanalheizung nehme ich Wasserbecken, streue Schwefelblüthe hinein und stelle diese auf den Kanal, sollte dies nicht hinreichend wirken, so hat ganz wenig Schwefelblüthe hin und wieder auf den Kanal gestreut, seinen guten Erfolg.

Es unterliegt keinen Zweifel, daß die Schwefelblüthe in trocknem Zustande ihre gute Wirkungen hat, doch eben nur bei Gelegenheiten, wo sie passend angewandt werden kann und wo sie, wie zum Beispiel im Freien gegen Mehlthau und derartige Uebel, sich nur in diesem Zustande anwenden läßt.

F. Stange.

Orchidographische Streitfragen.

Besprochen von Professor Dr. Reichenbach fil.

I. Macodes Lindl.

Vergl. Gardens' Chronicle 1858, pag. 863, b.

Autoren gegenüber, deren Werke man hoch ehrt, bewahrt man gern die äußerste Courtoisie. Im Text der Xenia Orchidacea bei Gelegenheit der Besprechung der Gattung Macodes habe ich dies wieder einmal gethan. Allein mein hochgeehrter Freund, Herr Lindley hat, ohne die ihm gewordene Aufmerksamkeit zu wittern, in No. 48 von Gardeners Chronicle mit jener ächt englischen Ueberhebung seinen alten Irrthum wieder neu aufgetischt, so daß ich mich zu einer recht verständlichen Auseinandersetzung gezwungen sehe.

Macodes Lindl. wurde in „Genera et Species Orchidearum“

hamburger botaniſchen Garten von Herrn Inſpector Otto, von dem ich früher die M. nigrescens zuerſt erhielt.

48. Eria eburnea.

Aff. E. hyacinthoidi Lindl. racemo densiflore, grandiflore, labello trilobo, lobis lateralibus semiſalcatis obtusis, lobo medio semiovato limbo involuto, disco laminae late ligularis utrinque calloso, linea callosa verruculosa introrsa utraque canalem per lineam mediam permittente, antrorsum in triangulum exsiliente, callositatem supra lobos laterales exiens, basi lobi medii callosa.

„Ceratium eburneum.“

Caulis paucipollicaris, cylindraceus, vaginis fuscis nitidis dense vestitus. Folia lineariligulata plus quam pedalia, basi canaliculata; sat carnosula. Racemi ex axillis squamarum summarum solitarii, axi puberuli. Bracteae squamaeformes minutae. Ovaria tomentosula brevia. Mentum valde obtusangulum. Sepalum summum oblongoligulatum. Tepala lineariligulata. Labellum gynostemio appressum, lobis lateralibus erectis, lobo medio deorsum refracto. Gynostemii pars libera semiteres. Fovea subcordiformis. Androclinium impressum, pronum inter auriculas Rostellum acutum. Anthera mitraeformis, pollinia haud omnino tegens.

Die dicht und großblüthige Traube mit ſchneeweißen, vorn an der Lippe etwas gelblichen Blüthen iſt äußerſt nett. Von Herrn Conſul Schiller eingeführt, kultivirt von Herrn Stange.

49. Evelyna lepida.

Aff. Evelynae cephalophorae Rchb. fil. bracteis lanceo-acuminatis, flores sulphureos longe excedentibus, labello obovato fimbriolato serrulato, callis baseos geminis contiguis.

Caulis atrofusco pilosus. Foliorum vaginae hispido setosae pilis de basi verrucosa deciduis. Laminae a basi rotundata oblongae acuminatae plicatae; utrinque, praesertim infra hinc pilosulae, summae bracteaeformes. Bracteae anthesi roseopurpureae.

Eine Sobralia-artige Orchidee mit an Artiſchocken erinnernden Köpfen von roſig angehauchten Deckblättern, welche die gelben Blüthen verſtecken.

Aus den Gärten der Herren Senator Jeniſch, Conſul Schiller und Booth erhalten, kultivirt von den Herren Kramer, Stange, Boyſen.

50. Oncidium pentecostale.

Aff. O. Kapplerii: labelli disco utrinque ante auriculas macula velutina tecto, callo baseos ex lamellis geminis oblongis lobulatis, antepositis dactylis collateralibus quinis, geminis aliis utrinque ante sinus dactylorum medii et lateralium; gynostemii fovea utrinque sub rostello subrostrato angulo utrinque insiliente, foveae basi dentibus duobus insilientibus, tabula utrinque angulo minore excedente supra majorem, alis oblongis acutis lobulatis.

Habitus Oncidii sphacelati. Panicula octopedalis. Ramus adest bipedalis brachycladus. Ramuli 2—3 flori. Bracteae spathaceae acutae ovario pedicellato ter breviores. Flores viridiflavi. Tepala et sepala dense castaneo tecta. Labellum flavum; disco brunneum,

lobo medio omnino replicatum in cucullum. Alae flavae maculis castaneis.

Von Rio durch Hrn. Conſul Schiller eingeführt, kultivirt von Hrn. Stange.

VI.

51. Laelia irrorata.

Aff. Laeliae Schillerianae tepalis oblongo lanceis, labelli laevis trilobi lobo antico ovali crispo basi utrinque semicordato, lobis lateralibus obtusangulis magnis.

Die Schillerſche Sammlung, überreich an Cattleyoiden, brachte dieſe Pflanze, die ebenſo wenig zu einer bereits bekannten Art zu ziehen iſt, als ſie andrerſeits weſentlich auffällig ſich zeigt. Läßt ſie ſich künſtlich leicht durch oben angegebene Merkmale von Laelia Schilleriana trennen, ſo gehört ſie doch ihrem ganzen Gewebe nach weit ab und nähert ſich mehr der Cattleya intermedia, der ſie überhaupt ſehr ähnlich ſieht. Die ganz glatte Lippe, die vorn ganz glatte Säule und die Anthere laſſen ſie leicht von dieſer unterſcheiden. — Baſtard?

52. Epidendrum prismatocarpum Rchb. fil. 1852.

Sepala ligulata acuta, prasina, atropurpureo maculata, maculae magnae uniseriatae, transversae, margine lobosae; sepala lateralia extus subcarinata. Tepala falcata acuta, prasina, minus maculata. Labellum infra dimidium gynostemio adnatum (Aulizeum!) unguiculatum, utrinque minute auriculatum, antice longe trulliforme; callus depressus a basi in basin trullae, antice bilobus, omnino biligulatus, limbis prominulis, inde utrinque medios impressus, basi luteus, antice purpureus; trullae discus elevatus. Gynostemium flavum, basi atropurpureum clavatum, apice trifidum; laciniae laterales ovato falcatae, postica lacinia linearis tridentata; rostellum semiovatum medio elevatum, fovea obtusangula. Antherae depressae. Pollinia longa, ligulata compressa, supra caudiculam communem.

Eine prächtige Art. Blüthen groß, lauchgrün mit ſchwarzpurpurnen Flecken. Lippe gelb und purpurn. „Tracht des Epidendrum cochleatum.“

Dieß iſt das „Epidendrum maculatum of Mr. Reichenbach“ der Steven'ſchen Auction von Bridges Pflanzen. In Herrn Conſul Schillers Sammlung von Herrn Stange gezogen.

53. Maxillaria plebeja

nulli affinis, caulescens, vaginis sub bulbo fuscis aridis, lanceotriangulis, arcte imbricantibus, bulbo ligulato (utrinque bis impresso), folio ligulato, bene acuto, ovario pedicellato brevi, basi imbricatim plurivaginato, bractea triangula ovarium superante, sepalis ovatis acutis, tepalis ligulatis acutis, labello oblongo medio obscure trilobato, circa limbum minutissimum ciliato denticulato, callo oblongo a basi in medium abrupto, vernixio.

Pseudobulbus vix pollicem longus. Folium ultra pollicare, vix tres lineas latum, basi complicatum, sub apice extus carinatum. Anthera carinata: carina serrata. Flos ochroleucoluteus, labello densius, sepalis tepalisque rarius atropurpureo punctatis.

Aus Braſilien von Herrn Conſul Schiller eingeführt, von Herrn Stange kultivirt.

54. Epidendrum glumaceum Lindl. (Epidendrum fragrans roseum Hort.)

Eine überraſchend hübſche Pflanze, obſchon verwandt mit E. fragrans Lindl. (nec. Sw.!!) Die Blüthen mit den welligen, vielfach gekrümmten Sepalen und Tepalen tragen die Lippe nach oben und ſtehen in dichter walziger Traube.

Herr Stange, der die Pflanze bei Herrn Conſul Schiller in Blüthe hatte, bemerkt: „blüht blasroſa auf und färbt ſich dann dunkler. Anſehen und Geruch einer rothen Hyacinthe. Blüht ſchon 6 Wochen, zuletzt wurde ſie blaſſer. Bulben und Blätter zwiſchen denen der E. cochleatum und lancifolium.“

55. Maxillaria venusta Lind. Rchb. fil.

Orchideen, welche im November bis Januar blühen, ſind alle beſonders werthvoll. So hat auch Maxillaria venusta ein gutes Anrecht, berückſichtigt zu werden. Die ſehr wohlriechende Blüthe iſt ſchneeweiß, die Hüllblätter ſind lang zugeſpitzt. Von einer Spitze eines ſeitlichen Sepalums bis zum anderen vier Zoll Breite. Die Lippe iſt mit hellgelbem Mehlſtaub (zerbrochenen Gliederhaaren) bedeckt, und die Ränder und Seitenlappen ſind purpurfarbig.

Dieſe ſchöne Art von Ocaña ſteht nächſt Maxillaria anatomorum Rchb. fil. und splendens Endl. Poepp. Ich erhielt ſie aus den Gärten der Herren Peſcatore, Linden, Booth, Keferſtein, Schiller.

56. Angrecum monodon Lindl.

Racemi abbreviati. Axis quasi moniliformis. Internodia altero latere apicem versus clavato incrassata, altero foveata. Bracteae hyalinae, superiores brevissimae, infimae amplexicaules. Perigonium tenue hyalinum. Sepala ligulata obtuse acuta, tepala angustiora. Labellum ovatum, a basi latiori rotundatum, antice retusum, nunc trilobulum, limbo crenulatum; callo dentiformi retrorse retuso in basi, calcar conico cylindraceum, anceps, ovario longius. Gynostemium clavatum, androclinium semirotundum, utrinque angulatum, antice medio in processum rostriformem expansum; fovea rotunda. Caudiculae geminae, clavatae; glandula una; pollinia depressa, margine interno perforata.

In Herrn Conſul Schillers Sammlung kultivirt von Hrn. Stange.

57. Oncidium varicosum Lindl.

Sepala ac tepala subaequalia oblongo undulata obtuse acuta, pallide viridula, maculis fasciisque atropurpureis. Labelli auriculae cuneato flabellatae undulatae supra isthmum ciliolatae, isthmus angustus brevissimus, portio antica transverse reniformis, antice fissa, ceterum lobata, callus rostriformis majusculus inter auriculas, utrinque extrorsum bidentatus, lineae callulis parvis tectae extrorsum radiantes. Gynostemium breve. Foveae limbus utrinque angulatus, juxta rostellum parvum; alae semiovatae subdentatae apice erecto acutae; tabula supra basin utrinque prono obtusangula. — Labellum supra basin angulatum. — Caudicula antice apice acuto intra pollinia.

Eine höchſt ſtattliche Orchidee! Die Sepalen und Tepalen grünlich mit dunkelbraunen Fleckchen. Die Lippe am Grunde mit rothbraun-

nen Flecken, ſchön goldgelb. Nachdem die Art meines Wiſſens bisher nur bei Herren de Jonghe in Brüſſel geblüht, erhielt ich ſie dieſer Tage aus der Sammlung der Herren Booth & Söhne in Flottbeck, kultivirt von Herrn Boyſen.

58. Laelia purpurata Lindl.

Dieſe herrliche Art hat auffallende Spielarten z. B. aurorea: mit roth angeflogenen Tepalen; hesperea mit ganz bleicher, faſt weißer Lippe. Letztere blühte bei Herrn Conſul Schiller, kultivirt von Herrn Stange. Von der Hauptart empfing ich die prächtigſte Blüthe von Herren Booth und Söhne, kultivirt von Herrn Boyſen.

59. Octomeria petulans.

Aff. O. tridentatae Lindl. folio cuneato oblongo acuto, floribus fasciculatis, labello lato, ante unguem humerato, utrinque plicato insiliente, trilobo, lobis lateralibus semiovatis semirhombeisve, lobo medio oblongo, ovato rhombeove apice minute tridentatulo, carina obliqua utrinque ante sinum lobarum lateralium et medii lobi, lineis elevatis supra nervos.

Folium in basi infra violaceum. Flores flavi. Labium non pictum.

Eine blaßgelb blühende unerhebliche Art. Vormals in Dresden kultivirt, kam ſie mir jetzt aus dem jardin de l'école de Medicine von Paris zu.

60. Epidendrum Sceptrum Lind.

Dieſe berühmte Art blühte neuerlich bei Frau Senatorin Jeniſch und in Herrn Conſul Schiller's Garten, kultivirt von Herrn Kramer und Stange. Sie gehört zu denen, welche bei kleinen Blüthen durch die Maſſe derſelben Effekt machen, wie die Amphiglottien, Calanthen. Die honiggelbe oder grünliche Hälfte trägt ſchwarz purpurne Flecke. Die ſtumpfrautenförmige Lippe (bis kurz vor dem Grunde frei) iſt weiß, mit Purpurflecken überſäet.

Die Gärtnerei des Herrn von Potemkin zu Abrotſchne.

Theils Schickſalsfügung, theils mein eigner Wille hat mich in's nord-öſtliche Rußland geführt; in einen Theil dieſes großen Reiches der uns Deutſchen im Ganzen zu fern liegt, um unſere genaue Aufmerkſamkeit zu feſſeln, und der dies in der That auch weniger verdient wie z. B. das ſüdliche Rußland, deſſen mildere Lüfte und reichere Vegetation dieſes Land zu einem weit angenehmeren Aufenthalt, zu einem dankbareren Kulturgegenſtande macht, wie manche Theile des übrigen Europas. Und doch, wie denn in den letzten Jahren die Künſte und Wiſſenſchaften einen ganz beſonderen Aufſchwung in Rußland genommen haben, ſo iſt auch ſchon in dieſe nördliche Gegend Flora, die lieb-

liche, reiche, mit ihren zarten Schützlingen vorgedrungen und hat der Kälte und dem langen Winter Trotz geboten, um dem fühlenden und denkenden Menschen in der Einsamkeit seines Winters ihre stillen Freuden zu bereiten, um ihn einigermaßen für die Entbehrungen zu entschädigen, die dieser rauhe Himmelsstrich mit sich bringt.

Mein augenblicklicher Aufenthalt: Abrotschne, das Stammgut des Herrn von Potemkin, liegt unweit der kleineren Stadt Potschinki, circa 260 Werst (32 deutsche Meilen) in süd-süd-östlicher Richtung von Nischni-Nowgorod, also ungefähr auf dem 55° nördlicher Breite und dem 63° östlicher Länge, und ist es nicht so sehr die nördliche wie vielmehr die stark östliche Lage, die dem Klima diesen rauhen Charakter verleiht. Nichts desto weniger habe ich hier eine Gärtnerei gefunden, die selbst in Deutschland mit zu den besten gezählt werden würde, und es wird vielleicht den geehrten Lesern nicht ganz ohne Interesse sein, etwas Näheres über dieselbe zu hören.

Die Ideen, die man sich in Deutschland über russische Gärtnereien macht und die ich meistens habe aussprechen hören, lauten gewöhnlich dahin, daß die Edelleute allerdings große Geldopfer bringen, um eine reiche Pflanzensammlung zu haben, aber die so nördlich gelegenen Etablissements böten dem Gärtner so große Schwierigkeiten und von einer ordentlichen Kultur könne gar keine Rede sein, da man sich nur darauf beschränken müßte, seine Pflanzen nothdürftig am Leben zu erhalten. Hierin liegt allerdings einiges Wahre und es giebt hier Gärtnereien, die in schlechtem Zustande sind, doch ist der Grund davon nicht immer derselbe. Der russische Edelmann wendet sich an einen deutschen Handelsgärtner mit der Bitte, ihm einen tüchtigen Gärtner zu empfehlen. Diese senden aber in der That manchmal Individuen, die den Namen „Gärtner“ wahrlich nicht verdienen, die aber glauben, die Russen seien in Bezug auf Gärtnerei noch so weit zurück, daß es leicht sei sie zufrieden zu stellen. Nun stoßen sie hier auf eine solche Menge Schwierigkeiten, daß ihre bescheidenen Kenntnisse, oft auch ihr Mangel an Denkvermögen nicht ausreichen, diese zu überwinden. Und groß sind die Schwierigkeiten, die sich dem Gärtner hier bieten. Betrachten wir diese etwas näher, um dann desto besser das Verdienst desjenigen würdigen zu können, der ihrer ungeachtet seine Pflanzen in bewunderungswürdigem Zustande von Gesundheit und Ueppigkeit erhält. —

Noch bevor man in den Besitz der im Auslande gekauften Pflanzen gelangt, erkranken sie meistens in Folge des langen Transportes und besonders der weiten Landreise, die sie durch Rußland zu machen haben. Es ist also die erste Aufgabe diese Pflanzen wieder zu gesunden Exemplaren zu schaffen. Wie schwer dies in vielen, wie unmöglich es in manchen Fällen ist, weiß jeder Gärtner, zumal da die Sendungen häufig erst im Spätherbst hier eintreffen können, und die kranken Pflanzen dann den 7 Monate langen Winter zu erdulden haben.*) Wa

*) Wie theuer ein solcher Transport kommt, wollen wir unerwähnt lassen, da der russische Edelmann keine Kosten scheut, um nur in den Besitz guter Pflanzen zu gelangen, doch mag beiläufig angeführt werden, daß eine Kiste mit Pflanzen von ca. 300 Fr. Werth mit dem Post-Transport auf 1000 Fr. kommt.

nicht unterwegs gestorben oder erkrankt war, hat nun selbst in den Gewächshäusern noch die größte Gefahr zu bestehen und es erfordert die ganze Geschicklichkeit des Gärtners, nur einige Ueberbleibsel der Sendung zu retten. — Die starke Kälte im Winter macht Doppelfenster unentbehrlich und müssen diese volle 7 Monate auf den Häusern bleiben; Schimmel, Schwamm, Fäulniß, besonders aber bei den an sich schon so kurzen Tagen, — der empfindlichste Mangel an Licht, dies sind die unausbleiblichen Folgen davon. Dichte Schneemassen lagern sich oft auf die Gewächshäuser und verhindern für ganze Tage das Eindringen der Lichtstrahlen. Dann klärt sich der Himmel wieder auf, das Quecksilber fällt bis auf 25—30° R. und schneidende Winde dringen mit eisiger Kälte durch die unbedeutendsten Fugen und Ritzen. Wasserheizungen sind deßhalb durchaus nicht anwendbar und würden diese außerdem durch den Transport hierher auch allzu theuer werden. Die Pflanzen müssen also 7 Monate hindurch die trockene Luft der Canalheizung erdulden, ohne daß man während dieser ganzen Zeit nur ein einziges Mal Luft geben könnte. Kommt dann endlich der ersehnte Sommer, so tritt die Hitze so plötzlich ein, daß das Frühjahr eigentlich nur einige Wochen dauert und oft, wenn in den nach Süden gedeckten Schluchten der Schnee noch Fuß hoch liegt, entwickeln Bäume und Sträucher schon ihre Blüthen und Blätter. Bei alledem ist der Gärtner auf sich allein angewiesen; ihm stehen nicht, wie in deutschen Gärtnereien, selbstständig denkende junge Leute zur Seite, sondern die Russen, die an Zahl allerdings reichlich genug vertreten, sind eben nur Maschinen, die bei jeder Kleinigkeit geleitet werden wollen und denen man auch nicht das Geringste allein überlassen kann. Ueberall muß der Gärtner selbst sein, jede Kleinigkeit selbst anordnen und überwachen, ja Maurer-, Zimmer-, Tischler- und Schmiede-Arbeit muß er beaufsichtigen und leiten. Um so anerkennungswerther ist es aber gewiß, wenn trotz aller dieser Schwierigkeiten die Pflanzen im besten Zustande sind und hierzu sind gewiß viel größere Erfahrungen, eine vielseitigere Bildung und ein weit ängstlicheres Ueberwachen nöthig, wie dies in Deutschland der Fall ist. —

Herrn von Potemkin's Gärtnerei steht ein Deutscher, Herr H. Schneeberg vor, über den wir uns jedes weiteren Urtheils enthalten, da die Beschreibung des Etablissements, zu der wir jetzt im Einzelnen übergehen, hinreichend zeigen wird, wie groß die Erfahrungen und die Ausdauer dieses Mannes sein müssen; nur fügen wir hinzu, daß es derselbe ist, der früher mit so glücklichem Erfolg den k. k. russischen Baumschulen in Nikita vorstand, diese Gegend aber seiner Gesundheit wegen verlassen mußte.

Man wird erstaunt sein zu hören, daß die meisten Einführungen von Herrn J. Linden in Brüssel schon die hiesigen Warmhäuser hier zieren und führen wir unter diesen Cyanophyllum magnificum, Begonia Rex und Lazuli, Maranta fasciata und pulchella, Aristolochia leuconeura, Bochmeria argentea und Campylotrys argyroneura als besonders schöne Pflanzen an. Die große Sammlung enthält ferner Prachtexemplare von Medinilla magnifica, Brownea grandiceps *), princeps

*) Beide erst vor nicht langer Zeit aus den berühmten Gewächshäusern der Hrn. James Booth & Söhne, Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen, eingeführt.

und erecta, Banisterien, Gardenien und Theophrasten, die großen Bäume von Ficus pendula, ovata, nitida, infectoria (venosa), Murrayana und subpanduraeformis, von Astrapaea Wallichii, Brexia madagascariensis und chrysophylla zu rechnen. Unter den Araliaceen, sind Aralia Sieboldii, leptophylla und reticulata, farinifera und elegans, Oreopanax Lindenii, Gilibertia und Gastonia palmata und Carolinea fastuosa als besonders schön hervorzuheben. An kleineren Warmhauspflanzen finden wir ferner die herrliche, ganz neue Cossignea borbonica, Maranta albo- und roseo-lineata, Magnolia Plumierii, Begonia Prince Trombetzkoy, Miranda, Madame Wagener und margaritacea, Medinilla Sieboldii, Pandanus furcatus, Zamia Potemkini, Gleshreghtii, Miqueliana und linearis, Dianela australis, Rhopala Jonghii, Skinneri, corcovadensis, glabra und pamplonensis. Stadmannia Jonghii, Theophrasta imperialis und viele andere schöne Pflanzen, doch ist es nicht allein die ausgesuchte Sammlung, sondern vielmehr die üppige Kultur, der reiche Farbenschmuck der Blätter und das von Gesundheit strotzende Aeußere der Gewächse, das wir bewundern müssen. Vorzüglich schön aber ist das große Palmenhaus, das von den edelsten Individuen dieser Aristokratie der Pflanzen-Welt bewohnt wird. Den Mittelpunkt bildet ein herrliches Exemplar von Latania borbonica mit 20 üppigen entfalteten Wedeln, an denen auch nicht eine einzigste Spitze vergelbt ist und welches erst vor 8 Jahren als fußhohes Pflänzchen aus Belgien hieher gebracht wurde, jetzt aber schon eine Pflanze von 15′ Höhe und 20′ Breite ist, und hierin allein kann man die kräftige Kultur in den hiesigen Gewächshäusern erkennen. Um diese herum gruppiren sich große Chamaedoreen, Chamaerops, Cocos, Caryota, Bactris, Areca, Rhapis, Phoenix, Maximiliana, Sabal und andere, doch den schönsten Effekt machen die ausgezeichneten Cycadeen, die in der üppigsten Fülle von Gesundheit ihre 13—15′ langen Wedel entwickeln und der ganzen Gruppe einen äußerst graciösen und zugleich majestätischen Ausdruck geben. Als die besten haben wir Prachtexemplare von Cycas circinalis, Dioon edule, Ceratozamia mexicana, Cycas revoluta und Encephalartos horridus hervor. Das ganze bildet eine große, äußerst geschmackvolle Gruppe, die hin und wieder von ungeheurem Dracaenen, Yucca, Rhopala und derartigen Decorations-Pflanzen überragt und von Crinum, großen Pandanus, Farrn, Scitamineen, Dasylirium, Pincenectitien und leuchtenden Amaryllis aufs angenehmste unterbrochen wird. Man denke sich nun alle diese Pflanzen in der vollsten Gesundheit, mit kräftig dunkelgrünen Blättern, an denen auch kein Stäubchen, nicht das geringste Ungeziefer zu entdecken ist, und man wird ein schwaches Bild von diesem herrlichen Wintergarten haben. Auch die bizarre Familie der Orchideen ist, wenn eben nicht sehr reichhaltig, doch in ausgesuchten Sorten aus kräftigen Exemplaren vertreten, und bilden diese auf sinnige Weise mit Farrn und Lycopodiaceen vereinigt, eine recht hübsche Gruppe. Unter den Farrn führen wir als besonders schöne Pflanzen Gymnogramma chrysophylla, chrysophylla macrophylla und peruviana, Pteris aspericaulis, Polypodium lanatum, Notochlaena chrysophylla und Cibotium Schiedei auf. —

Doch verlassen wir die tropischen Gewächse, um uns den weniger graciösen, aber deßhalb nicht weniger schönen Kalthaus-Pflanzen zuzuwenden. Hier sind es ganz besonders die Camellien und die Rhododendron, die unsere

Aufmerksamkeit auf's lebhafteste fesseln, denn weder in Deutschland noch im Auslande sahen wir je eine so üppige Kultur, wie diese Pflanzen sie aufweisen. Man könnte diese große Gruppe von 3—35' hohen Camellien in der That einen Wald nennen, so buschig und dicht belaubt, so üppig und dunkelgrün steht ein Baum neben dem andern. Breit und verzweigt von unten auf tragen die Pyramiden-Bäume ihre Fülle von Knospen zur Schau; majestätisch ragen aus ihrer Mitte die herrlichen Kronenbäume mit 10' hohen Stämmen und 5' breiten Kronen hervor, und ihre kräftigen bis 2' langen Triebe, die an ihrer Spitze einen Büschel von Knospen entwickelt haben, zeigen ein freudiges Wachsthum, eine Kraft und eine Ueppigkeit, wie man es in der That nur selten findet. Vor allem aber nimmt ein prachtvoller Fächerbaum von Camellia alba plena unsere Aufmerksamkeit in Anspruch; 15' hoch und 12' breit, ist sie von oben bis unten wie übersäet mit Knospen, jeder kleine Trieb trägt deren wenigstens 2, mancher sogar 5 an seiner Spitze; schon jetzt, in der Mitte des Monats November sind mehrere Knospen dem Aufblühen nahe und es wird nicht lange währen, dann werden einige der Blumen ihr schneeiges Weiß zwischen den dunkelgrünen Blättern entfalten. Nur die besten Sorten von Camellien sind hier vertreten und werden jedes Jahr alle Neuheiten aus erster Quelle bezogen, so daß auch jetzt schon kleine prächtige Pflanzen von C. Princesse de Prusse, Regina dei Giganti, Duc de Jenova, Miniature, Commerzienrath Linau, Dante, Auguste Delfosse, Mrs. Picouline etc. die Aussicht auf eine herrliche Blüthenpracht eröffnen.

Nicht weniger schön wie die Camellien sind die Rhododendron kultivirt; auch sie füllen ein großes, breites Haus, und Knospe auf Knospe ragen aus dem üppigen Blätterschmuck hervor. Die Gruppe, die sie bilden, besteht größtentheils aus 6—8' breiten Büschen, hin und wieder überragt von einem Kronenbaum, der auf schlank gezogenem Stamme seine kräftige, reich belaubte Krone trägt. Was die Neuheiten in dieser Familie betrifft, so finden wir alle Rhododendron vom Himalaya-Gebirge, von Assam und Botan in kleinen kräftigen Exemplaren vertreten, und unter denen mit gelber Corolle erregt besonders ein herrliches Exemplar von Rh. javanicum unsere Bewunderung. Bevor wir dieses Haus verlassen, wenden wir unsern Blick noch einer Fenstertablette zu, auf der wir die reichste Auswahl von allen neuen Pelargonien, Fuchsien, Rosen und derartigen Pflanzen finden; besonders die letzteren sind sehr reichlich vertreten und besteht das Sortiment aus mehr wie 200 Varietäten, und nur die wirklich schönen und entschieden unter sich abweichenden Sorten werden hier kultivirt. Dann betreten wir das für die aus Australien eingeführten Pflanzen ausschließlich bestimmte Gewächshaus, deren Beschreibung im Einzelnen wir übergehen, um den Leser nicht zu ermüden, doch möge nur erwähnt werden, daß auch sie in üppiger Gesundheit prangen und besonders die Familie der Acacien sehr reichlich in herrlichen Exemplaren vertreten ist. Von hier gelangen wir in ein für kleine Camellien bestimmtes Gewächshaus, aus welchem die Pflanzen nach und nach, wenn sie die gehörige Größe erlangt haben, in oben erwähntes großes Camellienhaus wandern. Das Azaleen-Haus, wohin wir uns jetzt wenden, enthält eine reiche Auswahl der besten Varietäten und finden wir unter diesen ebenfalls schon alle neuen Er-

zeugniſſe der ſo glücklich gelungenen Hybridation der letzten Jahre. Was die Kultur der Azaleen anbetrifft, ſo geben die Pflanzen den berühmten belgiſchen Exemplaren wenig an Ueppigkeit nach.

So ſind wir endlich zum höchſten und umfangreichſten der Gewächshäuſer gelangt, und ſei es uns vergönnt bei dieſem noch einige Augenblicke zu verweilen. Den Mittelpunkt nimmt eine herrliche Araucaria excelsa ein, eine Pflanze von wenigſtens 22′ Höhe, die ihre breiten, fächerartigen Zweige auf's regelmäßigſte nach allen Seiten ausſtreckt; um ſie herum gruppiren ſich zunächſt in allmähliger Abdachung große Cryptomerien, Araucaria Cunninghami, Bidwilli, imbricata und Cookii, ein Prachtexemplar von Pinus australis, Dacrydium elatum und cupressinum und eine Menge anderer ſchöner Coniferen, die alle einzeln zu nennen uns zu weit führen würde; dann erhebt ſich die Gruppe wieder zu beiden Seiten und bildet auf der einen eine herrliche Pflanze von Araucaria brasiliensis, auf der andern Seite die ſchöne Cunonia capensis den Mittelpunkt; ihnen zur Seite ſtehen gewaltige Bäume von Acacia Paulokowskiana, platycentra, elata glaucescens, latifolia floribunda und andern ſchönen Species; zu dieſen geſellen ſich ungeheure Podocarpus wie angustifolia, marginata und latifolia und die Außenwand iſt wieder von ſchönen Coniferen von Pinus Nordmanniana, leiophylla und abschasica, Abies Jezoensis, Libocedrus chilensis, Wellingtonia gigantea, Chamaecyparis nutkaensis, Fitzroya patagonica etc. gebildet. Die Seitengruppen beſtehen größtentheils aus prächtigen Plitosporen, Acacien, Eugenien, Olea, Myrten, Laurus und anderen, von denen jede Pflanze an und für ſich ihrer Ueppigkeit und ihres herrlichen Wuchſes wegen der Bewunderung werth iſt. Der trotz der Größe des Hauſes noch zu geringe Raum geſtattet nur ſchmale Wege zwiſchen den einzelnen Gruppen und man befindet ſich auf dieſer Weiſe wirklich wie in einem immergrünen Walde. Nichts iſt erfreulicher, als wenn man aus den hohen Schneebergen, aus der eiſigen Kälte, die ſtürmende Nordwinde noch empfindlicher machen, plötzlich in dieſen freudig grünen Hain eintritt, und da ſind es beſonders die Coniferen, die ſo entſchieden den Eindruck des Immergrünen, des Beſtändigen, der Ruhe und des Friedens auf jeden fühlenden Menſchen machen. Die größte Reinlichkeit herrſcht außerdem in allen Häuſern, kein vergelbtes Blatt, kein Stäubchen, kein Schwamm iſt zu entdecken und bei dem friſchen kräftigen Ausſehen der Pflanzen vergißt man in der That, daß man ſich in einem Klima befindet, in welchem kein Birnbaum, keine Buche im Freien aushält und wo die Roßkaſtanien und die weiße Akazie ſorgſam bedeckt werden müſſen.

Doch nicht allein auf die Zierpflanzen beſchränkt ſich die hieſige Gärtnerei; Baumſchulen, ſo viel das Klima es eben erlaubt, Stauden, Gemüſegarten, und eine herrliche engliſche Parkanlage verdienen einer ſehr lobenswerthen Erwähnung; doch beſonders ſtaunenerregend iſt die ausgezeichnete Fruchttreiberei, deren Producte in keiner Weiſe den beſten Erzeugniſſen deutſcher und belgiſcher Obſtgärten nachſtehen. Zwar hört man gewöhnlich ausſprechen getriebenes oder überhaupt in Häuſern gezogenes Obſt ſei nie ſo ſchmackhaft, wie das im Freien gereifte, doch haben wir hier Kirſchen, Aepfel, Apricoſen, Pflaumen, Pfirſiſche und Birnen gehabt, wie man ſie entſchieden in Deutſchland nicht beſſer

findet. Natürlich sind hierzu bedeutende Räumlichkeiten nöthig und besteht die Obsttreiberei in 4 großen Gewächshäusern, die zusammen wenigstens einen Flächenraum von 12—14000 □Fuß inne haben und mit herrlichen, theils Spalier- theils Kron-Bäumen gefüllt sind. Das Sortiment ist nicht allein sehr reich, sondern es besteht aus den vorzüglichsten Sorten und sind diese so reichlich vermehrt, daß alle Edelleute in der Umgegend von hieraus mit jungen Obstbäumen versorgt werden. Spargel-, Champignon- und Erdbeer-Treiberei ist ebenfalls im üppigsten Gedeihen und sind erstere jetzt so reichlich vorhanden, daß sie bei 10 ℔ Weise verschenkt werden, und die Erdbeeren bringen jedes Jahr schon im Monat Februar eine reichliche Menge Früchte.

So haben wir ein schwaches Bild von der hiesigen Gärtnerei entworfen und sind überzeugt, daß man sich im Auslande gewiß keine Idee von der Existenz eines so schönen Etablissements unter diesem rauhen Himmelsstriche machte, aber auch nur die große Pflanzenliebe, das warme Interesse und die unermüdliche Ausdauer des russischen Edelmannes und des deutschen Gärtners sind im Stande die ungeheuren Schwierigkeiten zu überwinden.

Möchte ein ebenso lebhaftes Interesse unter den Pflanzenliebhabern in Deutschland herrschen, dann würden, in dem bei weitem günstigeren Klima, gewiß noch glänzendere Resultate erzielt werden.

C. Claussen.

Die Weinkrankheit.

Trotzdem, daß ein langer Aufsatz über „die Vernichtung der Weinkrankheit“ im 5. Hefte, XIV. Jahrganges dieser Zeitung enthalten ist, hört man dennoch von vielen Seiten, daß ohngeachtet der Anwendung der in diesem Aufsatze angeführten Mittel sich die Weinkrankheit nicht hat wollen schrecken lassen, sondern ohne Gnade um sich griff, die jährige Erndte entweder theilweise verdarb oder gänzlich zu Grunde richtete, und auch die Tragreben für das nächste Jahr nicht zu der Vollkommenheit gedeihen ließ, um auf eine gute Erndte rechnen zu dürfen.

Man wird mir hierauf antworten, daß in solchen Fällen die Schwefelblüthe nicht gehörig angewandt oder daß die Anwendung derselben nicht frühzeitig genug geschehen sei.

Was nun das gehörige Anwenden anbelangt, so wird jeder wissen, der das Schwefeln mit trockner Schwefelblüthe, sei es mit der sogenannten Schwefelfackel, sei es auf andere Art, versucht hat, wieviel Zeit dazu gehört und was dies für ein Stück Arbeit ist, enge Weinhäuser oder Kästen von beträchtlicher Länge, wo sich die Blätter nahe dem Glase befinden, so zu schwefeln, daß es von Nutzen sein kann.

Zweitens in Bezug auf das frühzeitige Schwefeln setze ich den

Fall, daß die Krankheit in ihrem ersten Stadium, sei es aus Unwissenheit, sei es aus einem andern Grunde nicht sogleich bemerkt worden ist. Da das Schwefeln dann nicht mehr hilft, wäre der Wein für dies Jahr rettungs verloren.

Drittens wird Niemand abläugnen können, daß geschwefelte Trauben mehr oder weniger einen unangenehmen Nachgeschmack behalten und die Schönheit der Traube bei dem Entfernen der Schwefelblüthe leiden muß.

In meinem Weinkasten von 9 Fenster Länge, der gerade in diesem Jahre etwas sehr reichlich mit Trauben versehen war, wuchsen diese zu meiner Zufriedenheit aus und fingen an sich zu färben als ich Ende August auf einige Zeit verreisen mußte. Da in diesem Weinkasten sich nie eine Spur der Weinkrankheit gezeigt hatte, so rechnete ich auch in diesem Jahre nicht auf ihren Besuch und machte deßhalb in Bezug darauf keine Anordnungen.

Bei meiner Rückkehr war das Unglück groß. Der ganze Wein war von der Krankheit befallen, Blätter, Stengel, Alles was grün war, hatte einen weißen mehlartigen Ueberzug und an mehreren Trauben waren die Spitzen und besonders solche Beeren, die noch am weitesten zurück waren, schon welk geworden, kurz die Weinkrankheit war in ihrer größten Ueppigkeit zu sehen, sie mußte mit unglaublicher Schnelligkeit um sich gegriffen haben, wobei ihr noch der günstige Umstand zu Gute kam, daß die Erde, worin der Weinstock stand, zu trocken geworden war.

Mochte es helfen oder nicht, Schwefelblüthe und die sogenannte Schwefelfackel wurden zur Hand genommen. Nachdem ich mit ziemlicher Anstrengung zwei Fenster geschwefelt hatte, bemerkte ich, daß ich selbst mehr von der Schwefelblüthe abbekommen hatte, als der Wein, da ich von oben bis unten gelb war; während dem Wein oder dem Pilz an vielen Stellen nicht anzukommen gewesen war. Die fernere Operation wurde daher unterlassen. Gegen Abend dagegen, nachdem die Luftfenster des Kastens geschlossen waren, machte ich Holzkohlen glühend, nahm eine kleine Ofenschaufel voll davon in das Haus und streute eine halbe Handvoll Schwefelblüthe nach und nach auf die glühenden Kohlen, im Hause mit denselben auf- und abgehend, bis mir der Qualm unangenehm wurde, wo dann der Kasten mit einem matten bläulichen Rauch angefüllt war. Den folgenden Morgen roch das Haus noch unbedeutend nach Schwefel, aber nach ein Paar Stunden Lüften war der Geruch gänzlich verschwunden, der Pilz wurde untersucht, die Farbe desselben war grauer geworden, die einzelnen Stielchen zusammengeknickt, alle Anzeichen des Mißbehagens mit dieser Operation waren an ihm wahrzunehmen, ohne daß die Blätter des Weins mehr gelitten hätten, als ihnen schon durch die Krankheit angethan war. Abends wurde das Experiment wiederholt, worauf ich den folgenden Morgen ein öfteres Wiederholen für unnöthig hielt, da ich mich durch das förmliche Zusammenziehen des Pilzes von dessen Dahinscheiden überzeugt hatte. Die Trauben, welche vor meiner Reise halb ebenso weit, als bei meiner Rückkehr waren, wurden noch bis auf solche, die schon sehr gelitten hatten reif und süß, jedoch kamen sie 3 Wochen später als sonst und färbten sich die letzten Trauben nicht gehörig, was ich jedoch nicht dem

Räuchern mit Schwefel Schuld gebe, sondern was wohl daher gekommen ist, daß sie zu spät reiften und der Kasten dann nur von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr Sonne hatte. Wie gut das Verdampfen des Schwefels gegen die rothe Spinne bei der Treiberei von Bohnen, Erdbeeren, Gurken, Pfirsichen hilft, ist eine bekannte Sache und wo es nicht hilft oder die Pflanzen beschädigt, liegt es nur an unvernünftige Handhabung, oder die Pflanzen haben eine ihren Anforderungen ganz contraire Behandlung erhalten. Will natürlich Jemand kranke Pflanzen, die am leichtesten mit der rothen Spinne befallen werden, wo jedoch die Ursache der Krankheit an der falschen Behandlung der Pflanzen liegt, durch Schwefeln wieder gesund machen, so ist es kein Wunder, wenn der Erfolg nicht seinen Erwartungen entspricht. Allerdings hat man vorsichtig damit umzugehen. In Häusern mit Wasserheizung mische man den Schwefel mit Wasser, tauche einen Lappen ein und bestreiche die Röhren mit demselben, je heißer die Röhren werden, desto weniger Schwefel, damit sich nicht auf ein Mal zu viel Dampf entwickele. Bei Kanalheizung nehme ich Wasserbecken, streue Schwefelblüthe hinein und stelle diese auf den Kanal, sollte dies nicht hinreichend wirken, so hat ganz wenig Schwefelblüthe hin und wieder auf den Kanal gestreut, seinen guten Erfolg.

Es unterliegt keinen Zweifel, daß die Schwefelblüthe in trocknem Zustande ihre gute Wirkungen hat, doch eben nur bei Gelegenheiten, wo sie passend angewandt werden kann und wo sie, wie zum Beispiel im Freien gegen Mehlthau und derartige Uebel, sich nur in diesem Zustande anwenden läßt.

F. Stange.

Orchidographische Streitfragen.

Besprochen von Professor Dr. Reichenbach fil.

I. Macodes Lindl.

Vergl. Gardens' Chronicle 1858, pag. 863, b.

Autoren gegenüber, deren Werke man hoch ehrt, bewahrt man gern die äußerste Courtoisie. Im Text der Xenia Orchidacea bei Gelegenheit der Besprechung der Gattung Macodes habe ich dies wieder einmal gethan. Allein mein hochgeehrter Freund, Herr Lindley hat, ohne die ihm gewordene Aufmerksamkeit zu wittern, in No. 48 von Gardeners Chronicle mit jener ächt englischen Ueberhebung seinen alten Irrthum wieder neu aufgetischt, so daß ich mich zu einer recht verständlichen Auseinandersetzung gezwungen sehe.

Macodes Lindl. wurde in „Genera et Species Orchidearum“

pag. 496 nach Blume's Bild (Tabellen taf. 2) aufgestellt, wo die Blüthe als Neottia Petola recht traurig abgebildet ist. Ganz neuerlich erkannte ich die Gattung wieder in getrockneten Exemplaren aus Java. (Rchb. fil. Bonpl. 1857 pag. 36.) Und auch Herr Lindley hat in einem Exemplar Junghuhn's dieselbe Species erkannt (Journ. of the Proceedings of the Linnean Society of London, 1857, pag. 188.)

Immerhin blieb die Art Herrn Lindley selbst sehr dunkel. Dieß beweise ich durch die mir vorliegende Etikette, wo derselbe 2 Exemplare seiner Macodes Petola, von Reinwardt als Orchis picta bezeichnet, als Anoectochilus setaceus Bl. bestimmte, und dies ist das Document für die am angeführten Orte pag. 179 citirte Localität von Anoectochilus setaceus. Dabei findet sich allerdings ein Bild des ächten Anoectochilus setaceus Bl.

Wenn nun Herr Lindley am angeführten Orte sagt:

„30. Anoectochilus setaceus Blume Bijdr. Taf. 15; Bot. Reg. t. 2010 (Orchis picta, Herb. Reinwardt.) Java, Reinwardt" so ist hervorzuheben:

1) daß die Tafel Bot. Reg. t. 2010 gar nicht Anoectochilus setaceus ist, sondern der ganz verschiedene A. Friderici Augusti Rchb. fil.

2) daß Orchis picta Herb. Reinw. gar nicht ein Anoectochilus, sondern Macodes Petola. —

Nachdem ich nunmehr die Macodes Petola erkannt, konnte es nicht fehlen, daß ich die Verwandtschaft mit einer andern Art ermittelte, die wir längst kannten.

Es war dies die Dossinia marmorata, Morren (Ann. de la Société roy. d'Agr. et de Bot. de Gand IV. p. 171.) oder Cheirostylis marmorata Lindl. (Van Houtte Fl. des serres IV. 1848, tab. 70, pag. 370. Journ. Hort. Soc. V. 79., Paxt. Fl. Gard. I. 14). Anoectochilus Lowei Hort.

In der „Berliner Allgem. Gartenzeitung von Herrn Professor Dr. Karl Koch" stellte ich zuerst 1857, pag. 117 Macodes marmorata Rchb. fil. auf. Ebenso erschien sie im „Schiller'schen Katalog" 1858 pag. 77 und in genannter Gartenzeitung 1857 pag. 317. Ich hatte jedoch Mühe, gute Merkmale zwischen M. marmorata und Petola zu finden; die gedrehte Säule letzterer zeigte sich bei gepreßten Exemplaren nicht; es blieb nur der Umstand, daß erstere auf der Lippe einen größeren dritten Höcker hatte und außerdem einen größeren Mittellappen derselben.

Endlich erschien 1858 Macodes Petola (Anoectochilus Veitchianus) zuerst in Herrn Consul Schiller's Garten. Herr Stange hatte sie sogleich nach der Aehnlichkeit mit Macodes marmorata als Macodes erkannt. Auch im „Blass Garden" (Jardin Blass) blühte sie bald darauf. Der bereits gestochenen Tafel der „Xenia Orchidacea 96" wurden noch die Figuren 4 und 5 hinzugefügt, von denen 4 zeigt, wie die Säule wirklich bei der lebenden Pflanze gedreht ist.

In dem „Journal of the Proceedings of the Linnean Society (March 57 a. a. O.) hatte Herr Lindley eine Uebersicht der Physurideen aufgestellt. Dieselbe läßt viel zu wünschen übrig. Der größte, räthselhafte Fehler ist, daß Chloidia (sollte heißen Corymbis) mitten

unter den Physurideen ſteht, während ſie mit Tropidia und Cnemidia eine eigne Gruppe bildet*)

Was die Unterſchiede von A. und B. anlangt „labellum calcaratum und labellum basi manifeste ventricosum," ſo ſind ſie, wie uns die anderen Erſcheinungen bei Orchideen belehren, nicht beſonders wichtig. In derſelben Gattung können beide Momente vorkommen.

Macodes ſteht mit „columna nana" unter einer Abtheilung mit „labellum posticum." galeatum. Dagegen die nun wieder als Dossinia bezeichnete (früher Cheirostylis genannte) Pflanze unter „labellum anticum."

Nun iſt aber unglaublich leicht zu beweiſen, daß die Drehung der Fruchtknoten, durch die dies labellum anticum und posticum bedingt wird, höchſt untergeordneten Werth hat. In verſchiedenen Perioden der Blüthezeit ändert ſich das Verhältniß, das an fruchttragenden und knospenden Blüthen gar nicht zu beobachten iſt. Dieſer Charakter iſt alſo unglaublich ſchwach, ſelbſt in der Gattung Orchis wies ich vor Jahren eine Art nach, die ihren Fruchtknoten nie dreht, während es alle anderen bekannten Arten thun. Kann man auf dies Moment nicht zwei Species in verſchiedene Gattungen ſtellen, ſo iſt die Trennung zweier Species in zwei verſchiedene Gruppen ganz unerhört. Ueberhaupt iſt mit jener Tabelle die Schwierigkeit der Physurideen noch gar nicht überwunden, wie ich durch mühſame (deutſche) Unterſuchungen vieler Arten beweiſen werde. Mit „Columna nana und elongata" iſt noch gar nichts gethan und eine höchſt wichtige Frage, der Sitz und die Geſtalt der Narbengrube, und die Pollinia gar nicht in ihrem Werthe geahnt.

Ein Blick auf meine Tafel oder noch lieber, auf die lebenden Pflanzen wird die Wahrheit des über Macodes Geſagten belegen. Ich beſtehe auf meine Anſicht und freue mich darauf, Herrn Lindley in den Beſitz in Alkohol geſetzter Blüthen beider Arten zu ſetzen.

(Fortſetzung folgt.)

*) Es findet ſich pag. 188 ein ſeltſamer Schreibfehler: „from the analytical table given in the Gen. et Spec. Orchid. p. 448, there must be excluded Plexaure Endl., ascertained to be a Phreatia by Professor Reichenbach jun., Ulantha Hook., which is a Chloraea." Letztere Thatſache theilte ich eben ſo gut Herrn Profeſſor Lindley mit, der das obige Original Sir William's ſich ausbat und meine Anſicht conſtatirte. Ulantha mag in Zukunft heißen: Chloraea Ulantha Rchb. fil.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften.

Osbeckia aspera *Wight.*

Melastoma asperum L.; Asterostoma asperum Bl.

(Melastomaceae.)

Eine ſehr niedliche Melaſtomacee von Ceylon mit hübſchen dunkelvioletten Blumen, abgebildet im Bot. Mag. tab. 5085.

Monstera Adansonii *Schott.*

Dracontium pertusum L., Calla Dracontium Mey., Calla pertusa Kth., Arum hederaceum Plum.

Eine ſchon ſeit 1752 durch Ph. Miller aus Weſtindien in England eingeführte Aroidee, die von jeher wegen ihrer durchlöcherten Blätter in den meiſten Pflanzenſammlungen zu ſehen war und die jetzt von Schott zur Gattung Monstera gebracht worden iſt, zu der auch die viel ſchönere und impoſantere Art Lennea deliciosa gehört. Obige Art blühte unlängſt im Garten zu Kew und bringt das Bot. Mag. auf tab. 5056 eine Abbildung derſelben.

Apteranthes Gussoniana *Mik.*

Stapelia Gussoniana Jacq., St. europaea Guss., Bircherosia Munbyana Decn.

Asclepiadeae.

Von dieſen, den Stapelien ſehr ähnlichen Pflanzen, kannte man früher nur eine Gattung, heimiſch im ſüdlichen Afrika. Jetzt hat man von dieſer Pflanzengruppe noch die Gattung Caralluma mit zwei Arten, von denen eine in Oſtindien, die andere in Arabien wild wächſt, ferner die Gattung Boucerosia mit 9 Arten, heimiſch in Oſtindien, Arabien und Senegambien und endlich die Gattung Apteranthes, mit der oben genannten Art, die intereſſanteſte von allen, namentlich hinſichtlich ihrer geographiſchen Verbreitung, denn ſie iſt die einzigſte, die dieſe Pflanzengruppe in Europa vertritt. Zuerſt entdeckte ſie Profeſſor Guſſoni auf der Inſel Sicilien, ſpäter fand ſie auch Munby bei Oran in Algier und Webb in Spanien.

Das Ausſehen dieſer Pflanze iſt ganz wie das einer kleinblumigen Stapelia, die Stämme ſind mehr oder weniger hängend, ganz blattlos und fingerdick, 5—6 kantig. Die Blumen ſind klein, in Dolden an den Spitzen der Zweige, 5, 7 oder 8 in einer Dolde und kaum ¾ Zoll groß, fleiſchig, blaßgelb, gefleckt und geſtreift ſchmutzig purpur. Die fünf Blumenblätter zurückgerollt, wollig an den Rändern, wie im Schlunde der Blume. (Bot. Mag. tab. 5087.)

Lobelia trigonocaulis *F. Müll.*

Eine Auſtraliſche Art, entdeckt von Herrn Dr. F. Müller am Berge Lindſay, Moreton Bay. Die Blumen dieſer Art ſind blau und werden durch einen weißen Fleck auf der Lippe gehoben. Dieſe Art ſoll nach Dr. Müller perennirend ſein. (Bot. Mag. tab. 5088.)

Fieldia australis *All. Cun.*

Basyleophyta Frederici Augusti F. Müll.

(Cyrtandraceae.)

Dieſe wenig gekannte und ſonderbare Pflanze iſt ein Bewohner der blauen Gebirge von Neu-Süd-Wales, woſelbſt ſie zuerſt von Hrn.

Caley 1804 entdeckt wurde. Herr All. Cunningham nannte sie nach dem verstorbenen Herrn Baron Field. — Dr. Müller fand diese selbe Art später bei Shoal Haven, Neu-Süd-Wales.

Die Pflanze macht einen sparrig wachsenden Stamm, der mehr oder weniger kletternd ist und auf rauborkigen und mit Moos bedeckten Baumstämmen oft Wurzel schlägt. Die Blätter sind gegenüberstehend, ungleich groß, ein kleines gewöhnlich einem größeren gegenüberstehend, eirund, oder eirund-lanzettlich, zugespitzt, kurz gestielt, grob gesägt, ganzrandig an der Basis, blasser oder rauher auf der untern Seite. Blumenstengel achselständig, fast ein Zoll lang, eine einzelne herabhängende Blume tragend. Blumenkrone $1^1/_2$ Zoll lang, cylindrisch, blaß gelblich-grün, Saum kurz, fünftheilig, flach ausgebreitet. Eine sehr hübsche Pflanze. (Bot. Mag. tab. 5089.)

Billbergia Liboniana *de Jonghe.*

Die hübsche auf Tab. 5090 des Bot. Mag. abgebildete Art erwähnten wir bereits nach der Abbildung in der Flore des serres im XII. Jahrg. S. 15 der hamburg. Gartenztg.

Chelidonium japonicum *Thbg.*

Chelidonium uniflorum Sieb. & Zucc.

Diese Pflanze, wenig verästelt, erreicht eine Höhe von 1—2 Fuß und trägt an den Endspitzen meist eine aber auch öfters 2 und 3 gelbe Blumen, deren Stengel an der Basis zuweilen vereinigt sind. Es ist eine Pflanze von nur geringer Schönheit, die sich auch mit Leichtigkeit kultiviren läßt. Sie wurde vor einiger Zeit durch Herrn von Siebold aus Japan in Leiden eingeführt. Der japanische Name ist Yamabuki Sau. (Abgebildet in den Ann. d'Hortic. et de Botanique du Roy. des Pays Bas II. 8. Liv.

Jochroma coccineum *Schdw.*

Solaneae.

Eine sehr hübsche neuholländische Pflanze. Dieselbe ist von strauchartigem Habitus mit gestielten, länglichen, am Rande wolligen, langzugespitzten glatten Blättern. Die Blumen stehen in doldenförmigen Büscheln, sind röhrenförmig mit flachausgebreitetem Saum, scharlach roth. Eine sehr hübsche Art, welche dieselbe Kultur verlangt wie die übrigen Arten der Gattungen Habrothamnus, Cestrum, Jochroma etc. (Flore des serres tab. 1261.)

Hodgsonia heteroclita *Hook. fil.*

(Trichosanthes heteroclita Roxb. T. grandiflora Wall.)
Cucurbitaceae.

Diese höchst interessante Pflanze stammt aus Sikkim-Himalaya, wo sie von den Herren Dr. Hooker und Thomson in einer Höhe von

5000′ über dem Meere gefunden wurde. Ferner fand man sie in Assam, auf dem Berge Khasia; in Silhet, Chittapong, Penang ꝛc. Die eigenthümlichen Blumen erreichen einen Durchmesser von 6 Zoll und die zimmtfarbenen Früchte haben die Größe einer großen Melone. Die Pflanze ist perennirend, indem sich ihre Stengel verholzen, ähnlich wie bei Sechium edule und da sie zu ihrem Gedeihen die Temperatur von Sicilien oder Algier bedarf, so dürfte sie auch bei uns während des Sommers gut im Freien wachsen, blühen und Früchte tragen.

Der Saum der Blumen, so wohl an den männlichen als an den weiblichen Blumen ist mit langen Fransen besetzt, die meist gedreht sind und der Blume ein ganz eigenthümliches Aussehen verleihen. Obgleich diese Pflanze noch nicht lebend in Europa eingeführt ist, so hielt es die Flore des serres doch für räthlich sie abzubilden (tab. 1262—1263), um die Aufmerksamkeit der Reisenden und Blumenfreunde auf sie zu lenken.

Burlingtonia venusta *Lindl.*

Die Illustration Horticole bringt im 12. Hefte des V. Jahrg., tab. 188 nicht allein eine Abbildung dieser schönen Orchidee, die Reichenbach fil. jedoch zur Gattung Rodriguezia gebracht hat, sondern auch noch eine sehr genaue Beschreibung, da, wie Herr Lemaire sagt, diese Art noch nirgend vollständig beschrieben ist. Die Blumen dieser Orchidee stehen in einer hängenden Rispe; gewöhnlich zu 8—10, beisammen, sind groß, rein weiß, mit einer gelben und purpurnen Zeichnung auf der Lippe.

Leschenaultia biloba *Lindl. var.* Huntsii.

Die Leschenaultia biloba Lindl. auch L. grandiflora DC. ist wegen ihren schönen blauen Blumen allgemein in den Sammlungen bekannt, sie wurde bereits 1841 zuerst von Lindley abgebildet und beschrieben. Die oben genannte, auf tab. 189 der Illustrat. horticole abgebildete Varietät, zeichnet sich vor den Urspecies durch zahlreichere und viel größere, auch wohl intensiver gefärbte blaue Blumen aus.

Erica cerinthoides *var.* coronata.

Die Erica cerinthoides ist eine der prächtigsten Arten, mit großen scharlachrothen Blumen. Die Varietät incarnata ist nicht minder schön, die Blumen sind fast eben so groß, aber weiß mit scharlachroth schattirt und gestrichelt. Abgebildet auf tab. 180 der Illustrat. hortic.)

Rhodoleia Teysmanni *Miq.*

Die herrliche Rhodeleia Championi Hook. abgebildet im Bot. Mag. tab. 4509 nach einer chinesischen Zeichnung, gehört zu den schönsten und interessantesten Pflanzen. Da sie jedoch nur sehr schwer Blüthen hervorbringt, so fand sie nur geringe Beachtung und ist erst jetzt wieder mehr in Aufnahme gekommen, nachdem sie im vorigen Jahre zum ersten

Male in England Blumen erzeugt hat. (Siehe hamburg. Gartenztg. XIV. S. 235.)

Eine zweite Art dieſer Gattung beſchreibt Herr Profeſſor Miquel im 2. Bde. S. 115 der Annales d'Hortic. et de Bot. ou flore des jardins des Royaume des Pays-Bas, die von Herrn Teysman auf Sumatra entdeckt worden iſt. Herr Teysmann fand zwei Formen dieſer Art, nämlich eine kleinere, von den Eingebornen „Kajou barana“ und eine größere „Santoe oder Katji barana“ genannt; erſtere fand er bei Alaham Pandjang, letztere bei Paya Kombo auf der Inſel Sumatra. Beide ſind wie die Rh. Championi ſehr empfehlenswerthe Pflanzen.

Phalaenopsis violaceus *Teysmann.*

Eine der intereſſanteſten Pflanzen, ſchreibt Herr Garteninſpector H. Witte in der von ihm redigirten „flores des jardins du Royaume des Pays Bas,“ welche der bot. Garten zu Leiden durch die Güte des Herrn Teysmann aus Java von Palembang erhalten hat, iſt eine neue Phalaenopsis-Art mit violetten Blumen, die Herr Teysmann Ph. violaceus benannt hat. Von zweien Exemplaren der Ph. amabilis und zweien der Ph. violaceus, die Herr Teysmann in einem Glaskaſten überſandte, iſt nur ein Exemplar der letzten Art lebend angekommen. Schon beim erſten Anblick erkannte man es als ein neues Phalaenopsis, es iſt bei weitem robuſter als die bekannten Arten, die als Ph. amabilis und grandiflora kultivirt werden. Bei der Ankunft hatte die Pflanze nur ein Blatt, das völlig entwickelt eine Länge von 0,26 und eine Breite von 0,065 Metre hatte, aber dann auch bald abfiel. Die Pflanze iſt jedoch noch am Leben, treibt bereits neue Blätter und Wurzel und Herr Witt erwartet mit Begierde die erſte Blüthe, von der dann im genannten Journal eine Abbildung gegeben werden wird.

(In der Sammlung des Herrn Conſul Schiller befindet ſich gleichfalls eine neue noch unbeſchriebene Phalaenopsis-Art, ſollte dies vielleicht dieſelbe Art ſein? auch ſie hat noch nicht geblüht. Die Redact.)

Oncidium armillare *Lindl.*

Eine ſchöne dankbar blühende Art, die in der Gartenflora S. 307 des Jahrg. 1857 beſchrieben und auf Taf. 237 des Jahrg. 1858 abgebildet iſt. Vaterland Venezuela.

Tulpia biflora *L.*

Eine niedliche kleine Tulpe aus dem Süden Rußlands, wo ſie an den Ufern des kaſpiſchen Meeres, der Wolga und in den kaukaſiſchen Provinzen häufig wächſt. Sie trägt gemeiniglich 2 Blumen, die weiß mit gelb und von außen röthlich ſind. — Die Pflanze iſt ganz hart und hält die Winter im freien Lande aus. (Abgebd. in der Gartenfl. Taf. 239.)

Liquidambar Altingiana *Bl.*

(Aus den „Ann. d'Hortic. et de Botanique du Royaume de Pays-Bas, II. Liv. 7. überſetzt von F. W. Klatt.)

Vergangenes Jahr hatte der botaniſche Garten zu Leyden das Glück, Dank den unermüdlichen Bemühungen des Herrn J. E. Teysmann, unter einer guten Zahl intereſſanter Pflanzen, ein recht geſundes Exemplar des Baumes zu erhalten, der in Java den ſundaiſchen Namen **Rasamala** trägt. Derſelbe iſt eine Art aus der Gattung Liquidambar, die in Java durch L. Altingiana Bl. (Altingia excelsa Noronh, Alt. coerulea Poir.), in Kleinaſien durch L. orientale Mill. (L. imberbe Ait.) und im nördlichen Amerika durch L. styraciflua L. vertreten wird. Obwohl anzunehmen, daß der **Rasamala** früher ſchon in Holland eingeführt worden iſt, ſo wird man doch auch überzeugt ſein, daß wenn ſich dieſe Pflanze in irgend einem Garten Europa's fände, alſo nicht wieder verſchwunden wäre, wie im Garten zu Leiden, ſolches ein ganz merkwürdiger Fall, für den bot. Garten zu Leiden einer der glücklichſten wäre. Empfiehlt ſich dieſe Pflanze als Zierde? Das iſt vielleicht zu bezweifeln, denn der Liquidambar Altingiana Bl. iſt nur zu gewiß eine derjenigen Pflanzen, die gewiſſen Gegenden der ſo üppigen Inſel Java ihren phyſionomiſchen Charakter, durch ihre rieſenmäßige Ausdehnung, welche ſie zu einem der rieſigſten Bäume dieſes irdiſchen Paradieſes macht, giebt. Dieſes läßt ſich durch nachfolgende Zeilen des Herrn Junghuhn beweiſen, der ein ſo friſches und hinreißendes Gemälde der Phyſiognomie Java's gezeichnet hat.

„Der Fürſt dieſer Wälder, ſagt dieſer Naturforſcher, indem er von den Wäldern ſpricht, die ſich in der zweiten Zone, (2000—4500 Fuß über dem Meeresſpiegel) finden, iſt der **Rasamala** (Liquidamber Altingiana Bl.), deſſen ſenkrechter Stamm bis zu einer Höhe von 70 bis 100 Fuß von Zweigen entblößt iſt. Von dieſem Punkt an entfaltet ſich ſein kugelförmiger Wipfel, der ſich 50 bis 80 Fuß über die erſten Zweige erhebt, ſo daß die ganze Höhe des Baumes zwiſchen 140—170, oder durchſchnittlich 160 Fuß beträgt. — Dieſe eben mitgetheilten Notizen gründen ſich auf wirkliche Maaße der höchſten Bäume dieſer Art, die Herr Junghuhn hat fällen laſſen. — Man braucht alſo nicht bedenklich zu ſein, zu ſagen, daß die **Rasamalas** die mittlere Höhe von 150 Fuß erreichen, und daß der von Zweigen entblößte Theil des Stammes, welcher ſich in der Geſtalt einer Säule erhebt, die Höhe von 80 Fuß habe. Wenn man ſich die Eichen Europa's, welche doch gewöhnlich 75 Fuß hoch ſind, neben dieſe **Rasamalas** geſtellt denkt, ſo befinden ſich die Wipfel derſelben noch unter den nackten Zweigen der letztern, deren Laub noch 40—60 Fuß höher ſchwebt. Die Dadab (Erythrina indica L.) ſtellen noch ein demüthigeres Schauſpiel unter dieſen Rieſen des Waldes dar. Man hat von Zeit zu Zeit Gelegenheit dieſe zwei Bäume neben einander da, wo man Kaffeepflanzungen in einem ausgerodeten Theil eines jungfräulichen Waldes angelegt hat und wo

der gebliebene Theil ſich dann durch eine recht deutliche Linie begrenzt, zu ſehen. Die hellgrauen Stämme der Rasamalas, welche rieſenmäßige Säulengänge bilden, ſtechen ſehr gegen den ſchattigen und dunkeln Hintergrund des Waldes ab, deſſen Einfaſſung ſie ausmachen; die Dadads der Kaffeepflanzung, welche ſich vor dem Walde von Rasamales finden, ſcheinen nur noch Bäumchen, Gebüſche zu ſein, obwohl ſie eine Höhe von 35—40 Fuß haben! Die Stämme der größten Rasamalas meſſen 10 Fuß über der Erde, noch 5—7 Fuß im Durchmeſſer, ein Umfang, der ſich kaum bis zu der Höhe von 50—60 Fuß um einen Fuß mindert. Es ſind durchaus cylindriſche Säulen, und da die Rinde an ihnen ganz und gar gleich und kahl iſt, ſo fallen ſie um ſo mehr in die Augen, in dem alle anderen Bäume, die ſich zwiſchen ihnen erheben, mit einer ſo großen Zahl Lianen, Farnkräuter und Schmarotzern bedeckt ſind, daß die Rinde unter dem Grün, welches daraus entſteht, verſchwindet. Es heftet ſich nur äußerſt ſelten ein Schmarotzer an den Stamm des Rasamala, den eine hellgraue ebene Rinde umgiebt.

Man findet auch ſehr ſelten Lianengeflechte an ihnen. Ihre Größe und ihr ſehr regelmäßiger Wuchs verſcheuchen die Paraſiten, deßhalb aber iſt es auch unmöglich ihren grünen Wipfel zu erreichen, kein Javaneſe kann ſie erſteigen, das einzigſte Mittel ſich Blätter und Blüthen dieſer Rieſen zu verſchaffen, iſt, ſie zu fällen. — Hier und da verſucht wohl eine Feigenart, Kiara aroë genannt, längs des Stammes der Rasamala emporzuſteigen. Wenn der Stamm dieſer Feige neben einer Rasamala gewurzelt hat, erhebt ſie ſich ſchief ohne Zweige oder Haftwurzeln zu einer Höhe von 60—70 Fuß und bildet eine gleichmäßige Art Schnur von der Dicke eines Fußes. Nachdem ſie ſo den Stamm des Rasamalas bis beinahe zu ſeiner Verzweigung gefolgt iſt, bildet ſie Luftwurzeln, welche faſt in Spiralen den ganzen Baum umhüllen. Höher nehmen dieſe Spiralen die Geſtalt eines Netzes an, welches den Rasamala umhüllt, denn nur erſt in der Höhe von 120—150 Fuß vereinigt ſich endlich das Grüne der Feige mit dem des Rasamala. — Wenn, in einiger Entfernung von dem Stamm, ein Ciſſus (C. papillosa, dichotoma) ſeinen ſchlanken Stamm in einer Länge von 100 Fuß ſenkrecht und ohne ſich zu theilen, von einem der Zweige des Rasamala herabhängen läßt, ſo betrachtet der Reiſende, der ſich dieſen Stamm des Rasamala, ſo umſchlungen und umgeben, entgegenſetzt befindet, das Gemälde mit Entzücken, welches ihm ſo eine vollſtändige Idee von der Hoheit und der wunderbaren Vegetation der tropiſchen Natur geben kann. Und wenn man ſich in einiger Entfernung von dieſem Gemälde, vielleicht auf dem höchſten Punkt eines Berges mit ebenen Boden befindet, und wenn der Wald, der ſeinen Rücken bedeckt, entweder ausſchließlich oder zum größten Theil aus Rasamalas beſteht, ſo ſieht man dann nur die hervorſtehenden Halbkugeln oder die erhabenen Theile der kugeligen Wipfel; die Oberfläche des Waldes ſcheint ein unendlicher Teppich von Halbkugeln zu ſein. Dieſer Anblick iſt ſo überwältigend, daß bei der Betrachtung dieſer Bäume mit den rieſenmäßigen Ausdehnungen der Berg ſelbſt niedriger zu werden ſcheint.

In den Monaten März und April blühen die Rasamalas. Die Oberfläche ihrer Wipfel iſt dann ganz mit kleinen runden Kätzchen männlicher Blüthen in ſolcher Anzahl bedeckt, daß die Fläche unter

ihnen weit und breit eine rothe Färbung von dem Blüthenstaub erhält und daß man in einer beträchtlichen Entfernung die Rasamalas, deren Stämme sich in den Wald verbergen, wie eben so viele glänzende Kugeln, an der rothen Färbung ihrer Wipfel erkennen kann. Der Rasamala erzeugt ein schönes und wohlriechendes Harz, bekannt unter dem sundaischen Namen Kandal, welches aus der Rinde mit der Flüssigkeit des Honigs dringt, sich aber, der Luft ausgesetzt, bald verhärtet und die Risse der Rinde füllt. Dieses Harz findet man in großen Massen von unregelmäßiger Gestalt, in den Höhlungen der alten Stämme und Zweige.

Die kleine Biene ohne Stachel (Melipona vidua Lep. de St. Farg.) hält sich besonders gern und in dichten Schwärmen in diesen theilweise mit Harz gefüllten Höhlen oder in dem Harz selbst auf, der dann durchaus die Eindrücke und Spuren ihres Aufenthalts trägt. Die Risse und Spalten finden sich indessen nur an dem obern Theil des Stammes, man kann daher nur große Massen dieses Harzes, den die Javanesen wie Benzoë gebrauchen, sammeln, wenn man den Baum selbst opfert, in dem man ihn fällt.

Die geographische Verbreitung des Rasamala ist auf der Insel Java sehr begränzt und die Ausdehnung des Kaffeebaues giebt auch seine enger oder weiter gezogenen Gränzen an. Herr Junghuhn hat ihn niemals über 4000 und nie unter 2000 Fuß gefunden. Zwischen 2500—3500 Fuß findet er sich in größter Fülle und Stärke.

Diese Einzelheiten mögen genügen. Man hat nicht nöthig Herrn Junghuhn in die Specialörter zu folgen, wo er diesen Baum in größerer oder geringerer Fülle gefunden hat. Was hier so eben geschrieben, wird gewiß hinreichen die Leser die Liquidambare Altingiana als eine der interessantesten Pflanzen unserer Gewächshäuser, welche einen der größten Riesen des Pflanzenreiches darstellt, kennen zu lehren.

Chrysanthemum indicum.

Das Chrysanthemum indicum L. oder Ch. sinense ist eine der schätzbarsten Pflanzen, die wir besitzen, denn sie ist fast die einzigste Pflanze die in den trüben Herbst- und Wintermonaten ihre prachtvollen Blumen entfaltet und sich zur Ausschmückung der Conservatorien und Zimmer eignet, selbst auch in einem nur einigermaßen günstigen Herbste im Freien bei uns zur Blüthe gelangt. Dies haben die Engländer sofort bei Einführung der ersten Art erkannt und sind es auch sie, denen wir jetzt die so unendlich vielen Varietäten verdanken. In England ist das Chrysanthemum mit seinen vielen Varietäten eine der geachtesten Pflanzen, alljährlich werden Ausstellungen von Chrysanthemum veranstaltet, wodurch die Kultur dieser Pflanze auf eine sehr hohe Stufe gelangt ist. Nur wenige auserlesene Sammlungen finden wir dagegen in Deutschland von wirklich schön kultivirten Exemplare. Wie

weit man in England in der Erzeugung von Varietäten und wie weit man daſelbſt in der Kultur der Chrysanthemum gediehen iſt, davon haben die ausgeſtellten Exemplare auch der von der Londoner Gartenbau Geſellſchaft veranſtalteten großen Herbſt-Ausſtellung am 18. November in St. James Hall v. J., einen neuen Beweis geliefert.

In China kultivirte man das Chrysanthemum ſchon vor einigen Jahrhunderten als eine Lieblingspflanze; Linné citirt bei der Beſchreibung des Chrysanthemum indicum in ſeine Species Plantar. eine Abbildung in dem Hortus malabaricus. Rumphius erzählt in dem Herb. Amboinense, daß man dieſe Pflanze vornehmlich auf kleinen Beeten in den Gärten ziehe, jedoch daß ſie daſelbſt nicht ſo gut gedeihe als in Töpfen. Läßt man die Pflanze mehrere Jahre an einem und demſelben Orte ſtehen, ſo degenerirt ſie leicht, ſie wird weniger holzig und geht leicht ein. Die Chineſen ſchätzen dieſe Pflanze ungemein und verwenden viele Mühe auf die Kultur derſelben, ſie ziehen ſie in Töpfen und ſonſtigen Gefäßen und ſtellen dieſe an die Fenſter ihrer Zimmer, auch zieren ſie bei Gaſtmählern die Tafeln mit dieſen Blumen. Man kennt, ſagt Rumphius, drei Varietäten, zu denen die Chineſen noch eine vierte bringen. Bei der Kultur dieſer Pflanze bemühen ſich die Chineſen die Exemplare ſo niedrig als möglich zu ziehen und möglichſt große Blumen zu erlangen. Um letztere zu erhalten, ſchneiden ſie von den drei Blüthenknospen, die ſich gewöhnlich an den Endſpitzen der Blüthenzweige befinden, zwei ab, wodurch die eine bleibende bedeutend an Größe zunimmt und oft die Größe einer Hand erreicht. Noch erwähnt Rumphius einer fünften Varietät mit weißen Blumen, Tſchay ſay ſi genannt, die ſehr ſelten ſein ſoll und deren Blumen viel kleiner als die der übrigen Varietäten ſind.

Thunberg führt das Chrysanthemum indicum in ſeiner Flora japonica mit auf und ſagt, daß es in Papenberg bei Nagaſaki und an anderen Orten wüchſe, daß man es wegen der Schönheit der Blumen in den Gärten und Häuſern durch ganz Japan vielfach kultivirt fände, und daß die Blumen unendlich in Farbe und Größe variiren. Aehnliches bemerkt Kaempfer in ſeiner Ama. Exot.

Ueber die Einführung des Chrysanthemum indicum in Europa heißt es in einem Leitartikel der Gard. Chron. vom 20. November v. J.: „Wenn Jacob Breyn's deutſche Gärtner zugaben, daß deſſen 6 Sorten der „Kycho no Fannas“ eingingen, glaubten ſie gewiß nicht, daß ein Jahrhundert nöthig wäre, um ſie wieder zu erſetzen und daß wenn ſie wieder eingeführt, zu den prächtigſten aller Herbſtblumen gehören würden. Im Jahre 1688 hatte J. Breyn in ſeinem Garten zu Danzig 6 Sorten dieſer chineſiſchen Pflanze, die er „hellroſa, ſchneeweiß, purpur, ſchmutzig gelb, fleiſchfarben und carmoiſin“ nannte. Erſt im Jahre 1789 fand die alte purpurfarbene Varietät ihren Weg nach Frankreich. Sechs Jahre ſpäter blühte dieſelbe Varietät in Colvill's berühmter Handelsgärtnerei, wohin ſie aus dem Garten zu Kew gelangt ſein ſoll. Aus dieſer alten purpurfarbenen entſtand die variirende weißblumige, der mehrere chineſiſche Sorten folgen, meiſt eingeführt von Sir Abraham Hume. So hatte man 1808 gegen 10 Varietäten, von denen noch jetzt mehrere erinnerlich ſind. In Folge des nun ausgebrochenen Krieges erlitt auch die Gartenkunſt einen Stillſtand,

aber nach Eintritt des Friedens wandte man in England seine Aufmerksamkeit auch wieder auf diese Pflanze, und nun war es ganz besonders die Hortikultural Society, die eine Menge herrlicher Varietäten von China einführte. Im Jahre 1824 war die Zahl der Varietäten schon so groß, daß die Gesellschaft es für wünschenswerth hielt eine eigne Ausstellung dieser Chrysanthemum-Varietäten in ihrem Garten abzuhalten, was denn auch geschah und Herr Joseph Sabine sprach sich über diese Ausstellung dahin aus, daß man wohl niemals eine solche Blumenmasse einer Pflanzenart in so vielen Varietäten beisammen gesehen habe; was würde J. Sabine aber sagen, sähe er die jetzigen Ausstellungen dieser herrlichen Varietäten!

Blickt man 40 Jahre zurück, während welcher Zeit man so recht mit dieser Pflanze vertraut geworden ist, und betrachtet man die Veränderungen, welchen diese Blumen unterworfen sind, so kann man nur die Geduld und die Geschicklichkeit der englischen Gärtner bewundern, die in einem Zeitraume von kaum fünfzig Jahren mehr geleistet haben, als die Chinesen von Anbeginn an. Es ist allerdings wahr, daß noch einige chinesische Sorten in den Sammlungen existiren, jedoch nur wenige, alle anderen sind durch in England erzeugte Varietäten verdrängt worden und vergleicht man diese weniger noch existirenden chinesischen, mit denen von Herrn Bird zu Stoke Newington erzeugten Sämlingen, so verschwinden jene in totale Unbedeutsamkeit. Herr Bird erzog mehrere neue Sämlinge von erstaunender Schönheit. Die Blumen sind fast kugelrund und sind die Blüthen so symetrisch gestellt, als ob sie künstlich gelegt wären. Eine weißblüthige, die „Queen of England“ hatte die Größe einer Mannsfaust.

Ueber hybride Rhododendron.

Durch die Hybridisation sind die Gärtner im Stande die Pflanzensammlungen durch eine fast unberechenbare Menge von neuen Pflanzenformen zu bereichern. Giebt es auch einige Pflanzengattungen bei denen jede Hybridisation ohne Erfolg bleibt, so giebt es dann wieder andere, bei denen der Erfolg fast ohne Grenzen ist. Leider weiß man von sehr vielen Hybriden nicht die Urformen, aus denen sie entstanden sind, anzugeben, denn nur sehr selten haben sich die Gärtner damit befaßt, ihre Erzeugnisse durch künstliche Befruchtung zu registriren, und so ist es unmöglich, mit Bestimmtheit zu sagen, diese oder jene Hybride stammt von dieser oder jener Art.

Die Rhododendron sind in den Sammlungen heut zu Tage durch eine große Zahl von Hybriden vertreten, eine große Menge derselben verdanken wir den Bemühungen des Herrn J. Standish, einem der geschicktesten Handelsgärtner Englands, der sich zugleich die Mühe gegeben hat die Abkunft seiner Erzeugnisse genauer aufzuzeichnen und es

ist nicht ohne Interesse für die Blumenfreunde die Entstehung mehrerer dieser Hybriden, die wir Herrn Standish verdanken, kennen zu lernen.

Die Arten und Varietäten, aus denen die meisten Hybriden hervorgegangen, sind: Rh. arboreum, arb. album; ponticum, pont. purpureum, pont. album; caucasicum; campanulatum; catawbiense und maximum.

Das Rhododendron catawbiense befruchtet mit R. arboreum erzeugte das Rh. altaclarense; aus Rh. catawbiense befruchtet mit altaclarense ging das Rh. Blandyanum hervor; die Befruchtung des Rh. Blandyanum mit dem Rh. Queen Victoria hat das Rh. Blandyanum superbum, Manglesii, Robert Burns, Menziesii, la Countess de Morello, le Général cabrera etc. hervorgebracht.

Aus der Befruchtung des Rh. maximum mit arboreum ging hervor des Rh. Lindleyi, dieses wieder befruchtet mit ponticum album erzeugte eine Menge werthvoller Hybriden mit sehr zart in roth, purpur schattirten und fast weißen Blüthen, letztere wieder befruchtet mit Rh. altaclarense lieferten Paxtonii, Mrs. Beecher Stowe, Gem, Gulnare, Zuleika; das Rh. Paxtoni befruchtet mit Lindleyi erzeugte Rh. Climax und fimbriatum.

Aus der Befruchtung des Rh. ponticum purpureum mit altaclarense entstand die Queen Victoria, und diese wiederum befruchtet mit altaclarense erzeugte den Vesuvius, aus dessen Befruchtung mit Blandyanum die Rh. Brebnerii, Mme. Titiens etc. hervorgingen.

Das Rh. ponticum album, befruchtet mit caucasicum gab die Entstehung von Rh. Cunninghami mit weißen Blüthen, durch dessen Befruchtung mit Blandyanum, eins der schönsten Rhododendren von allen Varietäten, das Limbatum ,entstanden ist.

Die Hybriden Rh. catawbiense, als z. B. album elegans, befruchtet mit pictum, erzeugten Standish's perfection, Minnie, Mrs. Standish etc.

Die Charaktere aller dieser genannten Hybriden giebt Herr Standish (im Florist, fruclist and Garden Miscellany 1858) genau an; auch kann man diese Charaktere ersehen im 1. Bde. p. 116 des Journ. de l'Acad. d'Hortic. de Gand und in den Pflanzenkatalogen des Hrn. J. Baumann in Gent.

Die ersten Hybriden, welche aus dem Rh. maximum, befruchtet mit arboreum, erzogen worden sind, sind die am wenigsten blüthenreichen, dennoch stehen sie den übrigen nicht nach, sie haben einen sehr gedrungenen Blüthenstand und sind die Blüthen von sehr brillanter Färbung. Diese Hybriden des Rh. maximum befruchtet mit anderen Hybriden, haben nur Bleudlinge erzeugt, die viel blüthenreicher sind, viel blüthenreicher als irgend welche andere Hybriden. Um üppig wachsende Hybriden zu erzeugen ist es nothwendig, nur solche Arten oder Hybriden zur Befruchtung zu wählen, die unter sich schon eine Aehnlichkeit zeigen und von keinem schwächlichen Wuchse sind. Herr Standish hat mehrere seiner Hybriden mit weißen Blumen mit dem Rh. Falconeri befruchtet, und obgleich er sehr guten Samen erhalten hat, aus dem eine große Zahl junger Pflanzen hervorgegangen ist, so sind diese doch, mit Ausnahme der, die aus Rh. cinnamomeum, befruchtet mit Rh. Falconerii entstandenen, sämmtlich wieder eingegangen.

Herr Standish beſchäftigt ſich jetzt eifrig mit der Hybridiſation der Rhododendren von Sikkim und Bhotan, und hofft nicht nur Hybriden mit ſehr ſchönen, ſondern auch mit duftenden Blüthen zu erzielen.
(Journ. de l'Acad. d'Hortic. de Gand.)

Beitrag zur Kultur der chineſiſchen Yams-Wurzel der Igname von China, Dioscorea Batatas Decaisne.

Im erſten Hefte dieſes Jahrgangs der hamburger Gartenzeitung S. 44 brachten wir die Mittheilung, daß dieſe höchſt ſchätzenswerthe Pflanze in England als acclimatiſirt betrachtet werden könne. Daſſelbe gilt unfehlbar auch bei Bonn, woſelbſt Herr Garteninſpector W. Sinning zu Poppelsdorf bei Bonn viele Verſuche mit dieſer Pflanze angeſtellt hat, deren günſtige Reſultate Herr Sinning im 1. Hefte 1858 der „landwirthſchaftlichen Mittheilungen“ *) veröffentlicht hat, die wir unſern geehrten Leſern hier mittheilen wollen.

„Selten ſind wohl die Kultur-Verſuche einer fremden Nutzpflanze, ſchreibt Herr Sinning, mit ſo großem Intereſſe und ſo großen Erwartungen verfolgt, wie es bei der Kultur der China-Yamswurzel in Deutſchland der Fall geweſen iſt und jetzt noch iſt.

Die vielen Verſuche, welche mit dieſer Pflanze in Deutſchland angeſtellt wurden, ſind in ihren Reſultaten und den darauf ſich gründenden Meinungen von einander ſo abweichend und der Erfolg mit den hier von mir unternommenen Verſuchen verglichen, größeren Theils ſo verſchieden, daß man glauben ſollte, bei mehreren jener Verſuche lägen Täuſchungen zu Grunde.

Daher dürfte dieſe Mittheilung, welche nur die thatſächlichen Ergebniſſe der von mir vor drei Jahren begonnenen und ſeitdem fortgeſetzten Kultur dieſer in hohem Grade wichtigen Nahrungspflanze enthält, für Landwirthe und Gartenfreunde nicht ohne Intereſſe ſein.

Es iſt bekannt, daß die chineſiſche Yamswurzel die Igname von China, Dioscorea Batatas Decaisne, die in China den Kartoffel-Anbau vertritt, von dem franzöſiſchen Conſul zu Hong-Kong, Herrn Montigny nach Frankreich geſchickt und in dem Garten des naturhiſtoriſchen Muſeums in Paris 1854 zuerſt in größerer Vollkommenheit gezogen wurde.

Profeſſor Decaisne, Director der Kulturen im gedachten Garten,

---

*) Landwirthſchaftliche Mittheilungen. Zeitſchrift der k. höheren landwirthſch. Lehranſtalt und der damit vereinigten landwirthſch. Verſuchsſtation zu Poppelsdorf. Im Verein mit den Lehrern an derſelben, herausgegeben von Dr. Hartſtein. 1. Heft. Mit einer Tafel Abbildung. Bonn, Adolph Marcus. 1858.

hat das Verdienſt, dieſe Pflanze ausführlicher wie früher geſchehen, beſchrieben und die Reſultate des von ihm unternommenen Anbaues genau mitgetheilt zu haben.

Ich halte übrigens Dioscorea Batatas Decaisne von Dioscorea japonica Thb. nicht verſchieden und Dioscorea oppositifolia Thb. nur für eine Varietät davon. Beide Pflanzen kultivire ich, und zwar auf dieſelbe Weiſe wie Dioscorea Batatas. Die Beſchreibung unſerer China-Yamswurzel kann ich füglich übergehen, da dieſelbe bereits in vielen Zeitſchriften ausführlich mitgetheilt iſt.

Nur ſo viel glaube ich des Anbaues wegen über dieſe Pflanze bemerken zu müſſen, daß die ausdauernde Wurzel derſelben ein ächtes Rhizom, ein wahrer unterirdiſcher Stamm iſt, der aber ſtatt wie bei den meiſten eigentlichen Rhizomen ſeitwärts oder horizontal unter der Erdoberfläche wegzukriechen, mehr oder weniger ſenkrecht, oft bis zu 3 Fuß tief in die Erde eindringt.

Die Rhizome (Knollen) ſind keulenförmig, nach untenhin 2—3 Zoll ſtark, an der Spitze aber nur von der Dicke eines Fingers. Gewöhnlich bildet ſich nur ein ſtarkes Rhizom an jeder Pflanze aus, zuweilen erſcheinen auch zwei und drei beiſammen, die in der Regel aber kleiner ſind. Aus jedem Knollenſtückchen, wenn auch nur Zoll lang, erwächſt, gerade wie bei der Kartoffel, eine Pflanze.

Anfangs April 1855 habe ich die Kultur der China Yams-Wurzel begonnen.

Ich erhielt davon ſowohl ſtärkere eigentliche Wurzelknollen, wie auch Stengelknöllchen, die ſich an dieſer Pflanze in den Blattwinkeln der Stengel zahlreich bilden und die Größe ſtarker Erbſen erreichen.

Die Wurzelknollen, welche ich erhielt, waren verdorben, weshalb ich meinen erſten Verſuch auf die Ausſaat von Stengelknöllchen beſchränken mußte.

Der Vorſicht wegen wurden dieſe Knöllchen in Blumentöpfe ausgelegt und in einem mäßig warmen Miſtbeete zum Keimen gebracht. Das Austreiben der Knöllchen ging ſo raſch, daß die jungen, handlangen Pflänzchen ſchon Ende April in die freie Erde ausgeſetzt werden konnten. Von den verſuchsweiſe in verſchiedenen Bodenarten ausgeſetzten Pflanzen erreichten die Rhizome dieſer kleinen Stengelknöllchen bis Ende October, wo ſie ausgenommen wurden, durchſchnittlich die Länge von 12 bis 15 Zoll. Am untern Ende waren dieſelben zolldick, am oberen Ende des Knollenhalſes von der Dicke eines Gänſekiel. Während des Winters wurden dieſe Knollen theils in Sand gelegt, theils freiliegend im kalten Gewächshauſe und in einem trocknen Keller aufbewahrt.

Das ungünſtige, ſpäte Frühjahr von 1856 erlaubte das Auspflanzen der gezogenen Samenknollen erſt im halben April.

Ein Theil davon wurde ganz, unzertheilt, die übrigen in 1 bis 2 Zoll lange Stücke zerſchnitten, in die Erde gelegt.

Es wurde dazu ein ſonnig gelegenes, aus dem gewöhnlichen etwas ſtrengen aber kräftigen Lehmboden des botaniſchen Gartens beſtehendes Beet von 120 □Fuß groß benutzt. Daſſelbe wurde in Reihen der Art bepflanzt, daß jede Pflanze einen Flächenraum von 1 □ Fuß erhielt.

Spätere Erfahrungen haben mich belehrt, daß dieser Raum für eine Pflanze der angemessenste ist. Dichter gepflanzt bleiben die Knollen kleiner, wie dieses schon aus den Anbauversuchen in Paris und andern Orten sich herausgestellt hat.

Die Knollenstücke wurden ganz ähnlich wie Kartoffeln ausgepflanzt und mit etwa 3 Zoll Erde bedeckt. Um ein leichteres Ausnehmen der tief in den Boden dringenden Knollen zu ermöglichen, ließ ich einen Theil der Aussaat auf 10 Zoll hohe Erdrücken pflanzen. Während des Sommers geschah an der Pflanzung weiter nichts, nur der Boden wurde locker und rein gehalten und bei einem Theil der Pflanzen wurden die rankenden Stengel mit Reisern gestützt, die übrigen aber in ihrer natürlichen Lage über dem Boden liegen gelassen.

Der warme Herbst von 1856 wirkte sehr günstig auf die Yams-Wurzel-Kultur, und gestattete, dieselben bis zum 6. November stehen zu lassen. Das Ergebniß der gewonnenen Knollen war folgendes:

Das Gewicht der Knollen von jeder der aus Knollenstöcken hervorgegangenen Pflanzen betrug $1\frac{1}{4}$—$1\frac{3}{4}$ Pfund. Die einzelnen Knollen waren 2—$2\frac{1}{2}$ Fuß lang und an dem dickern Ende hatten sie $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser. Die aus ganzen Knollen erwachsenen Pflanzen lieferten Knollen die von einer Pflanze 2 bis 2 Pfund 20 Loth schwer waren. Im Ganzen wurden auf der 120 □Fuß großen Fläche 180 Pfund Knollen gewonnen.

Im letztverwichenen Jahre fand das Auspflanzen der Yams-Wurzeln in der zweiten Hälfte des April Statt.

Nach den gewonnenen Erfahrungen geschah dasselbe ohne alle weitere besondere Vorkehrung, ganz nach Art wie man die Kartoffeln zu setzen pflegt.

Der ungedüngte Boden wurde bloß umgegraben und die Knollenstücke mit der Hacke gepflanzt. Derselbe Raum von 120 □Fuß, wo die Yams-Wurzeln im Vorjahre gestanden hatten, wurde neben den weiteren Anpflanzungen noch ein Mal ohne Düngung dazu benutzt. Dieselbe Anzahl Pflanzen und derselbe Raum von 1 □Fuß für jede Pflanze kam dabei wieder in Anwendung. Trotz des anhaltend trocknen Wetters wurden die Pflanzen nicht begossen.

Auch der Versuch Stengelknöllchen zu setzen, wurde wiederholt, aber nicht wie früher in Töpfen, sondern die Knöllchen wurden einfach in Reihen in ganz gewöhnlichen Boden im Freien ausgelegt. Halben November wurden die Knollen ausgenommen. Die Aussaat der Knollenstücke lieferte auf dem schon einmal dazu benutzten 120 □Fuß großen Beete nahe an 200 Pfund Knollen. Ein Unterschied zwischen den im frischen Boden gezogenen Knollen war weder in der Größe der einzelnen Knollen noch im Gewicht bemerkbar. Einzelne Knollen hatten das Gewicht von 2 Pfund 25 Loth erreicht.

Die aus der Stengelknöllchen-Aussaat erwachsenen Knollen waren daumendick, von der Länge von 10 bis 12 Zoll geworden.

Wenn man nun auch annimmt, daß dem Yams-Wurzel-Anbau im Großen auf Aeckern nicht die Sorgfalt zugewendet werden kann, als dieses bei den Versuchen in Gärten möglich ist, wodurch sich der Ertrag allerdings verringern kann, und nimmt man deshalb ferner nur das auf den □Fuß thatsächlich gewonnene geringste Gewicht der Knollen

von einer Pflanze zu 1¼ Pfund an, so ergiebt sich dennoch nach den hier vorliegenden Resultaten pro Morgen der eminente Ertrag von 33400 Pfund; mithin das Doppelte des Ertrags, den eine gute Kartoffelernte aufbringt.

Diese Versuche liefern demnach den schlagendsten Beweis, daß der Anbau der Yams-Wurzel für die Landwirthschaft von der größten Wichtigkeit und der vollsten Beachtung werth ist und daß demselben wirklich eine große Zukunft bevorsteht.

Nur ein Hinderniß bleibt dabei noch zu beseitigen, nämlich das allerdings beschwerliche und kostspielige Ausnehmen der tief in den Boden dringenden Knollen, welche es nöthig machen, daß der Boden beim Ausnehmen vollständig 2—2½ Fuß tief rigolt werden muß. Das Bestreben in dieser Hinsicht muß nun dahin gerichtet sein, zweckmäßige Geräthe zu construiren, mittelst welchen das Einernten der Yams-Wurzeln erleichtert wird. Vielleicht gelingt es auch, eine andere Art des Auspflanzens zu erfinden, wobei man diesem Ziele ebenfalls näher kommt.

Noch eine andere Hoffnung, zwar noch entfernt, zeigt sich uns, um vielleicht zu einer natürlich leichteren und wohlfeileren Art des Ausnehmens der Knollen zu gelangen. Es ist Thatsache, daß die erste Sendung der Yams-Knollen, welche Montigny aus China nach Frankreich schickte, bloß aus männlichen Pflanzen bestand, weshalb, da die Dioscoreen ganz getrennte Geschlechter besitzen, kein Samen gewonnen werden konnte. Spätere Sendungen, welche davon aus China nach Frankreich kamen, haben auch weibliche Pflanzen enthalten. Es ist nun mithin die Aussicht vorhanden, Samen davon zu gewinnen und damit gewinnt auch die Züchtung von Spielarten Raum, deren Rhizome vielleicht, statt in die Länge, verkürzt in die Breite sich ausdehnen und dadurch den Anbau dieser wichtigen Nahrungspflanze erleichtern.

Wir haben ein ähnliches Beispiel bei der Kartoffelknolle, die wir ebenfalls durch die Samenaussaat in möglichst verschiedenen Formen erzogen, besitzen.

Der gemachte Versuch, die Pflanzen auf 10—12 Zoll hohe Erdrücken zu setzen, hat dem Zwecke nicht entsprochen. Ich habe dabei gefunden, daß der Theil des Rhizoms im Erdrücken schwach bleibt und daß dasselbe sich erst mehr verdickt, wenn es in den vollen Boden eindringt.

Endlich habe ich bei meinen Versuchen die Ueberzeugung gewonnen, daß die China-Yams-Wurzel weit weniger empfindlich ist, als man dieses anfänglich erwartet hat. Die Yams-Wurzel erscheint gegen alle ungünstigen Witterungseinflüsse weniger empfänglich, als die Kartoffel, dieselbe erträgt nach den gemachten Erfahrungen sogar unseren Winter im freien Boden ohne Schutz und ohne zu leiden. Schon im Herbst 1856 hatte ich einige Pflanzen im freien Boden stehen lassen, die beim Eintritt des Frostes aber mit einer mäßigen Laubbedeckung versehen, im Frühjahr kräftig ausgesprossten. Es ergab sich dabei die Eigenthümlichkeit, daß die im Vorjahre gewachsenen Rhizome nicht fortwuchsen, sich also nicht vergrößerten, was ich erwartet hatte, sondern ganz ähnlich, wie die alte Setzkartoffel abstarben; wogegen sich am oberen Ende des Rhizoms aber neue, äußerst kräftige Knollen bildeten, die an Größe

die Knollen, welche die im Frühjahr gemachte Aussaat lieferte, bedeutend übertrafen. Auf diese Erfahrung hin ließ ich im letztverwichenen Herbst eine größere Anzahl im Freien stehen, ohne sie zu bedecken. Gegen alle Erwartungen haben auch diese Pflanzen die Kälte des vergangenen Winters, die einige Mal auf 9 und länger auf 8 Grad stieg, selbst ohne Schneedecke, die wir hier nicht hatten, ohne den geringsten Nachtheil ausgehalten, und diese im Freien ohne Decke überwinterten Knollen haben in diesem Augenblick, den 7. Mai, bereits 8 Zoll hohe kräftige Stengel getrieben. Selbst die Rhizome sind vollkommen gesund geblieben und scheinen nicht wie bei dem früheren Versuche abzusterben, sondern fortzuwachsen. *)

Die im verwichenen Herbste gewonnenen über 300 Pfund Yamsknollen habe ich auf Haufen wie Kartoffeln im Keller aufbewahrt, wo sie sich vortrefflich gehalten haben und jetzt noch im Geschmacke einer feinen Kartoffel gleichkommen."

Nach Dr. Sopp's Untersuchung enthielt die chinesische Yamsfrucht in 100 Thl.:

	Wasser	74,15 o/o
	Trockensubstanz **).	25,85 "
in d. letzt:	Stärke	15,40 "
	Albuminate	2,10 "
	Asche nach Abzug der Kohlensäure	0,92 "

Das spezifische Gewicht eines Wurzelabschnittes von 120 Grm. Schwere war: 1,087.

Da die Bestandtheile der Yamsfrucht und der Kartoffeln gleichartig sind, so steht gewiß wie bei diesen, so auch bei jenen das spez. Gewicht der Wurzeln mit ihrem procentischen Gehalt an trockener Substanz und Stärkemehl im Einklang. Dieses Verhälteiß ist aber nicht mit dem für Kartoffeln aufgefundenen identisch zu nennen; denn für Kartoffeln entspricht nach:

Berg und Lädersdorff das spez. Gew.	1,087	24,46 %	Trockensubst.
		16,85 "	Stärkemehl.
nach Balling . . . " " "	1,086	24,43 "	Trockensubst.
		16,83 "	Stärkemehl.

---

*) Mein verehrter Freund, Herr Garteninspector Sinning theilt mir unterm 3. Jan. d. J. noch brieflich mit, daß er, außer den Knollen, die zum Gebrauch bestimmt sind, seine ganze Anpflanzung ohne allen Schutz im freien Boden gelassen habe, und die Kälte im Monat November v. J., die bei Bonn auf 12—14 Grad R. stieg, hat nicht die geringste Einwirkung auf die Knollen gehabt. Herr Sinning hat Knollen, die jetzt schon drei Jahre ohne Bedeckung im freien Lande stehen, ohne daß dieselben im geringsten gelitten hätten. E. D—s.

**) Auffallend erscheint es, daß Herr Dr. Grouven in Früchten, welche auf demselben Felde, von welchem unsere Yamsfrucht stammt, im Jahre 1856 geerntet wurden an Trockensubstanz nur . . . . . 17 %,
" Stärke " . . . . . 8 % fand.
Unmöglich können solche Unterschiede durch fortgesetzten Anbau oder wechselnde Jahreswitterung bedingt sein.

Nach Trommer wechselt der Gehalt der Kartoffeln an Stärke zwischen 14 und 27%; nach Balling enthalten Kartoffeln an Stärke guter Qualität durchschnittlich 21% Stärkemehl; es zeigt demnach die von uns gezogene Yamsfrucht den Stärkegehalt geringer Kartoffelsorten.

Nach den Angaben des Herrn Garteninspector Sinning läßt sich der Ertrag eines Magdeburger Morgens leicht auf 300 Ctr. bringen; nehmen wir an, daß auf derselben Fläche 450 Ctr. Kartoffeln erzielt werden können, so müßten diese schon der besten Qualität angehören (30% St.), um an Nährwerth der Yamsfrucht gleich zu kommen.

Demnach ist gewiß der Anbau der Yamsfrucht als Surrogat der Kartoffeln empfehlenswerth.

Die süßen Bataten.

(Batatas edulis.)

Unter den am Schlusse des Preis-Verzeichnisses für 1859 der Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei von Herrn Garten-Inspector F. Jühke (Firma Carl Appelius) in Erfurt beigefügten Erläuterungen, auf die wir weiter unten näher eingehen werden, befindet sich ein sehr schätzbarer Artikel über die „süßen Bataten", den wir, da vielleicht das Verzeichniß nicht in die Hände aller Pflanzenfreunde gekommen sein mag, hier unverkürzt wiedergeben. Es heißt daselbst:

Die an Stärke reichen Wurzel-Rhizome von süßen Bataten bilden in vielen Theilen Nord-Amerikas die Basis der Volksnahrung, und wenn ein so allgemein ausgedehnter Anbau dieser Frucht auch in Deutschland vorläufig noch nicht stattfinden wird, so ist es doch über allem Zweifel gewiß, daß die beiden Formen von süßen Bataten auf jedem schattenfreien Quartier des Küchengartens überall gedeihen und die Summe seiner äußerst wohlschmeckenden Kultur-Produkte vermehren werden. Die von mir kultivirten gelben und rothen Bataten verdanke ich der Güte des Königl. General-Directors Herrn Lenné, der die Einführung durch den Königl. Minister-Residenten Herrn Frhrn. von Gerolt aus Washington im Jahre 1857 vermittelte. Die süße Batate verlangt einen sehr kräftigen, gut gedüngten und 2 Fuß tief rijolten, mehr leichten, als schweren Boden. Auf schwerem Boden würde ich deshalb der Hügel-Kultur den Vorzug geben. Diese Hügel werden durch Zusammenschaufeln der oberen Gartenerde gebildet und in zweifüßiger Entfernung angelegt. Mit dem Aufhören der Nachtfröste werden die Pflanzen im Freien ausgetopft. Die Ranken erhalten keine Sträucher, sondern bedecken den Boden. Für solche Liebhaber, die Gelegenheit zur Ueberwinterung von Pflanzen haben, sei hier bemerkt, daß man die Ranken am besten im September einlegt, mit Erde bedeckt, im October in Töpfe pflanzt und bei einer Temperatur von

8—10° überwintert, während man die Knollen im October aufnimmt und im Winter über verspeis't. Die Ueberwinterung der Knollen gelingt immer dann am sichersten, wenn man den Rest der Erndte im Januar und Februar wieder einpflanzt, warm stellt und zur neuen Anzucht benutzt.

Da es nun unter allen Umständen wünschenswerth bleibt, dergleichen neue Kultur-Produkte auf ihren Gehalt an Nahrungsstoffen zu untersuchen, so erfüllte der Herr Dr. Schulz-Fleeth in Berlin meine Bitte und veranlaßte in seinem Laboratorium eine Untersuchung beider Sorten. Hierbei konnte nun zwar der Gehalt des Extractes an Zucker, Dextrin ꝛc. nicht bestimmt werden, indem die zur Untersuchung bestimmten Knollen, durch unvorhergesehene Umstände, zu stark ausgetrocknet waren, weshalb die Bestandtheile auf die wasserfreie Substanz berechnet wurden. Dieselbe enthielt in 100 Theilen:

Rothe Bataten: Stärke 64,19, Extract 19,23, Stickstoff 2,45.
Gelbe „ „ 63,83, „ 21,72, „ 2,78.

In dem Zustande, in welchem die Knollen zur Untersuchung gelangten, enthielt die rothe Sorte 74,09 und die gelbe 70,94 % Wasser. Wenn sich hiernach nun auch aus dem Stickstoff der Gehalt an Proteinstoffen sehr leicht berechnen läßt und wenn auch im Ganzen diese Zahlen der Wahrheit ziemlich nahe kommen dürften, so wird Herr Dr. Schulz-Fleeth doch in nächster Zeit eine zweite Analyse von frischen Knollen vornehmen. So viel hat diese Untersuchung indessen schon jetzt ergeben, daß die hier besprochenen Sorten von süßen Bataten, sich sehr viel reicher an Nahrungsstoffen zeigen, als die von anderer Seite untersuchten Sorten. In Asche geröstet und mit ein wenig Salz und Butter abgewellt, schmecken die Knollen vortrefflich.

Carl Gottlieb Kunicke.

(Nekrolog.)

Carl Gottlieb Kunicke, geboren den 12. Mai 1801, in der Ortschaft Dornbusch bei Liegnitz in Schlesien, wo sein Vater Gottlob Kunicke eine sogenannte Mitwohner- (kleine Gärtner-) Stelle besaß, erlernte die Kunstgärtnerei in dem rühmlichst bekannten Garten zu Buchwald im Liegnitzer Bezirk, in der Zeit vom 1. März 1818 bis dahin 1821. Seine eifrige Lernbegierde und die Anstelligkeit die er zu dem von ihm gewählten Lebensberuf zeigte, veranlaßte die Aufmerksamkeit der damaligen Besitzerin des Gutes Buchwald, der Frau Staatsministèr Gräfin von Rheden auf den Lehrling, und sie, die eifrige und kenntnißreiche Freundin des Gartenbaues beförderte des jungen Kunicke Ausbildung für sein Fach mit menschenfreundlicher Gesinnung, wie sie ihm auch später zu seinem weitern Fortkommen behülflich war. Auch benutzte er die ihm hier gebotene Gelegenheit nicht

blos zur Erlernung der Gartenkunst, sondern zugleich zu seiner weitern allgemeinen Ausbildung, um so eifriger, da ihm bis zum Antritt seiner Lehre, bei der sehr beschränkten Vermögenslage seines Vaters, nur der Unterricht in einer niedern Schule hatte zu Theil werden können.

Nach zurückgelegter wohlbenutzter Lehrzeit, erhielt er eine Anstellung als Gartengehülfe im botanischen Garten der Universität zu Breslau, wo er bei seiner regen Lernbegierde weitere und umfangreichere Kenntnisse, nicht blos in Ansehung der Kultur der Pflanzen, sondern auch in der Pflanzenkunde überhaupt erwarb. Auch hier erwarb er sich die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, namentlich auch des damaligen Directors jenes botanischen Gartens, des berühmten Professors der Botanik Treviranus, dessen Unterricht und ihm bewiesenes Wohlwollen auch in seinem spätern Leben in seiner dankbarsten oft gegen mich ausgesprochenen Erinnerung blieb.

Sein, besonders in diesem botanischen Garten erwecktes und befördertes Interesse an der Pflanzenkunde im Allgemeinen, begleitete ihn, als er sich im Anfange des Jahres 1824 mit einer Empfehlung des Professors Treviranus an den Professor und Director des botanischen Gartens zu Wien Baron von Jacquin versehen, dorthin begab, und in dem v. Fischer'schen Garten zu Böselau unsern Baden bei Wien, und demnächst im Fürstlich Batthyanischen Garten zu Trautmannsdorf bei Bruck an der Leitha, die Stelle eines Gartengehülfen versah, und sich in Mußestunden auch mit den wildwachsenden Pflanzen der reichen österreichischen Flor beschäftigte, aus der er auch an den botanischen Garten in Breslau, in dankbarer Einnerung an das ihm dort gewordene Gute, Sämereien und Pflanzen schickte.

Im Jahre 1828 erhielt er die Anstellung als Gräflicher Stolberg Wernigerodischer Hofgärtner und damit einen seinen Neigungen und Fähigkeiten ganz entsprechenden Wirkungskreis. Seiner in diesem Garten bewiesenen unermüdlichen Thätigkeit und Geschicklichkeit, verdanken sämmtliche hiesige Gräfliche Gärten Verschönerungen und Verbesserungen, die auch außer den Grenzen unsrer Grafschaft Anerkennung gefunden und den Gräflichen Gärten ehrenvolle Beachtung verschafft haben. Ohne hier in alle Einzelheiten der amtlichen Wirksamkeit unsers dahingeschiedenen Freundes eingehen zu können, wozu es mir auch, ohne eine längere Verzögerung dieser ergebensten Zuschrift, an Zeit fehlt, beschränke ich mich darauf, nur die Verdienste unseres Knnicke um die hiesigen Gräfl. Baumschulen und um den Pflanzenreichthum, den ihm die Gräfl. Gärten verdanken, hervorzuheben. Die auf seinen Betrieb erfolgten bedeutenden räumlichen Vergrößerungen der Gräfl. Obstbaumschulen und deren Bereicherung mit den werthvollsten Obstsorten hat auch durch Abgabe und Verkauf davon, an andere Gärten in und außerhalb der Grafschaft, vielfältigen anerkannten Nutzen gestiftet und zur Beförderung der so wichtigen Obstbaumzucht, in weiten Kreisen beigetragen; von dem Gartenbau-Verein in Berlin, wurde bei einer an demselben im J. 1855 veranstalteten Obst- und Gemüse-Ausstellung, unserm Hofgärtner für das von demselben aus den hiesigen Gräfl. Gärten eingesandte Sortiment von Aepfeln und Birnen, eine Seitens des Königl. Landes Oekonomie-Collegiums dem Verein zur Disposition gestellte silberne Medaille verliehen, zum „Anerkenntniß" — wie das

mir vorliegende Ueberſendungs-Schreiben des obgedachten Vereins vom 25. Novbr. 1855 beſagt — „ſeinen bewährten Beſtrebungen zur Förderung der Zwecke des Vereins“, und von dem Herzogl. Anhaltiſchen Gartenbau-Verein in Deſſau erhielt er bei der dortigen Pflanzen-Ausſtellung im J. 1857 die ſilberne Medaille, die ihm nach Inhalt der desfallſigen Beſcheinigung des Vereins „für das reichhaltigſte Obſtſortiment aus dem nördlichen Deutſchland“, durch preißrichterliches Urtheil zuerkannt worden.

Auch die Pflanzenſammlung des hieſigen Gräfl. Luſtgartens, die durch des Verewigten unermüdliche Beſtrebungen beſonders reich an Gewächſen iſt, die im freien Lande ausdauern und zur Zierde dienen oder zu den officiellen oder techniſch wichtigen gehören, hat ſich die Beachtung auch in weitern Kreiſen erworben und den Garten nicht blos in Verkehr mit auswärtigen Handelsgärten brachte, ſondern auch mit mehreren botaniſchen Gärten, mit welchen er bereits ſeit einer Reihe von Jahren tauſchte. Dabei wurden auch glückliche Verſuche zur Acclimatiſirung ausländiſcher Pflanzen wärmerer Gegenden gemacht, in welcher Beziehung Ihnen, Hochgeehrteſter Herr Redacteur, die Nachricht nicht unintereſſant iſt, daß das Gyherium argenteum ſeit einigen Jahren, im freien Laude auch im Winter gut ausgedauert, und ſowohl im vorigen als im gegenwärtigen Spätſommer ſeine ſchönen und mächtigen Blüthenrispen vollſtändig entfaltet hat. Aber auch die Bereicherung der Gewächshäuſer des Gräfl. Luſtgartens iſt, ſo weit es der darin gebotene Raum irgend geſtattete, nicht verſäumt, und auch aus dieſen hat ſelbſt an botaniſche Gärten dieſen noch fehlende Pflanzen abgegeben werden können. Beiſpielsweiſe benenne ich den ſchönen Farrn, Davallia aculeata Sw., der wohl zuerſt im hieſigen Garten aus Sporen, die ſich Kunicke aus Portorico verſchafft hatte, gezogen, und wovon an den botaniſchen Garten in Leipzig, deſſen berühmte reiche Farrnſammlung er noch fehlte und an den Königl. botaniſchen Garten in Neu-Schöneberg abgegeben wurde. Als Züchter von Zierpflanzen fand auch unſer Kunicke ebenfalls ehrenvolle Anerkennung, unter andern auch für einen Beitrag von dergleichen Pflanzen, namentlich Calceolarien, Gentianen und Stiefmütterchen, den er im J. 1851 zu einer in Potsdam veranſtalteten Pflanzen-Ausſtellung lieferte, und der dort die Aufmerkſamkeit ſelbſt Allerhöchſter Herrſchaften auf ſich zog.

Bei ſolchen Erfolgen ſeiner raſtloſen Thätigkeit, und bei der Treue und tiefinnigen Ergebenheit, die er gegen ſeine hohe Dienſtherrſchaft bewies, konnte es nicht fehlen, daß er ſich die vollkommene Gewogenheit der letzteren erwarb, was ihm bei ſeiner ſo eben gerühmten Geſinnung gegen dieſelbe, die werthvollſte Belohnung war.

Seinen Untergebenen war er ein freundlicher auch für ihr weiteres Fortkommen möglichſt ſorgender Vorgeſetzter, der nur da, wo es nothwendig war, Strenge gegen dieſelben, doch ohne Verletzung der Gerechtigkeit, bewies.

Sein hieſiges Privatleben konnte ebenfalls, abgeſehen von dem Schwanken ſeiner frühern feſten Geſundheit in den letzteren Jahren ein glückliches genannt werden. Sein im J. 1835 mit ſeiner jetzt hinterbliebenen Wittwe Jenny, geb. Kratzenſtein geſchloſſener Ehebund, war ein beide Theile beglückender, wenn er auch kinderlos blieb; ſeine

Gattin erwiederte seine innige Liebe in gleichem Maße, und leitete den Haushalt mit Unermüdlichkeit und größter Umsicht. In seinen Mußestunden, deren ihm freilich nicht viele wurden, verkehrte er gern persönlich und schriftlich mit seinen ihm werthen Verwandten und mit Freunden, die ihm seine Kenntnisse und herzgewinnende Freundlichkeit und Dienstwilligkeit zahlreich erwarb.

Zu den Annehmlichkeiten seines Lebens gehörten auch nahe und entferntere Reisen in amtlichen und außeramtlichen Geschäften, die er sämmtlich zur Vermehrung seiner Kenntnisse in seinem Fach, durch den Besuch von Handels- und botanischen Gärten und zur Bereicherung der hiesigen Gräfl. Gärten eifrigst benutzte.

In diese günstigen Lebensverhältnisse griffen schon seit mehreren Jahren leider verschiedene körperliche Beschwerden störend ein. Er ertrug dieselben mit Geduld und beklagte nur die Bemühungen Anderer um seine Pflege, und die Hinderung an seiner Amtsthätigkeit, in der er nicht eine Pflicht, sondern auch einen vorzüglichen Lebensgenuß fand. Mit seinem festen Willen suchte er eine solche Hinderung möglichst zu überwinden. Besonders bedenklich erschien ein Magenleiden, daß ihm von Zeit zu Zeit befiel und durch alle angewandten ärztlichen Mittel, verbunden mit einer strenggeregelten Diät nicht gründlich zu heben war. Auch in diesem Jahre hatte er daran zu verschiedenen Malen zu leiden; doch war es nicht dieses Uebel, welchen seinen Tod herbeiführte, sondern, wie sich bei der Obduction ergeben hat, eine von jenem Uebel unabhängige Unterleibsentzündung, die nach 5tägigen schweren Leiden am 29. v. M. sein thätiges Leben endigte. Er starb in den letzten Augenblicken schmerzlos in den Armen seiner treuen und in seiner Pflege unermüdlichen Gattin.

Sporleder.

Wernigerode, d. 19. Decbr. 1858.

Literatur.

Hülfs- und Schreib-Kalender für Gärtner und Gartenfreunde auf das Jahr 1859. Herausgegeben vom Prof. Dr. K. Koch. 2 Theile. Berlin, Verlag von G. Bosselmann. 12.

Der 1. Theil dieses so sehr brauchbaren und nützlichen Kalenders ist in seiner innern Einrichtung nur wenig von der der vorigen Jahrgänge verschieden. Er enthält außer dem eigentlichen Kalender fast dieselben vielen nützlichen Tabellen, als z. B. Tabellen für Dünger, Obst, Gemüse, Blumen, Ausgaben, Schema einer vergleichenden Uebersicht der täglichen Einnahmen und Ausgaben ꝛc. ꝛc. Ferner ein Album, 10 Seiten weiß Papier, dem das eigentliche Hülfsbuch folgt, enthaltend z. B. Menge der Aussaat auf eine □-R. — Heizung der Treibhäuser. — Aräometer — Verzeichnende Zusammenstellung der Grade auf den verschiedenen Thermometer Scalen (sehr nützlich). — Hülfstafel über Dimensionen und Inhalt der Gräben. — Die Geldsorten der verschiedenen Länder

und Staaten im Verhältniß zu der preußisch-deutschen Münz-Convention vom 30. Juli 1858. — Uebersicht der wichtigsten Maaße und Gewichte reducirt auf preuß. a. Längenmaaße, b. Flächenmaaße ꝛc. — Mehrere Gewichtstabellen. — Tafel zur Stellung der Uhr im Jahre 1859 ꝛc.

Weggelassen ist: Münzvertrag vom 24. Januar 1857; Gesetz, betr. die Einführung eines allgemeinen Landesgewichts vom 17. Mai 1856 und Auflösung verschiedener, besonders bei Garten-Anlagen vorkommenden Aufgaben. Dagegen sind neu hinzugekommen: 1. Herschel'sche Wetterregel und 2. Berechnung des Preises für das vom 1. Juli 1858 gültige Preuß. Gewicht nach dem Preise für das alte Gewicht.

Die Ausstattung dieses Theils ist sehr sauber und zierlich, aber leider ist der Deckel wieder mit gepreßtem Papier überzogen, anstatt wie es von Vielen gewünscht wurde, mit einem glatten, weil man zu oft in die Lage kommt das Büchelchen als Unterlage zum Schreiben im Garten zu gebrauchen. Dies mehr zierliche Aussehen sollte hier dem mehr Praktischen weichen. Es ist dies ein Wunsch, den wir im Namen Vieler aussprechen.

Der 2. Theil, vom 1. ganz unabhängig und auch nur in einem farbigen Umschlag geheftet, enthält: 1. ein Verzeichniß der Handelsgärtnereien, nicht nur, wie früher von ganz Deutschland sondern auch von denen des Auslandes von Prof. Koch, so weit es dem Verfasser möglich war die Namen der Gärtnereien zu erhalten. Dieses über 94 Seiten umfassende Verzeichniß dürfte für sämmtliche Handelsgärtner von großen Nutzen sein. Diesem Verzeichnisse folgt 2. Verzeichniß der kultivirten Farrn und deren Synonyme, vom Obergärtner Herrn Lauche. Dieses Verzeichniß enthält alle Farrn Arten, die dem Verfasser durch eigene Anschauung bekannt geworden sind, wie die, welche derselbe aus dem Inhalte jetzt vorhandener Verzeichnisse dem Namen nach kennen gelernt hat. In Betracht der Synonyme hat Herr Lauche viele veraltete, die im Kunze'schen Verzeichnisse, das dem Lauche'schen zu Grunde gelegt ist, aufgeführt sind, weggelassen, dagegen hat er eine große Anzahl neuer, vor allen die Wallich'schen, hinzugefügt. Der 3. und letzte Artikel in diesem Theile bildet eine Auswahl der in den letzten Jahren eingeführten neuen Pflanzen. Wir finden hier eine Menge Pflanzen aufgeführt, die sich durch Schönheit allgemein empfehlen, darunter jedoch auch eine beträchtliche Zahl alter bekannter Arten, die freilich schön und selten, der Ueberschrift dieser Abhandlung aber nicht entsprechen.

Allen Gärtnern und Pflanzenfreunden, die noch nicht im Besitze dieses Kalenders sein sollten, erlauben wir uns denselben hierdurch nochmals bestens zu empfehlen. E. O—o.

Xenia Orchidacea. Beiträge zur Kenntniß der Orchideen von H. G. Reichenbach fil. 10. Heft, Taf. XCI.—C. Text Bogen 28—31. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1858.

Von diesem vortrefflichen Werke ist bereits das 10. Heft erschienen (ausgegeben am 15. Octbr. 58), womit der erste Band schließt. Dieser Band giebt Monographien von 38 Gattungen, darunter und außerdem Beschreibungen von 220 Arten, Abbildungen von 195 Arten, von denen nur 31 vorher (meist ungenügend) dargestellt worden waren. Mit

Freuden hören wir, daß das Werk ohne Unterbrechung seinen Fortgang haben wird.

In diesem 10. Hefte sind abgebildet: Laelia Boothiana Rchb. fil. (Taf. 91); Aerides falcatum Lindl. (Taf. 92); Warscewiczella discolor Rchb. fil.; W. amazonica Rchb. fil. (Taf. 93); Bifrenaria modora Lindl. und B. Harrissoniae Rchb. fil. (Taf. 94); Cattleya maxima Lindl. (Taf. 95); Macodes marmorata Rchb. fil. und M. Petola Lindl. (Taf. 96); Telipogon Boisserianus Rchb. fil., T. angiensis Rchb., T. Fritillum Rchb. fil., T. Warscewiczii Rchb. fil., Trichoceros armillaris Rchb. fil. (Taf. 97); Oncidium ansiferum Rchb. fil., O. cerebriferum Rchb. fil. (Taf. 98); Oncidium valvox Rchb. fil. O. cardiostigma Rchb. fil., O. carthaginense Sw. B. Oerstedii Lindl. und O. pachyphyllum Rchb. (Taf. 99); Papperitzia Leiboldi Rchb. fil. und Cohnia queketioides Rchb. fil. (Taf. 100).

Abbildungen würtembergischer Obstsorten. Eine Sammlung vorzüglicher Aepfel- und Birnsorten, ausgewählt bei der unterländischen Obst- und Traubenausstellung in Cannstadt 1857. Im Auftrag des k. Würtemb. Centralstelle für die Landwirthschaft herausgegeben von Ed. Lucas, Garteninspector in Hohenheim. Mit 50 Abbild. in Farbendruck, auf 12 Tafeln. Stuttgart. 1858, 4. Verlag Ebner u. Seubert.

In möglichster Naturtreue sind in diesem vortrefflichen Werke abgebildet a. Aepfel:

1) der Gravensteiner, 2. Sommergewürzapfel (Engl. Kantapfel), 3. Prinzenapfel (rothgestreifter Schlotterapfel), 4. Calvillartiger Winterrosenapfel (Danziger Kantapfel, Schwäbischer Rosenapfel), 5. Kaiser Alexander, 6. Goldzeugapfel. 7. Pariser Rambourreinette (Reinette von Canada), 8. Weiße Wachsreinette, 9. Champagner Reinette, 10. Downton Pepping, 11. Gäsdonker Reinette, 12. Ananas Reinette, 13. Langtons Sondersgleichen, 14. Muscat Reinette, 15. Carmeliter Reinette, 16. Engl. Spital Reinette, 17. Grauer Kurzstiel, 18. Königl. Kurzstiel, 19. Große Casseler Reinette, 20. Reinette von Orleans, 21. Wintergoldparmaine, 22. Luikenapfel, 23. Großer Bohnapfel, 24. Kleiner Fleiner, 25. Kleiner Langstiel (Blauschwanz).

2. Birnen.

1. Stuttgarter Gaishirtenbirne (Gaishirte), 2. Gute Graue (Graue Sommerbutterbirne), 3. Engl. Sommerbutterbirne (Je länger je lieber), 4. Römische Schmalzbirne, 5. Punktirter Sommerdorn, 6. Grumkower Winterbirn (Grumkower Butterbirne), 7. Marie Luise, 8. weiße Herbst-Butterbirne (Kaiserbirn, Herbstbergamotte), 9. Coloma's Herbstbutterbirne (Herbst Coloma), 10. Capiaumonts Herbstbutterbirn (die Capiaumont), 11. Napoleon's Butterbirn, 12. Dorc's Flaschenbirn, 13. Forellbirn, 14. Wildling vom Motte, 15. Rotheherbstbutterbirn (Rothe Dechantsbirn), 16. Diel's Butterbirn, 17. Liegels Winterbutterbirn (Coloma's köstliche Winterbirn), 18. Hardenponts Winterbutterbirn (Kronprinz Ferdinand von Oestreich), 19. die Regentin (die Argenson), 20. Winterdechantsbirn, 21. Schneiderbirn, 22. Harigelbirn, 23. Champagner Bratbirn (Echte oder deutsche Bratbirn), 24. Wildling vom Einsiedel (Extra Mostbirn), 25. Wolfsbirn.

Pflanzen- und Samenverzeichniſſe.

Das Preisverzeichniß für 1859 der Samenhandlung, Kunſt- und Handelsgärtnerei

des Herrn C. Appelius (jetziger Inhaber bekanntlich Herr Garteninſpector Jühlke) gewährt ein großes Intereſſe, nicht allein wegen ſeines reichen Inhaltes, ſondern ganz beſonders noch in Bezug auf die dieſem Verzeichniſſe beigefügten Erläuterungen. Dieſe Erläuterungen beziehen ſich bis auf wenige auf einzelne Gemüſe- und landwirthſchaftliche Gewächſe, deren Samen im 1. Theile des Verzeichniſſes aufgeführt ſind und dürften den meiſten Garten- und Pflanzenfreunden ſehr willkommen ſein, denn aus denſelben erſieht man, welche Sorten Erbſen, Bohnen, Zwiebeln oder Rüben ꝛc. am beſten auf dem oder dem Boden gedeihen, welche Sorte ſich lohnend und ſicher zum Anbau eignet. Bei mehreren Arten iſt auch genau angegeben, zu welcher Zeit die Samen geſäet und wie die Pflanzen behandelt werden müſſen. Einigen Arten, die bisher als ſehr ergiebig oder als „vortrefflich“ empfohlen wurden, wird das Todesurtheil geſprochen und vor dem Anbau dieſer oder jener Sorte abgerathen. Nach den von dem Verfaſſer während ſeines langjährigen thätigen Wirkungskreiſes an der k. landwirthſchaftlichen Akademie zu Eldena angeſtellten, ſehr umfangreichen genauen Verſuchen und nach den dadurch gemachten Erfahrungen bei dem Anbau landwirthſchaftlicher Gewächſe, können wir dieſen Erläuterungen vollkommenes Vertrauen ſchenken und werden ſie von großem Nutzen ſein. Benutzt man dieſe Erläuterungen und den Leitfaden zur Behandlung der Samen, welche in den Verzeichniſſen von Carl Appelius in Erfurt offerirt werden“ (Erfurt. Verlag von C. Appelius 1857), hamburg. Gartenztg. XIV. p. 187, bei der Auswahl und Anzucht ſeiner, von einem reellen Handlungshauſe bezogenen Samen, ſo kann man auch wohl auf eine ſchöne Blumenflor und reichen Fruchtertrag hoffen.

In den meiſten Samenverzeichniſſen finden wir die Arten einer Familie ſehr wichtiger Kultur-Produkte, nämlich Rüben, als: Runkelrüben, Speiſerüben, Waſſerrüben, Turnips, Kohlrüben, Steckrüben ꝛc. unter der allgemeinen Bezeichnung „Rüben“ aufgeführt und nicht nur dem Landwirth, Gärtner, beſonders aber dem Laien wird es oft ſchwer die richtige Art oder Sorte herauszufinden, die er anzubauen wünſcht. Um nun die Auswahl bei der ſtets wachſenden Zahl der Sorten zu erleichtern, hat der Verfaſſer der gedachten Erläuterungen dieſe wichtigen Kulturprodukte gruppirt und wünſcht derſelbe dadurch insbeſondere einen Beitrag zur richtigen Bezeichnung der Formen auf dieſem Wege zu liefern, indem die richtige Benennung der Sorten nicht blos äußerſt wichtig iſt, ſondern die geringſte Vernachläſſigung dieſer Kenntniſſe auch gar leicht dahin führt, der Landwirthſchaft materielle Verlüſte beizubringen, die um ſo empfindlicher ſind, je größer die beſtellte Fläche mit der irthümlich bezogenen Sorte war. Aus dieſem Grunde, fährt der Verfaſſer fort, iſt es ſehr wünſchenswerth, daß die richtige Benennung der Sorten ein Eigenthum des Volkes werde, damit ſich Jedermann klar bewußt werde und bleibe, was er unter Runkel-, Speiſe-, Waſſerrüben,

Turnips, Wrucken, Kohl- und Steckrüben, Rutabage und Schwedische Turnips zu verstehen habe. Es ist durchaus nothwendig, daß in den verschiedenen Theilen Deutschlands eine jede Gruppe mit dem ihr zukommenden rechten Namen benannt und daß hinfort nicht mehr der Name Turnips statt Runkelrübe, und umgekehrt, weder bestellt, noch in den Verzeichnissen geführt werde. Nur erst dann, wenn die Gärtner die verschiedenen nutzbaren Pflanzenformen im Besonderen geschichtet und zuerst richtig benennen, kann sich für den Pflanzenkundigen an den Namen eine bestimmte plastische Vorstellung knüpfen und daraus etwas begriffsmäßig Bestimmtes dem Zwecke des Anbaues Entsprechendes entwickeln! die Volkswirthschaft und was damit zusammenhängt, der Fortschritt des Ackerbaues in Deutschland werden von der richtigen Benennung der Sorten einen um so größeren Gewinn haben, wenn die zu den einzelnen Spielarten und Gruppen hinzugefügten Kulturbemerkungen berücksichtigt werden. Die Eintheilung selbst ist naturgemäß, indem sich aus der Saat, Pflege, verschiedenen Behandlungsweise und Nutzung x. sehr wichtige Fingerzeige für die Kultur ergeben.

Mögen diese hier wahr gesprochenen Worte von Vielen beherzigt werden und Jeder bemüht sein dazu beizutragen, daß in Deutschland eine jede Pflanzengruppe mit dem ihr zukommenden rechten Namen benannt werde!

Allen Landwirthen, Gärtnern, Blumen- und Pflanzenfreunden empfehlen wir dieses Verzeichniß zur genauen Durchsicht, indem wir uns selbst hier auf dessen reichen Inhalt nicht einlassen können.

Das Verzeichniß des Herrn **Fr. Ad. Haage jun.** in Erfurt liegt uns gleichfalls vor, und ist wie die übrigen hier besprochenen auch von der Redaction dieser Zeitschrift zu beziehen. Wie alljährlich, ist dieses Verzeichniß auch in diesem Jahre wieder ungemein reichhaltig. Um den Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, hat Herr Haage auf S. 9. sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, welches er gütigst zu beachten bittet. Näher auf den Inhalt einzugehen, verbietet der gemessene Raum und müssen wir dies den Blumen- und Pflanzenfreunden selbst überlassen. Besonders hervorheben möchten wir jedoch die Gehölzsamen (S. 35), namentlich die der Coniferen, unter denen eine große Menge der neuesten von Roezl eingeführten Arten sind. Im Ganzen sind gegen 500 Gehölzsamen aufgeführt.

Der diesem Hefte beigegebene Auszug des Haupt-Preis-Courants No. 29 u. 30 der Herren Gebrd. **Villain** in Erfurt empfehlen wir gleichfalls den geehrten Lesern, indem sie manches Neue und Interessante darin finden werden, sowohl für den Gemüse- als Blumengarten.

Herr **F. C. Heinemann** hat das Titelblatt seines überhaupt sehr sauber ausgestatteten General-Katalogs (No. 54 u. 55), der gleichfalls mit diesem Hefte den geehrten Lesern zugeht, mit einer Miniatur-Abbildung der so herrlichen **Begonia Rex** geziert, zu welchem Zweck dies

geschehen, ist uns freilich nicht recht klar, indem diese Begonia bereits schon so vielfältig in lebenden Pflanzen verbreitet und den Blumenfreunden so oft in vortrefflicheren Abbildungen durch am weitesten verbreitete Journale vorgeführt worden ist.

Der Katalog enthält eine reiche Auswahl schöner Pflanzen, unter denen viel Neues sich befindet, und die den Blumenfreunden theils in Samen, theils in Pflanzen offerirt werden. Sehr zu wünschen wäre es gewesen, wenn mehr Sorgfalt auf die richtige Schreibart vieler lateinischer Namen verwendet worden wäre, es würde dies zur Empfehlung des Katalogs noch bedeutend mehr beitragen. An Büchern zum Nachschlagen fehlt es jetzt nicht. E. D–s.

Feuilleton.

△ **Aconitum Napellus.** Herr Naudin macht in der Flore des serres mit Recht auf die Gefährlichkeit dieser Giftpflanze aufmerksam, die man so häufig in den Gärten angepflanzt findet. In den Vereinigten Staaten Nordamerikas starb erst kürzlich ein Jude durch den Genuß der Wurzel dieser Pflanze plötzlich. Die Wurzel nimmt gerieben eine braune violette Farbe an und unterscheidet sich deutlich von jeder anderen Rübenart. Wenn man die Wurzel kaut, so hat sie einen scharfen Geschmack, der jedoch bald in Folge der Lähmung der Zungennerven verschwindet. Nach dem Genuß folgt Mattigkeit, Verzuckung der Gesichtsmuskeln, Erbrechen, Irrereden und endlich der Tod. Die Wurzel gerieben und auf Wunden gelegt wirkt augenblicklich schrecklich auf das Nervensystem. Es ist selbst abzurathen die frische Wurzel längere Zeit in der Hand zu halten, denn man hat Fälle gehabt, wo darnach die Hand steif wurde, Symptome der Schwäche eintraten und selbst der Tod erfolgte. In England starben vor zwei Jahren mehrere Personen, welche Wurzeln dieses Aconitum für Rettig gegessen hatten.

Ueber den **Kohlen-Mangel** in Griechenland und im Orient. Die Theuerung der Kohlen ist in allen Hauptstädten des Reiches unerhört geworden, denn während in früheren Jahren der Centner mit 2 bis 3½ Drachmen bezahlt wurde, kostet der Centner nun 15, ja 18 bis 20 Drachmen. — Preise für Kohlen, die nie im Oriente erhört worden sind. Würden die Regierungen nicht trachten, diesem Mangel auf eine Weise abzuhelfen, so könnte diese Nichtberücksichtigung schlimme Folgen nach sich ziehen. Die Ursache dieses Mangels ist in dem Mangel des Holzes zu suchen, das ausnehmend im Preise stieg. Dasselbe wird nun ebenfalls nach Okken verkauft und 1 Okka mit 10 Lepta bezahlt. Aus Ursache des Baumfrevels und der Waldbrände, die häufig stattfinden, sind bis in der Nähe der Hauptstadt sich befindenden Staatswaldungen baum- und holzleer geworden; denn in früheren Jahren konnte Jeder in den Staaatswaldungen Holz fällen, sich daraus Häuser und Schiffe bauen, der Kalkbrenner seinen Kalk mit Holz aus diesen Waldungen brennen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Nun sind die traurі-

gen Nachfolgen einer solchen gewissenlosen Verwaltung der Staatswaldungen eingetreten.

Bis zur Stunde wurden in Griechenland an 22 Orten Braunkohlenlager mit Kohlen von ausgezeichneter Güte und zu allen Zwecken dienbar gefunden; jedoch wird nicht der geringste Gebrauch von ihnen gemacht. Diese Braunkohlenlager sind Eigenthum der Regierung und nirgends im Lande finden sich selbe zum Kaufe. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, die Ausbeute dieser Schätze zu beginnen. Jedes Vorurtheil gegen die Anwendung derselben würde sich heben und da sich in der Türkei keine Braunkohlen finden und die sich findenden weit vom Meere entfernt sind, so könnten die griechischen Braunkohlen auch nach dem Oriente verführt werden und dort Eingang finden. Der Kohlenbrenner brannte in früheren Zeiten in Griechenland seine Kohlen aus folgenden Bäumen und Sträuchern: Arbutus Andrachne, Arb. Unedo, Pistacia Terebinthus, Pinus Pinea, Olea europaea, besonders auch aus Quercus coccifera, Q. Ilex, Cercis Siliquastrum — jedoch sind alle diese Bäume und Sträucher nun so selten geworden, daß man keine Kohlen mehr daraus brennen kann.

(Dr. Landerer in der »Flora«.)

Mittel gegen Erdflöhe. Herr Lehrer Titze hat Wasser, in welchem stinkendes Fleisch gelegen, mit Erfolg gegen den Erdfloh angewendet. Derselbe hat bemerkt, daß auf Beeten, wo unmittelbar vorher Rasen gewesen, dieses Insekt sich nicht zeigt.

Personal-Notizen.

* **Heinrich Lehmann**, früherer Obergärtner bei Herrn Keferstein bei Magdeburg und zuletzt Kultivateur der Orchideen im Petersburger botanischen Garten, hat die Handelsgärtnerei von Böhm und Grünhof bei Stettin, käuflich übernommen.

---

e. Herr Obergärtner **Günther**, früher bei Herrn Haage in Erfurt, hat nach einer belebten Unterhaltung mit Herrn Laurentius den Garten desselben freiwillig verlassen und sich wieder zu Herrn Haage begeben *). Die besagte Gärtnerei steht nunmehr unter dem persönlichen Schutz des Herrn Laurentius.

---

† **Weinmann**, Kaiserl. Russ. botanischer Garten-Inspector in Pawlowsk bei Petersburg, starb am 17. August v. J. in einem Alter von 70 Jahren. Rußland verliert in ihm einen seiner tüchtigsten Gärtner und Botaniker.

(Gartenflora.)

---

† **Dr. Charles Morren** zu Lüttich starb am 17. December v. J. in seinem 52. Lebensjahre nach einer langen schmerzhaften Krankheit.

---

† Herr Hofgärtner **C. G. Knicke** zu Wernigerode verstarb am 29. November v. J. nach einer fünftägigen Krankheit in seinem 58. Lebensjahre.

(Siehe den Nekrolog S. 86.)

Herr **W. Lauche** hat seit dem 1. Jan. seine Stellung als Obergärtner auf der Wildpark-Station bei Potsdam aufgegeben und sich daselbst als Handelsgärtner etablirt

---

*) Wir nannten Herrn Günther vor einiger Zeit als Nachfolger des Herrn Böttger. Anmerk. v. Redakt.

Die besten Schlangengurken-Kerne

letzter Erndte, eigener Zucht und Pflege in großen Anlagen, empfehle ich den Kultivateuren dieser Frucht und allen Saamenhandlungen nach vieljährigen Erfahrungen als das Vorzüglichste für Garten und Feld. In Hinsicht der schönen langen Formen, des guten Geschmackes und der sehr starken Tragbarkeit zeichnen sich diese Gurken erfahrungsmäßig vor allen andern Sorten aus. — Ganz besonders dauerhaft aber sind sie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen gegen das sogenannte Befallen und Fleckigwerden.

Bestellungen erbitte ich mir rechtzeitig und wird das Zollpfund bester trockner Kerne gegen Einsendung des Betrages mit 1⅔ ℛ berechnet. Bei Abnahme von 10 Pfund und darüber à ⅞ ℛ Pr. Crt.

Gleichzeitig empfehle ich mich auch zur Abnahme hiesiger bester (Grochlitzer) Schlangengurken-Kerne letzter Erndte, und berechne bei Abnahme von 10—100 Pfund 1 ℛ pr. Pfund, über 100 Pfund 27 Sgr. pr. Pfund, so weit die neue Erndte reicht.

Briefe und Gelder erbitte ich mir franco.

Grochlitz, b. Naumburg a. d. Saale. **Gustav Kühlewein,** Kultivateur.

Preis-Courant für 1859 über Blumen-, Feld- und Wald-Samen

von **Friedrich Adolph Haage jun. Erfurt** (Preußen), jetzt im Druck begriffen, wird zur gewohnten Zeit, mit Beginn des neuen Jahres zur Ausgabe bereit sein.

Es ist das Verzeichniß des umfassendsten Lagers von allen im Handel vorkommenden Samen, welche zum großen Theil, in's besondere die feineren Blumen- und Gemüse-Samen, selbst gebaut und die in einigen Gegenden, im In- und Auslande, als eigenthümlich vorkommenden Sorten direct von den zuverlässigsten Züchtern bezogen werden.

Specielle Verzeichnisse über meine ca. 500 Sorten umfassende Sammlung von Pelargonien, sowie über Cacteen, von welchen ich gegenwärtig vielleicht die vollständigste Sammlung in Europa besitze, liegt zur Ausgabe bereit.

Den mir bekannten Geschäftsfreunden wird derselbe wie früher ohne weitere Aufforderung zugehen, und steht derselbe mir noch unbekannten Gartenliebhabern und Landwirthen gratis und franco zu Dienst.

Erfurt, 1. December 1858.

☞ Diesem Hefte sind gratis beigegeben und den geehrten Lesern bestens empfohlen: 1) 26. Jahrg. Preis-Verz. für 1859 der Samenhandlung, Kunst- u. Handelsgärtnerei von Herrn **C. Appelius** in Erfurt. 2) Preisverzeichniß über Samen und Pflanzen des Herrn **E. Benary** in Erfurt. 3) No. 54 u. 55 General-Katalog der Samen- u. Pflanzenhandlung von Herrn **F. C. Heinemann** in Erfurt. 4) Preis-Verz. von Sämereien, engl. Gartengeräth ꝛc. von Herrn **P. Smith & Co.**, Hamburg. 5) Auszug des Haupt-Preis-Courant No. 29 u. 30 der Herren Gebr. **Villain** in Erfurt. 6) Verzeichniß für 1859 von Gemüse-, Feld- u. Blumen-Samen, welche in frischer und ächter Qualität bei **Ziegler & Brämer** in Stralsund zu haben sind.

Baſtarde und Formen bei Befruchtungen von Begonien verſchiedener Arten etc.

Im Jahre 1857 machte ich einige Verſuche, verſchiedene Begonien gegenſeitig unter einander zu befruchten und zwar ſolche, die als Arten anerkannt ſind, wie auch Arten mit dem Pollen von Baſtarden, Baſtarde mit dem von Arten, und endlich Baſtarde mit ſich ſelbſt. Nachſtehend die Erfolge dieſer Befruchtungen, die vielleicht für diejenigen, welche ſich mit dergleichen Vermiſchungen beſchäftigen, einiges Intereſſe haben mögen. Ferner einige meiner Anſichten, die ſich mir bei wiederholten Verſuchen in dieſem Jahre (1858) und bei dem Erfolge, welcher ſich aus dieſen Verſuchen ergab, aufdrängten.

1) **Baſtarde mit ſich ſelbſt befruchtet.**

Begonia xanthina marmorea mit ſich ſelbſt befruchtet. Die Abkömmlinge dieſer Befruchtung gaben größtentheils ſich ſelbſt, alſo die Pflanze aus der ſie gezogen waren, wieder. Unter ungefähr 100 Pflanzen waren gegen 10 einfarbig und dennoch von B. xanthina gandaviensis kaum zu unterſcheiden, wenn man nicht eine unbedeutend dunklere oder hellere Färbung der Pflanze als Unterſchied gelten laſſen will. Eine einzige Pflanze dagegen wich bedeutend ab, ſie zeigte eine ſtarke Neigung, beſonders in der Färbung nach B. rubro-venia hin. Die Blätter waren ſchmaler und feſter, auf der Oberſeite dunkelgrün mit abgegränzten, intenſiv weißen Flecken. Auch der Geſtalt nach kommt ſie der B. rubro-venia näher, indem die Pflanze einen kürzeren und gedrungeneren Wuchs als ihre Mutterpflanze hat.

Beg. xanthina gandaviensis mit ſich ſelbſt befruchtet, gab ebenfalls größtentheils ſich ſelbſt wieder, einige Pflanzen hatten eine noch dunklere Färbung der Blätter, während andere heller waren und ſich unbedeutend von B. xanth. marmorea unterſchieden.

2) **Baſtarde mit dem Pollen einer guten Art befruchtet. Begonia xanthina gandaviensis mit dem Pollen der splendida.**

Die Abkömmlinge von dieſen Eltern hatten ſämmtlich einen und denſelben Habitus. Sie ſtanden darin in der Mitte zwiſchen der guten Art B. xanthina und B. splendida mit einer größeren Neigung zu B. splendida. In der Färbung der Blätter dagegen boten ſie den größten Gegenſatz dar, indem aus derſelben Samenkapſel Pflanzen erſchienen ſind, deren Oberfläche der Blätter ſchneeweiß mit hellgrünen Adern iſt, während andere Pflanzen einfarbig dunkelbraun faſt ſchwarz ſind. Hierin, in der Färbung, theilten ſich die Pflanzen in nier der Anzahl nach ziemlich gleiche Theile. Ein Viertel der Pflanzen

zeigte die Abstammung von B. rubrovenia (einer der Großeltern), die Oberfläche der Blätter ist silberweiß bis auf die hellen grünen Adern und nächste Umgebung derselben, die Unterseite der Blätter wie übrigen Theile der Pflanze ebenfalls hellgrün. Das zweite Viertel hat ebenfalls Blätter mit weißer Oberfläche, das Weiß hat jedoch einen rothen Metallglanz und sehen die Blätter, wenn ganz jung, ganz roth aus; die Adern, dunkelgrün und die Unterseite der Blätter, bei der vorigen Form hellgrün, ist bei dieser dunkel rothbraun. Hier war demnach B. rubro-venia und B. xanthina gemeinschaftlich vertreten. Das dritte Viertel hat einfarbige, dunkelbraune, fast schwarze Blätter, sowohl auf der Ober- als Unterseite derselben, B. xanthina macht sich hierin geltend. Während das letzte Viertel einfach grüne wie B. splendida gefärbte Blätter hat und sich von dieser nur durch den Habitus und etwas wenigere Behaarung unterscheidet. Außer diesen 4 Hauptformen entstanden noch 5 Formen in je einem Exemplare, die ein merkwürdiges Gemisch von diesen 4 Hauptformen bilden. Sämmtlich hatten sie die rothe Behaarung von B. splendida, nur daß diese nicht so stark auftritt. In den Blumen unter sich kaum verschieden, sind dieß kaum der B. splendida sehr ähnlich.

Begonia xanthina argentea (latimaculata) mit dem Pollen der B. splendida befruchtet.

Aus dieser Befruchtung entstanden fast ganz dieselben Pflanzen als bei der vorhergegangenen Befruchtung und besteht der ganze Unterschied darin, daß jedes obenerwähnte Viertel in der Färbung dunkler ist.

Interessant ist hier, wie zwei, in Färbung des Laubes so verschiedene Mutterpflanzen, weil diese dieselben Eltern haben, die nämlichen Pflanzen, die doch unter sich so verschieden sind, lieferten.

3) **Eine gute Art mit dem Pollen eines Bastardes, B. splendida mit dem Pollen der B. xanthina argentea (latimaculata einiger Gärten) befruchtet.**

Hier war der Vater der Bastard, dennoch waren Habitus, Behaarung, Blumen ganz ebenso, wie bei der Befruchtung unter 2) wo der Bastard die Mutter vorgestellt hatte, dagegen war auffallender Weise die Färbung der Blätter von diesen ganz verschieden und gegen 300 Pflanzen bei allen ein und dieselbe. Die Oberfläche der Blätter ist mit weißen Punkten, von der Größe eines Stecknadel-Knopfes bis zu der einer Erbse bedeckt, während die ganze übrige Pflanze dunkelbraun ist. Sobald also der Pollen des Bastardes auf eine gute Art angewandt war, trat dieser Bastard mehr selbstständig auf, er gab sich selbst wieder, ohne nach einer seiner Eltern zurückzuschlagen. Da aus den Befruchtungen 2) und 3) Habitus, Behaarung und Blumen ganz dieselben sind, so läßt sich daraus schließen, daß die jungen Pflanzen bei Bastardirungen nicht eine dieser drei Eigenschaften vom Vater, die andere von der Mutter besonders nehmen, sondern, daß diese hervortreten, je nachdem das eine der Eltern über das andere im Wachse vorherrscht.

4) **Eine gute Art mit dem Pollen einer anderen guten Art befruchtet.**

B. splendida mit dem Pollen der B. annulata (Griffithi) befruchtet.

Diese Bastarde, mehrere hundert Pflanzen, sind sich in der Gestalt

alle gleich, ebenfalls in der Färbung bis auf geringe Abweichungen, so daß einige Pflanzen wenig dunkler, andere wenig heller sind. Sie stehen gerade in der Mitte zwischen beiden Eltern. Der Wuchs ist kräftiger, als der der B. annulata, die Behaarung dichter aber kürzer als bei B. splendida. Der Rand der Blätter ist dunkelbraun, dann kommt nach Innen zu eine breite grüne, weiß untermischte Binde, und ist die Mitte wieder dunkelbraun. Die Unterseite der Blätter ist wie die der B. annulata mit dem Unterschiede, daß die mittlere Binde breiter als bei dieser ist.

Diese Befruchtungen waren, wie schon vorher erwähnt, im Sommer 1857 gemacht, der daraus hervorgegangene Samen wurde im Herbste desselben Jahres ausgesäet, worauf die Bastarde im Frühjahr oder Anfang Sommers die ersten Blumen brachten. Meine Absicht war nun diese Bastarde, die Abkömmlinge der drei letzten Befruchtungen 2) 3) und 4) sogleich wieder zu neuen Befruchtungen zu benutzen; doch zu meinem Erstaunen wollten sich bei sämmtlichen Pflanzen die männlichen Blumen an den ersten Blumenstielen, die die Pflanzen hervorbrachten, nicht ausbilden, sondern sie fielen schon als kleine Knospen ab. Die weiblichen Blumen wurden zwar soweit vollkommen, daß diese sich ausbildeten und aufblühten, doch waren sie völlig unfruchtbar, da sie nie Samen ansetzten, sondern stets, mochten sie mit dem Pollen ihrer Eltern oder dem anderer Arten befruchtet sein, abfielen, nachdem sie verblüht waren. Ich habe dies bei hunderten von Pflanzen wahrgenommen, bei solchen die dürftig und üppig wuchsen und die sich unter verschiedenen Verhältnissen der Temperatur befanden. Wie jedoch später neue Blumenstiele erschienen, bildeten sich die männlichen Blumen immer mehr aus, bis sie endlich an älteren Pflanzen und besonders an solchen, die schon vielfach geblüht hatten, dem Aeußeren nach zur Vollkommenheit gelangten und völlig aufblühten, jedoch nicht den geringsten Pollen entwickelten, bis sich dieser zuerst im vorigen Herbste (1858) an eine der ältesten Pflanzen zeigte. Doch auch dieser Pollen war noch unfruchtbar, da er, weder auf die Narbe seiner Pflanze noch auf die seiner Eltern gebracht, den geringsten Eindruck machte. Mit der Narbe dieser Bastarde verhielt es sich ähnlich. Trotzdem sich die weiblichen Blumen der ersten Blumenstiele äußerlich vollkommen ausbildeten, so waren diese, wie schon vorher bemerkt, völlig unfruchtbar, an den späteren Blumen stellte sich schon eine größere Fruchtbarkeit ein, indem die Narben annahmen, die Samenkapseln anschwollen, jedoch ohne daß die Samen zur Reife kamen, nach einer oder zwei Wochen wieder abfielen, während endlich ältere Pflanzen und besonders solche, die schon durch Ableger oder Blätter vermehrt waren, völlig reifen Samen brachten, von dem jedoch der zuerst gewonnene auch noch unfruchtbar sein mußte, da er nicht keimte, bis es mir jetzt endlich gelang aus einer Samenkapsel junge Pflanzen zu erziehen.

Die Abkömmlinge der Bastarde mit sich selbst befruchtet unter 1) brachten dagegen, soweit ich es versuchte, sogleich fruchtbare männliche wie weibliche Blumen.

Ohne etwa aus diesen Erfolgen eine feste Regel aufstellen zu wollen, da sich diese aus den Experimenten nur einer Gattung ergaben, so zeigt sich doch wenigstens aus denselben, daß das Fruchtbarwerden

von Baſtarden mit der Zeit kommen kann und gewiß in vielen, wenn nicht in ſämmtlichen Fällen eintreten wird, ſobald ſich Pollen überhaupt bilden.

Im vorigen Jahre 1858 habe ich dieſe Kreuzbefruchtungen weiter ausgedehnt und bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß bei dieſen Baſtardirungen und dem Erfolge aus denſelben das Verhältniß der Temperatur, worin ſich die Pflanzen befinden, in Bezug auf Licht, Wärme und Feuchtigkeit eine Hauptrolle ſpielt, indem einer, zwei oder alle drei dieſe Agenten im erhöhten Maaße, je nachdem es die Eigenthümlichkeit, die Qualität der Beſtandtheile der Pflanze erlaubt, Pollen und Narbe eine erweiterte Wirkung verſchaffen, dadurch Baſtardirungen ermöglichen und ebenſo, bei Pflanzen mit ſich ſelbſt befruchtet, andere Formen erzeugen, ſo daß ſich Pflanzen unter veränderten Verhältniſſen der Temperatur in Bezug auf ihre natürlichen leichter oder nur baſtardiren laſſen, ferner, daß die Entſtehung anderer ohne Baſtardirung erhaltener abweichender Formen, wenn dieſe aus Samen entſtanden, gleichfalls von abweichenden Verhältniſſen der Temperatur in Bezug auf Licht, Wärme und Feuchtigkeit abhängen.

In einem Hauſe, wo mehrere verſchiedene Arten Begonien ſtanden, ſetzten ſolche mit ſich ſelbſt befruchtet leicht Samen an und bildete dieſer ſich gut aus, während es ungeachtet vieler Verſuche in demſelben Hauſe nicht möglich war zwei dieſer Arten zu baſtardiren, dagegen ließ ſich dies an denſelben Arten in einem andern Hauſe unter veränderter Temperatur leicht ausführen; ferner brachten zwei Kreuzungen (dieſelben) unter verſchiedenen Temparaturverhältniſſen vorgenommen bedeutend abweichende Pflanzen zum Vorſchein.

In der Natur iſt hierdurch der Baſtardirung von Pflanzen in wildem Zuſtande ein Ziel geſetzt, daß ſie dort unter den ihnen zuſagenden Verhältniſſen der Temperatur beſtehen und daß zwei ſonſt ſehr nahe verwandte Arten, ohne durch dieſe veränderten Verhältniſſe gereizt zu werden (wenn man ſich ſo ausdrücken darf) in Ewigkeit dicht beiſammen ſtehen können ohne ſich gegenſeitig zu befruchten, ſelbſt wenn der Pollen der einen auf die Narbe der andern gebracht würde. Ereignete es ſich auch in der Wildniß in einem ungewöhnlich feuchten, warmen oder trocknen Sommer, daß ſich ein neuer Baſtard eine neue Form bildete, ſo würde dieſer in den meiſten Fällen wieder zu Grunde gehen, wenn ſich nicht jährlich wieder ein Temperatur-Verhältniß einſtellte dem entſprechend, unter deſſen Einwirkung der Baſtard oder die Form entſtanden iſt. So führen die kultivirten Pflanzen im entgegengeſetzten Falle denſelben Beweis, wo ſo viele neue Formen und Baſtarde durch die veränderten Verhältniſſe der Temperatur entſtehen, deren Beſtehen an die Verhältniſſe des Entſtehens gebunden iſt, ſo daß ſie ihrem wilden Zuſtande wieder überlaſſen, entweder ausſterben oder wieder in die Urform zurückgehen würden. Ferner ſind wenige unſerer Kulturpflanzen, die beſtändig aus Samen gezogen werden müſſen und ſchon ſeit vielen Jahren aus Samen gezogen ſind, von denen man nicht verſchiedene Formen beſäße, wogegen man von ſolchen die ungeſchlechtlich fortgepflanzt werden, obgleich ſie auch ſchon ſeit langer Zeit kultivirt werden, z. B. Helianthus tuberosus, deſſen Samen nicht zur Reife kommt und der nur durch Knollen vermehrt wird, nur eine Form hat.

In Beziehung hierauf läßt ſich nur eine Acclimatiſion von Pflanzen denken; ſo gedeihen viele in Frankreich entſtandene Obſtſorten in unſerem Klima nicht, trotzdem ſie mit den unſrigen dieſelbe Abſtammung haben und iſt der gute Levkoyen-Same, obgleich „engliſche Levkoye“ auf den Etiketten ſteht ein deutſches Produkt.

Ferner erzeugen die Beſtandtheile des Bodens, worin die Pflanze ſteht, viel weniger abweichende Formen, als man allgemein glaubt, ſondern beziehen ſich dieſe vielmehr auf das Maaß in wieweit der Boden der Luft zugänglich iſt, dadurch Wärme, Licht und Feuchtigkeit auf die Wurzeln der Pflanzen Einfluß haben, und je nach der Eigenthümlichkeit der Pflanze auf dieſe wirkten und eine Abänderung bei der Zucht derſelben aus Samen verurſachten oder ſie zu Baſtardirungen geneigter machten. Den beſten Beweis hierfür geben unſere Kulturpflanzen, deren Stammeltern hieſige Eingeborene ſind, dieſe behalten die Eigenſchaften, welche ſie durch die Kultur, durch Lockerung des Bodens, erhalten haben, wenn der Wildniß überlaſſen, weder auf den fetteſten noch mageren Boden nicht bei, ſondern gehen entweder in ihre Urform zurück oder ſterben aus, wenn ſie durch zu lange Kultur, durch vielfaches Ziehen aus Samen unter veränderten Verhältniſſen verwöhnt ſind.

Auf dieſe Anſichten bauend, haben ſich bei dem im vorigen Jahre gemachten Befruchtungen Erfolge herausgeſtellt, die meine Erwartungen weit übertroffen haben und bin ich jetzt außer anderen, die noch nicht geſäet ſind oder gekeimt haben, im Beſitze von jungen Pflanzen von nachfolgenden Kreuzungen:

Begonia	splendida		mit	dem	Pollen	der	B. laciniata
„	„		„	„	„	„	B. Rex
„	xanthina		„	„	„	„	B. laciniata
„	„	gandaviensis	„	„	„	„	B. „
„	„	argentea	„	„	„	„	B. „
„	„	gandaviensis	„	„	„	„	B. Rex
„	„	argentea	„	„	„	„	B. Lazuli
„	Rex		„	„	„	„	B. laciniata
„	„		„	„	„	„	B. splendida
„	„		„	„	„	„	B. xanthina gandaviensis.

Einer der ſelbſt gezogenen Baſtarde unter 2) mit dem Pollen der B. laciniata.

B. rubro-venia mit dem Pollen der B. Twaitesii. Dieſe Kreuzung zu wiederholten Malen gemacht, brachte ſtets Samen, der jedoch nie keimte, bis ich bei einer Ausſaat eine Pflanze erhielt. Bemerkenswerth iſt noch, daß B. splendida und xanthina gandaviensis jede mit dem Pollen der B. annullata oder laciniata befruchtet, anſetzten und wie oben erwähnt junge Pflanzen brachten, während die beiden letzteren mit dem Pollen einer der erſteren befruchtet, alſo im umgekehrten Falle, nie auch nur Samen anſetzten. Andere wieder brachten ſcheinbar guten Samen, der öfters 3—4 Monate zur Reife gebrauchte und doch war derſelbe nicht keimfähig.

F. F. Stange.

Ovelgönne, d. 3. Jan. 1859.

Verzeichniß der vorzüglichsten Nelken-Sorten.*)

Durch das nachfolgende „Elite-Verzeichniß aus den uns bekannt gewordenen Nelken“ glauben wir den angehenden Nelkenisten, so wie den ältern Nelkenfreunden einen Dienst zu erweisen. Ersteren wird eine Auswahl der anzuschaffenden Nelken durch dasselbe erleichtert; die Letzteren aber werden durch dasselbe hoffentlich auf manchen Edelstein unter ihren Lieblingen geführt werden, der ihnen vielleicht anders unter dem großen Haufen von Schutt und Spreu, den alljährlich die Marktschreierei in ihren vielnummerigen Catalogen anpreiset, verborgen geblieben wäre. Es ist das nachstehende Verzeichniß nicht eine willkührliche Auswahl; vielmehr ist dasselbe die Frucht einer sorgsamen, kostspieligen Sammlung und einer mühsamen, regelrechten Prüfung. Wir selbst besitzen die Blumen, haben sie blühen gesehen, und können sie jedem Liebhaber empfehlen.

Um indeß von vornherein allen Irrthümern vorzubeugen, bemerken wir, daß wir keine Nelken verkaufen oder abgeben, außer im Tausch oder als Geschenk an unsere uns nahestehende Nelkenfreunde.

Als Bezugsquelle müssen wir daher für Diejenigen, welche nachstehende Nelken sich verschaffen wollen, zunächst die Züchter der einzelnen Nelken selbst bezeichnen; können indeß in Uebereinstimmung mit unserm kürzlich in dieser Zeitschrift enthaltenen Schreiben „An unsere Nelkenfreunde“ nicht unerwähnt lassen, daß fast sämmtliche nachstehend verzeichnete Nelken nach unserer mehrjährigen Erfahrung echt und in gesunden, kräftigen Senkern — was ja die Hauptsache ist! — bei dem Nelkenisten Friedrich Vöchting in Blomberg, Fürstenthum Lippe, abgegeben werden. Herr Vöchting hat uns stets auf unsere Bitte ein Exemplar seines Verzeichnisses und seine Blätterkarte gesandt.

Schließlich bitten wir auch andere Nelkenfreunde, auf die eine oder andere wirklich gute Nelke in diesen Blättern aufmerksam machen zu wollen.

A. Randsaum-Picotten.

Prinzessin Adelheid (V.), rahmweiß mit schwarzpurpur, ganz reine Zeichnung und vorzüglich gebaut.

Freundesblick (V.), wachsweiß mit hellscharlach, sehr groß und gefüllt.

Prinzessin Therese (V.), weiß mit carmoisin, in jeder Hinsicht eine Prachtblume und allgemein beliebt.

Liebliche (V.), hagelweiß mit dunkelincarnat.

Marion (R.), weiß mit carmoisin, sehr groß und schön gebaut.

---

*) Durch die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses hoffen wir besonders den angehenden Nelkenfreunden eine Freude zu bereiten, indem sie dadurch in den Stand gesetzt werden leichter und sicherer eine Auswahl guter Blumen treffen zu können.
Die Redact.

Werther's Lotte (Pal.) weiß mit carmin, sehr voll, schöner Habitus.
Freund John (Benary), weiß mit lilla.
Rose von Brüggen (Sam.), cerise mit purpur. Interessante Färbung.

B. Altdeutsche Picotten.

Fürstin Elisabeth zur Lippe (B.), hochgelb mit scharlach, vortrefflich im Bau.
Braut von Corinth (B.), schwefelgelb mit incarnat, groß und sehr gefüllt.
Agnes (B.), schwefelgelb mit scharlach, sehr liebliche Blume.
Krone von Klattau (Bullm.), weiß mit lilla.
Juwel von Arnstadt (Möhring), weiß mit cerise.
Henriette (Sam.), schwefelgelb mit scharlach.

C. Neudeutsche Picotten.

Hulda (B.), weiß mit leuchtend scharlach, groß und schön gebaut.
Chanoinesse (B.), weiß mit leuchtend violettpurpur, sehr lebhaft illuminirt und schön gebaut.
Semiramis (R.), weiß mit bläulichpurpur, sehr regelmäßig und ganz vorzüglich gebaut.
Leonidas (B.), hagelweiß mit leuchtend carminviolett, groß und vorzüglich gebaut.
Aphrodite (B.), hochgelb mit goldglänzend carmoisinbraun.
Madame Reese (B.), weiß mit leuchtend hellscharlach, sehr regelmäßig und vorzüglich gebaut.
Dr. Moerike (B.), weiß mit zartrosa.
Hauptmann Richmann (B.), gelb mit leuchtend carmin, sehr regelmäßig und groß.
Admirable (B.), hagelweiß mit leuchtend carmoisin.
Carl Zahn (B.), blaßgelb mit carmin, groß, sehr gefüllt.
Freund Matthews (B.), weiß mit leuchtend bräunlich carmoisin.
Maria Lott (B.), weiß mit hochrosa.
Anna Pick (Sam.), weiß mit dunkelbraun.
Schöne Schweizerin (B.), weiß mit hochcarmin.
M. Bullmann (B.), gelb mit purpur cerise.
Amtmann von Linsingen (Sam.), gelb mit lebhaft carmoisin.

D. Römische Picotten.

Prinzessin Caroline (B.), gelb mit leuchtend carmin, groß und sehr gefüllt.
Professor Blazina (B.), weiß mit leuchtend purpurcarmoisin, sehr groß.
Alice (B.), blaßgelb mit aschrosa. Selten!
Amor (B.), gelb mit bräunlich chamois.
Bellmonte (B.), rahmweiß mit mennigroth.
Van Houtte (B.), kupferigmordore mit silbergrau, selten und sehr schön.
Fortuna (R.), gelb mit dunkel fen.

Fatime (Hlbz.), gelb mit hell feu.
Cantorin Palandt (Pal.), hellchamois mit violettpurpur.

E. Römiſche Picotten.

Körner (B.), blaßgelb mit hellkupfer und aurora.
Prächtige (B.) gelb mit aſchroſa und ſcharlach.
Freund Böchting (R.), gelb mit carmin, aſchgrau und weiß.
Profeſſor Scheidweiler (B.), hochgelb mit ſcharlach und ſchwarzbraun.
Freya (R.), dunkelgelb mit iſabell und blaugrau.
Mad. Ficus (B.), weiß mit kupfer und ſchwarzceriſe.

F. Pyramidal-Picotten.

Anna (Bichm.), hochſchwefelgelb mit hagelweiß.

G. Holländiſche Picotten.

Andromeda (B.), hagelweiß mit ſchön violetter Zeichnung.
Auguſt Eckhardt (R.), weiß mit violett.
Bertha von Ulmenſtein (v. U.) hagelweiß mit dunkelſammtpurpur.

H. Holländiſche Picott-Picotten.

Arminius (B.), gelb mit aurora und aſchgrau.
Herzogin Mathilde von Würtemberg (B.), gelb mit leuchtend carmin und hochpurpur.
George Cuvier (B.), blaßgelb mit aurora, aſchgrau und ceriſe.
Clementine (B.), gelb mit ſilbergrau, aurora und carmin.
Zierde der Nelken (B.), lichtgelb mit aſchroſa und incarnat.
Freund Pörtner (B.), blaßſchwefelgelb mit ſilbergrau, ſcharlach und ceriſe.
Boorhelm (B.), weiß mit kupfrig ſcharlach und dunkelceriſe.
Barneſiana (B.), ſchwefelgelb mit kupferroſa und aurora.
Krone von der Lippe (B.), hochgelb mit ſchwarzpurpur, ſcharlach und weiß.
Guſtav Adolph (B.), hochgelb mit aurora, ſcharlach und ſchwarzviolett.
Triumpf von Blomberg (B.), hochgelb mit aurora und carmoiſin.
Euryanthe (R.), ſcharlach mit kupfer, ſilbergrau und weiß.
Hermythe (B.), lichtgelb mit aurora und ſtahlviolett.
Salome (R.), hochgelb mit feu, lackroth und ſchwarzbraun, groß und herrlich gebaut.
Luna (B.), gelb mit kirſchroth, lackroth und lilla.
Corinna (B.), hochgelb mit chamois, zinnober, ſtahlgrau und ſchwarzviolett.
Mad. Heinemann (B.), hochſchwefelgelb mit zinnober.
Genofefa (B.), ſchwefelgelb mit ſcharlach und weiß.
Juno (L.), weiß mit ſcharlach und mennigroth.
Fanny Moore (Pal.), milchweiß mit zinnober und ſchwarzbraun.
Germania (Sam.), weiß mit aurora, grau und carmin.
W. Neubert (Appelius), weiß mit dunkelroſa und ſchwarzbraun.

Adolphine (Bullm.), gelb mit kupfer und feu.
Sereniſſimus (Hlbz.), gelb mit ſchieferblau, lackroth und braun.
Pretioſa (Hlbz.), gelb mit iſabell und aſchgrau.
Jungfrau von Blomberg (B.), hagelweiß mit leuchtend carminpurpur. — Die größte und regelmäßigſte der uns bekannt gewordenen Nelken! —
Pretioſa (Flor.), gelb mit hell- und dunkelbraun.
Pretioſa (Kr.), gelb mit ponceau, ſchwarz, braun und aurora.
Najade (Hlbz.), gelb mit aſchgrau und iſabell.

I. Neu-Franzöſiſche Picotten.

Nymphe (B), blaßgelb mit leuchtend carmoiſin, ſehr gefüllt und prächtig gebaut.
M. Bullmann (B) hochgelb mit leuchtend carmoiſin, ſehr gefüllt und vorzüglich gebaut.
Erzherzog Stephan (B.), weiß mit leuchtend carminpurpur, ſehr groß und vorzüglich gebaut.
Erzherzog Stephan (Sam.), weiß mit purpur und cerife.
Annaſore (B.), hochgelb mit goldglänzend carmoiſin.
Loddiges (B.), weiß mit leuchtend carmoiſinpurpur.
Graf Stephan Erdody (B.), rahmweiß mit kupferroſa und ſchwarzviolett.
Director Eichenberg (B.), dunkelgelb mit aurora, ſcharlach und ſchwarzviolett.
Souvenir (Hlbz.), gelb mit hochroſa und carmoiſin.

K. Spaniſche Picotten.

Zauberſpiegel (B.), ochergelb mit glänzend kupfrig aurora.
Teutonia (B.), weiß mit hellmordore, ſehr groß und ſchön gebaut.
Mathilde von Ullmeenſtein (B.), hagelweiß mit glühend ſchwarzpurpur.
Pauline (Cz.), ſchwefelgelb mit hochzinnober, groß, vorzüglich gebaut.
Auguſte Rabe (B.), weiß mit dunkelviolett.
Thecla (R.), gelb mit ſcharlach, feu und ſchwarzbraun.
Oberſt Vetter von Doggenfeldt (B.), gelb mit cerife.
Samuels Galeotti (Sam.), gelb mit medorbraun.
Paſtor Ludwig Samuel (Sam.), gelb mit purpur und glänzend braun.
Thusnelde (Hlbz.), weiß mit dunkel ſcharlach und dunkelcarmoiſin.
Babtiſta Seni (R.) altſp. P., hagelweiß mit bleigrau.
James Buchanan (B.), neuſp. P. weiß mit leuchtend carminviolett.
Kaiſerin Eugenie (B.), neuſp. P. P. dunkelgelb mit carmin, ſcharlach und purpur.
Schloßhauptmann von Ullmenſtein (B.), neuſp. P. weiß mit hellſcharlach, groß, vorzüglich gebaut.
Mithridates (B.), neuſp. P. P. hochgelb mit zinnober und braun.
Königin Victoria (Bullm.), neuſp. und weiß mit zinnober.
Don Carlos (Bullm.), neuſp. P. ſchwefelgelb mit rothgrau.

Mad. Willbrand (B.), neuſp. P. hagelweiß mit leuchtend purpurcarmoiſin.
Rittergutsbeſitzer Bieder (B.) neuſp. P. P., hochgelb mit leuchtend carmoiſinpurpur und ſchwarzbraun.

L. Italieniſche Picotten.

Joſephe (Sam.), gelb mit hochſcharlach.
Coletti (B.), altital. P. P. weiß mit hellkupfer und cerise.
Hardy (B.), altital. P. hagelweiß mit glänzend dunkelaſchgrau.
Non plus ultra (B.), altital. P. P. blaßgelb mit graukupfer, aurora und ſchwarzbraun.

M. Engliſche Doubletten.

Chriſtian Rabe (R.), weiß mit incarnat.
Diamant (B.), hochroth mit ſtahlgrau, groß und vorzüglich gebaut.
Inſpector Warscewicz (B.), weiß mit dunkelaſchgrau.
Orlando (B.), glänzend hellſtahlblau mit hochroth.
Braut von Blomberg (B.), hagelweiß mit bläulich violett.
Tarlot (B.), hochſcharlach mit amaranthbraun.
Mont Giebel (Fldr.), weiß mit leuchtend roſa, groß und ſchön gebaut.
Freund Schmidt (R.), weiß mit dunkelblauviolett.
Voltaire (Fldr.), weiß mit leuchtend carmin.
Emilie Wenzel (R.), weiß mit hellſcharlach.
Liebchen (R.), weiß mit hochroſa.
Krone v. Traenkenau (R.), weiß mit incarnat.
Jocaſte (R.), hochgelb mit feu, groß, ſehr gefüllt und ſchön gebaut.
Titania (R.), weiß mit roſa.
Preis v. Blomberg (B.), weiß mit leuchtend roſa.
Dr. v. Stacmeyen (v. U.), weiß mit königsblau.
Electa (R.) grauaurora mit bläulichpurpur.
Schach Sephi (R.) hochgelb mit blaßchair.
Wilhelm Tell (B.) dunkelgranatroth mit tief ſchwarzbraun (faſt ſchwarz.)
Mozart (B.), glänzend ſtahlblau mit ſcharlach.
Madonna (Bichm.) glühend dunkelſcharlach mit tiefſchwarzbraun (faſt ſchwarz.)
Hofgärtner Heicke (Sam.), weiß mit carmin.
M. Koch (Sam.), carmin mit weißen Bändern. Ganz neue intereſſante Färbung.

N. Deutſche Doubletten.

Chriſtan Sckell (R.), dunkelcerise mit hagelweißen ſcharfen Strichen.
Lady Seymour (R.), hochgelb mit chair.
Albrechts Neue (-), hellcerise mit hagelweißen ſcharfen Haarſtreifen.

O. Engliſche Bizarden.

Ruhm von Blomberg (B.), weiß mit incarnat, aſchgrau und ſchwarzviolett, groß und vorzüglich gebaut.
Particulier Müller (B.), weiß mit aſchgrau und ſchwarzviolett.

Fürſt Georg zu Schaumburg-Lippe (B.), orangegelb mit kirſchroth, ſtahlblau.
Juwel von Blomberg (B.), hochgelb mit incarnat, ſcharlach und ſchwarzpurpur.
General von Ziethen (B.), glühend röthlich ſchieferblau mit ſcharlach und ſchwarzviolett.
Prinz Eugen (Bichm.), gelb mit lackroth und ceriſe.
Marie Rabe (R.), ſchwärzlich kupfer mit ſtahlblau, ceriſe und ſcharlach.
Inſpector Roeſe (B.), carmin mit ſchiefergrau und puce.
Arethuſa (B.), hellkupfer mit ſtahlblau, ſcharlach und braun.
Kaiſer Franz Joſeph (B.), gelb mit chair-ceriſe und ſtahlgrau.
Baron von Tettenborn (B.), hellkupfer mit zinnober, ſchwarzviolett und braun.
Schöne Blombergerin (B.), gelb mit incarnat und purpur, regelmäßigen Bändern, groß und vorzüglich gebaut.
Nelkenfürſt (B.), weiß mit glänzend kupfer, ſcharlach, ſchwarzbraun und ſtahlgrau.
Präſident (Bichm.), weiß mit glänzend kupfer, ſcharlach, ſchwarzbraun und ſtahlgrau.
Balduin (Hlbz.), weiß mit hochroth und purpurbraun.
Nelkenkönigin (B.), roſenweiß mit glänzend aſchgrau, ſcharlach und ſchwarzviolett.
Prima-Donna (R.), weiß mit ſcharlach und caſtanienbraun.
Oberlehrer Borwerk (B.), weiß mit ziegelroth und braun.
Sappho (Baill.), weiß mit zinnober und ſchwarzbraun.
Panagia (Fldr.), weiß mit zinnober und purpurbraun.
Dauer (R.), hochgelb mit chair und feu.
Annette (Fldr.), weiß mit ſcharlach und ſchwarzbraun.
Osiris tendre (Fldr.), weiß mit ſcharlach und purpurbraun.
Oberſtlieutnant Barkhauſen (B.), glänzend ſchiefergrau mit purpur, lackroth und ſchwarzviolett, ſehr groß und ſchön gebaut.
Diadem von Blomberg (B.), hochgelb mit kupfer ſchwarzbraun und roſa.
Reizvolle (B.), weiß mit aſchgrau, lackroth, purpur und ſchwarzviolett.
Triumpf von Bückeburg (v. U.), weiß mit ſcharlach und braun.
Johanna (Cz.), weiß mit incarnat und ſcharlach.
Zimmermann (R.), gelb mit zinnober und carmoiſin.
Dante (B.), weiß mit incarnat und dunkelviolett.
Otthilia (Cz.), weiß mit zinnober und ſchwarzpurpur.
Amor (Bichm.), weiß mit feu, kupfer und braun.
Marſchall Clauſel (Bichm.), weiß mit feu und braun.
Hyon (R.), kupfergrau mit carmin, purpur und ſchwarzviolett.
Potentiana (Cz.), weiß mit incarnat, aſchgrau und violettpurpur.
Marianne (Cz.), weiß mit ſcharlach, hellackroth und kirſchbraun.
Lord Gray (R.), gelb mit roſa, incarnat und bleigrau.
Talismann (B.), gelb mit roſa, feu und ſtahlblau.
Dr. Reichenbach (B.), weiß mit hellſcharlach und ſchwarzbraun.
Barbaroſſa (Bichm.), röthlich chamois mit chair und purpurbraun.

Rubienne (B.), weiß mit incarnat und ſchwarzviolet.
Hartweg (B.), weiß mit ſcharlach und ſtahlgrau.
Fanny Elsler (B.), weiß mit carmin und aſchgrau.
Impoſante (Lip.), weiß mit ponçeau und dunkelbraun.
General Möllendorf (R.), weiß mit hochroth und puce.
Saphir (Hlbz.), gelb mit incarnat und aſchgrau.

P. Deutſche Bizarden.

Meiſterſtück (R.), hochgelb mit roſa, feu und braun, ſehr gefüllt und gut gebaut.
Peter Pachum (R.), kupfer mit ſchwarzviolett und weiß.
Erzherzog Johann (R.), rauchgrau mit ſchiefergrau, ſcharlach und braun.
Don Carlos (B.), auroragrau mit hellceriſe und ſtahlgrau.
Superbe (B.), carmoiſinviolett mit ſtahlgrau und hagelweiß.
Sancho Panſa, (R.), carmin mit bleigrau und purpur.
Bizarro (B.), carmin mit ſtahlgrau, hochroth, purpur und weiß.
Freund Sinning (L), grau, incarnat purpur und puce.
Exquiſite (Sam.), dunkelſcharlach, bergblau und glänzend ſchwarzbraun.

Q. Feuerfaxe und Flambanten.

a. Picotten-Faxe.

Geheimer Hofrath v. Möller (B.), dunkelorangegelb mit glänzend ſchwarzkupfer.
Bethmann (R.), auroragelb mit bleigrau.
Erzherzog Johann (Bichm.), feurigorange mit glänzenddunkelrothgrau.
Carl Auguſt (B.), chamois mit röthlich bleigrau.
Cleopatra (Bullm.) aurora mit dunkelaſchgrau.
Brand von Moskau (Appelius), dunkelchamois mit reinem ſcharlach.
Ruhm von Erfurt (Lorenz), glänzend ſcharlach, aſchgrau und kupfer.
Venusſpiegel (Lorenz), gelb mit ſchieferblau und aurora.
Melanchthon (Sam.), chamois mit aſchgrau und aurora.

b. Bizard-Faxe.

Oberhofgärtner Schmidt (B.), hochgelb mit glänzend ſtahlgrau und ſcharlach.
Voltaire (R.), gelb mit incarnat und purpur.
Thecla (R.), hochgelb mit kupfer, feu und ſchwarzbraun.
Carl Rabe (R.), aurora mit grünem Schein, mit feu und ſilberblau geſtreift.
Erbprinz Adolph v. Schaumburg-Lippe (B.), chamois mit ſtahlviolett, hochroth und puce.
Ludwig Woborzil (Bullm.), aurora mit ſtahlblau, incarnat und ceriſe.
Roſalie (Cz.) auroragelb mit feu incarnat und ſtahlblau.
Inſpector Palandt (Sam.), grauroſa, mit glänzend aurora, ſcharlach und dunkelbraun.

Nordlicht (Sam.), aurora mit hellbraun und ſchwarz.
Tancred (L.), gelb mit rothgrau feu und puce.
v. Sagern (R.), gelb mit grau, incarnat und purpur.
Zierde von Brüggen (Sam.), gelb mit aſchroſa und incarnat.
Cantor Palandt (Pal.), aurora, ſchiefergrau, braun, lackfarben und incarnat.

R. Fameuſen.

Octavie (R.), ſpan. P. Fam. weiß mit roſaviolett.
Schöne von Altenburg (Sielm.), neud. P. Fam. weiß mit gelb und hellviolett.
Cloteire (B.), weiß mit ſcharlach, zinnober und ceriſe.
Fürſt von Lippe (B.), w. ſcharlach purpur.
Pepita (B.), ſpan. P. Fam. gelb mit leuchtend carmin.
Candidat Panzer (R.), neud. P. P. Fam., hagelweiß mennigroth und dunkelviolett.

S. Grenobles.

Minona (R.) bräunlich ceriſe mit feinen, ſcharfen weißen Strichen.
Troubadour (Hlbz.), dunkelcarmoiſin mit weißen ſcharfen Strichen.

T. Salamander.

Theodor Oſten (Sam.), hellpfirſichblüthe mit violett punktirt.
Ottilie (Bullmann.), roth mit weiß und zinnober punktirt und geſtrichelt.
Raphael (Bullm.), und Kaiſer Ferdinand (Bullm.) Beide weiß mit ſcharlach punktirt und geſtrichelt.
Königin von Preußen (—) röm. P. Salamander, gelb mit puce, punctirt und geſtrichelt.

Brüggen u. Hildesheim, im Novbr. 1858.

E. Samuel, Paſtor. — H. W. Palandt, z. Z. Pr. d. hannov. Gartenb.-Ver.

Die Verſammlung der deutſchen Obſt- und Weinproducenten zu Wiesbaden,

in den Tagen vom 5. bis incl. den 11. October 1858.

Die Ausſtellung der deutſchen Obſt- und Wein-Producenten wurde in der, zur Abhaltung des mittelrheiniſchen Muſikfeſtes, auf einem frei belegenen Platze zu Wiesbaden eigens dazu erbauten großen Tonhalle, abgehalten. —

Ein geeigneteres, geräumigeres Local, wäre wohl nicht leicht zu finden geweſen und die Schönheit deſſelben wurde durch das von oben

angebrachte Licht, was die ausgestellten Früchte besonders beleuchtete, noch bedeutend erhöht.

Die Tonhalle, welche 236 Fuß in der Länge und 80 Fuß in der Breite maß, gestattete den vielen Besuchern der Ausstellung, ohne Beengung, die aufgestellten köstlichen Früchte mit Muße zu beschauen. Während bei früheren Ausstellungen, z. B. in Naumburg a. d. S. und Gotha immer mehrere Räume zu den Ausstellungen benutzt werden wußten, war es in Wiesbaden möglich, die vielen, aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands, Belgien, Frankreich, der Schweiz ꝛc. eingesandten Fruchtsortimente, in dem einen Raume der Tonhalle zweckmäßig und schön zu arrangiren.

Im Schiffe der Halle waren der Länge nach, 6 lange Tafelreihen aufgestellt, zwischen denen breite Wege eine bequemere Ansicht der selbst auf Tellern aufgestellten Früchte gestatteten. Im hintern Raume der Halle waren 10 Terrassen angebracht, welche jede mit langen Tafeln und Tischen besetzt, ebenfalls auf Tellern sortirt, das eingesandte Obst des deutschen Auslandes, Belgiens, Frankreichs, der Schweiz ꝛc. präsentirten. — In der Mitte dieser Terrassen fanden sich, auf einzeln stehenden Tischen, die eingesandten, ausgezeichneten Trauben-Sortimente der hauptsächlich Weinbau treibenden Gegenden und sonstiger eifriger Weinkultivateure.

Die Seitenwände der Tonhalle waren mit jungen, frischen Birkenbäumen, zwischen denen sich geschmackvoll gewundene Guirlanden hinzogen, gedeckt und geschmückt und außerdem mit vielen Fahnen reich dekorirt. Die inneren größeren Räume waren, ohne eine Verengung des Locales herbeizuführen, durch das kunstverständige Arrangement des Herzogl. Nassauischen Gartendirectors Teismann zu Biebrich in schmucke Gartenpartien verwandelt; blühende und immergrüne Topfpflanzen waren zu lieblichen Gruppen geordnet und durch Herstellung von kleinen Rasenplätzen war dem schmuckvollen Ganzen das Ansehen eines freundlich unterhaltenen Gartens gegeben.

Der Total-Ueberblick dieser Ausstellung, von den Terrassen aus, war denn auch in der That großartig und schön. Man kann sich einen ohngefähren Begriff davon machen, wenn man sich vorstellt, daß auf etwa 100 langen, symetrisch aufgestellten Tafeln und Tischen, etwa 12,000 mit den köstlichsten und ausgesuchtesten Aepfeln, Birnen und Weintrauben belegte Teller paradirten.

Am Tage der Eröffnung der Ausstellung, Mittags, geruhten denn auch Se Hoheit, der Herzog von Nassau und Ihre Hoheit die Frau Herzogin, mit hohem Gefolge, die Ausstellung durch Ihren Besuch zu beehren und sich nicht allein über das zweckmäßige Arrangement, sondern auch über die vielen eingegangenen schönen Obstsortimente lobend auszusprechen und es anzuerkennen, wie ein solches gegenwärtig in Deutschland vorwaltendes reges Bestreben, die Obst- und Weinkultur auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu führen, demnächst herrliche Früchte tragen müsse. — Auch von Seiten des Publikums wurde die Ausstellung, obgleich die Saison in Wiesbaden bereits vorüber, sehr reich besucht.

In der Versammlung hatten sich über 150 Mitglieder, welche an den Verhandlungen Theil nahmen, eingefunden.

Wenden wir uns nun zu den vorliegenden Früchten der Ausstellung selbst, so bemerken wir im Schiffe des Gebäudes eine wunderschöne Collection von Aepfeln und Birnen, eingesandt von dem Präsidenten der Ausstellung, Herrn Regierungsrath v. Trapp zu Wiesbaden, der leider durch die vielen Vorarbeiten dieser Ausstellung angegriffen, sich ein so bedeutendes Unwohlseyn zugezogen hatte, daß er weder an der Ausstellung noch in den Versammlungen an den Verhandlungen Theil nehmen konnte. Hr. v. Trapp, ein eifriger Pomolog, arbeitet unermüdlich an der Verbesserung des Obstbaues und die von ihm eingesandten Früchte geben ein redendes Zeugniß, daß seine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind. — Die außerordentlich schöne Färbung, welche die in der nächsten Umgebung von Wiesbaden gezogenen Früchte annehmen, erklärt sich durch bergig geschützte, dem Obstbaue sehr zusagende Lagen und durch den, wenn auch etwas steinigen, doch durchgehends schönen Boden.

Eine, von den Bewohnern zu Eltville eingesandte, bedeutende Sammlung schöner Aepfel, in werthvollen Sorten, zog dann zunächst die Aufmerksamkeit auf sich; es waren etwa 100 Sorten ausgestellt. Die Früchte des Gutsbesitzers S. Marx zu Eltville dürften indeß zu den vorzüglichsten dieser Sammlung gezählt werden.

Dieser Ausstellung reihten sich die zum Theil sehr ansehnlichen und werthvollen Einsendungen, von Herborn, Hadamar, Hachenburg, Dillenburg, Diez, Braubach, Weilburg, Nassauen, Marienberg, Montabaur, Idstein und Hochheim an. — Hochheim hatte nicht allein ein Sortiment schöner Aepfel, sondern auch ansehnliche und edle Birnen eingesandt.

Aus Rüdesheim war ein sehr schmuckes Obstsortiment zur Stelle gebracht und ist es erfreulich, berichten zu können, wie die Rüdesheimer viele Neigung zeigen, neben der immer größeren Vervollkommnung ihres Weinbaues, auch dem Obstbaue eine vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Von Runkel, Reichelsheim, Rennerod, Selters, Wehen, St. Goarshausen, Königstein und Limburg waren mehr oder weniger große und schöne Obstsortimente ausgestellt und die vielen, unter den verschiedenen Sortimenten bemerklichen, anerkannt werthvollen Obstsorten, liefern den sichtlichen Beweis, daß die großen, deutschen Obst-Ausstellungen bereits aller Orten günstige Erfolge hervorgerufen haben.

Ein besonderes Interesse bot das aufgestellte Obstsortiment, aus der Diel'schen Sammlung, sie überzeugte aber leider, daß seit Diel's Tode nicht viel für die Aufrechterhaltung einer richtigen Nomenklatur geschehen ist. — Aus Christ's Pflanzung und aus dessen ehemaliger Baumschule, welche gegenwärtig noch in Cronberg bei Frankfurt a. M. im Besitze des Handelsgärtners J. Müller fortgeführt wird, war ein großes und gut kultivirtes Obstsortiment aufgestellt, das in Rücksichtnahme auf die Thätigkeit Christ's im Fache der Pomologie nicht ohne Interesse war.

Das Obstsortiment des Herrn Freih. v. Molsberg zu Langenau bei Mainz, aus schönen Aepfeln und Birnen bestehend, ist lobend zu erwähnen, desgleichen das Apfelsortiment des Herrn Gutsbesitzers

Martin Hechtelberger zu Biſchofsheim bei Mainz. Anſehnlich und ſchön war das eingeſandte Sortiment des Herrn Louchon auf Ho.

Aus dem Großherzogthum Heſſen paradirte, eingeſandt durch Frau v. Berna zu Rüſſelheim, ein großes ſchönes Sortiment von Aepfeln und Birnen, welche meiſtentheils ſehr groß und anſehnlich, von ſorgfältiger Kultur zeugten, ſchade, daß hier die Benennung der Sorten noch mancher Berichtigung bedurfte.

Das ausgeſtellte Sortiment des Gartenbau-Vereins zu Darmſtadt, beſtehend aus Aepfeln und Birnen, beſonders guter Kultur, lieferte ein erfreuliches Zeichen der Thätigkeit dieſes Vereines und verſpricht für jenes Ländchen einen ſegensreichen Aufſchwung der Obſtkultur. — Ein gleiches, faſt höheres Lob, iſt dem Gartenbau-Verein zu Meiningen zu ſpenden. Das von demſelben aufgeſtellte Obſtſortiment war reich an werthvollen Sorten und die einzelnen Früchte von vorzüglicher Kultur.

Aus dem Großherzogthum Baden waren mehrere anſehnliche Obſtſortimente eingeſandt, die ebenfalls Zeugniß gaben, daß die Obſtkultur dort in einem erfreulichen Fortſchritte begriffen iſt.

Ein ſehr reiches und gut kultivirtes Obſtſortiment war vom Stadtpfarrer Hörlin aus Sindringen bei Stuttgart und ein rühmliches vom Superintendenten Aberdieck zu Jeinſen bei Hannover, ausgeſtellt. Die Früchte dieſer um die Obſtkultur verdienten Pomologen waren von ſchönem Anſehen und es fand ſich darunter eine große Anzahl der werthvollſten Sorten.

Ein intereſſantes großes Obſtſortiment, beſtehend aus Aepfeln und Birnen war aus Schleswig, Holſtein und Lauenburg durch den Prof. Dr. Seelig aufgeſtellt. Die Früchte waren insgeſammt gut ausgebildet, viele darunter von vorzüglicher Schönheit und lieferten aufs Neue den Beweis, daß nördlicher belegene Gegenden, noch einen lohnenden Obſtbau betreiben können.

Von der Königl. Obſtbaum-Plantage zu Herrenhauſen war unſtreitig das reichhaltigſte Obſtſortiment aufgeſtellt; beſonders fanden die Birnen, welche in vielen werthvollen Sorten vertreten waren, vielſeitige Beachtung und Anerkennung. Wenn wir, ohne unbeſcheiden ſein zu wollen, inmitten aller der aus den obſtreichſten und zum Obſtbaum am günſtigſten belegenen Gegenden eingeſandten Früchte, uns ſagen dürfen, daß die hannoverſchen Früchte, ſowohl was die Größe und das Anſehen derſelben, als das edle der Sorten betrifft, mit allen eingeſandten Früchten concurriren konnten, ſo darf uns dieſe erfreuliche Wahrnehmung nur Veranlaſſung ſein, die erworbenen Erfahrungen zur Verbeſſerung unſeres vaterländiſchen Obſtbaues nach Kräften zu benutzen und in dem Streben nach höherer Vervollkommnung der Obſtkultur nicht nachzulaſſen.

Es iſt hier der geeignete Ort, einige Worte über die Art und Weiſe zu ſagen, auf welche in der Königl. Obſtbaum-Plantage zu Herrenhauſen für die Vervollkommnung des Obſtbaues gewirkt wird.

Seit dem Jahre 1846 exiſtiren daſelbſt Mutterbaum-Pflanzungen, einer ſehr großen Anzahl verſchiedener Obſtſorten, ſowohl von Aepfeln

und Birnen, als von Pflaumen und Kirschen, theils in Pyramidenform angepflanzt, theils als Hochstamm erzogen; außerdem ist eine große Sortenzahl von Pfirsich, Apricosen und Wein an den Mauern zur Erprobung angepflanzt. — Jeder Grundstamm ist nur mit einer Obstsorte veredelt, wodurch der Probe- oder Mutterbaum sich demnächst in seiner vollen Eigenthümlichkeit zu entwickeln im Stande ist. — Grundprincip ist, nur die reichtragendsten, edelsten und für allgemeine Verhältnisse passende, werthvolle Obstsorten zu erproben, darnach in größerer Anzahl anzuziehen und im Lande zu verbreiten. —

Vor allem muß der Obstbaum, der einer weiteren Verbreitung würdig erachtet werden soll, einen kräftigen, gesunden Stamm ausbilden, übrigens gut im Wuchse sein und dann die vorhin erwähnten, werthvollen Eigenschaften im Fruchttragen besitzen. — Alle schwächlichen, den verschiedenen Krankheiten bedeutend unterliegenden Obstsorten, sowie diejenigen, welche minder werthvolle Früchte tragen und zu ihrer Reifezeit durch bessere Obstsorten ersetzt werden können, wurden beseitigt und es erscheint dies Verfahren gewiß als das unfehlbarste Mittel den Werth des Obstbaues unseres Vaterlandes bedeutend zu erhöhen. Da nun die Probebäume seit mehreren Jahren schon reichen Fruchtertrag gewährten, so ließen sich durch Untersuchung und Erprobung der Früchte viele Erfahrungen sammeln, welche bereits seit einigen Jahren als Grundlage für die anzuziehenden und demnächst vorzugsweise zu verbreitenden Obstsorten dienen.

Wenn sich ferner Gelegenheit bietet, neue, edle und werthvolle Obstsorten anzuschaffen, so werdrn diese ebenfalls als Mutterbäume angepflanzt, erprobt und wenn sie sich als vorzüglich bewähren, zu weiterer Verbreitung angezogen.

Doch nun zurück zur Ausstellung in Wiesbaden.

Von Herrn Schamal, zu Jungbunzlau in Böhmen war eine neue, von ihm als sehr vorzüglich gerühmte, große und ansehnliche Tafelbirne, welche vom October bis December reifen soll, unter dem Namen: „Georg von Podiebrad-Birne," ausgestellt; die Früchte waren so imponirend, daß sie gewiß zu vielseitigen, weiteren Kulturversuchen angeregt haben werden.

Eine ausgezeichnete Sammlung schöner, fast nur neuer Birnsorten, war von Herrn A. v. Galhau zu Wallerfangen bei Saarlouis eingesandt. In besonders schönen Früchten lagen vor: v. Mons de Léon le Clere; — Doyenne g'hiver nouveau; — Beurré Piquery; — und Beurré Bretonnoau. — Für die späte Jahreszeit waren die, dieser Sammlung beigefügten Pfirsich, beachtenswerth. Sie bestanden aus den Sorten Bourdino; Dessa tardive; Chevreuse tardive und Admirable jaune.

Ein Obstsortiment von Aepfeln und Birnen, von Hrn. Cantonsrath Bachmann zu Romanshorn in der Schweiz eingesandt, enthielt mehrere schöne und gut ausgewachsene Exemplare von Aepfeln und Birnen; — im Allgemeinen ließe sich aber wegen Unvollkommenheit der meisten Sorten, kein günstiges Urtheil über diese Sammlung fällen.

Die von Belgien eingesandten Früchte (nur Birnen) von Herrn de Jonghe zu Brüssel, waren sehr schön und es fanden sich in diesem Sortimente die neuesten und werthvollsten Früchte, in schönen und

ansehnlichen Exemplaren. Herr de Jonghe, unstreitig der ausgezeichnetste und am vielseitigsten gebildete Pomolog Belgiens, ist seit Jahren ernstlich bemüht, die vorzüglichsten für Belgien passenden Obstsorten zu erproben und hat darin bereits bedeutende Erfolge errungen. — Es war dem Referenten, der gleich nach Beendigung der Ausstellung zu Wiesbaden eine Reise nach Belgien machte, und Hr. de Jonghe persönlich kennen und schätzen lernte, höchst angenehm zu erfahren, daß in Belgien dieselben Grundsätze zur Verbesserung des Obstbaues leitend sind, welche in der Königl. Obstbaum-Plantage zu Herrenhausen seit Jahren in Anwendung kommen, nämlich vor allen Dingen Gesundheit und Kraft des Baumes, reiche Tragbarkeit und innerer Werth der Früchte. Belgien nimmt seit Jahren durch seine Zucht und Vollkommnung der Birnen, namentlich feiner und ansehnlicher Tafelbirnen, eine hohe Stufe ein. Es ist aber auch nicht zu verwundern, wenn man sieht, mit welcher Liebe und mit welchem Fleiße die Bäume gepflegt und behandelt werden, wie jeder Obstliebhaber die werthvollsten Sorten genau kennt und wie überhaupt die Kenntniß der richtigen Namen allgemein verbreitet ist.

Aber nur der Kultur der Birnen, die nur in Pyramidenform oder en Espalier gezogen werden, wird Aufmerksamkeit geschenkt; — Aepfel und andere Obstbaumfrüchte werden in ihrem Anbaue sehr vernachlässigt, weshalb die Belgier noch viel zu thun haben werden, ehe sie diese Obstgattungen auf die Stufe der Vollkommenheit bringen, wohin sie bereits in Deutschland gelangt sind. —

Um beurtheilen zu können, ob es uns möglich sei, die Birnenkultur auf eine eben so hohe Stufe der Vollkommenheit zu bringen, als es den Belgiern gelungen ist, halten wir einen Vergleich der Gegenden Belgiens mit unserm Lande für zweckmäßig. — Der Character der Gegend von Lüttich bis Brüssel, ist unseren nordischen Gegenden sehr ähnlich, es finden sich wie bei uns fast nur große ebene Flächen; — das feuchtere Terrain besteht aus schönen Rieselwiesen und herrlichen Weideländern, mit künstlichen Pappelpflanzungen in geraden Linien versehen, während das trockene Land oft stundenweit keinen Baum aufzuweisen hat. Also in Beziehung auf Schutz und besonders günstige Lage hätte die Gegend von Lüttich bis Brüssel vor unseren Gegenden nichts voraus; dagegen sind der dort früher eintretende Frühling, der wohl durchgehends immer angenehmere Sommer, der schon bedeutend mildere Winter, der später eintretende Herbst und der fast durchgehends ausgezeichnete Boden, Gegenstände, welche die Obstkultur sehr fördern und auf die vollkommene Ausbildung, Ansehen und den Wohlgeschmack der Obstfrüchte wesentlich einwirken.

Diese hier aufgezählten Vortheile können wir uns nicht verschaffen, wir müssen daher Obstsorten, welche sich zu ihrer völligen Ausbildung mit einem kürzeren Sommer begnügen und außerdem für unsere klimatischen Verhältnisse passen, die aber dennoch höchst werthvoll sein können, erproben und die Sorten durch sorgfältige Kultur zu höherer Vollkommenheit zu bringen suchen. Daß uns dies zum Theil gelungen und noch immer mehr gelingen werde und wir in Zukunft gewiß manche eben so ausgezeichnete Fruchtsorte, von Ansehen, Größe und Wohlgeschmack, als die Belgier, bauen werden, ist gar nicht zu bezweifeln.

Indem wir nun zur weiteren Schilderung der Ausstellung in Wiesbaden zurückkehren, wolle der gefällige Leser diese neue Abschweifung, die uns zur Beurtheilung der Möglichkeit einer Vervollkommnung der Obstkultur unseres Landes nöthig schien, gewogentlichst entschuldigen.

Wir rechnen auf Nachsicht, wenn bei der großen Menge der eingesandten Fruchtsortimente und bei der Kürze der Zeit, welche man der Durchsicht der Früchte widmen konnte, manche Einsendung hier nicht in dem Maaße gewürdigt ist, als sie es verdiente und wir in Bezug darauf nur erklären, daß noch manche Einsendung außer der hier genannten, viel Schönes und Interessantes bot.

Vom Oberförster Schmidt zu Blumberg bei Stettin war ein höchst interessantes Sortiment von Haselnüssen eingesandt, das aus 47 Sorten bestand und allgemeines Interesse erregte. — Herr Schmidt, ein tüchtiger Obstkultivateur und Pomolog, unterhält seit Jahren in Blumberg, zu gleichen Zwecken wie es zu Herrenhausen geschieht, eine Obstprüfungsschule und seine sorgfältigen Untersuchungen werden gewiß in Zukunft viel dazu beitragen, den Obstbau zunächst der Preußischen Provinz Pommern, sehr zu verbessern. —

Es dürfte für manchen Obstfreund von Interesse sein zu erfahren, welche besonders werthvolle Obstsorten vorzugsweise auf der Ausstellung vertreten waren, weßhalb wir hier einige namentlich aufführen wollen.

An Aepfeln:

Alexander, Kaiser v. Rußland.
Ananasapfel (Melonenapfel).
Bredeke, Winter.
Calville, rother Herbst.
" weißer Winter.
Citronenapfel, Winter.
Eckenhagener Wellers.
Goldzeugapfel.
Gravensteiner.
Kantapfel, Danziger.
Königin Sophien-Apfel.
Parmain, Gold, engl. Winter-.
Pepping, deutscher, Herrenhäuser.
" Gold, großer.
" Parkers grauer.
" Ribston's.
Prager, bunter.
Rambour, Tafel-, Braunschweiger.
" reinettenart. Herberts.
Reinette, Ananas.
" d'Anjou.
" Bastard, rothe.
" v. Breda.
" Carpentin.
" Casseler.

An Birnen:

Baronsbirne.
Bergamotte, Craffane.
" Gansell's.
" National.
Butterbirn, Blumenbach's.
" Capiaumont's, Herbst.
" v. Chaumontel.
" v. Clergeau
" englische.
" " Winter.
" Gellert's.
" graue Herbst.
" Coloma's Herbst.
" weiße Herbst.
" holzfarbige.
" Napoleon's.
" Hardenports Winter.
" Winter Liegel's.
Callvillbirn.
Christbirn, gute Winter.
Dechantsbirn, Winter.
" lange weiße.
Flaschenbirn, Bose's.
Forellenbirne.
Herbstbirn, lange gestreifte.

An Aepfeln:	An Birnen:
Reinette, Gold, verſchieden.	Kamper Venus.
„ Granat, engliſche.	Köſtliche von Charneu.
„ Muskat.	Kümmelbirne.
„ Orleans.	Louiſe bonne d'Anranches.
„ Quitten, Credes.	Mannabirne, muskirte.
„ Rambour, Pariſer.	„ von Mons.
„ rothe Winter, Baum.	Marie Louiſe.
„ Scheiben.	Pomeranzenbirn, Wiener.
„ weiße Herbſt.	Regentin.
Säuerling, bluthrother.	Robine, Winter.
Strichapfel, weißer Herbſt.	Ruſſelet v. St. Vincent.
Taubenapfel, verſchiedene.	Soldat Laboureur.
Taffentapfel, aromatiſcher.	Schmalzbirn, Omſerwitzer Schönert's
„ weißer Winter.	Sommerdorn, rother.
Uelzener Apfel.	Wildling v. Montigny.
Weinſäuerling, rother.	Winterbirn, Grumkower.
Zuckerapfel, polniſcher.	Winterbirn, ſchönſte.

Die zur Ausſtellung eingeſandten Weinſortimente waren, was das Anſehen und die vorzügliche Reife der Trauben betrifft, im Allgemeinen nicht von ſo beſonderer Schönheit, als man es nach dem günſtigen Weinjahr erwarten konnte.

Das ſchönſte, anſehnlichſte und reichhaltigſte Traubenſortiment, in dem, außer zur Weinbereitung geeigneten Sorten, ausgezeichnete Tafeltrauben befindlich waren, hatte Herr Freiherr v. Zwierlein zu Geiſenheim ausgeſtellt; das Sortiment enthielt nicht allein ſehr edle Trauben, ſondern ſie zeichneten ſich auch durch beſondere Reife vortheilhaft vor vielen andern aus. Als eine der allergrößten Trauben dieſes Sortiments iſt die de Candolle zu bezeichnen; ſie iſt indeß als Tafeltraube, da ſie ſpät reift, wenn nicht zur Hauskultur, für unſere Gegenden nicht zu empfehlen. — Der gelbe Orlean, eine ſehr zarte und empfindliche Weinſorte, zeichnete ſich durch ſchönes, gelbes Anſehen der Beeren, vortheilhaft aus. Dieſe Sorte wird zwar vorzugsweiſe zur Weinbereitung gebaut, allein ihr ſchönes Anſehen und bei völliger Reife, der ſehr angenehme Geſchmack, empfiehlt ſie für beſonders günſtige Lagen, auch zur Anpflanzung bei uns als Tafeltraube, jedoch in ſehr beſchränktem Maaße.

Die Iſabellentraube, (aus Nordamerika) bei uns noch wenig bekannt, eignet ſich wegen ihres raſchen und kräftigen Wachsthums und durch ihr ſchönes Blatt, das unten weißwollig iſt, beſonders zur Bekleidung von Mauern, Wänden, Laubgängen ꝛc. Sie erträgt den Winter ohne alle Bedeckung und ihre ſchönen, blauen, weißbedufteten Trauben, ſollen einen gewürzreichen, gutſchmeckenden Wein geben; auch wird die eigenthümlich gewürzhafte Traube ſelbſt von Vielen ſehr wohlſchmeckend befunden. Sie iſt zur Decoration ſehr zu empfehlen.

Von Herrn Prof. Bender aus Weinheim war, außer anderen Traubenſorten, der weiße Alexandriner ausgeſtellt. — Dieſe Traube iſt dem Orlean ſehr ähnlich, die Beeren werden aber größer und länger und die Traube beſitzt demnach beſonders ſchönes Anſehen, ſie hat aber

den Fehler, in ungünstigen Jahren sehr viele kleine Beeren zu erzeugen, was beweiset, daß sie in der Blüthezeit sehr empfindlich ist und sich demnach nicht für unsere Gegenden eignen möchte.

Erwähnenswerth, durch Lieblichkeit der Früchte waren die aufgestellten Weinsortimente des Herrn Grafen v. Kielmannsegge in Nassau und des Herrn Marix zu Eltville, welcher letztere die de Candolle-Traube, über 3 Pfund Gewicht haltend, ausgestellt hatte.

Von vielen Gemeinden Nassaus und aus der nächsten Umgegend von Wiesbaden waren reiche und ansehnliche Weinsortimente ausgestellt, aber in diesen, wie in den meisten Sortimenten, waren die zur Weinbereitung geeigneten Traubensorten vorzugsweise vertreten.

Ein sehr reiches, ansehnliches und schönes, zur Weinbereitung vorzugsweise geeignetes Trauben-Sortiment, war von der Herzogl. Nassauischen Domaine aus dem Steinberger Weinberge, aufgestellt. Hier fanden sich die edelsten und köstlichsten Keltertrauben des Rheines in ausgezeichneter Schönheit und Reife; auch war die Isabellentraube in großer Vollkommenheit mit aufgestellt.

In dem Sortimente von Herrn C. Lichtenberger zu Hambach aus der Bayer'schen Pfalz eingesandt, waren besonders die Malagatraube und die Nisch-Nisch-Rosine, von vorzüglicher Schönheit und Reife.

Verschiedene Einsendungen aus dem Großherzogthum Baden, waren sehenswerth, da sie recht Schönes enthielten.

Höchst interessant waren das eingegangene Traubensortiment des landwirthschaftlichen Central-Gartenbau-Vereins zu Karlsruhe und das der Königl. Würtembergischen Hof-Domaine zu Stuttgart.

Unter dem Vorsitze des Herzogl. Nassauischen Hof-Kammerraths Kepp fand die große Weinprobe, der im Jahre 1857 erzeugten Weine, im Casino-Saale zu Wiesbaden statt. Es waren dazu 240 verschiedene Wein-Einsendungen eingetroffen. Da jede Einsendung aus 4 bis 8 Sorten bestand, so ist es erklärlich, daß diese Weinprobe mehrere Tage in Anspruch nahm. — Es hatten sich dazu die meisten Wein-Producenten der Umgegend und viele ausgezeichnete Weinkenner des In- und Auslandes eingefunden. Die Weinsorten wurden unter Nummern zur Probe aufgestellt und die Einsender der betreffenden Nummern geheim gehalten, damit ohne alle Parteilichkeit nur den edelsten Weinen der Preis zuerkannt werden sollte. — Daß das ausgezeichnete Weinjahr 1857 viele köstliche, sehr selten so vorzüglich vorkommende Weine erzeugt habe, wurde von allen Weinkennern bei der Probe erklärt. —

Eine Excursion, die nach den, dicht bei Wiesbaden befindlichen Baumschulen und Versuchsfeldern des landwirthschaftlichen Vereines für das Herzogthum Nassau, zu Hof-Geismar, mit denen sich eine landwirthschaftliche Lehranstalt verbindet, gemacht wurde, gewährte besonders den anwesenden Landwirthen großes Vergnügen; die vielen lehrreichen Sammlungen dieser Anstalt, unter denen sich die Bibliothek vortheilhaft auszeichnet, sind lobend zu erwähnen und dürfen wir annehmen, daß dieselbe, vervollständigt durch die ausgezeichnete Lei-

tung des Directors Herrn Prof. Dr. Thomä, tüchtige Landwirthe ausbilden werde.

Ein schöner zweijähriger Zuchtstier von der Durham-Race, in England theuer erworben, in Wiesbaden später öffentlich versteigert und dann für obige Lehranstalt für 600 Gulden angekauft, erregte das besondere Interesse der Landwirthe.

Nach Beendigung dieser Excursion war die Gesellschaft nach dem Herzogl. Domainialkeller in Wiesbaden, zur Besichtigung der neueren Keller-Einrichtungen und der hydraulischen Presse eingeladen worden. Als diese Statt gefunden, ließ Sr. Hoheit der Herzog die Gesellschaft mit edlen Weinen vom Jahre 1857, bewirthen. — Zuerst wurde 1857. Traminer aufgestellt, dann folgte Neroberger Riesling No. 2. und zuletzt der köstliche Neroberger, Riesling No. 1. — Außer dieser freundlichen Bewirthung hatten Sr. Hoheit der Herzog in huldvoller Weise befohlen, daß mehrere von der Gesellschaft stattfindende Dinées, mit ausgezeichneten Weinen des Herzogl. Kellers versehen werden sollten. — Es ist überhaupt nicht dankbar genug zu erkennen, mit welch außerordentlicher Huld und Gnade Sr. Hoheit der Herzog, so wie die Herzogl. Regierung alles aufgeboten, um den zur Ausstellung gekommenen Gästen den Aufenhalt in Wiesbaden angenehm zu machen und gewiß werden jedem der Anwesenden die Tage der Ausstellung noch lange in angenehmer, freundlicher Erinnerung bleiben.

Verhandlungen der Obstbau-Section.

(Unter dem Vorsitze des Herrn Pfarrers Hörlin und später des Garten-Inspectors Lucas.)

Zunächst wurde für nothwendig befunden, wie bei früheren Ausstellungen, eine Obst-Prüfungs-Commission, welche sich mit der Untersuchung und näheren Bestimmung der eingesandten Obstfrüchte zu beschäftigen habe, zu ernennen. — Dieselbe wurde aus folgenden Herren zusammengesetzt:

Superintendent Oberdiek aus Jeinsen bei Hannover,
Garten-Inspector Lucas aus Hohenheim,
Freiherr v. Trauttenberg, k. k. Kämmerer aus Prag,
Gartendirector Schnittspahn aus Darmstadt,
Pfarrer Hörlin aus Sindringen und
Hof-Gartenmeister Borchers aus Herrenhausen.

Hierauf wurde zu den Verhandlungen über die im Programm aufgeworfenen Fragen übergegangen.

I. Welche neueren Erfahrungen liegen vor, u. über die beste Methode, Obstkerne und Obststeine bis zur Auspflanzung aufzubewahren?

Es wurden darüber verschiedene werthvolle Mittheilungen gemacht und dabei mehrseitig ausgesprochen, daß Obstkerne, namentlich Birnkerne sich 2—4 Jahre gut hielten, wenn sie trocken und kühl aufbewahrt würden. *)

*) Nach des Referenten Erfahrung ist das allerdings der Fall, jedoch ist es immer besser, frische Obstkerne zur Aussaat zu verwenden, da es immer schwieriger wird, eine rechtzeitige Keimung der Saat herbeizuführen, je älter der Same ist.

Die Herstellung eines gepflasterten, aber unten zum Abflusse der Feuchtigkeit mit Löchern versehenen Beetes, wurde sehr empfohlen. Dieses, nach vorn sich neigende Beet ist mit 9″ hoher Erde zu versehen. In dieser Erde sind Obststeine ½″ tief und die Obstkerne 1″ tief, in Reihen zu legen. Ueber das Ganze wird hiernach ein Drathgitter gespannt, welches dicht genug ist, um die Mäuse abzuhalten; die Aussaat findet dann zeitig im Frühjahr Statt. Dies Verfahren war von mehreren der Anwesenden mit gutem Erfolge angewandt. Ferner wurde empfohlen, Steinobstkerne nur oben auf das Saatland zu legen und sie nachher mit Moos oder Gras zu bedecken; zu dieser Saatlegung sei vorzugsweise der Herbst geeignet. — Die einfachste und sicherste zur Anwendung empfohlene Methode, Obstkerne bis zur Aussaat aufzubewahren, bestand darin, große Blumentöpfe in der Tiefe etwa 2″ hoch mit Moos oder dgl. auszufüllen, darauf eine dünne Lage mäßig feuchten Sand, oder in Ermangelung desselben magere Erde zu bringen und auf derselben eine dünne Schicht Obstkerne auszustreuen. Hierauf folgt wieder eine Lage Sand, dann wieder Obstkerne ꝛc., bis der Topf voll ist, die letzte Schicht Obstkerne muß jedoch mit Sand bedeckt werden. Diese Töpfe gräbt man im Spätherbst etwa 2 Fuß tief in die Erde und bedeckt sie zum Schutze gegen Mäuse mit Brettern. — Zeitig im Frühjahre wird dann die Aussaat vorgenommen. — Der empfohlenen, breitwürfigen Aussaat wurde deßhalb kein großer Werth zuerkannt, weil die jungen, sich entwickelnden Pflänzchen schwer vom Unkraute rein zu halten sind. —

Aus den ganzen Verhandlungen ging hervor, daß in milden Gegenden eine Herbstaussaat geeignet erscheint, in unseren nördlichen Gegenden aber eine Frühjahrsaussaat passender ist.

Frage I. b. Ueber die Vorbereitung der Saatbeete und die Art der Auspflanzung nach Verschiedenheit der Obstgattungen.

Es ging aus den Verhandlungen über diesen Gegenstand hervor, daß namentlich für Birnen eine sehr lockere, nahrhafte, aber nicht mit frischem Dunge versehene Erde zu wünschen sei, daß oft ein Wechsel der Saatschale stattfinden müsse und daß dieselbe vor allem sehr rein von Unkraut zu halten sei, damit die jungen Pflanzen nicht unter dem Kraute ersticken.

Frage I. c. Ueber die Verpflegungs-Methoden zur Gewinnung möglichst reicher Wurzeln.

Als Vorbedingung zur Gewinnung namentlich schöner Birnenwildlinge wurde die Aussaat von Aepfel- und Birnenkernen durcheinander, sehr empfohlen. Man verhütete dadurch das Befallen der jungen Zöglinge vom Roste, wodurch oft große Aussaaten in kurzer Zeit zu Grunde gingen. Dann sei es von großer Wichtigkeit, zur Erzeugung schöner Wurzeln, den zur Aussaat zu verwendenden Boden, wenngleich in nahrhaften Zustand zu setzen, ihm doch keine frische Dungtheile zuzuführen und vor allen Dingen den Boden nicht zu rigolen, da das besonders Veranlassung zu einem Tiefgehen der Wurzeln sei und sich dadurch die werthvollen Seitenwurzeln immer mehr verlieren würden.

Bei einer Reihenaussaat wurde das Abstoßen der Wurzeln der einjährigen Wildlinge im Herbst oder Frühjahr, in einer Tiefe von etwa 3/4 oder 1 Fuß, zur Erzeugung schöner Wurzeln empfohlen; auch wurde dem Piquiren der jungen, noch nicht holzig gewordenen Obstsämlinge, mit Ausnahme der Wallnüsse, (die sich im jugendlichen Zustande nicht gut piquiren lassen) lebhaft das Wort geredet. *)

Bei Saatbeeten wurde die Verwendung von Rasenerde und vergangene Torfabfälle, als zu einer reichen Wurzelbildung der Obstwildlinge beitragend, gerühmt **).

Frage I. d. Ueber die günstigste Jahreszeit zur Verpflanzung in die Baumschule.

Es wurden viele Beispiele über günstige Erfolge von Herbst- und Frühjahrs-Pflanzungen angeführt und ging aus den mitgetheilten, verschiedenen Erfahrungen hervor, daß eine zeitig im Herbste ausgeführte Pflanzung, eben so günstige Erfolge zeige, als wenn sie im Frühjahr stattgefunden habe.

Frage II. Welche Arten der Veredelung haben sich für größere Baumschulen als die besten bewährt und welche Zeit ist dazu die günstigste? — Welche Bindemittel und welche Gattung von Baumwachs sind dabei die zweckmäßigsten?

Für die Gegenden des mittleren und südlichen Deutschlands wurde das Oculiren aufs schlafende Auge als besonders empfehlenswerth gehalten. Es stellte sich ferner heraus, daß jede Art der Veredlung (mit Ausnahme des Pfropfens in den Spalt), wenn sie nur gut ausgeführt werde, geeignet sei, gleich günstige Erfolge zu gewähren.

Die Zimmer-Copulation fand viele Verehrer, aber auch ihre Gegner ***).

Was die Wahl zwischen Oculation und Copuliren (Pfropfen) für unsere nördlichen Gegenden betrifft, so ist kaum zu bezweifeln, daß auch die Oculation bei uns günstige Erfolge ergeben würde, allein da man hier mit dem Oculiren nicht so vertraut ist, als mit dem Pfropfen; letztere Veredlungsmethode aber von vorzüglichem Erfolge ist, so würde wohl schwerlich die Oculation, als allgemeine Veredlungsart, bei uns in Aufnahme kommen.

Es wurde noch mitgetheilt, daß in den großen Baumschulen Frank-

---

*) Letztere beiden Methoden sind auch nach des Referenten Erfahrung sehr anwendenswerth befunden.

**) So sehr wir Rasenerde für obigen Zweck geeignet finden, rathen wir doch, bei Verwendung von Torfabfällen vorsichtig zu sein und ihnen jedenfalls einen bedeutenden Zusatz anderer Erde zu geben, da Torfabfälle zu wenig Nahrung besitzen, um einen kräftigen Wildling ausbilden zu können.

***) Nach des Referenten Erfahrung ist die Zimmer-Copulation im leichten Boden niemals mit sicherem Erfolge auszuführen; trockene Frühjahre, wie 1857 und 1858 können nimmermehr günstige Resultate ergeben haben. Ueberhaupt eignet sich die Zimmer-Copulation für größere Baumschulen, wenn man sich nicht periodisch großen Verlüsten aussetzen will, gewiß nicht; außerdem wird durch sie gewiß leicht zur Verwechslung der Sorten beigetragen.

reichs nur aufs schlafende Auge oculirt werde. Es sei empfehlenswerth, den Boden mit zergangenen, wollenen Lappen zu düngen, da sich Feuchtigkeit dadurch erhalte, die Bäumchen saftreicher wären und die Veredelung besser wachse; auch sei in neuerer Zeit in Frankreich allgemein ein neues, vorzügliches Bindemittel in Gebrauch.

Als guten Baumwachs wurde die Zusammensetzung von 1 Theil Talg, 1 Theil gelben Wachs und 1 Theil Terpentin, alle 3 Theile langsam und kurze Zeit gekocht, empfohlen; zur Verbindung der Copulation ist die entstandene Masse dünn auf Bänder zu streichen. Von anderer Seite wurde diese Zusammensetzung getadelt, weil sie zu viel Fett enthalte und dagegen die Bereitung eines Baumwachses aus folgenden Theilen zusammengesetzt, für sehr brauchbar erklärt: 1 Pfund Pech, 4 Loth Wachs und 1 Loth Talg.

Eine besondere Empfehlung wurde dem kaltflüssigen Baumwachse des Herrn Lucas zu Theil, da es nicht allein allen Anforderungen entspreche, sondern seiner großen Billigkeit wegen, dem von Frankreich aus in neuerer Zeit in den Handel gekommenen kaltflüssigen Baumwachse weit vorzuziehen sei.

Als Bindemittel wurde ein in Frankreich in neuerer Zeit allgemein in Gebrauch gekommenes Material, aus Wolle und Baumwolle bestehend, besonders empfohlen und erwähnt, daß dieses in Zukunft hinsichtlich seiner großen Brauchbarkeit alle bis jetzt angewandten Bindemittel verdrängen werde; bei dieser Gelegenheit wurde an ein ähnliches, von Herrn Pastor Görges zu Lüneburg bereits früher schon zu diesem Zwecke gebrauchtes und empfohlenes Bindemittel, erinnert.

Frage III. Welche Erfahrungen sind bis jetzt über das Institut der Baumwärter gemacht worden? Wie werden dieselben am zweckmäßigsten ausgebildet? Welche Bestimmungen haben sich als die angemessensten bewährt, in Beziehung auf ihre Anstellung, Beschäftigung und Renumeration? Wie hoch berechnen sich danach annähernd die von den Baumschulbesitzern aufzubringenden Kosten?

Aus den Verhandlungen über diesen Gegenstand ging hervor, daß das Institut der Baumwärter in Würtemberg, in diesem, den Obstbau in bedeutendem Umfange betreibenden Staate, am besten ausgebildet sei und daß es daselbst Bedürfniß geworden, in neuerer Zeit mehrere Ober-Baumwärter anzustellen. Herr Lucas sprach sehr ausführlich über die Art und Weise der Heranbildung tüchtiger Baumwärter in Würtemberg, er erklärte das Institut der Baumwärter für jedes Obstbau in einigem Umfange betreibende Land, für Bedürfniß und theilte zugleich sehr erfreuliche Erfahrungen über das Institut derselben in Würtemberg mit. Hinsichtlich der Beschäftigung der Baumwärter, wird als Sommerbeschäftigung das Ausputzen größerer Bäume, in den Monaten Juli bis September, empfohlen. —

Der Betrieb des Obstbaues durch Schullehrer, wurde für sehr wichtig erachtet und dafür gehalten, daß überall, wo sich einiger Nutzen vom Obstbaue versprechen lasse, auf den Seminarien, wie dies in Würtemberg geschehe, Obstbaumzucht und Obstkultur, praktisch und theoretisch gelehrt werde. — Die Lehrer wurden dadurch befähigt werden,

wesentlich auf die Verbesserung des Obstbaues einzuwirken. Wie verdient sich ein Lehrer, der diesen wichtigen Kulturzweig mit Lust und Liebe ergreift, machen kann, ist ersichtlich, wenn wir erwähnen, daß der Lehrer Bofseler aus Heilbronn binnen 3 Jahren über 200 Gemeinde-Baumwärter ausgebildet hat.

Es wurde anerkannt, daß das Institut der Baumwärter für Nassau und Baden ebenfalls sehr wichtig sei und bemerkt, daß man in beiden Ländern die Ausbildung tüchtiger Leute für den Obstbau, so wie die Heranbildung von Lehrern zu diesem Zwecke anstrebe.

Frage IV. Welche Kernobstsorten, Aepfel und Birnen, können als die geeignetsten zur Anpflanzung in rauhen und hohen Lagen empfohlen werden?

Da diese Frage besonders in Bezug auf das südwestliche Deutschland gestellt und beantwortet wurde, jene Verhältnisse aber erfahrungsmäßig für unsere nördlichen Gegenden nicht passen, so dürfen wir füglich die desfallsigen Verhandlungen übergehen.

Frage V. Welche Kirschensorten, süße und saure, können nach Tragbarkeit, Güte ꝛc. am meisten empfohlen werden?

a. Welche Lagen und Bodenverhältnisse haben sich für Kirschpflanzungen am meisten bewährt?

b. Welche Unterlagen sind für Zwergkirschen die zweckmäßigsten?

c. Welche Veredlungsarten sind bei Kirschen die sichersten und wann ist die Veredlung am besten?

d. Welche Erfahrungen können über die Düngung von Kirschen mitgetheilt werden?

Hinsichtlich der Bodenverhältnisse war man der Ansicht, daß die Kirsche sich zwar mit mäßig gutem Boden begnüge, daß er aber doch nicht gar zu arm sein dürfe und daß sie im Allgemeinen auch eine etwas freie Lage liebe.

Zu mehrfachem Anbaue wurden empfohlen: Die Cromberger frühe schwarze Herzkirsche, — die Flamentiner, — die Kesterter Frühkirsche, — die Ostheimer Weichsel und die schwarze Werdersche Herzkirsche. Außerdem wurden noch einige Sorten benannt, die entweder in ihren Gegenden nur unter Provinzialbenennungen existiren, oder uns nicht bekannt sind.

Hinsichtlich der Pflanzung war man allgemein der Ansicht, daß dieselbe in früher Jugend geschehen müsse; am besten sei es, dieselben im 3—4jährigen Alter der Bäume vorzunehmen, da die Pflanzung älterer Bäume nicht selten fast ganz fehl schlüge oder doch auf lange Zeit oder immer ein schwächliches Wachsthum zeige.

Als Unterlage für Hochstämme wurden die gewöhnliche Waldkirsche empfohlen, für Zwergstämme dieselbe, oder Prunus Mahaleb.

Hinsichtlich der Veredlungsart der Kirschen stellte es sich heraus, daß man in verschiedenen Gegenden darüber auch verschiedener Ansicht ist; in einigen Gegenden werden die Bäume jung veredelt, in anderen erst später und dann in der Krone. Beide Manieren haben gute Erfolge ergeben; — daß übrigens die Veredlung in der Jugend viel ein-

facher und daher auch besser ist, steht nicht zu bezweifeln. Die Vereblung selbst ist sowohl zweckmäßig durch Oculation, als durch Pfropfung zu bewerkstelligen.

Als Düngung für Kirschen wurde besonders Compost oder Lauwasser empfohlen, letztere Düngung wird vom April bis August ausgeführt.

Frage VI. Welches ist das beste Kulturverfahren für Haselnüsse?

Diese Frage wurde vom Oberförster Schmidt ausführlich beantwortet.

Er erklärte: Die Kultur der Haselnüsse sei außerordentlich einfach, sie gedeihen im Schatten und überall, wo nicht zu großer Nahrungsmangel vorherrsche. Die Düngung sei am besten durch Compost zu bewerkstelligen. Ein Schnitt dürfe nur sparsam und mit Vorsicht angewandt werden, da die Blüthen sich an den Endspitzen der Zweige befänden. Am besten gedeihe die Haselnuß an freiliegenden Spalieren und sei sie deßhalb auch als Einfriedigung zu empfehlen. — In England habe man schon von einer 300 □Ruthen großen Pflanzung 30 Centner Nüsse geerndtet. Rechne man nun in 5 Jahren 2 gute Erndten, und durchschnittlich auf obige Fläche pr. Jahr nur 5 Centner Ertrag, so ergebe sie, nach den bekannten Preisen, einen Bruttogewinn von 80 ℳ.

Durch Niedersenken der Zweige und durch Auslegung der Nüsse werde sie am leichtesten vermehrt. Die Aussaat sei jedoch nicht zu empfehlen, wenn man eine Sorte rein erhalten wolle, da sie, wie alle Obstsorten aus Samen fortgepflanzt, leicht ausarteten. Wichtig sei es, daß der Boden, so weit die Wurzeln der Haselnuß reichen, durch eine starke Laubdecke gegen die Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt werde.

Frage VII. Ueber Erfahrungen der Entstehung des Krebses an Obstbäumen und über die heilsamsten Heilmittel.

Es wurde erklärt, daß die Entstehung des Krebses durch eine Krankheit der neuesten Holzschichten herbeigeführt werde, manche Obstsorte sei indeß vorzugsweise dazu geneigt und es wäre nicht immer eine vorhergegangene Verwundung ꝛc. die Ursache davon. Damit indeß der Obstzüchter nicht selbst zu weiterer Verbreitung der Krankheit beitrage, dürfen nur durchaus gesunde Reiser und auch nur solche, die von gesunden Bäumen entnommen sind, zur Veredlung gewählt werden, da es an Beispielen nicht fehle, daß Stämme, welche mit Reisern von krebskranken Bäumen veredelt wurden, sehr bald dem Krebse unterlagen. — Sehr häufig entstehe diese Krankheit indeß auch durch Unguust des Bodens und der Lage. Der Unterschied zwischen Brand und Krebs bei den Obstbäumen, wurde darin gefunden, daß der Brand eine Krankheit der Rinde, der Krebs dagegen eine Krankheit der jüngeren Holzschichte sey.

Es wurde noch bemerkt, daß die auf Quitten veredelten Birnen sehr viel vom Krebse litten (in Nassau), daß die auf Wildling veredelten Birnen bei Erscheinung des Krebses dagegen leichter wieder durchzubringen seien und habe die Erfahrung gelehrt, daß auf leichtem Sande

und Torfboden die Birnen auf Quitten veredelt gar nicht fortkämen, während sie im schweren oder mehr feuchten Boden sehr gut darauf gedihen.

Als Mittel zur Heilung des Krebses wurden angegeben: Hydraulischer Kalk; Zubinden des angegriffenen Theiles mit Papier, das mit Theer bestrichen ist und Ausschneiden der Wunde. — Ferner: Anstrich mit Kalk oder Seife.

In Folge einer Zuschrift des Herrn Aug. Peters zu Braunschweig, einige von ihm bereitete und eingesandte Apfelwein-Proben einer Untersuchung zu unterziehen, erklärte die zur Untersuchung ernannte Commission, daß die eingesandte Probe No. 1 reiner Apfelwein, flüssig und gesund sei, aber etwas Säure besitze, daß No. 2 nicht reiner Apfelwein, sondern daß derselbe durch einen Zusatz künstlich verbessert sei.

Borchers.

Correspondenz.

Fragaria Grayana.

Dem Redacteur der Hamburger Gartenzeitung.

Darmstadt, den 16. Januar 1859.

In einem der letzten Hefte der Hamburger Garten- und Blumenzeitung findet sich eine Abhandlung vom Professor Dr. von Schlechtendal in Halle über mehrere Arten der Gattung Fragaria und wird dabei besonders der Fragaria Grayana, Fraise d'Asa Gray, gedacht. Von Schlechtendal wünscht von dieser Art die Mittheilung der Beschreibung aus: Decaisne jardin fruitier du Museum. Da ich dieses schöne pomologische Werk eigenthümlich besitze, so gebe ich hier die dortige Beschreibung in einer Uebersetzung und füge eine Abbildung der Früchte von Fragaria virginiana und der Fragaria Grayana hier bei.*)

Asa Gray's Erdbeere, Decaisne jardin fruitier, Heft 15.

„Frucht durch eine Verlängerung des Halses, durch die lebhafte durchscheinende rothe Farbe der Haut und durch einen ganz besonderen Geruch, welcher einige Aehnlichkeit mit dem der wilden und hohen Erdbeere hat, ausgezeichnet. Samen sparsam, gelb auf der Schattenseite, roth auf der Sonnenseite, tief eingesenkt und in den tiefen Höhlen wie quer liegend.

Blumen mittelgroß; Blumenblätter ganz flach, dicklich, von schöner bleichweißer Farbe, unter sich einen deutlichen Stern vorstellend; 20 gut entwickelte Staubfäden, Träger kurz; Antheren groß, lebhaft gelb; Stempel stark und kurz; Narben breit, orange, fast roth.

Kelch zehnblättrig, die fünf, den Blumenblättern gegenüberstehenden

---

*) Die uns eingesandte colorirte Zeichnung liegt jedem sich für diese Erdbeere Interessirenden zur Ansicht bereit. Die Redact.

Blätter zweitheilig; 5 Kelchblätter bilden gleichsam eine Kandel um die Frucht, während die 5 anderen mehr abstehen und wie ein doppelter Kelch erscheinen. Schaft sehr stark, gerade, grün, sehr zottig, wie die gleichfalls sehr kräftigen, tiefrothen, mit kurzen derben Haaren bedeckten, etwas zurückgebogenen Blumenstiele gefärbt.

Ausläufer stark, hellroth, bis zum Ansatze einer neuen Pflanze sehr verlängert, das Vorblatt auf eine weiche, schön roth gefärbte Scheide reducirt.

Blätter zahlreich, freudig hellgrün; Abschnitte kurz, stark, vorne vorspringend, wenig zottig, sehr zusammengedrückt, an den Blattstielen stehen kleine gerade zottige Anhängeblätter.

Die ganze Pflanze sehr kräftig, vom Ansehen der F. elatior, die jungen Schäfte sind zottig, entwickeln sich kräftig und bringen ihre Früchte wenige Tage später als Fragaria virginiana sehr gleichförmig zur Reife. —

Diese Art, welche ich für sehr ausgezeichnet halte, wurde von dem berühmten amerikanischen Botaniker Asa Gray, welcher sie im Jahre 1852 in einer ganz unbebauten (wild and savage) Gegend des äußersten Ostens von Neu-York fand, eingesendet, ihm allein gebührt es daher nur hier einen Artennamen zu geben, denn ich bin sicher, daß er bei Ansicht von Exemplaren unserer F. virginiana sich überzeugen wird, daß seine Erdbeere von der Morison's, Parkinson's, Miller's, Ehrhart's und der des berühmten Duchesne verschieden ist; dies voraussetzend gaben wir ihr einstweilen den Namen unseres gelehrten unermüdeten Freundes.

Wir haben mit einer um so größeren Freude diese Art erhalten, da wir seit mehreren Jahren aus Amerika und sogar aus England unter den Namen von **Boston pine, Hovey's Seedling, Jenney's Seedling, Highland chief, Black Roseberry** u. s. w. eine große Anzahl Erdbeeren erhielten, welche wir unmöglich an eine der bis daher bekannten vier amerikanischen Typen anzureihen versuchten, ohne zu erkennen, daß sie die Grenzen von dem überschritten, was man von den eigenthümlichen Abweichungen erwarten kann; der Kreis dieser Abweichungen bietet allerdings einen großen Raum dar, aber selten täuscht man sich bezüglich der Grenzen derselben. —

Man kann annehmen, daß von dieser Erdbeere die Erdbeere **Belle d'Orleans**, oder wie sie in der Umgegend von Paris auch heißt: Alphonsine abstammt, eine Frucht, welche erst vor wenigen Jahren erschien, deren Ursprung aber ganz dunkel ist."

Ihr ꝛc.

Schnittspahn.

Cupressus disticha L.

Taxodium distichum Rich.

In dem letzten Hefte der Hamburger Garten- und Blumenzeitung findet sich im Feuilleton von England aus die Bemerkung, daß Cupressus disticha daselbst zum erstenmale Früchte getragen habe und wird die Frage gestellt, ob anderwärts dies auch schon beobachtet wäre, hierzu erlaube ich mir folgende Bemerkung.

Bei meiner längeren Anwesenheit zu Paris im Jahre 1829 besuchte ich natürlich auch den damals allein in der ganzen Umgegend im englischen Style angelegten reizenden Garten zu Klein-Trianon unterhalb des Versailler Parks. Ich fand daselbst an dem Weiher eine Menge dieser Bäume, welche theilweise die Höhe von 30—40 Fuß erreicht hatten und übersäet mit Früchten waren und besitze ich jetzt davon noch mehrere Exemplare in der Früchte-Sammlung des hiesigen bot. Gartens. Im Sommer 1856 besuchte ich abermals Paris und versäumte auch diesmal nicht mich nach Klein-Trianon zu begeben, und obgleich der Garten jetzt sehr vernachlässigt war, so begrüßte ich doch noch die schönen Wassercypressen, welche zwar nicht viel höher gewachsen waren, dagegen hatten die Stämme an Dicke zugenommen und die knorrigen Wurzeln standen längs dem Graben bei 2 Fuß Höhe aus dem Boden bogenartig heraus und bildeten eine förmliche starke Einfassung.

In dem hiesigen Großherzoglichen Schloßgarten befinden sich zwei sehr schöne gegen 30—36 Fuß hohe, fast von der Erde an dicht beästete Wassercypressen, welche ich im Jahre 1821 aus Samen erzog, den der hiesige bot. Garten damals von Michaux aus Paris erhielt; das stärkere dieser beiden Exemplare zeigte schon vor mehreren Jahren Fruchtansätze, in diesem Jahre ist es sehr reichlich damit versehen, auch fangen bei diesem Exemplar schon seit 3 Jahren die Wurzeln an sich aus der Erde zu erheben.

Die warmen Sommer von 1857 und 58 waren, so sehr sie auch in anderer Beziehung in dem hiesigen trockenen Boden Schaden verursacht haben, günstig für die Fruchtbildung, so erhielt ich von manchen Baum- und Strauchart reife Früchte, die vorher nie solche ansetzten, wie z. B. von Chimonanthes fragrans, Calycanthus occidentalis, Abies Menziesii; Pinus excelsa setzte Zapfen an, die aber bei halber Entwicklung abfielen. In Töpfen: Widdringtonia juniperoides, Frenela australis, Callitris quadrivalvis, Cryptomeria japonica und Cupressus Goveniana. Endlich trug diesen Sommer ein gleichfalls im Jahre 1821 aus Samen erzogener Liquidambar styraciflua reichlich Früchte.

Schnittspahn.

Aesculus Californica,

in jenem Hefte gleichfalls von England aus als ein schöner dauernder Strauch erwähnt, hielt im hiesigen botanischen Garten die Winter von 1855 auf 1856, sowie von 1856 auf 1857 im Freien aus, dagegen im letzten Winter 1857 auf 1858 erfror er vollständig, was jedoch vielleicht auch an dem vorhergegangenen sehr trocknen Sommer gelegen haben mag.

Schnittspahn.

Zur Kultur der Farrn.

(Fortsetzung.)

IV.

Behandlung.

Das natürliche Vorkommen der Farrn zeigt schon darauf hin, daß ein schattiger Standort eine Hauptbedingniß zu ihrem kräftigen Gedeihen und das Bedürfniß von feuchter Luft umgeben zu sein, bedingt. Diejenigen Arten daher, welche in's Freie gepflanzt werden und dort den Winter über bleiben sollen, oder solche, die aus wärmeren Gegenden stammen und nur unsern Sommer im Freien aushalten, müssen, ganz besonders die letzteren, an eine passende Oertlichkeit gepflanzt oder aufgestellt werden, wo sie in den Sommermonaten von Morgens acht Uhr bis Abends gegen sechs Uhr gegen die unmittelbaren Strahlen der Sonne geschützt sind. Im Freien ist den Farrn daher Laubschatten, also solcher von Bäumen oder Sträuchern, weil dieser die Feuchtigkeit der Luft mehr zusammenhält, am zuträglichsten, doch gedeihen sie auch bei anderer Beschattung, wenn man ihnen die gehörige Feuchtigkeit der Luft dabei verschaffen kann, recht gut. Bei den Farrn, die entweder nur den Winter hindurch in Gewächshäusern sich befinden oder die das ganze Jahr darin stehen müssen, darf man jedoch unter einen schattigen Standort nicht etwa einen dunkelen oder sogar finsteren verstehen. Die meisten Farrn verlangen viel Licht ohne dabei von den Strahlen der Sonne getroffen zu werden. Man wird daher hierbei am sichersten gehen, wenn man darnach strebt, ihnen so viel Licht als möglich zukommen zu lassen, dagegen aber auch sorgt, daß sie so wenig als möglich von den directen Strahlen der Sonne getroffen werden. In den Winter-Monaten, wo die Sonne zu schwach ist, um Schaden anzurichten, und man schon des Lichtes wegen jeden Sonnenblick auffangen muß, ist diese Vorsicht nicht nöthig; desto mehr hat man im Sommer darauf zu achten, daß sie gehörige Beschattung erhalten und darf man selbst das Laub zu dieser Zeit, wenn die Pflanzen auch beschattet sind, dem Glase nicht zu nahe kommen lassen, da die Luft in der Nähe desselben zu trocken ist und die Wedel leicht verderben würden. Einige kleinere Arten, wie die Trichomanes, Hymenophyllum, Selaginellen u. a. wollen jedoch einen dunkleren, vom Glase entfernteren Standort haben, wodurch ihr Laub eine dunklere Färbung erlangt und überhaupt die Pflanzen besser wachsen. Andere Arten wieder, die im Wasser oder in dessen unmittelbarer Nähe wachsen, wie z. B. Ceratopteris, Isoetes, Pilularia, Salvinia, müssen zu ihrem Gedeihen viel Wasser haben. Es sind dies jedoch meist Pflanzen von geringem Interesse für die Gärtnerei. So können auch die einheimischen größeren Arten, wenn sie sich in der Nähe von Gewässern oder an anderen sehr feuchten Orten befinden, mehr der Sonne ausgesetzt werden.

Hinsichtlich des Wärmegrades der Temperatur, wie ihn die Farrn zum guten Gedeihen haben müssen, hat man sich in den Hauptpunkten

nach dem natürlichen Vorkommen der Arten, ob in tropiſchen oder weniger warmen Gegenden, zu richten, und in Bezug hiermit kann man ſämmtliche Farrn bei zwei Temperatur-Verhältniſſen oder Wärmegraden überwintern: für die tropiſchen eine Temperatur von + 10 bis + 15° R. und für die aus weniger warmen Gegenden + 4 bis + 8° R. Ich ſage überwintern und verſtehe die Heizwärme, welche ſie im Winter bei Ermangelung einer warmen äußeren Temperatur erhalten. Selbſt ſolche, die unſern Winter im Freien aushalten, kann man in einem Hauſe bei einer Temperatur von + 4 bis + 8° R. überwintern, ohne daß ſie durch zu frühes Austreiben Schaden leiden, man muß ihnen dann jedoch einen halbdunkeln Standort geben und ſie während der Winter-Monate halb trocken halten; auch laſſen ſich dieſe in einem Kaſten, den man gegen zu ſtarken Froſt durch Fenſter oder Bretter und Laub oder ähnliches Deckmaterial ſchützt, leicht conſerviren, ſo wie ſie auch in jedem beliebigen kalten Hauſe und dort ſelbſt mit einem ſchlechten Platze vorlieb nehmen, wenn dieſer nicht zu trocken iſt. Fangen die Pflanzen an zu wachſen, ſo ſteigere man die Wärme allmählig, je nachdem das Licht im Frühjahr zunimmt, bis ſich ſpäter im Sommer der Wärmegrad in den Häuſern nach der äußeren Temperatur richtet und man nur dafür zu ſorgen hat, daß bei den Arten aus tropiſchen Gegenden die Wärme nicht unter + 12° R. falle. Zu viel Wärme kündet ſich an den Pflanzen dadurch an, daß die Wedel immer ſchwächer hervorkommen, bis ſie ſich zuletzt nicht mehr halten können und umbrechen. Iſt dies der Fall, ſo liegt doch auch oft die Schuld daran, daß ſie bei zu ſtarker Wärme zu wenig Feuchtigkeit der Luft haben, denn es ſind wohl wenige Pflanzen, die einen ſo verſchiedenen Wärmegrad ertragen können, als die Farrnkräuter, wenn ſie im Verhältniß zu der erhöhten Wärme nur Licht und beſonders Feuchtigkeit genug haben. Bei Berückſichtigung dieſer Verhältniſſe laſſen ſich ſolche aus weniger warmen Gegenden, ſelbſt viele der einheimiſchen Arten in den wärmſten Häuſern kultiviren. Beſonders wenn man die Abſicht hat, Pflanzen ſchnell zu großen Exemplaren heranzuziehen, kann man bei Farrn durch ein erhöhtes Temperatur-Verhältniß bedeutende Vortheile erreichen und in einer Zeit von 10 Monaten Pflanzen zu einer Größe bringen, zu der ſie bei ihrem gewöhnlichen Wachsthum drei Jahre oder noch längere Zeit brauchen. Freilich iſt es dann auch ein Hauptbedingniß, das Wurzelvermögen zu reizen und den Wurzeln die Gelegenheit zu geben, auch bei der Ernährung der Pflanzen das Ihrige zu thun.

Die Feuchtigkeit des Bodens, worin die Farrnkräuter wachſen ſollen, im richtigen Maße zu halten, iſt mit ein Hauptbedingniß bei ihrer Cultur, ſo gut wie die Feuchtigkeit der Luft, und hat man ſich wie bei dieſer hiermit ebenfalls nach der Jahreszeit, nach der Zeit des mehr oder weniger kräftigen Wachſens der Pflanzen und nach ihren natürlichen Anforderungen zu richten. Im Allgemeinen wollen ſie feucht gehalten werden, die Erde, worin ſie ſtehen, darf nie ganz trocken werden, ſelbſt bei denen, die im Winter kein Laub haben; ſtehen dieſe im freien Lande, ſo iſt ihnen die winterliche Feuchtigkeit hinreichend, wogegen ſie in Töpfen, je nachdem ihr Standort feucht oder trocken iſt, öfters angefeuchtet werden müſſen. Um ſo mehr bedürfen ſolche, die auch den Winter hindurch wachſen, die gehörige Feuchtigkeit, welche darin

besteht, die Töpfe zu begießen ehe die Erde darin ganz trocken geworden ist und wenn man gießt, den Ballen gehörig zu durchgießen. Es ist nichts schädlicher und besonders für Farrnkräuter, als die Erde durch öfteres Gießen, indem man ihr zu jeder Zeit nur wenig Wasser giebt, in den Töpfen feucht halten zu wollen. Das Gießen hat nicht nur den Zweck die Erde naß zu machen und den Pflanzen Nahrung zu geben, sondern es soll auch dadurch die Luft, welche sich im Ballen zwischen der Erde befindet und mit der Zeit schlecht geworden ist, hinausgedrängt werden, damit, nachdem das Wasser durchgeflossen, frische Luft wiederzukommen kann, die theilweise durch Zersetzung neue Nahrungsstoffe zu erzeugen hat, theilweise die Wurzeln vor Fäulniß schützen soll. Natürlich muß dabei für einen guten Abzug des Wassers gesorgt sein.

Im Frühjahr und Sommer, wenn die Pflanzen im üppigen Wachsthum begriffen sind, kann ihnen kaum zuviel Wasser gegeben werden, wenn dieses den gehörigen Abfluß hat und die Erde darnach beschaffen ist. Zu diesen Zeiten ist das Durchgießen der Erde und das Gießen, bevor die Erde in den Töpfen ganz trocken ist, ganz besonders nothwendig und dies um so mehr, wenn sich die Pflanzen in einer Luft befinden, der es an der erforderlichen Feuchtigkeit fehlt. Solche Farrn, die in ihren Gefäßen bleiben und damit den Sommer über in das Freie gebracht werden, mögen sie zu Gruppen oder zu einzelnstehende Pflanzen benutzt werden, müssen mit den Gefäßen bis an den Rand in die Erde eingegraben werden. Dieses Eingraben der Töpfe bezweckt nicht nur ein weniger schnelles Ausdunsten der Feuchtigkeit, sondern wird auch dadurch die Erde in den Töpfen eine gleichmäßigere Feuchtigkeit behalten. Sind dagegen die Töpfe nicht eingegraben, so ist es oft, wenn die Pflanze die Erde, worin sie steht sehr durchwurzelt hat, sehr schwierig, die Erde feucht genug zu halten, und es kann durch eine kleine Nachlässigkeit beim Begießen großer Schaden entstehen. Viele Farrn, deren Wedel tragender Theil, wie bei den baumartigen der Stamm, sich über der Erde befindet, verlangen auch, daß diese Theile fortwährend und vorzüglich während der Zeit ihres Wachsthums feucht gehalten werden. Sie haben das Vermögen daraus neue Wurzeln zu bilden, deren Gedeihen den Wachsthum der Pflanze ungemein befördert. Vorsicht hat man dagegen beim Begießen der Erde zu gebrauchen, daß das Wasser bei den mit jener eigenthümlichen gelben oder weißen Masse bestäubten Arten, wie mehrere Cheilanthes, Gymnogramma sie haben oder mit langen Haaren versehene Farrn nicht zwischen der Basis der Wedel längere Zeit stehen bleibe, dadurch Schaden anrichte und Fäulniß, wenn es nicht schnell genug abtrocknen kann, erzeuge. Um dies zu vermeiden, kann man solche Pflanzen in der Mitte des Topfes erhaben pflanzen, so daß sich die Erde nach dem Rande des Topfes zu abdache. Das Stellen der Töpfe in Untersätze oder Schüsseln mit Wasser zu der Zeit, wo die Pflanzen am meisten wachsen und am nässten gehalten werden wollen, ist im allgemeinen nicht anzuempfehlen, es müßte denn bei Pflanzen geschehen, die zu sehr durchwurzelt sind, zu schnell austrocknen und bei denen ein Umpflanzen nicht rathsam oder anwendbar ist, oder bei Arten, die wie Cratopteris vermöge ihres natürlichen Bedürfnisses im Wasser wachsen, oder doch dort besser gedeihen.

Werden Farrn zur Bekleidung von Wänden, Baumstämmen benutzt, auf Felspartien oder auch an Stücken Holz gezogen, wo sie für die Wurzeln nur wenig Erde haben, so müssen diese dafür um so näſſer gehalten werden, was man durch öfteres Besprützen der Gegenstände, woran sie wachsen, leicht erlangen kann. (Forsetzung folgt.)

Gartenbau - Vereine.

Cöln. Zur Beförderung der Pflanzenkultur durch Anregung und Belebung der Theilnahme und des Sinnes für Pflanzenkunde, Gärtnerei und Blumistik, wie überhaupt für alle Zweige des praktischen Gartenwesens auf dem Wege freundschaftlichen und geselligen Zusammenwirkens und der Centralisirung der entsprechenden Talente, hat sich in Cöln ein Verein gebildet, dessen ausführliche Statuten uns vorliegen und die wir gern bereit sind, Jedem, der sich dafür interessirt, mitzutheilen.

Die Redact.

Würzburg. Der fränkische Gartenbau-Verein in Würzburg hat durch ein veröffentlichtes Programm zu der am 10—12 April zu veranstaltenden 2. Ausstellung von Blumen, Garten-Producte ꝛc. folgende Preise ausgesetzt:

a) Für Pflanzen und Blumen:

1. Preis 30 fl. Der geschmackvollst aufgestellten Gruppe gut kultivirter reichblühender Pflanzen, welche die meisten Species enthält.

2. Preis 20 fl. Der nächsten Gruppe, welche obengenannten Bedingungen entspricht.

3. Preis 25 fl. Der schönsten und reichhaltigsten Rosengruppe, welche außer Hybrides-remontantes, mindestens noch Bourbon-, Thee- und Moos-Rosen enthält.

Accessit 12 fl.

4. Preis 20 fl. Der schönsten und reichhaltigsten Camellien-Sammlung.

Accessit 10 fl.

5. Preis 20 fl. Der bestkultivirten reichhaltigsten Sammlung von Azalea indica.

Accessit 10 fl.

6. Preis 15 fl. Der mannigfaltigsten und schönsten Sammlung von Blatt- und Modepflanzen.

7. Preis 15 fl. Der reichhaltigsten Gruppe der bestkultivirten krautartigen Pflanzen.

Accessit 6 fl.

8. Preis 10 fl. Der schönsten Gruppe getriebener Blumenzwiebeln, mindestens 6 Species enthaltend.

9. Preis 10 fl. Den schönsten Levkojen, in mindestens 6 Farben, und Lack.

Accessit 5 fl.

10. Preis 8 fl. Der Cinerarien-Gruppe, welche sich durch Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, sowie durch vorzügliche Kultur auszeichnet.

11. Preis 5 fl. Für die schönste Verbenen-Gruppe in mindestens 12 unter sich streng verschiedenen Sorten.

12. Preis 5 fl. Für die schönsten und mannigfaltigsten Pensées (Viola altaica).

13. Preis 4 fl. Den schönsten Aurikeln, sowie Primula acaulis und elatior in gefüllten und einfachen Varietäten.

14. Preis 5 fl. Für die geschmackvollste Zusammenstellung abgeschnittener Blumen (nicht Bouquet), sei es Blumenkorb, Gewinde ꝛc. ꝛc.

15. Preis 3 fl. Für das geschmackvollste, aus freier Hand gebundene Bouquet.

b) Für Gemüse und Obst:

1. Preis 20 fl. Der schönsten Sammlung getriebener Gemüse in mindestens 8, unter sich verschiedenen Sorten.

2. Preis 10 fl. Der schönsten Sammlung von dergleichen in 6 Sorten.

Accessit 5 fl.

3. Preis 3 fl. 30 Kr. Der reichhaltigsten Sammlung besteonservirten frischen Obstes.

c) Für Garten-Instrumente, Gartenmöbel, Decorations-Gegenstände, Modelle, Verzierungen ꝛc.

1. Preis 20 fl. Für einen größern Gegenstand, wie Blumentisch, Ward'scher Kasten ꝛc. ꝛc., durch Geschmack, Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit sich empfehlend.

2. Preis 5 fl. Für einen kleinern Gegenstand: Töpferwaaren, Vasen, Garten-Instrumente, Korbflechtereien ꝛc.

Ein Preis von 5 fl. ist den HH. Preisrichtern zur freien Verfügung gestellt.

Außerdem werden 6 Gartengehülfen und 6 Gartentaglöhnern, welche bei ein und derselben Herrschaft, erstere eine Dienstzeit von mindestens 5, letztere 10 Jahren, bei ausgezeichnetem Fleiße, musterhaftem Betragen und steter Treue durch amtlich beglaubigte Zeugnisse nachweisen, von Seite des Vereins Diplome ertheilt.

Bei Zuerkennung von Preisen soll hauptsächlich auf Kulturvollkommenheit, Blüthenfülle, Neuheit mit blumistischem Werth und geschmackvolle Aufstellung Rücksicht genommen, überhaupt nur wirklich Preiswürdiges, den Bedingungen des Programms vollkommen Entsprechendes gekrönt werden.

Mehr als zwei Preise kann kein Aussteller erhalten, seine Preiswürdigkeit muß aber vorkommenden Falls anerkannt werden. Auch sind Pflanzen, welche bei dieser Ausstellung bereits einmal gekrönt wurden, von der Concurrenz um die folgenden Preise ausgeschlossen.

Preise, welche aus was immer für einem Grund nicht zuerkannt werden können, fallen in die Vereinskasse zurück.

Das Preisgericht beginnt seine Funktion am Sonntag den 10., früh 8 Uhr, und wird Sorge tragen, seine Geschäfte bis 11 Uhr, der Eröffnungsstunde der Ausstellung, zu beenden. Die öffentliche Preisvertheilung findet am Schlusse der Ausstellung statt.

Bremen. Preisaufgaben des Bremischen Gartenbau-Vereins für die Frühlings-Ausstellung am 9. 10. u. 11. April 1859.

1) Für 6 Sorten der schönsten Topfgewächse in vorzüglichem Kultur- und Blüthenzustande: 1. Prämie die goldene Medaille, 2. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔.
2) Für eine Collection von 12 Sorten der schönsten und bestkultivirten Camellien in Blüthe: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 5 ℔.
3) Für eine Collection von 6 Sorten der neuesten und schönsten Camellien in Blüthe: 1. Präme die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 5 ℔.
4) Für eine Collection von 8 Sorten der schönsten indischen Azaleen im besten Kultur- und Blüthenzustande: die silberne Medaille und 5 ℔.
5) Für eine Collection von 6 Sorten der schönsten und bestkultivirten Rhododendron in Blüthe: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 5 ℔.
6) Für eine Collection 12 Sorten Cinerarien in Töpfen: 1. Prämie die silberne Medaille und 2½ ℔, 2. Prämie 5 ℔, 3. Prämie 2½ ℔.
7) Für eine Collection von 18 Sorten Hyacinthen in Töpfen: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 5 ℔.
8) Für 6 Sorten der schönsten getriebenen Sträucher in voller Blüthe: die silberne Medaille und 5 ℔.
9) Für eine Collection von 12 Sorten der schönsten blühenden Frühlingsblumen in Töpfen: die silberne Medaille.
10) Für das schönste Blumenbouquet: die silberne Medaille.
11) Für die Gesammtlieferung der schönsten getriebenen Bohnen, Carotten und Erbsen: die goldene Medaille.
12) Für die besten Gurken: 1. Prämie die silberne Medaille und 2½ ℔, 2. Prämie 2½ ℔.
13) Für den besten Kopfsalat: 1. Prämie die silberne Medaille, 2. Prämie 2½ ℔.
14) Für das beste Sortiment Gemüse, gleichviel ob frisch oder conservirt: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

15) Für die beſten Erdbeeren: die ſilberne Medaille und 5 ℛ.
16) Für die beſten Himbeeren: die ſilberne Medaille und 5 ℛ.

Für die Concurrenz gelten folgende Beſtimmungen:

a. Bei den Preisaufgaben 1, 8, 9 und 14 dürfen keine Producte concurriren, die ſchon unter anderen Nummern als zu prämirende aufgeführt ſind.
b. Wenn mehrere Prämien für eine Preisaufgabe beſtimmt ſind, darf derſelbe Ausſteller nur mit einer Lieferung concurriren.
c. Die zu prämirenden Pflanzen, Gemüſe und Früchte müſſen vom Ausſteller ſelbſt kultivirt oder doch mindeſtens die drei letzten Monate im Beſitze deſſelben geweſen ſein, und muß dieſes auf Verlangen nachgewieſen werden.
d. Jede Pflanze muß mit ihrem richtigen beſonderen Namen oder doch mit einer Nummer verſehen ſein, die der Nummer des richtigen Namens im einzuliefernden Verzeichniſſe der concurrirenden Pflanzen entſpricht.

Für die zweite Ausſtellung des Jahres 1859, die im Beginn des Sommers ſtatthaben wird, werden ſchon jetzt Pelargonien, Roſen, Nelken, Gloxinien, Verbenen und Petunien als verzugsweiſe zu prämirende Pflanzen bezeichnet.

Der Vorſtand des Gartenbau-Vereins.

Garten-Notizen.

Der Garten des Heern Retemeyer in Bremen.

Wie uns von fachkundiger Hand mitgetheilt worden iſt, beabſichtigt Herr Retemeyer ſeinen ſo freundlich angelegten Garten nebſt die ſo exquiſite Pflanzenſammlung im Laufe des Sommers mehr in die Nähe der Stadt zu verlegen.

Der Hauptſchmuck der Warmhäuſer des genannten Gartens bildete im Monat Februar die ſo herrliche, bis jetzt viel zu wenig beachtete Naegelia (Gesneria) cinnabarina. Ein Exemplar dieſer herrlichen Pflanze ſtand in einem 12zölligen Topfe und hatte einen Umfang von 7½ Fuß bei einer Höhe von 2 Fuß. Die Pflanze hat 10 Blüthenſtengel, jeder mit einer Menge Blüthen und Knospen verſehen. Sie bot einen unbeſchreiblich ſchönen Anblick. — Gleich der Naegelia zebrina läßt ſich dieſe Art ſehr leicht kultiviren, verlangt jedoch ein wenig mehr Wärme.

Thunbergia laurifolia, in Kugelform gezogen, blüht ungemein reichlich. Ihre großen hellblauen Blumen ſind wahrhaft imponirend und iſt die Pflanze um ſo mehr zu empfehlen, da ſie während des Winters gleich leicht und dankbar blüht. (Dieſe ſchöne Art blüht auch im hieſigen bot. Garten ſeit Januar. E. O—o.)

Von intereſſanten Orchideen blühten im Monat Februar in Herrn

Retemeyer's Sammlung das ſchöne Uropedium Lindeni mit mehreren Blumen auf einem Stengel.

Barkeri Skinneri mit drei Blüthenriſpen. Die Pflanze ſteht ſchon über 3 Monate in voller Blüthe.

Oncidium leucochilum mit einem 5½ Fuß langen Blüthenſtengel, dann das liebliche Onc. incurvum; die ſeltene Batemania Meleagris Rchb. fil. (Huntleya) Lycaste Skinneri und aromatica. Dendrobium album Wight, Odontoglossum Cervantesii Lexarz., mehrere Cypripedien, unter denen auch das noch ſeltene villosum und Brassavola glauca, ſowohl im Topfe als auf einem Block gezogen. Dieſe hübſche Orchidee blüht eben nicht ſehr leicht und nach gemachten Erfahrungen darf man ſie nie zu naß halten.

In den Orchideenhäuſern des Herrn Conſul Schiller

ſtanden Mitte Februar mehrere ſehr ſeltene und prächtige Orchideen-Arten in Blüthe, von denen wir nur erwähnen wollen, das herrliche und ſeltene Cypripedium hirsutissimum Lindl., in genannter Sammlung zum Erſtenmale blühend. Wir verweiſen die Orchideenfreunde auf die früher gegebene Notiz dieſer Art in der hamburg. Gartenztg. XIII. pag. 12. Zu den dankbarſt blühenden Arten der Gattung Cypriped. gehört das C. barbatum floribundum, das faſt fortwährend in Blüthe ſteht und zugleich eine der ſchönſten Arten iſt. Eine andere ſeltene Art, die wir hier in Blüthe ſahen iſt die Aeriopsis javanica Reinw. aus Batavia. Dendrochilum glumaceum Lindl., eine liebliche Pflanze, ebenſo das Odontoglossum apterum Lexarz. (Ehrenbergii Hort. et Lem.) Odontoglossum bictoniense mit mehreren Varietäten blühte in vielen Exemplaren ſehr reich und ein Prachtexemplar bildete ein Oncidium ornithorrhynchum. Sehr üppig und voll blühte die Preptanthe vestita (Calanthe) α. candida, dann deren Varietät mit gelben Auge P. vestita flavo oculata und P. vestita rubro oculata mit roſa Auge. — Cirrhopetalum Medusae Lindl. hatte 14 Blüthenſtengel, jedoch hatten die Blumen ſchon ihr Beſtes gethan. Aus der Gattung Dendrobium blühten D. Pierardi Roxb. (cucullatum Hort.); moniliforme Sw., Rückeri Lindl. und nobile c. pendulum, ſämmtlich empfehlenswerthe Arten. Mit ungemein kräftigen Blüthentrauben ſtanden die Angraecum arcuatum Lindl., A. eburneum P. Th. und A. superbum P. Th. (eburneum Lindl.), letztere beide ſich ſehr nahe ſtehend, aber dennoch verſchieden, gleichzeitig in Blüthe, wie auch Vanda suavis und tricolor in 6 Fuß hohen Exemplaren.

Neue Züchtungen der verſchiedenſten Begonien Baſtarde von Hrn. Obergärtner Stange, wie die neuen von uns unlängſt erwähnten Chantin'ſchen Caladien-Arten, die wir hier bereits trefflich gedeihen ſahen, erregen die Bewunderung der Pflanzen- und Blumenfreunde.

Die Residenz des Herrn Georg von Hormuzaki.

Die Residenz des Herrn Georg von Hormuzaki zu Czernauka in der Bukowina besitzt zur Zeit eine der schönsten und großartigsten Gartenanlagen in der Bukowina, und freut es uns mittheilen zu können, daß diese erst im vorigen Sommer vollendete Gartenanlage von einem deutschen Landschaftsgärtner, dem Gartenconducteur Herrn Joh. Flach geschaffen worden ist. Herr Flach, der einem Rufe nach Czernauka Folge geleistet hatte, begann daselbst seine Thätigkeit im Spätherbste 1856. Ein nur kleiner Theil des sehr großen, nun bepflanzten Terrains, hatte ein Vorgänger Flach's angelegt und da kein Plan vorhanden war, aus dem man ersehen konnte, wie die neue Anlage weiter fortgeführt und mit der schon bestehenden verbunden werden sollte, so blieb Hrn. Flach nichts weiter übrig als erst einen neuen Plan zu entwerfen, nach dem auch die Ausführung der ganzen Anlage vom Besitzer von Czernauka sofort genehmigt wurde und Hr. Flach sein großes Werk, aus einer Wüste ein Paradies zu schaffen, beginnen konnte. Der ungemein milde Winter von 1856—57 kam den Erdarbeiten sehr zu Statten, so daß fast den ganzen Winter hindurch gearbeitet und im Frühjahre 1857 schon mit dem Pflanzen begonnen werden konnte. In Folge dieses günstigen Umstandes wurde die ganze Anlage fast ein Jahr früher fertig, als es contractlich zu geschehen brauchte, denn schon im Juli v. J. konnte Hr. Flach die Anlagen mit jeder nur möglichen Ausschmückung von einjährigen, perennirenden und Gewächshaus-Pflanzen dem Besitzer, der hierbei keine Kosten gescheut hatte, übergeben.

Zu den Anpflanzungen wurden nicht weniger als 28,000 Stück dortige Waldbäume in 35 Sorten verwendet, außerdem noch eine große Zahl edler Laub- und Nadelhölzer, die im Werthe von 1200 ℔, sämmtlich aus Deutschland bezogen worden waren und den Anlagen zur großen Zierde gereichen. Die Besitzung Czernauka enthält außer den großartigen Park- und Gartenanlagen, einen Blumengarten, eine sehr reichhaltige Sammlung von Laub- und Nadelhölzer, eine auserlesene Sammlung Rosen, vorzügliche Obstsorten, große Baumschulen zur Anzucht feinerer Gehölze und Obstsorten. In der unmittelbaren Nähe des Parks befindet sich der sehr gut eingerichtete Küchengarten wie Weingarten, ferner Orangerie, Sammlungen von Neuholländischen und Capischen Pflanzen, Camellien, Azaleen, Rhododendron ꝛc.

Möge diese reizende Schöpfung nur recht viele Nachahmer unter den so reichen Grundbesitzern der Bukowina finden. Die Lage, das Klima und der Boden des Landes sind der Art, daß die Gartenkultur in diesem Lande schnell emporschreiten muß und bald auf die Stufe, auf der sie in England, Frankreich und Deutschland steht, gebracht werden kann. Haben nur erst Einige den Anfang gemacht, so finden sich auch bald Nachahmer und da es dort an tüchtigen Gärtnern fehlt, so dürfte dieses reich gesegnete Land vielleicht manchem tüchtigen jungen deutschen Gärtner eine glänzende Zukunft gewähren.

Herrn Flach, der mit dieser seiner ersten großen Anlage, ein so großes Glück gemacht hat, sind seitdem mehrere glänzende Anträge gestellt worden und ist derselbe bereits auf einer andern Besitzung mit großartigen Anlagen beschäftigt.

Frucht- und Gemüse-Garten.

Chinesischer rosenrother Rettig.

(Franz. radis rose d'hiver de Chine; engl. scarlet oblong chinese radish; holländ. Chineesche roode Rammenas.)

Ein eigenthümlicher, schöner rother Rettig, dessen Einführung wir dem Herrn Abbé Voisin verdanken. Der Geschmack ist nur wenig beißend. Die Art gehört mehr zu den frühen Radis als zu dem schwarzen Winterrettig. Das Fleisch ist fest, weiß, etwas ins Gelbliche fallend.

Man muß, um gut zu ernten, den Samen vor Monat August säen, früher gesäet, gehen die Pflanzen in Samen über, später gesäet, erhalten die Wurzeln nicht die gehörige Reife und sind dann nicht haltbar.

Es giebt von dieser Sorte noch eine Varietät von violett rother Farbe. Beide reifen ihre Wurzeln unter der Erde. Nach der Abbildung in der „Flore des serres tab. 1247“ hat die Wurzel eine Länge von mehr als 6 Zoll und ein Durchmesser von fast 3 Zoll.

Birne: Général Totleben (Fontaine).

Eine köstliche Frucht, von der die Illustrat. hortic. auf tab. 191 eine Abbildung giebt und die von Hrn. A. Papeleu zu Ledeberg-lez-Gand, folgendermaaßen beschrieben wird:

Diese Varietät wurde 1838 von Herrn Fontaine de Gheling aus Samen gezogen und im Jahre 1855 wurden die ersten Früchte geerntet. Sie ist eine Frucht ersten Ranges, Reifzeit December bis Februar, Größe 5—6 Zoll lang und 4—5 Zoll breit, Birnenform. Farbe gelb, wenn reif, braunroth, gefleckt und punktirt. Geschmack: weinsäuerlich, sehr saftreich, wenig körnig, aromatisch und zuckerhaltig.

Am besten gedeiht diese Birne an spalierförmig gezogenen Stämmen.

Herr Verschaffelt in Gent ist im Besitze der ganzen Vermehrung dieser Birne und giebt veredelte Stämme zu 10 Frs. ab.

Pêche Docteur Krans.

Eine neue von Herrn Krans in Lüttich aus Samen gewonnene Pfirsich, die sich von allen bekannten Sorten am vortheilhaftesten als freistehender Hochstamm kultiviren läßt. Obgleich die Mutterpflanze bei Herrn Kranz oft kurz geschnitten worden ist und im Wuchse aufgehalten wurde, so blieb dieser Baum dennoch stets gesund und zeigte eine ungeheure Fruchtbarkeit, denn die letztjährige Ernte gab über 250 Stück Früchte, obschon eine große Menge vorher ausgebrochen war. Die Frucht ist von mittlerer Größe und sehr hübsch gefärbt. Das Fleisch ist fein und saftreich, weinsäuerlich, es verbindet die Eigenschaften der besten

Früchte der Spalierbäume. Die Haut ist dünn und der Kern löst sich leicht. Letzterer ist klein und das ihn umgebende Fleisch gewöhnlich mehr oder weniger carminroth gefärbt. Diese Frucht empfiehlt sich mit einem Worte durch große Fruchtbarkeit, durch guten Geschmack und durch schönes Colorit.

Eine getreue Abbildung dieser Pfirsich giebt die Belgique Horticole IX. Liv. 2. pag. 61.

Die große Oregon-Birne.

In dem Amerikanischen „Country Gentleman" befindet sich folgende Notiz über die oben genannte Birne, die, nach Gard. Chronicle, der wir diese Notizen entnehmen, wohl identisch mit der allbekannten „Uvedale's St. Germain-Birne" ist. Gard. Chronicle giebt gleichzeitig einen Umriß dieser Birne, die, wie so viele andere europäische Frucht- und Gemüsearten in Californien eine ganz enorme Größe und Schwere erreicht. Ein Herr Walling theilt in dem gedachten amerikanischen Journal mit, daß er an mehreren 2—3jährig veredelten Bäumen 11 Birnen geerntet habe, die zusammen 34 ℔ wogen. Die schwerste von ihnen wog 4 ℔, die leichteste 2 ℔. Die Bäume stehen in einem schwarzen, reichen, tief bearbeiteten Boden und etwas feucht, auch stellte Herr Walling während der Wachsthumsperiode ein großes Gefäß mit Wasser unter den Baum. Der Standort der Bäume befindet sich etwa 20 bis 25 Ruthen vom Flusse entfernt. Die größte gewonnene Birne hatte in der Rundung 18 Zoll und in der Länge 21 Zoll. Das Erzeugniß dieser Birnen hat ein ungemein großes Interesse für die Fruchtkultur in Californien hervorgerufen.

Diese ungewöhnlich große Fruchterzielung bestätigt die Angaben, welche Seyd über die enorme Größe anderer europäischer Gartenfrüchte mitgetheilt hat, die bisher als übertrieben angesehen wurden, so wog z. B. eine „rothe Rübe" 73 ℔; eine Carotte 10 ℔, diese war 1 Fuß 8 Zoll im Umfang und 3 Fuß 3 Zoll lang; funfzig Carotten waren auf demselben Beete von gleicher Größe und Stärke. Eine Zwiebel wog 2 ℔ 30 Lth. und hielt 22 Zoll im Umfang. Eine süße Kartoffel wog 11 ℔ 4 Loth, eine andere 21 ℔; der Ertrag einer Kartoffelstaude aus einem Auge gezogen, wog 10 ℔. Weintrauben wiegen in der Regel 4 ℔. — Eine Citron-Limone, 16½ Zoll im Umfang, wog 2 ℔ 28 Loth. — Pfirsich, von in 28 Monaten aus Samen erzogenen Bäumen, haben 9 Zoll im Umfang und wiegen 14—17 Lth., von denen 34 von einem Baume geerntet wurden. Ein Apfel wog 46 Loth und war 15½ Zoll hoch und ebenso breit. Acht Zwiebeln wogen zusammen 25 ℔, eine davon allein 4 ℔ 4 Loth. Eine rothe Rübe maß 3 Fuß 6 Zoll, dieselbe war jedoch noch nicht ausgewachsen. — Ein Kohlkopf wog 32 ℔, er war durchaus nicht überwachsen, die äußeren Blätter waren entfernt worden, zuvor man den Kopf auf den Markt sandte und nur der feste innere Theil wog 32 ℔. Die dritte Blätterlage war bereits weiß und die mehr inneren Blätter waren völlig schneeweiß, der Geschmack war ungemein fein und zart.

Pfirsich Baron Peers.

Herr Professor E. Morren sagt in der „Belgique horticole“ von dieser Pfirsich, von der er auf Taf. VI. (Decbr. Heft 1858) eine Abbildung giebt, daß sie alle guten Eigenschaften der Spalierpfirsich besitze und dennoch wurde diese Frucht von einem freistehenden fast verwilderten Baume gewonnen, der niemals geschnitten und nie veredelt worden war. Der Baum wächst den Nordwinden ausgesetzt in einer Pfirsich-Baumschule, den man, da er bisher nie Früchte getragen, wenig beachtet hatte. Er wurde von Herrn Baron E. Peers d'Oostcamp bei Bruges aus Samen gezogen. Die Frucht ist fast rund, etwas mehr breit als hoch und von beträchtlicher Größe. Die Haut ist fein und löst sich leicht, auf der Sonnenseite schön carminroth gefärbt, während der übrige Theil der Frucht blaßgelbgrün ist. Das Fleisch ist fein, schmelzend und saftreich und besitzt einen feinen aromatischen Geruch. Der Kern löst sich leicht, ist mäßig groß und das um denselben befindliche Fleisch der Frucht ist lebhaft rosa gefärbt.

Die Früchte reiften an dem einzigen Baume, der bis jetzt von dieser Sorte existirt, Ende September und Anfang October. Nach den Berichten des Herrn Baron Peers ist es eine der besten Früchte zu Hochstämmen. Der Baum ist sehr fruchtbar, ist ungefähr 10 Jahr alt und trug im vorigen Jahre 150 Früchte. Der Besitzer ist eifrig bemüht Vermehrung dieser Fruchtsorte zu erzielen und ist auch gern bereit Edelreiser davon abzugeben.

Berichtigung über Arnoldi's Obst-Cabinet.

Im ersten Hefte der Hamburger Gartenzeitung von diesem Jahre machten wir die geehrten Leser derselben, namentlich aber die Pomologen abermals auf die vortrefflichen Obst-Cabinette des Herrn Arnoldi in Gotha aufmerksam, und machten in Folge einer von dem Herausgeber uns gewordenen Mittheilung Bemerkungen über die Preise dieser Cabinette, jedoch dürfte der dabei erwähnte Rabatt von 20 % auf den Preis von ℳ 2⅓ pr. Lieferung leicht zu Mißverständnissen Veranlassung geben, weshalb sich Herr Arnoldi veranlaßt fand uns um folgende Berichtigung zu ersuchen:

„daß dieser Rabatt von 20 % sich lediglich auf meine Verleger und zwar bei Bezug von mindestens 10 Exemplaren jeder erscheinenden Lieferung bezieht. Dagegen ist der Preis jeder einzelnen Lieferung Netto ℳ 2⅓ ab hier für jeden Abonnenten, sowohl direct als durch Verleger bezogen, feststehend.

Die 6. Lieferung ist vollendet und enthält Aepfel: No. 15 Wellers Eckenhagner, No. 16 Charlamowski, No. 17 Fromms Goldreinette. Birnen: No. 15 Römische Schmalzbirne, No. 16 Die Westrumb., No. 17 Eiförmiger Augustin, so wie auch die 7. Lieferung zur Versendung bereit liegt und enthält Aepfel: No. 18 Großer rheinischer Bohnenapfel, No. 19 Ananasreinette, No. 20 Carmeliter Reinette; Pflan-

men, No. 2 Isabelle, No. 3 Washington, No. 4 Violette Dattelzwetsche. Zu recht zahlreichen Bestellungen hierdurch ladet ein

Gotha, den 12. Februar 1859. H. Arnoldi.

Pflanzen- und Samenverzeichnisse.

Preisverzeichniß von Sämereien und engl. Gartengeräthschaften für 1859 von den Herren P. Smith & Co. in Hamburg.

Wir empfehlen allen Blumen- und Pflanzenfreunden dieses dem vorigen Hefte beigegebene Verzeichniß, es brüstet sich dasselbe nicht mit 3 oder 4000 Nummern verschiedener Pflanzenarten und Sorten, dagegen liefert es eine Auswahl wirklich schöner und anerkannt guter Gemüse- und Blumensämereien, von denen die meisten unter der speciellen Leitung genannter Firma gebaut sind. Die aufgeführten neuen Gemüsesorten sind fast sämmtlich versucht worden und entsprechen vollkommen den ihnen zuvor gewordenen Anpreisungen. Samen von Bäumen und Sträuchern bietet das Verzeichniß in großer Menge an, unter diesen viele beachtenswerthe. Besonders aufmerksam möchten wir auf die „Sortimente von Blumensamen“ machen. Wir sahen die verschiedenen Sortimente von Astern, Ritterſporn, Dianthus, Immortellen, Petunien, Tageten, Zinnia ꝛc. in schönster Blüthenpracht und jede Farbe rein für sich stehend im Garten zu Bergedorf, die an Schönheit nichts zu wünschen übrig ließen. Das specielle Verzeichniß der Blumensamen enthält viele Neuheiten, wie natürlich alle bekannten und beliebten Zierpflanzen in großer Auswahl, während alles weniger empfehlenswerthere fortgelassen worden ist.

Reich an schönen blumistischen Neuheiten ist wiederum das diesjährige Verzeichniß des Herrn Chr. Deegen in Köstritz. Ein Auszug des großen Verzeichnisses ist diesem Hefte beigegeben, auf die wir die Blumenfreunde aufmerksam machen möchten. Das Hauptverzeichniß enthält besonders:

Georginen in 82 allerneuesten und 640 der edelsten Sorten.

Petunien in Riesengröße und schönster Füllung, fast den Päonien gleich.

Phlox in 36 allerneuesten Sorten von großen Blumen und reichen Dolden.

Päonien, chinesische wohlriechende in 50 Prachtsorten, ersten Ranges.

Gladiolen in den reizendsten und prächtigsten Farbenschattirungen.

Ein anderer, den Pflanzenfreunden mit diesem Hefte der Gartenzeitung zugehender, sehr beachtenswerther Preis-Courant ist der des Herrn G. Geitner's Treibgärtnerei zu Planitz bei Zwickau. Es ist dies ein mit vieler Mühe, Umsicht und Fleiß angefertigtes Verzeichniß, ein Verzeichniß wie es sein muß und das sich diejenigen Handelsgärtner zum Muster nehmen sollten, die ihre Pflanzenverzeichnisse einigermaßen

wissenschaftlich bearbeiten wollen und denen an eine richtige Nomenclatur ihrer Pflanzen selbst gelegen ist. Bemühen sich erst nur noch einige unserer größeren Handelsgärtner ihre Verzeichnisse mehr wissenschaftlich zu bearbeiten, so folgen die kleineren Etablissements bald nach, erleichtern dann ihren Kunden die Auswahl der Pflanzen und was am meisten werth ist, man kann mit mehr Sicherheit annehmen auch nur die Pflanzen zu bekommen, die man zu beziehen wünschte.

Näher auf den reichen Inhalt des Geitner'schen Verzeichnisses einzugehen, gestattet uns der gemessene Raum nicht, die Blumen- wie Pflanzenfreunde mögen sich selbst davon überzeugen und glauben wir sicher, daß Niemand das Verzeichniß aus der Hand legen wird ohne sich über die Bearbeitung desselben gefreut und ohne in demselben das gefunden zu haben, was er wünschte.

Das genannte Verzeichniß ist auch bei der Redaction dieser Zeitschrift gratis zu erhalten.

Das Preis-Verzeichniß über **Floristen-Blumen** ꝛc. von den Herren **Peter Smith & Co.** in Hamburg und Bergedorf ist in diesem Jahre getrennt von dem von uns oben erwähnten Samen-Verzeichniß erschienen und bildet ein Octav-Heft von 34 Seiten. Es ist reicher als je ausgestattet und enthält neben den besten älteren Sorten die vorzüglichsten Neuheiten, besonders englischer und französischer Züchter, welche im Laufe des letzten Jahres erschienen sind, von deren Schönheit sich Herr P. Smith zuvor selbst auf seinen alljährlichen Reisen nach England und Schottland überzeugt hat. Besonders empfehlen möchten wir die strauchigen Calceolarien, die Pelargonien, sowohl großblumige wie Fancy und dann besonders die buntblättrigen Pelargonien, nicht minder schön sind die Fuchsien und die Verbenen, von denen wir herrliche Blumen sahen. Ferner enthält die Sammlung noch vorzügliche Sortimente von Cinerarien, Petunien, Chrysanthemum, gefüllte Stockrosen in wahren Prachtsorten, Georginen, Nelken, Pensées ꝛc.

Unter den neuen und älteren schönblühenden Pflanzen für Topfkultur machen wir die Blumenfreunde auf die in England viel Furore machende Callicarpa tomentosa aufmerksam (abgebildet in Gard. Chronicle No. 6), dann die hübsche Alosia aurea var. pyramidalis und viele andere Pflanzen. Die Rubrik „Sträucher zu immergrünen Gruppen" enthält nur Straucharten, die wirklich im Freien aushalten, wenigstens haben sie im Garten der Herren P. Smith & Co. seit mehreren Jahren ohne Deckung ausgehalten.

Unter den vielen bekannten Erdbeersorten machen wir auf die in unserer Zeitung mehrfach besprochene Erdbeere Fragaria lucida Madame Vilmorin aufmerksam, die ihre Früchte reift, wenn die anderen Sorten vorüber sind.

Wir glauben sicher, daß keiner der verehrten Leser dieser Zeitung den besprochenen Katalog aus den Händen legen wird, ohne etwas Anziehendes darin gefunden zu haben.

Ein neues Verzeichniß pro 1859 der Herren **James Booth & Söhne**, Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen ist so eben erschienen. Es umfaßt dieses Verzeichniß nicht weniger als 135 engge-

druckte zweispaltige Octavseiten. Die erste Abtheilung: die Obstbäume und Obststräucher. Bei den Obstbäumen ist genau angegeben die Reifzeit und ob sich die Sorte für die Tafel oder für den Haushalt eignet, ob reich tragend oder nicht ꝛc. Dem Verzeichnisse der Obstbäume folgt das der Waldbäume, ungemein reichhaltig, dann folgen die Zierbäume und Sträucher, ferner schöne Bäume und Sträucher zur Gruppenbildung, kletternde und klimmende Pflanzen und dann eine Abtheilung der ausdauernden Bäume und blühenden Gesträuche zu Gartenanlagen. Das Verzeichniß der Coniferen wie das der Eichenarten ist ungemein reichhaltig und selten dürfte man wohl so herrliche Sammlungen von Coniferen wie Eichen anderswo finden, als man sie seit Jahren in den Flottbecker Baumschulen zu sehen Gelegenheit hat. Die Verzeichnisse der Rosen und Stauden, nur das Schönste und Neueste enthaltend, machen den Schluß der 1. Abtheilung dieses General-Catalogs aus, es folgt die 2. Abth. die Gewächshauspflanzen enthaltend. Hier sind es namentlich die Familien der Orchideen, Palmen und Farrn, deren große Reichhaltigkeit uns fesselt, aber nicht minder reich ist das allgemeine Verzeichniß der Warmhauspflanzen, obgleich es nur eine Sammlung der schönsten und seltensten Pflanzenarten enthält. Unter den Kalthauspflanzen finden wir auserlesene Sammlungen von Azalea indica, Camellien, Epacris, Erica, Rhododendren, Topfrosen ꝛc., wie viele sehr schöne und werthvolle Arten aus den verschiedensten Gattungen Pflanzen überhaupt. Eine genaue Durchsicht dieses Verzeichnisses liefert einen Beweis von der ungeheuren Reichhaltigkeit der in den Flottbecker Baumschulen vorhandenen Pflanzenschätze. E. D—o.

Feuilleton.

Die **größte und prächtigste Art aller Erdorchideen**, die bisher entdeckt worden ist, hat wohl das westlich-tropische Afrika aufzuweisen. In einem Schreiben des Herrn Dr. Welwitsch an W. W. Saunders Esq. über die Vegetation im westlich-tropischen Afrika, datirt S. Paulo de Loanda den 12. Septbr. 1857, das in einer Sitzung der Linnean Society in London im August v. J. vorgelesen worden ist, heißt es unter anderm: Erd- und parasitische Orchideen sind hier ziemlich zahlreich vertreten. Unter den ersteren befindet sich eine merkwürdige Art, vermuthlich ein Lissochilus, mit fast 5 Fuß langen Blättern und einem 10—12 Fuß hohen Blüthenschaft, der eine 1½ Fuß lange Blüthenrispe, aus 20—25 großen rosafarbenen Blumen bestehend, trägt. Knollen dieser herrlichen Pflanze sollen sich bereits auf dem Wege nach London befinden, mögen sie lebend anlangen und erhalten bleiben.

Die ganze Vegetation von Holungo Alto, heißt es weiter in dem Briefe, hat einen riesenartigen Charakter, so daß fast kein Raum für kleinere Gewächse übrig ist, mit Ausnahme von einjährigen Pflanzenarten. Eine Umbelliferen-Art z. B. bildet einen Baum mit 1 bis 1½ Fuß dicken Stamm.

Herr Dr. Welwitsch hat eine sehr reiche Ausbeute in jener Gegend gehabt, er hat allein über 2000 Pflanzenarten gesammelt, von denen die meisten neu sein dürften.

(Journ. of the Proc. of the Linn. Soc. III, No. 11, p. 151. 1859.)

Pflanzen-Etiquetten. In Gardeners' Chronicle werden von Herrn J. Boot, Lloyd Street, Hulme, Manchester, neue Etiquetten zu Pflanzen unter der Bezeichnung „Patent Anti-Corrosive marked labels“ sehr warm empfohlen. Da es in den meisten Gärten noch an dauerhaften, jeder Witterung widerstehenden Etiquetten fehlt, so glauben wir vielleicht manchem Gartenbesitzer einen Gefallen zu erzeigen, wenn wir ihn auf diese neue Erfindung aufmerksam machen. Die Etiquetten sind aus unzerstörbarem Metall gefertigt und haben eine leserliche Schrift. Der Erfinder garantirt deren Dauerhaftigkeit in jedem Klima, weder Feuchtigkeit noch Hitze übt den geringsten Einfluß auf diese Etiquetten. Wasser und Seife reicht hin sie von Schmutz zu reinigen und ihren Glanz zu erneuern.

Die Form der Etiquetten ist verschieden, entweder sind sie

1. zungenförmig, zum Einstecken, für Topfgewächse des Kalt- und Warmhauses wie für Pflanzen im freien Lande ꝛc. Der Preis dieser ist per Dutz. 4 s. (1 ℳ 10 Sgr.)

2. oval zum Anhängen an Bäume ꝛc. Derselbe Preis.

3. zungenförmig, kleiner als 1., nur mit einer Nummer versehen. Preis 6 s pr. 100 (2 ℳ).

3. oval, kleiner als 2. mit einer Nummer, 5 s pr. Hundert.

Kew-Garten. Nach dem, von dem Director der K. Gärten zu Kew, Sir W. J. Hooker veröffentlichten Jahresberichte für 1857 ist das Areal des eigentlichen bot. Gartens in dem Zeitraum von 17 Jahren von 14 engl. Acres auf 72 Acres vergrößert worden. Im Jahre 1841, von welcher Zeit an das Publikum täglich Zutritt zum Garten hat, war die Zahl der Besucher 9174, die Zahl der Besucher stieg jedoch von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1857 auf 361,978.

Paulownia imperialis. Im Garten von Wm. H. Pole Carew Esq., in der Grafschaft Cornwall, hat im vorigen Jahre eine Paulownia zum ersten male Früchte gereift. Im Januar d. J. war der Baum gleichzeitig mit Früchten und neuen Blüthenknospen bedeckt.

---

* **Gras-Mäh- und Walz-Maschine.** Auf der letzten Seite des diesjährigen Preisverzeichnisses von Sämereien, engl. Gartengeräthen ꝛc. der Herren P. Smith & Co. in Bergedorf und Hamburg befindet sich die Zeichnung einer verbesserten Gras-Mäh- und Walz-Maschine. Diese Maschine ist die zweckmäßigste, die wir kennen gelernt haben. Wir haben uns im vorigen Sommer selbst von deren Brauchbarkeit im Garten der Herren P. Smith & Co. überzeugt und können sie daher mit vollem Rechte allen Gartenbesitzern empfehlen. Es ist die einfachste, aber auch die wirksamste bis jetzt erfundene Maschine, sie bedarf keines Wechselns der Räder oder Walzen beim Schneiden der Ränder, Kanten und Rasenstücke, sondern mäht ganz nahe die Kanten und Ränder der Blumenbeete, kehrt und wendet sich mit Leichtigkeit, schlingt sich durch alle Windungen des Blumengartens, kehrend, schneidend und walzend zu gleicher Zeit.

Personal-Notizen.

† Gothenburg, den 2. Febr. Der berühmte, hier wie im Aus-

lande als tüchtiger und ausgezeichneter Botaniker bekannte Bischof **Dr. C. A. Agardh** ist nach kurzem Unwohlsein am 28. Januar früh Morgens im Alter von 74 Jahren und 6 Tagen gestorben. Bischof Agardh war früher Professor der Botanik an der Universität zu Lund, nach seiner Ernennung zum Bischof der Provinz Wermland nahm er seinen Wohnsitz in Carlstad, die Residenzstadt genannter Provinz, wo er sich noch immer gerne mit der Botanik beschäftigte.

† Der um die Erforschung der Flora des Vorgebirgs der guten Hoffnung sehr verdiente Herr **Carl Zeyher**, Herausgeber zweier Hefte der Enumeratio plant. Africae austr. extratropicae (1835—36) mit dem noch lebenden **Christ. Friedr. Ecklon** ist nach kurzem Krankenlager gegen Ende des vorigen Jahres auf seinem Besitzthum am Cap gestorben. (Bot. Ztg.)

Herr Privatdocent **Dr. Caspary** in Bonn ist zum ordentlichen Professor der Botanik an der philosophischen Facultät der Universität und zum Director des botanischen Gartens in Königsberg ernannt worden.

Herr **C. L. Siemers** ist zum Director der neu errichteten Ackerbauschule in Alnarp in Schonen in Schweden ernannt worden, woselbst man bereits mit großartigen Anlagen beschäftigt ist.

Neuestes Cactus Verzeichniss pro 1859.

Den zahlreichen Freunden dieser in jeder Hinsicht prachtvollen Pflanzen-Familie empfehle ich dieses Verzeichniss der in meiner Sammlung wirklich vorhandenen Arten und Unterarten zur geneigten Durchsicht. Durch Ankauf einiger grossen Sammlungen im vorigen Herbst habe ich die meinige sowohl durch Prachtexemplare als auch hinsichtlich der Artenzahl bedeutend vergrössert, sowie es mir bei dem jetzigen guten Stand meiner Pflanzen gelungen ist, manche seltene Art in Vermehrung zu bringen. Die Preise habe ich möglichst billig gestellt und gebe dafür nur gesunde, gut bewurzelte Exemplare. Das Verzeichniss, welches ausserdem noch eine Anzahl schöner succulenter Pflanzen enthält, steht auf frankirte Anforderung umgehend zu Diensten.

Erfurt, im Januar 1859. ***Friedrich Adolph Haage*** **jun.**

In dem hierbeifolgenden Auszuge erlaube ich mir auf die neuesten prächtigsten **Florblumen** hinzuweisen, die ich zur nächsten Florsaison darbiete, und welche sowohl in den einzelnen Sorten als in den Sortimenten das Beste, Schönste dieser Arten umfassen. Die Neuheiten aus unsern Culturen, die Georginien, Delphinen, Phlox, Violen, Pelargonien, Petunien ꝛc., sie werden einen erfreulichen Beweis geben, welchen Aufschwung unsere deutschen Blumen-Culturen gewonnen. Die in neuerer Zeit mit Recht zu Pracht-Gruppen empfohlenen Päonien, Gladiolen ꝛc. kann ich in den vollkommensten Prachtsorten liefern, während über Delphinien, Phlox, Petunien, Fuchsien ꝛc. sich alle Stimmen vereinigen, daß sie in solch dargebotenen Schönheiten zu den prächtigsten

Schmuckblumen gehören. Mit Vergnügen theile ich das specielle Haupt-Verzeichniß franco mit. **Christ. Deegen** in Köstritz,
Blumist und Handelsgärtner.

Unser neues Preis-Verzeichniß über Floristen-Blumen für Topfkultur und Blumenbeete im freien Lande, Sträucher für immergrüne Gruppen und einige der beliebtesten Obstsorten etc. erlauben wir uns diesem Hefte beizugeben und noch besonders auf die reiche Auswahl der Floristen-Blumen aufmerksam zu machen, unter denen sich alle empfehlenswerthen Neuheiten befinden. — Cataloge senden auf Verlangen gratis und franco zu und führen jeden Auftrag prompt und gut aus. **Peter Smith & Co.,**
Hamburg und im Samengarten zu Bergedorf.

Ananas-Pflanzen von der grossfrüchtigen und vorzüglichen Sorte, nervosa maxima, in kräftigen, gut durchwinterten Exemplaren das Dutzend 2 *Rthlr.* ***Fuchsien****, diesjährig neue, in* 18 *Sorten* 4 *Rthlr.* ***Begonien****, neueste buntblättrige in* 8 *Sorten, darunter die rühmlichst genannte Rex* 2 *Rthlr.*
Grafenort bei Habelschwerdt in Pr. Schlesien. **F. Schlegel.**

Von Dracaenopsis indivisa Pl. können einige Dutzend kräftige Pflanzen je nach der Größe zu 18 Rthlr. und 24 Rthlr. abgegeben werden.
Göttingen. Garten Etablissement **Koop.**

☞ Diesem Hefte sind gratis beigegeben:

1) Auszug aus dem Haupt-Verzeichnisse der vorzüglichsten Florblumen von **Ch. Deegen** in Köstritz.
2) No. 19. Preis-Courant von **G. Geitner's** Treibgärtnerei zu Planitz.
3) Preis-Verzeichniß über Floristen-Blumen ꝛc. von Herren **P. Smith & Co.**
4) Verzeichniß ausgewählter Sämereien für 1859 von Herrn **Moritz Rhein** in Sachsenhausen.
5) Nachtrag der Rosensammlung des Herrn **Lehmann** in Hildesheim.
6) No. 19. Nachtrag zum Verzeichniß No. 13. von Herrn **J. G. Ohlendorff & Söhne** in Ham.
7) Preis-Verzeichniß von Garten-, Blumen- und landwirthschaftlichen Sämereien ꝛc. des Herrn **Julius Rüppell** in Altona.

Auf dieses letzte Verzeichniß machen wir die geehrten Leser ganz besonders aufmerksam, es enthält viel Neues und Schönes, namentlich auch unter den landwirthschaftlichen Sämereien, die Herr R. aus den reellsten Häusern bezogen, bei denen er früher selbst beschäftigt gewesen ist. Die Redact.

Berichtigungen.

Seite 13, Zeile 21 von Unten lies 1853 für 1858.
„ 17, „ 4 und 5 von Oben lies „— von Murphy Camp, der nächsten Goldgräberei, und wenn man die Poststraße verfolgt, 95 von Sacramento City und 85 von Stockton entfernt liegt —“ anstatt „— von Murphy Camp, der auf der Poststraße nächsten Goldgräberei, 95 von Sacramento City und 85 von Stockton liegt —“

Paradisus Vindobonensis

ist der Titel eines botanischen Prachtwerkes (groß Folio), daß Professor Stephan Endlicher im Verein mit Anton Hartinger unternahm. Dasselbe, welches in den vierziger Jahren Heftweise zu erscheinen anfing, nimmt unter Endlichers Werken eine ehrenvolle Stelle ein und wurde ohne Unterbrechung fortgesetzt worden sein, wenn nicht der Tod Herrn Hartinger seines talentvollen Mitarbeiters beraubt und ihn gezwungen, seine fertigen Tafeln der Welt einstweilen ohne erläuternden Text zu übergeben. Der Zweck dieses großartigen Werkes war, seltene und schönblühende Pflanzen der Wiener und anderer Gärten und Museen in naturgetreuen Abbildungen und in natürlicher Größe zu geben. Um diesen Zweck möglichst vollkommen erreichen zu können, ward dazu ein Groß-Folio gewählt, das dem Künstler bei Doppeltafeln einen Spielraum von fast 3 Fuß und 2 Fuß Breite bot, und den Herausgeber in den Stand setzte, eine Reihe von Abbildungen zu liefern, wie sie vorher nie geboten worden.

In dem Leitartikel der Bonplandia von 15. Februar d. J. wie im Anzeiger derselben Zeitschrift ersehen wir mit Freuden, daß der dem Werke fehlende Text nicht nur nachgeliefert, sondern das Werk überhaupt seinen Fortgang nehmen wird, indem die Bearbeitung des wissenschaftlichen Theils des Werkes Herr Dr. Berthold Seemann, Redacteur der „Bonplandia“ ꝛc. übernommen hat.

Um auch unsere geehrten Leser etwas näher mit diesem Werke bekannt zu machen, führen wir noch folgende Details über dasselbe aus der Bonplandia hier an.

Alle bis 1858 erschienenen Tafeln des Paradisus belaufen sich auf 80, die 87 Arten, 45 Monocotyledonen und 42 Dicotyledonen erläutern. Darunter befinden sich gar viele seltene Pflanzen, von denen weiter keine Abbildungen existiren und fast alle sind Gewächse von solcher Schönheit, daß Manufacturisten die Tafeln zu Dessins in so großer Menge angekauft haben, daß nur noch 18 vollständige Exemplare der ersten 80 Tafeln vorhanden sind, und der Herausgeber, um der wachsenden Nachfrage zu genügen, den größten Theil derselben gegenwärtig von Neuem anfertigen lassen muß. Diese ersten 80 Tafeln sind von Dr. B. Seemann nach Endlicher's System geordnet, und mit dem erforderlichen Texte in lateinischer, deutscher und englischer Sprache versehen worden. Sie machen zusammen einen dicken Band aus, der für etwa 100 Thaler im Buchhandel zu haben ist. Der von Endlicher selbst zu den ersten 6 Tafeln gelieferte Text ist, wo er nicht veraltet war, nochmals abgedruckt, so daß das ganze Werk gleichmäßig und dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft angemessen ist.

Mit dem vollständigen Texte zum 1. Bande wird auch zugleich die Fortsetzung des Werkes erscheinen. Von drei zu drei Monaten wird ein Heft mit 4 Tafeln in Farbendruck nebst erläuterndem Texte ausgegeben werden, wobei die gegenwärtig besonders beliebten Orchideen, Farrn, Palmen und „Blattpflanzen“ nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollen, und vorzüglich Arten, die ihrer Größe wegen in Publicationen kleineren Formats nur ungenügend oder gar nicht abgebildet werden können. Die neuesten Hefte bringen unter Andern die seltsame Stangeria paradoxa, sowie eine ganze Reihe schöner Cycadeen, die in den Gewächshäusern des Herrn Yates bei London zur Blüthe gelangten, und von den ersten englischen Pflanzenmalern nach der Natur gezeichnet wurden, eine westindische Palmenlandschaft (als Titelblatt), Begonia Rex, und sonstige Blattpflanzen, das wunderbare Angraecum sesquipedale von Madagaskar, Gesneraceen, technisch und medizinisch wichtige Pflanzen, so wie, und zwar in jedem Hefte, wenigstens eine allgemein interessante Art.

An reichem Material mangelt es gegenwärtig nicht, da mehrere ansehnliche Gelehrte sich dem Unternehmen thatkräftig zugewendet haben, doch wenden sich die Herausgeber an alle Gartenvorsteher und Gartenbesitzer mit der Bitte, sie davon in Kenntniß zu setzen, wenn sie irgend eine seltene oder schönblühende Pflanzen haben, die des Abbildens werth ist, damit die Herausgeber die nöthigen Schritte thun können, sie in dem Paradisus aufzunehmen.

Der Preis einer jeden Lieferung dieses Werkes ist 4⅔ Ngr. oder 7 fl. Oestr. Währ., der Preis eines einzelnen Blattes 1 Ngr. 10 Ngr. oder 2 fl. Die Abonnenten auf die Fortsetzungen des Werkes sind nicht gehalten, die früher erschienenen Lieferungen anzuschaffen. Der Preis jeder dieser früheren Lieferungen bleibt wie bisher 8 fl. oder 5 Ngr. 10 Ngr. und können dieselben zur Bequemlichkeit der Abnehmer nach und nach bezogen werden. *)

Welche Prachtpflanzen in dem ersten Bande des Paradisus abgebildet sind, ersehen wir aus dem hier nachfolgenden Inhalte.

Liliaceae.

1) Lilium speciosum Thbg. var. punctatum. 2) L. excelsum Hort. 3) L. callosum Zucc. 4) Blandfurdia nobilis Smith. 5) Ornithogalum aureum Curt.

Irideae.

6) Cipura Northiana Endl. 7) Gladiolus carneus Jacq.

Amaryllideae.

8) Amaryllis (hybrida?) miniata R. et Pav. 9) Crinum amabile Don. 10) Pancratium rotatum Ker. var. repandum Endl. 11) P. Amancaes Ker. et et P. nutans Ker. 12) P. ringens R. et P.

Bromeliaceae.

13, 14) Bromelia antiacantha Bert. (B. sceptrum Fenzl.)

*) Verlag des Werkes: Wallishauser'sche Buchh. (Joseph Klemm) Wien, hohen Markt 541.

Orchideae.

15) Dendrobium moschatum Wall. 16) D. nobile Lindl. 17) Epidendrum cinnabarinum Salzm. 18) Cirrhopetalum Medusae Lindl. 19) C. picturatum Lodd. et Sophronitis grandiflora Lindl. 20) Cattleya labiata Lindl. 21) C. Harrissoriana Batem. 22) C. guttata Lindl. var. Russelliana Hook. 23) C. Skinneri Batem. 24) Saccolabium guttatum Lindl. 25) Aerides odoratus Lour. 26) Oncidium Lanceanum var. superbum Endl. 27) O. Papilio Lindl. 28) Odontoglossum grande Lindl. 29) Miltonia spectabilis Lindl. et M. spectabilis Lindl. var. bicolor Hort. Lodd. 30) Stanhopea tigrina Batem. 31) St. Wardii Lodd. 32) Coryanthes speciosa Hook. et C. macrantha Hook. 33) Huntleya violacea Lindl. 34) Zygopetalum Mackai Hook. 35) Z. Maxillare Lodd. et Cycnoches chlorochilon Kl. 36) l. Loddigesii Lindl, 37) Sabralia macrantha Lindl. 38) Cypripedium insigne Wall. et C. purpuratum Lind. 39) C. venustum Wall.

Zingiberaceae.

40) Globba (Mantisia) saltatoria Rosc.

Cycadeae.

41, 42) Encephalartos Frederici Guilielmi Lehm.

Proteaceae.

43) Protea cynaroides L. 44) Telopea speciosissima R. Br. 45) Banksia Baueri R. Br.

Goodenoviae.

46) Leschenaultia biloba Lindl. (L. grandiflora DC.)

Rubiaceae.

47) Ixora coccinea Curt. 48) Rondeletia odorata. 49) Luculia gratissima Sweet.

Apocyneae.

50) Plumieria rubra L. (P. aurantia Hort.) 51) Dipladenia Rosa campestris C. Lem. (Echites Rosa campestris Endl.)

Asclepiadeae.

52) Centrostemma Lindleyanum Dcne. 53) Stephanotis floribunda A. Brogn.

Gentianeae.

54) Eustoma Russellianum Grisb. (Lisianthus Russellianus Hook.)

Verbenaceae.

55) Clerodendron splendens G. Don.

Borragineae.

56) Halgania littoralis Gaud.

Convolvulaceae.

57) Ipomaea rubro-coerulea Hook. 58) J. Platensis Ker. 591) Batatas insignis G. Don. (B. paniculata Chois.)

Solanaceae.

60) Juanulloa aurantiaca Otto & Dietr. (J. aurantiaca Hort., non R. et Pav.) 61) Habrothamnus fasciculatus Endl.

Gesneriaceae.

63) Achimenes longiflora DC. 64) Tydaea picta Hanst. (Achimenes picta Bth.) et Dolichodeira tubiflora Hanst. (Gloxinia tubiflora Hook.) 65) Ligeria speciosa Hanst. var. discolor Seem. (Glox. speciosa Lodd. v. discolor Endl.) 66) Skiophilia pulchella Hanst. (Besleria pulchella Auct.)

Ericaceae.

67) Erica aristata Andr. et E. aristata v. aristela Bedf. (E. Sprengelii Hort.) 63) E. mammosa L.

Ranunculaceae.

69) Clematis coerulea Lindl. v. azurea Endl. (var. grandiflora Hook.)

Sarraceniaceae.

70) Sarracenia purpurea Lin.

Cacteae.

71) Echinopsis Zuccariniana Pfr. (Cereus tubiflorus Pfr.) 72) Cereus Napoleonis Grah.

Tremandreae.

73) Platytheca galioides Steetz (Tremandra verticillata Hgl.)

Tropaeoleae.

74) Tropaeolum peregrinum L. 75) T. azureum Miers.

Combretaceae.

76) Poivrea coccinea DC.

Melastomaceae.

77) Lasiandra heteromallum Naud. (Pleroma heteromallum Don) et Melastoma macrocarpum Don. 78) Monochaetum Humboldtianum Kth. (Lasiandra Endlicheri Beer et Fzl.

Papilionaceae.

79) Bartonia sessiflora DC. 89) Dauhertonia punicea DC.

Linden's neueste Einführungen.

Durch den so eben ausgegebenen 14. Katalog neuer und seltener Gewächse, die von Herrn Director J. Linden eingeführt wurden und in dessen Etablissement zu Brüssel kultivirt werden, wird den Pflanzen- wie Blumenfreunden wieder Gelegenheit geboten, ihre Sammlungen mit ausgezeichneten Neuheiten zu bereichern. Es existirt wohl kein zweites Etablissement, das alljährlich eine so große Anzahl von meist prachtvollen Gewächsen unseren Sammlungen zuführt, als das Linden'sche und somit rechtfertigt es vollkommen seinen Ruf und seinen Titel als „Etablissement d'introduction pour les plantes nouvelles."

Wieder sind es drei Begonia, die die größte Aufmerksamkeit der Blumenfreunde auf sich ziehen werden und gleich der Begonia Rex bald die größte Verbreitung finden dürften. Es sind

Begonia amabilis Lind. Es ist eben so schwierig, eine genaue Beschreibung von der Schönheit dieser Pflanze zu geben, als man es von der B. Rex zu thun im Stande war. Obgleich weniger groß in ihren Dimensionen als die B. Rex, zeigt diese Art dennoch einige Aehnlichkeit mit jener, in Folge des silberweißen Glanzes auf dem mittleren Theile der oberen Blattfläche. Die Blätter sind kleiner, von fester Substanz, unregelmäßig und tief gelappt. Die Oberfläche glatt, schwarzgrün und sehr glänzend, zeigt ein glänzend silberweißes Schild. Die untere Blattfläche ist purpurroth.

Diese, wie die beiden folgenden Begonien-Arten bewohnen dieselben Gegenden, als die B. Rex in dem Königreiche Assam, wo sie von Hrn. Simons entdeckt worden sind.

Begonia argentea Lind. Es giebt bereits mehrere Hybriden in den Gärten unter den Namen B. splendida argentea oder argentea-guttata, keine derselben ist jedoch analog mit dieser Art und keine derselben verdient diese specifische Benennung. Die Blätter der B. argentea scheinen in der That aus gediegenen Silber geschnitten zu sein oder besser noch aus Perlmutter. Einige fast unbemerkbar grüne Punkte sind auf der Blattoberfläche sichtbar, während die Hauptnerven strohgelb scheinen. Die Blätter sind mittler Größe, stumpfherzförmig, länglich, fein gezähnt und gesägt. Die untere Blattfläche ist blaßgrün, mit einem Gewebe von purpurfarbenen Adern geziert. Blumen noch unbekannt.

Begonia Victoria Lind. Habitus und Blätter ähnlich dem der vorhergehenden Art. Die Blätter sind von ausgezeichneter Schönheit, die Grundfarbe ist bräunlich grün, silber punktirt und breite silberne Streifen von ungleicher Länge befinden sich an den Blattnerven, die sich strahlenförmig an der Blattbasis vereinen. Die Unterfläche der Blätter ist rosapurpur.

Der Preis dieser drei indischen Pflanzenschätze ist 50 Frs. Jede Art 25 Frs.

In dem ehestens von Herrn Linden erscheinenden 1. Hefte seines „Hortus Lindenianus" sind diese drei Begonien abgebildet.

Arachnothria rosea Pl. & Lind. Eine hübsche Rubiacee, nahe verwandt mit Rogiera und Rondeletia.

Diese Pflanze stammt aus Neugranada, von wo Herr Director Linden vor mehreren Jahren Samen erhalten hat. Es ist ein hübscher Strauch, mit länglich-eirunden, kurz gestielten, oberhalb glatten und unterhalb blaugrünen, mit kurzen Flaumhaaren bedeckten Blättern. Die Blumen, in achselständigen Doldentrauben beisammen stehend, sind rosaroth und machen einen herrlichen Effekt. Die Pflanze wird im 1. Hefte des Hortus Lindenianus abgebildet. — Preis 15 Frs.

Beloperone violacea Pl. & Lind. Ein Halbstrauch, ästig, mit Blüthen in endständigen Rispen von schöner violetter Farbe, von denen die innere Lippe durch ihre Größe auffällig ist. Die Pflanze, in der kälteren Region der Cordilleren in Columbien heimisch, gedeiht vortrefflich im Freien (wenigstens in Brüssel) und dürfte eine schöne Acquisition für die Blumenparterre unserer Gärten sein, Blüthezeit vom Juli bis October. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 2—3 Fuß und macht während der Blüthezeit einen herrlichen Effekt. Im Kalthause kultivirt, dauert die Blüthezeit bis December. — Die Pflanze erscheint abgebildet im Hortus Lindenianus. Preis derselben 10 Frs.

Centradenia grandiflora Schlecht. Von Schlechtendal beschrieb diese schöne Melastomacee im Jahre 1839 nach getrockneten Exemplaren, die von Schiede gesammelt waren. Herr Linden erzog diese Pflanze im Jahre 1857 zufällig aus Samen, der in einer Erde keimte, die er aus Chiapas (Mexico) erhalten hatte. Diese Art übertrifft um vieles die bekannten C. rosea und floribunda, sowohl hinsichtlich ihres Habitus, als auch hinsichtlich der Schönheit und Größe ihrer Blumen. Es ist nicht nur eine schöne und graciöse Pflanze, die sich durch leichtes und reichliches Blühen empfiehlt, sie ist selbst Zierpflanze, die gleich dem Cyanophyllum und den Medinilla-Arten empfohlen zu werden verdient. Blüthezeit vom November bis Februar. Die Pflanze verlangt ein Kalthaus und eine Erdmischung aus Haide-Lauberde und Lehm. Abgebildet im Hort. Lind. pl. 4. Preis 15 Frs.

Cuphea ocymoides Dne. Habitus und Blüthenreichthum dieser lieblichen Pflanze erinnern an die Saponaria ocymoides, eine der elegantesten Alpenpflanzen. — Sie gehört zur Gruppe der Cuphea, bei denen die Corolle aus 6 Petalen besteht und deren Blüthen 12 Staubfäden haben. Blumen schön violettpurpur. Herr Linden entdeckte diese reizende Pflanze 1840 im Staate Chiapas und wurde 1857 eingeführt. Abgebildet im Hort. Lind. No. 5. Preis 10 Frs.

Lindenia rivalis Benth. Bereits vor einer Reihe von Jahren stellte Bentham die Gattung Lindenia nach einer Pflanze auf, die Hartweg in Mexico entdeckt hatte. Linden fand sie später in großer Menge an den Ufern des Rio Puyopatango, im Staate Tabusco, wo sie mit der Chamaedorea Martiau fast undurchdringliche Gebüsche bildet. Herr Ghiesbreght sandte im Jahre 1856 Samen dieser hübschen Rubiacee ein, aus dem Herr Linden eine Menge Pflanzen erzog, die er jetzt zu 10 Frs. das Stück anbietet. Es ist eine hübsche Pflanze von 2—3 Fuß Höhe, stark verästelt von unten auf, mit dicken weidenartigen Blättern und langen, röhrenartigen rein weißen Blumen. Abgebildet Hort. Lind. No. 6.

Maranta Porteana Lind. Es ist dies die ächte Art, die von Herrn Linden eingeführt worden ist und nun in den Handel kommt. Sie steht keiner der vorangegangenen Arten an Schönheit nach. Die langgestielten Blätter sind mit silberweiß eingefaßt und auf der untern Seite roth gefärbt. Im Habitus hat diese Art Aehnlichkeit mit der Stromanthe oder Calathea sanguinea. — Herr Porte, dem zu Ehren sie benannt wurde, führte sie von Rio-dos-Pheos, Provinz Bahia, ein. Starke Exemplare 25 Frs.

Dieses wäre ein Theil der vorzüglichsten Neuheiten, die Herr Linden vom 1. Mai an in den Handel giebt, außer diesen sind im erwähnten Verzeichnisse noch mehrere aufgeführt, denen dann noch 7 neue und prachtvolle Blatt-Pflanzen folgen. Die Einführungen von 1858 sind bedeutend in den Preisen heruntergesetzt, wie Jeder aus dem Verzeichnisse ersehen wird, auf das wir die Aufmerksamkeit aller Pflanzenfreunde lenken möchten.

Die schwarze Malve.

Im Sommer 1857 erhielt ich von einem Freunde einige Pflanzen der Althea rosea (schwarze Malve) zum Versuchsanbau. Mein Freund theilte mir mit, daß er durch den Anbau dieser Pflanze in der Nähe von Nürnberg pro Morgen einen Rein-Ertrag von 200 ℔ und darüber, während mehreren Jahren erzielt habe. — Es ist nämlich einem englischen Chemiker gelungen, aus der Blüthe der Althea rosea einen für die Zeugfärberei vollkommen haltbaren Farbestoff herzustellen, der durch die besondere Art der Zubereitung als Ersatz des theuren Indigo's benutzt wird. Es hat nach authentischen Mittheilungen der Verbrauch dieses Farbestoffes sich für England von Jahr zu Jahr bedeutend gesteigert. England bezieht seinen Bedarf an Blüthen der Althea rosea zum größten Theile aus Frankreich, welches dieselbe namentlich zum Färben der Rothweine, Liquere und des Essigs benutzt und deßhalb anbaut. — Versuche, die Stengel der Althea rosea zur Papierfabrikation und den durch Abkochen der Wurzel gewonnenen Schleim zum Leimen des Papiers, namentlich des chinesischen Druckpapiers zu verwenden, sollen in Frankreich ebenfalls vollkommen gelungen sein. Behandelt man die Stengel in der Wasserröste, so geben sie einen Bast, der sich wie Hanf verarbeiten läßt.

In Deutschland geschieht der Anbau der Althea rosea in größern Massen bisher nur um Nürnberg herum und ist es auffallend, daß die Pflanze nicht bereits in andern Gegenden Deutschlands einheimisch geworden ist, da der sichere Ertrag und die wenig kostspielige Kultur den Anbau der Pflanze um vieles lohnender, als jeder andere Handelsgewächsbau macht, dabei aber auch durch den stets steigenden Bedarf

die Sicherheit für den Absatz durch Ausfuhr nach England und Frankreich gewährleistet ist.

Nach Mittheilungen des Kaufmanns Heerdegen in Nürnberg, der den Export nach England besorgt, ist die Nachfrage von englischen Häusern in diesem Artikel so groß, daß die im Verhältniße immer nur geringen Massen, welche die dortige Gegend produciren kann, gegen den normalen Preis von 34 ℳ pro Ctr. in den letzten Jahren reißend vergriffen sind. Der Preis pro Ctr. stand vor wenigen Jahren noch auf 17. ℳ und hat sich stets steigend in dieser kurzen Zeit auf die oben genannte Summa hinaufgeschwungen.

Herr Kaufmann Heerdegen in Nürnberg hat in Folge der bedeutenden Nachfragen mich durch einen Dritten ersucht, die schlesischen Besitzer zum Anbau der Althea rosea aufzufordern und verpflichtet sich zur alljährlichen Abnahme von vielen Tausend Ctr. zu zeitgemäßen Preisen.

Wenn wir nur mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen können, daß die Englische Erfindung, aus der Blüthe der Althea rosea ein Ersatzmittel des Indigo's herzustellen, was bisher Geheimniß geblieben ist, — sich nach Deutschland überträgt, oder es einem deutschen Chemiker gelingt, das Verfahren selbstständig zu finden, so läßt sich wohl nicht zweifeln, daß der Anbau der Althea rosea stets ein außerordentlich lohnender bleiben wird. Zu derartigen Versuchen offerire ich den Herren Chemikern meine vorjährige Erndte von ca. 10 ℔ gratis.

Was die Kultur der Althea rosea anlangt, so bietet dieselbe durchaus keine Schwierigkeiten. Es ist die Althea rosea eine seltsam genügsame Pflanze, die wenig Dünger, wenig Handarbeit beansprucht und fast in jedem Boden gedeiht. Allerdings ist für den größern oder geringern Ertrag die Bodengüte und die der Pflanze zu Theil werdende Behandlung maßgebend.

Eine warme gegen Westen geschützte Lage und ein sandiger Lehmboden sagen ihr ganz besonders zu, doch baut man sie in der Gegend von Nürnberg auch auf Sandboden mit Vortheil. Frische Düngung ist nicht zu empfehlen — man thut besser sie in der zweiten Tracht zu bauen, und, wenn der Boden zu sehr erschöpft ist, eine Düngung von gut verrotteten Kompost zu geben. Außerdem empfiehlt sich ein öfteres Begießen mit verdünnter Jauche — selbiges muß indeß stets nach einem Regen geschehen.

Der Anbau geschieht durch Samen, den man Mitte Mai auf ein gut gedüngtes und sauber zugerichtetes Gartenland in 3 Zoll von einander entfernten ⅓ Zoll tiefen Furchen so einstreut, daß die Körner etwa ½ Zoll von einander zu liegen kommen. Die Furchen werden dann gedeckt und die lose Krume etwas angedrückt. Ende Juni, spätestens Mitte Juli haben die Pflanzen dann eine Stärke erreicht, die sie zum Versetzen tauglich macht.

Man bringt sie alsdann in ein geleertes Rapsfeld oder in irgend einen andern Acker, der eine Vorfrucht getragen hat und zur Aufnahme der Pflanzen durch tiefes Umpflügen und gut gekrümelte Ackerkrume sauber vorbereitet ist.

Die Anpflanzung geschieht in 2 Fuß von einander entfernten Rei-

len, in einem Anſtande von 2 Fuß der einzelnen Pflanzenſtöcke. Die Wurzeln der Pflanzen, die vor dem Anpflanzen etwas geſtutzt werden, müſſen ſenkrecht in den Boden kommen — man erreicht dieſes durch Anwendung eines Pflanzholzes. Sind die Pflanzen etwas herangewachſen, ſo werden ſie behackt, oder wenn man größere Flächen kultivirt, wie eine andere Hackfrucht, berührt. Allerdings bleibt es bei Anwendung des Ruhrhackens ſtets rathſam mit der Krauthacke nachzuhelfen.

Ein Behacken iſt in der Regel nicht nothwendig, weil die Pflanzen ſehr bald den Boden ſo bedecken, daß keine Unterkräuter aufkommen können. Im zweiten und in den folgenden Jahren — die Pflanze iſt eine perennirende — beſchränkt ſich die Arbeit auf das Behacken, Ueberdüngen im Herbſte mit Compoſt oder langen Stallmiſt und Reinhalten von Unkraut.

In gutem Boden giebt die Plantage eine reichliche Erndte während einer Zeit von 5—6 Jahren, mit geringem Boden etwa während 3 Erndtejahren. Etwa entſtehende Lücken werden durch Nachpflanzen ausgefüllt.

Im erſten Jahre iſt kein Ertrag zu erwarten — im zweiten Jahre tritt die Pflanze im Juli in Blüthe und ſomit in die Erndteperiode, welche ununterbrochen bis Mitte September fortdauert. Die Erndte geſchieht in der Art, daß die Blüthen bei trockenem Wetter, wenn der Thau abgetrocknet iſt, mit den Kelchen abgeſtückt und auf luftigen Boden oder auf Horden im Freien abgetrocknet werden. Ein öfteres Umrühren muß dadurch, daß man die Blüthen möglichſt dünn ausgebreitet unnöthig gemacht werden, weil ſolches die Blüthen zu ſehr zerreißt. Nach dem Abtrocknen ſetzt man die Blüthen in einen Haufen zuſammen und durchſeiht ſelbigen von Zeit zu Zeit mit einem Rechenſtiel.

So bleibt die Maſſe liegen bis man zur Verſendung ſchreitet. Zum Verpacken wählt man einen möglichſt feuchten Tag — die Blüthen ſind dann durch Feuchtigkeit etwas klamm geworden und laſſen ſich ohne zu krümeln mit den Händen in Hopfenſäcken feſt eindrücken.

Zu bemerken iſt noch, daß die Althea rosea mit ihren langen Wurzeln bis zu einer außerordentlichen Tiefe in den Boden dringt, daß ihr Anbau für die darauf folgenden Früchte alſo alle Vortheile gewährt, die wir von tiefwurzelnden Gewächſen zu erwarten berechtigt ſind. In Folge dieſes tiefen Wurzelvermögens widerſteht ſie den Einflüſſen einer dürren Witterung ganz außerordentlich. So zeigte der Boden auf dem bei mir die Pflanzen in dem letztverfloſſenen dürren Sommer ſtanden, bei 3 Fuß Tiefe keine Spur von Feuchtigkeit, und dennoch trieben die Stengel zu einer Höhe von 8 Fuß und waren ſo dicht mit Blüthen bedeckt, daß ich von je 3 Pflanzen 1 Pfund getrockneter Blüthen gewann. —

Iſt die Pflanzenplantage nicht mehr tragbar, d. h. befinden ſich die Stöcke im Abſterben, ſo iſt es räthlich den Acker zu rijolen und alsdann durch einen Sommer mit einer Hackfrucht in ſtarker Düngung anzubauen. Nach der Hackfrucht folgt dann am beſten eine zeitige Sommerhalmfrucht, worauf nach Aberntung derſelben abermals die Malvenplantage eingerichtet werden kann. Samen der ſchwarzen Malve, den ich in allen Verzeichniſſen der Handelsgärtner und Samenhandlungen

vermiſſe, offerire ich zum Verſuchsanbau, ſo weit mein kleiner Vorrath von 3 Pfund reicht, gratis.

Für eine Plantage von 1 Morgen (Magdeburger) bedarf man etwa 6—8 Loth Samen.

Hammemann,
Inſtitutsgärtner u. Lehrer des Gartenbaues an der Königl. höheren landwirthſch. Lehranſtalt zu Proskau.

Die Tulpen Italiens.

Nach Parlatore's Flora italiana. Von Prof. Dr. v. Schlechtendal.

Während wir für unſere Gärten Schmuckpflanzen und überhaupt Neuigkeiten aus entfernten Gegenden mit großen Geldopfern und mit häufigen Verluſten des ſchon Errungenen zu erwerben bemüht ſind, vernachläſſigt man die näher gelegenen, leichter zu erreichenden Gegenden unſeres eigenen Welttheils und der benachbarten beiden an das mittelländiſche Meer belegenen. Es fiel mir dies bei der Durchſicht der von Parlatore in Florenz herausgegebenen Flora italiana bei den Zwiebel- und Knollengewächſen, welche im 2ten Theile derſelben (erſchienen 1857 in Florenz) enthalten, ſehr auf, weil wir noch zahlreiche Arten hier aufgezeichnet finden, welche in unſern Gärten noch gar nicht oder nur ſelten angetroffen ſind und überhaupt einzelne noch ſolche Seltenheiten ſind, daß ſie der Verfaſſer der Flora ſelbſt noch nicht lebend geſehen hat, obwohl ihm ſeine Stellung als Vorſtand des botaniſchen Gartens in Florenz es ſehr erleichtern müßte, dieſelben zuſammenzubringen. Ich will hier nur einige Gattungen der Liliaceen anführen, woraus man ſchon erſehen kann, wie wenige derſelben erſt bei uns gefunden werden, obwohl ſie in Gegenden wachſen, die alljährlich von ſo vielen Reiſenden beſucht werden, die freilich weder für das, was Menſchen dort gethan, ein Intereſſe haben, noch ſich für die Schönheiten der Natur im Allgemeinen begeiſtern, ohne die einzelnen Gegenſtände aus denen der vegetabiliſche Teppich zuſammengeſetzt iſt, einer genaueren Beachtung zu widmen und geduldig Zweige von Prunus Laurocerasus nach Hauſe bringen, als Proben der Lorbeergebüſche, die ſie an claſſiſchen Stellen geſehen haben wollen.

Die Gattung Tulipa wird mit 11 Arten vorgeführt, man kann ſie nach der Zeit ihrer Blüthen in drei Abtheilungen bringen, die früheſten bringen ihre Blumen von der Mitte des März an, wie T. praecox, Oculus solis, Clusiana und sylvestris; andere blühen einen Monat ſpäter, wie T. maleolens und variopicta, noch andere endlich erſcheinen mit ihren Blumen Ende April bis Mitte Mai, wie T. apula, Franconiana, strangulata, spathulata, serotina und Celsiana. Nach dieſer verſchiedenen Zeit des Aufblühens ſind ſie aber nicht aufgezählt, ſondern auf folgende Weiſe:

Zwiebelſchuppen innen mit Wolle (Tulipanum Reboul).

1. T. Oculus solis St. Amans. Dieſe auch in Frankreich vorkommende Art zeichnet ſich durch ihre ſehr ſpitzen Blumenblätter aus, welche auf ihrer rothen Grundfarbe an der Baſis einen großen ſchwarzen ſchmalen, länglichen Fleck haben, der an den Innenblättern an der Spitze dreizähnig iſt und bei allen von einem gelbgoldigen Streifen begrenzt wird. Hat keinen Geruch.

T. praecox Tenore. Kommt ebenfalls auch in Frankreich vor, hat kleinere Blumen als die vorige Art, deren Blumenblätter eine korallenrothe Farbe und einen eiförmig-rhombiſch-ſtumpfen, ſchwarzen, blaßgelb umſäumten Fleck auf der Innenſeite tragen, der nur die Länge eines Drittheils des Blattes hat. Ohne Geruch.

3. T. apula Gussone. Nur im Königreich Neapel gefunden, hat nur $1^1/^2$ Zoll lange Blumen, die aber viel kleiner als die der vorigen Art, am Grunde wenig mehr als einen Zoll Breite haben, von rother innen lebhafter Farbe, mit umgekehrt eiförmigem runden, dunkeln Fleck, mit gezähnt-geſchlitztem Rande und linealiſch gelblicher Umgebung, der nur ein Drittheil des Blumenblatts einnimmt, die innen kürzeren ſtumpfen, mit kurzen Spitzen verſehenen Blätter haben ein am Grunde mehr kielförmigen Fleck. Der Geruch fehlt. Von der vorigen durch kleinere Blumen, ſtraffer tiefer gerinnte Blätter mit geradem deutlicher gewimperten Rande und ſpäteres Blühen unterſchieden.

4. T. maleolens Reboul. Im mittleren Italien bei Florenz, Genua, Lucca. Die Blumen ſind kleiner als bei T. Oculus Solis, von roſenrother Farbe, außen nach dem Grunde grün-gelblich; der Flecken iſt von violetter Farbe mit breiterer gelber Einfaſſung, bei den äußern umgekehrt eiförmig und geſtutzt oder ausgerandet, bei den innern etwas kleiner, mit ſtumpfer Spitze an der öfters einige Zähnchen. Hat einen üblen aber ſchwachen Geruch.

5. T. Clusiana DC. Wächſt im weſtlichen und mittleren Theile von Italien und nördlichen Frankreich, wird auch in Perſien angegeben. Unterſcheidet ſich leicht von den übrigen Tulpen durch die weiße Farbe ihrer Blumen, welche am Rande ihrer Außenblätter von einem breiten Streifen von dunklem Roth umgeben ſind, und an allen Blättern einen umgekehrt-eiförmigen bis an den Blattrand reichenden ſchön amaranthrothen Fleck haben.

Zwiebelſchuppen innen mit Haaren beſetzt.

6. T. Fransoniana Parl. Nur bei Florenz gefunden. Unterſcheidet ſich leicht durch ihre dunkelrothen Blumen von denen jedes Blatt außen am Grunde einen weißen grünlich und innen einen dunkel-violetten breiten Fleck von umgekehrt-eiförmig-rhombiſcher Geſtalt hat, der am Rande fein gezähnt iſt, indem der oberſte Zahn wie eine kleine Spitze verlängert iſt. Eine ſchmale weiße Umgebung begrenzt die Flecke, welche nur den vierten Theil der Länge der Blätter erreichen. Ob dieſe Tulpe mit T. Didieri Jord. zu vereinigen ſei, fragt ſich, doch unterſcheidet ſich die letztere durch drei längere Zähne an den Flecken,

durch die nicht so viele Bulbillen erzeugende Zwiebel und durch die nicht wolligen Blattränder.

Zwiebelschuppen innen kahl (Tulipanum Reboul).

a. Stengel unbehaart.

7. T. sylvestris L. Ein durch Europa weitverbreitete, vom südlichen Schweden und Schottland bis nach Sicilien und Griechenland, in diesen südlichen Gegenden aber nur in Berggegenden wachsende Art. Die Blumen gelb ganz ohne Flecken, nur außen etwas grünlich oder röthlich angehaucht an den äußern Blättern. Es ist bekannt, wie sehr die Pflanze, wo sie sich angesiedelt hat, wuchert und wie schwer sie zu vertilgen ist.

8. T. Celsiana DC. Wächst mehr im südlichen Europa, so wie in Kleinasien und Nordafrika an höher gelegenen feuchten Orten und wurde früher für eine Form der vorigen gehalten, von welcher sie sich durch kleinere Blumen, welche vor dem Blühen nicht hängen, durch lauter lanzettliche zugespitzte, an der Spitze weniger behaarte Blumenblätter und andere geringe Merkmale unterscheidet.

9. T. Gerneriana L. Auf Getreidefeldern bei Florenz und in Oelbaumpflanzungen bei Lucca hat Prof. Parlatore diese bei uns in Gärten in so vielen Spielarten gezogene Tulpe gefunden, welche ursprünglich aus dem Oriente kommen soll, ob ihr künstlicher Verbreitungsbezirk durch Verwilderung noch größer ist, sich durch Europa weiter erstreckt und wo sie eigentlich ihre wahre Heimath hat, ist noch nicht sicher ausgemacht. Diese Art hat die größten Blumen von allen Tulpen Italiens, deren Blätter von fast gleicher Länge sind, die innern aber viel breiter, umgekehrt-eiförmig, oder stumpf und fast ausgerandet. Die äußeren Blätter sind ein wenig gelblich am Rande nach dem Grunde hin und die innern sind hier dunkler nach dem Rande hin mit einer gelblichen Linie in der Richtung des Mittelnerven, sonst zinnoberroth, mit einem ungefähr ein Viertheil der Länge des Blumenblatts messenden dunkelvioletten fast schwarzen Flecken von umgekehrt-eiförmig rhomboidalischer Gestalt, der an der Spitze einen großen Zahn hat, ohne gelbliche Umsäumung, nur mit einem leichten gelblichen Anhauch an den beiden Seitenecken des Fleckens. Es giebt eine Abänderung mit viel blasserer Blume, mit gelblichen Flecken, die oben eine grünliche Stelle haben. Von Bertoloni und andern italienischen Botanikern ist diese Art T. spathulata genannt worden.

b. Stengel kurzhaarig scharflich.

10. T. serotina Reboul. Diese Art sah Prof. Parlatore nie frisch, obgleich sie bei Florenz von Reboul, aber später nicht wieder gefunden wurde. Sie soll sich von der vorigen schon durch größere Kleinheit aller Theile unterscheiden, ferner dadurch, daß ihre rothe Farbe beim Trocknen schwindet, während sie sich bei der vorigen erhält. Der Flecken am Grunde der Blumenblätter soll unten gelb, nach oben schwarz sein. Die Staubgefäße sollen fast länger als das mit einer kleinen Narbe

verſehene Piſtill ſein, während jene Art eine große Narbe und Staubgefäße hat, die faſt kürzer als das Piſtill ſind. Parlatore ſtellt dieſe Pflanze neben die mit behaarten Stengeln, während ihr Entdecker ſie denen mit kahlem Stengel zugeſellte. Alles dies macht dieſe Art etwas zweifelhaft in unſern Augen.

11. T. strangulata Reboul. Auch dieſe Art iſt nur an verſchiedenen Orten von Florenz bis jetzt beobachtet. Die Blumen ſind ſcharlachroth und nach oben hin wie etwas zuſammengezogen oder eingeſchnürt, daher der Name, die äußeren haben am Grunde nach außen eine etwas gelbliche Färbung, die Flecken im Innern haben einen breiten, nur ein Fünftel der Perigoniallänge meſſenden ſchwarzen Fleck, der an der äußern umgekehrt-eiförmig, faſt geſchlitzt-abgeſtutzt, an der innern rhombiſch iſt und eine goldgelbe Umgebung hat, außerdem ſind die Blätter dieſer Art ſehr breit.

12. T. variopicta Reboul. Gleichfalls wurde dieſe Art nur in der Umgegend von Florenz gefunden und wird im botaniſchen Garten daſelbſt kultivirt. Bertoloni rechnet ſie mit der vorigen zuſammen und nennt dieſe Art T. scabriscapa, während Kunth ſie zu der vorigen als Varietät zieht. Ueberdies hat Hr. Reboul ſie auch mit den Namen T. Bonarotiana und neglecta bezeichnet, durch den Druck bekannt gemacht. Die Farbe der Blumen ſoll bei dieſer Art ſehr variabel ſein, die Blumenblätter ſind nämlich roth, mit einem unten am Grunde nach außen gelben Fleck und nach innen mit einem kleinen (nur den ſechsten Theil des Blattes meſſenden) ſchwärzlich rhombiſchen, faſt 3-lappigen mit breiter gelber Umgebung; oder ſie ſind gelblich roth geſtreift oder blaßgelb, mit dunkelgelbem oder einem citronengelben nach außen blaſſen Fleck, nach außen und nach innen mit einem weniger dunklen und auf den innern Blättern mit zwei gelben Streifen verſehen, die von Flecken nach der Spitze verlaufen. Auch die Form der Blumenblätter bildet einige Verſchiedenheit von der bei der vorigen Art.

Italien hätte alſo ein ganzes Dutzend verſchiedener Tulpenarten, wieviel hat denn Frankreich? Darüber belehrt uns die neueſte franzöſiſche Flor von Grenir und Godron in ihrem 3ten, 1855 erſchienenen Bande, in welcher die Gattung Tulipa in zwei Abtheilungen zerfällt, je nachdem die Staubfäden kahl ſind oder am Grunde Haare tragen. Zu jener Abtheilung gehören T. Clusiana DC., Oculus solis St. Am. (mit dem Synonym T. acutiflora Pourr.), praecox Ten. und Didieri Jord. Wenn dieſe letztere mit T. Fransoniana zuſammenfällt, ſo ſind dieſe vier ſämmtlich in Italien vorhanden. — Zur zweiten Abtheilung gehören T. sylvestris L., T. gallica Loiseleur (T. acrocarpa Jord. iſt Synonym derſelben) und T. Celsiana DC. Von dieſen dreien würde T. gallica als nicht in Italien wachſend zu erwähnen ſein. Sie kommt im Departement du Var bei Hyères vor und unterſcheidet ſich von T. sylvestris durch tonnenförmige (nicht glockige) Geſtalt der Blume, faſt gleiche (nicht ſehr ungleiche) Blumenblätter und durch eine um ein Drittheil kleiner umgekehrt-eiförmig, dreikantige an beiden Enden verſchmälerte (nicht länglich-dreikantige) Kapſel. Sie erſcheint nicht in der italieniſchen Flor vorhanden zu ſein, dürfte ſich aber vielleicht doch in Italien finden.

Von der andern ſüdeuropäiſchen Flor noch zu ſprechen wäre über-

flüſſig, da wir über ſie keine vollſtändige und keine neue Werke beſitzen, alſo noch nichts über ihre Tulpenarten wiſſen.

Die neuere ruſſiſche Flor von Ledebour, deren letzter Theil, worin die Tulpen ſtehen, 1853 erſchien, hat folgende Arten: T. julia C. Koch, welche ſehr ungenügend bekannt iſt, obwohl ſie mit praecox Ten. und montana Lindl. verglichen wird. 2. T. Gesneriana L. mit ziemlich großem Verbreitungsbezirk, bei welcher aber die Frage aufgeworfen wird, ob nicht mehrere Arten zuſammengefaßt ſeien. 3. T. altaica Pall. mit gelber Blume. 4. T. sylvestris L. mit drei Varietäten: minor, tricolor und biflora, welche beſtimmt nicht zuſammen gehören, ſo wie es auch von T. repens Fischer ungewiß iſt, ob ſie hierher zu rechnen ſei, ſo daß hier erſt eine Sichtung und Unterſuchung vorgenommen werden muß, ehe man über die Verhältniſſe der Tulpen in jener Gegend etwas Sicheres wiſſen wird.

Einen Umſtand muß ich noch im Intereſſe der Kultur erwähnen, nämlich die Beſchaffenheit ihrer Vermehrung durch die Zwiebel. Die franzöſiſche Flor ſagt bei T. Clusiana, Oculus solis, Celsiana, daß der Bulbus Stolonen triebe und zwar bei den letzteren nach dem Blühen; von T. sylvestris und gallica wird ganz beſtimmt geſagt ohne Stolonen, was ganz entgegen dem wäre, was wir oben bei T. sylvestris geſagt haben, wenn es ſich nicht blos auf die blühbare Zwiebel beziehen ſoll, die allerdings ohne Stolon iſt, während die jüngere ſolche hervorbringt. Bei T. praecox und Didieri werden die Stolonen gar nicht erwähnt. Hier werde nämlich, wie es an den in unſern Gärten befindlichen T. praecox und Gesneriana bekannt iſt, nur eine oder mehrere Zwiebeln im Innern neu erzeugt und dadurch entſteht, da wo eine Tulpenzwiebel ſtand, allmählich ein ganzer Trupp. Wie verhält es ſich aber bei denen, wo Stolonen an der Zwiebel angegeben werde, finden ſie ſich ſtets nach dem Blühen ein, oder früher, oder nur bei jüngern vor dem blühbaren Zuſtande? Hat man ferner Ausſaaten von Tulpenſaamen gemacht und welche Reſultate haben ſie in Bezug auf Farbe, Geſtalt der Blumen u. ſ. w. ergeben?

Zur Kultur der Farrn.

(Beſchluß.)

VI.

Behandlung.

Bevor das Ver- oder Umpflanzen der Farrn beſprochen werden kann, iſt es zweckmäßig, einige Worte über die Erde, worin die Pflanzen wachſen ſollen und wie ſie dieſe lieben, vorausgehen zu laſſen. Aus der Beſchaffenheit der Wurzeln der Farrnkräuter, die bei den meiſten

Arten dünn und faserig und nie von bedeutender Stärke oder Länge sind, ersieht man, daß sie eine leichte und lockere Erde verlangen, eine Erde in der sich die zarten Wurzeln leicht ausbreiten, die sie leicht durchdringen können und die das Wasser schnell durchläßt. Daher ist ihnen eine Moor-, Torf-, Heide- oder ähnliche Erde am zuträglichsten, wenn diese nach ihrer Beschaffenheit mit Sand, Kohle oder auch mit Lauberde oder Lehm zubereitet ist. Eine Beimischung von Holzkohle zu der Erde, für kleinere Pflanzen, grobe gestoßene, für größere auch in Stücken angewendet, lieben die Farrn alle ganz besonders. Die Holzkohle hält die Erde rein, nimmt die überflüssigen Nahrungsstoffe auf, theilt sie den Wurzeln nach und nach mit und giebt auch diesen einen Anhaltepunkt. Ist die Heide- oder Moorerde zu locker, so daß sie sich im trocknen Zustande wollig anfühlt oder im feuchten zusammenklebt oder bäckt, so muß sie durch Sand und Kohle, oder auch durch Lauberde oder Lehm verbessert werden. Lauberde und Lehm als Beimischung zu einer leichteren Erde haben den Zweck die Erde schwerer, dichter und gehaltreicher zu machen, sind daher für Pflanzen, besonders in Töpfen als Beimischung in geringerem oder größerem Maaße anzuwenden wenn sich Töpfe an Oertlichkeiten z. B. im Freien befinden, wo die Erde schneller austrockne als in feuchten Gewächshäusern.

Doch in Ermangelung jener Moor-, Heide-, oder Torferde lassen sich die Farrn in fast jeder beliebigen anderen Erde, selbst die meisten bei schwerer lehmiger Beschaffenheit derselben kultiviren, wenn die Erde nach ihrer Dichtheit und Schwere mit Sand und zerstoßener Holzkohle vermischt wird. Ist die Erde sehr schwer, so muß sie in halb trockenem Zustande so fein als möglich gerieben werden, worauf dann noch Sand und Kohle, damit sich diese mit der Erde gehörig verbinden könne, beigemischt werden.

Viel kann man bei der Kultur der Farrn durch Hinzufügen von Hornspähnen, Knochenmehl oder ähnlichen allmählig verwesenden Düngungsmittel zu der Erde, worin die Pflanzen zu stehen kommen, erlangen und Farrn in einem Sommer zu derselben Größe heranzuziehen, wozu man sonst ohne diese Hülfe mehrere Jahre haben müßte. Bei Anwendung dieser Düngungsmittel muß man jedoch Vorsicht gebrauchen, erstens, daß man diese nicht übermäßig viel zu der Erde thut, zweitens muß sich zu gleicher Zeit Holzkohle zwischen der Erde befinden, um diese rein zu halten und endlich hat man dann besonders darauf zu achten, daß die Erde, wenn begoßen, gehörig durchgegossen wird. Diese Düngungsmittel befördern nicht nur bedeutend den Wachsthum der Pflanzen, sondern geben auch dem Laube eine gesundere, dunkelgrüne Färbung. Da ein öfteres starkes Durchgießen der gedüngten Erde, worin die Farrn stehen, eine Hauptbedingung ist, so versteht sich wohl von selbst, daß man bei solchen Umpflanzungen, die im Spätsommer oder zu einer Zeit geschehen, wo vieles Gießen nicht anwendbar ist, dergleichen Düngungen unterläßt, ebenso kränkliche Pflanzen, solche mit wenigen oder schlechten Wurzeln, ferner die von sehr schwacher Beschaffenheit, deren Existenz mehr von der Atmosphäre abhängt, damit verschont.

VII.

Behandlung.

Die angemeſſene Zeit zum Um- oder Verpflanzen der Farrn iſt bei denen, die in Häuſern überwintert werden als auch bei ſolchen, die Winter und Sommer in den Häuſern bleiben, im Februar und März. Die dann ſchon ſtärker wirkenden Strahlen der Sonne erzeugen in den Häuſern eine den Pflanzen zuträglichere Luft, als bisher nur durch das Heizen hat erlangt werden können. Ein öfteres und ſtärkeres Zulaſſen friſcher Luft iſt ermöglicht, weßhalb dieſe auch feuchter gehalten werden kann. Die neuen Wedel brechen hervor und mit dieſen zeigen ſich friſche Wurzeln, die, wenn ſie durch das Umpflanzen willkommene Nahrung finden, den Pflanzen bald zu einem üppigen Wachsthum verhelfen werden. Solche dagegen, die in Käſten überwintert werden, wo ſie nur gegen zu ſtarken Froſt geſchützt ſind und die, wenn kein Froſt mehr im Freien zu befürchten, dort anderweitig ihre Anwendung finden, verpflanze man Ende April oder Anfang Mai, je nachdem das Wetter es zuläßt, wenn ſie aus den Käſten gebracht werden, oder man ſtelle ſie nach dem Umpflanzen wieder in die Käſten, laſſe ſie darin noch bis vierzehn Tage ſtehen, halte die Luft im Kaſten feucht und ſorge beſonders, wenn die Sonne zu dieſer Zeit ſchon ſtärker wirkt, für hinreichende Beſchattung. Dies würde nun für ſolche, die in Töpfen gezogen werden, die Zeit des Umpflanzens im Allgemeinen ſein. Viele Farrn jedoch haben einen ſehr ſtarken Wachsthum und durchwurzeln dann in kurzer Zeit die Erde worin ſie ſtehen, daß dieſe ihnen bald keine Nahrung mehr darbieten kann, der Erdballen trocknet zu ſchnell aus, die neuen Wedel werden kleiner und das ganze Laub der Pflanze verliert das ſaftige Grün und wird gelblich; ein nochmaliges Umpflanzen bei Pflanzen, wo ſich dieſe Merkmale zeigen, verhilft ſie bald wieder zu einem geſunden Aeußern und kräftigem Wuchſe. Andererſeits kann man wieder bei den Farrn durch ein noch öfteres Umpflanzen, wenn dies mit der gehörigen Vorſicht geſchieht, viel erlangen und dies beſonders bei jungen Pflanzen, wenn man dieſe, ſobald ſich die Wurzeln am Rande des Ballens zeigen, immer wieder in um ein Weniges größere Gefäße pflanzt.

Bei dem Umpflanzen im Frühjahr hat man zuerſt darnach zu ſehen, ob die Pflanzen gut durchwurzelt und die Wurzeln auch geſund ſind, was man an den grünen Spitzen derſelben leicht erkennen kann. Iſt dies der Fall, ſo iſt der Ballen ſo wenig als möglich zu ſtören und muß die Pflanze in ein verhältnißmäßig größeres Gefäß geſetzt werden. Sind dagegen wenig Wurzeln vorhanden oder ſind dieſe ſchlecht geworden, ſo muß die alte Erde ſoviel als möglich aus dem Ballen der Pflanze geſchüttelt und die faulen oder todten Wurzeln müſſen behutſam entfernt werden, die Pflanze wird darauf in einen größeren oder kleineren Topf geſetzt, als der war, worin ſie ſtand, je nachdem ſie viele oder wenige geſunde Wurzeln hat. Iſt zu einem nochmaligen Umpflanzen Zeit genug vorhanden, ſo iſt es vortheilhafter, den Pflanzen bei dieſem erſten Umpflanzen ein möglichſt kleineres Gefäß zu geben und ſie, wenn friſch bewurzelt, in ein größeres zu ſetzen. Werden Farrn nach dem

ersten Umpflanzen im Frühjahr nochmals oder noch mehrere Male den Sommer über verpflanzt, so störe man den Erdballen und die Wurzeln ebenfalls so wenig als möglich, lockere höchstens, wenn die Wurzeln zu dicht am Rande des Ballen liegen, diese ein wenig auf und entferne behutsam Steine- oder Holzkohlen-Stücke des Abzugs, wenn diese sich nach dem Herausnehmen der Pflanze aus dem alten Gefäße an dem unteren Ende des Ballen noch befinden. Bei jedem Einpflanzen in neue Gefäße, Töpfe oder worin die Pflanzen zu stehen kommen, hat man sich zuerst zur Regel zu machen, daß diese einen guten und schnellen Ab- oder Durchfluß des überflüssigen Wassers haben, daher sind zuerst die Abzugs-Oeffnungen im Boden des Topfes zu untersuchen, ob diese weit genug sind und wenn dieses nicht der Fall ist, sie zu erweitern, darauf ist für einen sogenannten guten Abzug zu sorgen, der aus einer Lage kleiner Steine, Scherben oder Holzkohle besteht und der Erde in den Töpfen als Unterlage dient. Die meisten Farrn haben den Stamm, den Wurzelstock oder das Rhizom unmittelbar auf der Erde oder erheben sich über dieselbe, beim Einpflanzen hat man darauf zu sehen, diesen Theil nicht zu hoch aber noch weniger zu tief zu pflanzen. Die meisten Aspidien, Asplenen, Aneimien, Gymnogramen und viele Pteris, deren unteres Ende des Wurzelstockes jährlich abstirbt, müssen auch jährlich tiefer gesetzt werden, jedoch immer soviel über die Oberfläche der Erde erhaben, daß das obere Ende des Wurzelstocks soweit es noch grün und gesund ist, frei bleibt, es sind dies solche Farrn, deren Wurzelstock wie auch bei einigen Blechnum, schon kleine oder größere Stämmchen bilden, ohne jedoch wie die Cyatheen, Alsophilae Hemiteliae und andere zu den baumartigen gerechnet werden zu können, deren Stämme, wenn sie einmal die gehörige Dicke erreicht haben, von dauerhafterer Natur sind. Die meisten Polypodien, mehrere Cheilanthes, als Ch. dicksonioides Endl., chlorophylla Sw., amaurorhachis Kze., repens Klfs., einige Pteris, Gymnogramme javanica Bl., Cybelium glaucescens Kze. und andere kriechen mit ihrem Wurzelstocke, der mehr oder weniger gestreckt ist, je nachdem sich die Wedel dichter oder entfernter an demselben vorfinden, auf der Oberfläche der Erde hin. Bei den Adianten, mehreren Cheilanthes, Notochlaenen und Farrn von ähnlichem Wuchse, besteht der Wurzelstock aus vielen Köpfen, die zusammenhängen und sich auf der unmittelbaren Oberfläche der Erde befinden, die daher beim Einpflanzen nicht tief in die Erde kommen dürfen. Bis endlich einige, meist aus kälteren Gegenden stammende, wie Pteris aquilina L. die Botrychium, Aphioglossum, Equisetum, wenn man diese mit hierher gehörend rechnen will, gegen die Kälte in der Tiefe der Erde Schutz suchen und demnach solche ihrer Natur gemäß zu pflanzen hat. Da die Farrn viel Wasser gebrauchen und öfters stark begossen werden müssen, so hat man gleich beim Einpflanzen darauf zu achten, daß nach dem Einpflanzen noch hinreichend Raum für das Wasser beim Begießen bleibt oder daß die Gefäße noch einen gehörigen Gußrand behalten. Nach dem Umpflanzen halte man die Temperatur recht feucht und wo es möglich ist, die Pflanzen schattiger bei mehr geschlossener Luft, damit dadurch die Wurzeln schneller in Thätigkeit gesetzt werden. Bei den tropischen Arten erhöhe man auch be-

ſonders nach dem Umpflanzen im Frühjahr die Wärme der Temperatur um einige Grade.

Das Auspflanzen oder Umſetzen von Farrn im freien Lande geſchieht am zweckmäßigſten nur im Frühjahre, alſo Ende April oder Anfang Mai, wenn man ſtarke Kälte nicht mehr zu erwarten hat, nachdem der Boden, worin die Pflanzen ſtehen ſollen, wenn dieſer nicht ſchon von Natur paſſend iſt, bei Anwendung obenerwähnter Erdmiſchungen für größere Farrnarten wenigſtens ein Fuß tief zubereitet iſt. Kleinere Farrn wie Asplenium viride Huds., Trichomanes L., Petrarcae DC., Breynii Retz., Ceterach officinarum W., Cystopteris, Polypodium Robertianum Hoffm. und ähnliche Arten müſſen eine ſchwerere Erde erhalten, worin ſie gepflanzt werden oder man muß dieſe mit kleinen Steinen untermiſchen um den kurzen Wurzeln einen Anhaltepunkt zu geben. Solche Arten die nur den Sommer über im freien Lande ſtehen, dagegen in Käſten oder Häuſern überwintert, nimmt man, bevor es friert, alſo Anfang October heraus und pflanzt ſie, nachdem man beim Herausnehmen die Wurzeln möglichſt zu ſchonen geſucht hat, wieder in Töpfe, bringt ſie an Ort und Stelle und gießt die Erde, erſt wenn dieſe trocken zu werden beginnt, einmal tüchtig durch, worauf ſie an feuchten Orten überwintert, gewöhnlich den Winter über genug Waſſer haben und man das Gießen nur, wenn ſie etwa zu trocken werden ſollten, zu wiederholen hat.

Einige Farrn wie Ceratopteris, Pilularia, Isoetes, die von der Natur einen Standort im Waſſer angewieſen bekommen haben, müſſen in ſchwerere Erde gepflanzt werden, die den Wurzeln einen Anhalt giebt und bei etwaigen Bewegungen des Waſſers das Ausſpühlen der Pflanzen nicht zuläßt. Andererſeits giebt es mehrere Farrn, die mit ihren zarten Würzelchen nur auf der Oberfläche der Erde hinkriechen, oder doch nur ſehr wenig in dieſelbe eindringen, die nur wenig oder gar keine Erde nöthig haben und deren Gedeihen meiſt nur auf die Feuchtigkeit des Gegenſtandes, worauf oder woran ſie wachſen und der ſie umgebenden Luft ankommt, wie dies bei mehreren Hymenophyllen, Trichomanes, den kleineren Selaginellen, als Sel. hortensis Mett., Ludoviciana A. Br., apus Spr., helvetica Lk., delicatissima A. Br. der Fall iſt. Bei dieſen und ähnlichen kleinen Arten kommt es daher auch nicht auf die Qualität der Erde an, worauf ſie zu wachſen haben, ſie gedeihen auch auf Moos und ähnlichen Beſtandtheilen, einige auch auf bloßen Steinen und Holz, woran ſie ſich mit ihren Würzelchen anklammern. So laſſen ſich mit Selaginella hortensis Mett. und apus Spr. ganze Wände bekleiden, wenn man in ein oder zwei Zoll weiter Entfernung von demſelben ein Drathgeflecht anbringt, den Raum zwiſchen dem Drathgeflecht und der Wand mit Moos ausfüllt und an dieſer Moswand die Selaginellen anbringt, indem man ſie in geringer Entfernung in das Moos ſteckt, worauf das Moos feucht gehalten, die Selaginella in kurzer Zeit die Wand überzogen haben wird, wenn dieſes Experiment im Frühjahr oder Anfang Sommer ausgeführt worden iſt. Natürlicherweiſe dürfen ſolche Wände der Sonne nicht ſehr ausgeſetzt werden, obgleich Sel. hortensis ſelbſt ziemlich viel Sonne ertragen kann, wenn das Moos, worauf ſie wächſt, feucht genug gehalten wird.

Will man dagegen Farrn von größerem Wuchse zur Bekleidung von Wänden, Baumstämmen u. s. w, benutzen, so müssen sie zuerst mit etwas Moos oder wurzeliger Erde befestigt, kleine Töpfchen oder Kästchen angebracht oder irgend eine andere Vorrichtung getroffen werden, um den Pflanzen einen Anhaltpunkt zu geben, bis sie sich mit ihren Wurzeln festgeklammert haben. Hierzu eignen sich jedoch nicht alle Arten der Farrn und darf man dann auch nicht auf einen so üppigen Wachsthum rechnen, als man diesen erlangen kann, wenn sie sich in Töpfen befinden, wo die Wurzeln mehr Spielraum haben und die Pflanzen dadurch mehr Nahrung erhalten. Besonders lassen sich hierzu mehrere Polypodien, Cheilanthes mit gestrecktem Rhizom und Stenochlaena scandens verwenden; dann Arten, die ihrer Eigenthümlichkeit gemäß auch bei weniger Nahrung gedeihen, als die Doodien, Adianten, mehrere Blechnum, Cheilanthes und Asplenien, als B. glandulosum Klfs, occidentale L., C. hastata Knz., elongata W., Aspl. ebenum Ait., monanthemum L., Trichomanes L., viride Huds. und ähnliche. Die Acrostichen haben besonders geeignete Wurzeln, sich an feste Gegenstände fest zu klammern. Ferner die Arten der Nephrolepis, welche mit langen Ausläufern versehen sind, an deren Enden sich wieder junge Pflanzen bilden, die sich mit einiger Nachhülfe an Stein und Holz bald festwurzeln und deren schlanke Wedel dann in gemessenen Bogen herabhängen. Auch die Platycerien und Polypodium quercifolium, die auf diese Art angebracht, ihre baroque Form um so mehr präsentiren. So mag es außer den angeführten noch viele Arten geben, die bei derartiger Verwendung gedeihen und ihren Zweck erfüllen, wenn man ihre Natur etwas belauscht und ihnen demnach durch künstliche Mittel Hülfe zukommen läßt.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Campanumoea javanica *Bl.*

(Codonopsis javanica Hook. et Th.)

Campanulaceae.

Die Herren Doctoren Hooker und Thomson entdeckten diese Pflanze zuerst in Sikkim in einer Höhe von 5–7000 Fuß über der Meeresfläche. Ebenso fand man sie auf den Khasia Gebirgen in einer Höhe von 5–6000, wo sie während der Regenzeit blüht.

Es ist eine kletternde Campanulaceae, ähnlich den Arten der Gattung Codonopsis. Da ihre Blumen von keiner besonderen Schönheit sind, so hat diese Pflanze für den Blumenfreund auch nur geringen Werth. Die grünen Blätter haben gerieben einen der Raute ähnlichen Geruch.

(Flore des serres tab. 1264).

Bouvardia Oriana (Hybrida).

Ein sehr schöner Bastard mit scharlachrothen Blumen, erzogen durch künstliche Befruchtung der B. longiflora und leiantha. Bouvardia Laura, Hogarth und Rosalinda sind Schwestern der B. Oriana von gleicher Schönheit. Diese schönen Erzeugnisse sind englischen Ursprungs und haben die Herren E. Henderson & Sohn die ganze Vermehrung an sich gebracht und diese Pflanzen bereits in den Handel gegeben.

Sämmtliche Bouvardia-Arten lassen sich im Kalthause bei 4—6° R. gut überwintern und gedeihen während des Sommers besser im freien Lande als in Töpfen.

(Flore des serres tab. 1265.)

Datura meteloides *DC.*

Von dieser wahrhaft schönen Art, die wir bereits im vorigen Jahrgange der hamburger Gartenztg. S. 182 ausführlich besprochen und empfohlen haben, bringt das Octoberheft 1858 der Flore des serres, das am 10. Januar 1859 erschienen, auf Taf. 1266 eine Abbildung. Diese Art wurde zuerst als D. Wrightii durch Herrn Vilmorin Andrieux aus den vereinigten Staaten Nordamerikas eingeführt und von demselben in Handel gebracht. Die Pflanze, vermuthlich aus Californien stammend, ist ziemlich hart und gedeiht während des Sommers sehr gut im freien Lande. Es ist eine sehr empfehlenswerthe Pflanze.

Larix Griffithii *Hook. fil et Thom.*

Die Flore des serres giebt auf Tafel 1267—68 eine Abbildung dieser sehr hübschen Lerchentanne, die von den Herren Doctoren Hooker und Thomson sehr häufig in den Thälern des Sikkim Himalaya und im östlichen Nepal angetroffen wurde. Der Baum gedeiht in allen Höhen, selbst in den tiefsten Thälern, wo er eine Höhe von 60 Fuß erreicht. Eine sehr hübsche Art.

Arisema ringens *Bl.*

(Arum ringens Thbg., Arum triphyllum Thbg.)

Aroideae.

Charles Morren gab schon im II. Bde. seiner Ann. soc. d'hort. de Gand p. 447 eine Abbildung dieser sehr hübschen und interessanten Art. Thunberg fand sie zuerst in der Umgegend von Jedo und bei Mangasaki. Jedo liegt südöstlich von der Insel Kin-Sin. Nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen läßt sich diese Pflanze während der Zeit ihres Ruhestandes sehr gut im Kalthause überwintern und kultivirt man sie ebenso wie andere zum Winter einziehende Aroideen-Arten. — Eine andere noch viel schönere Art: Arisoma Murrayi wird die flore des serres ehestens ihren Abonnenten vorführen.

(Flore des serres tab. 1269—70.)

Aucuba himalaica *Hook. fil. et Thom.*

Jedermann kennt die Acuuba japonica, von der nach Aussagen der genannten Autoren sich die A. himalaica kaum unterscheidet; dennoch ist sie ohne Zweifel eine bestimmte Art. Die Flore des serres widmet dieser Pflanze im XII. Bde. Liv. X. pag. 169 eine lange Abhandlung und bringt zugleich auf tab. 1271 eine Abbildung, auf die wir verweisen.

Torenia pulcheriana.

Die Herren John und Charles Lee, Handelsgärtner zum Hammersmith bei London zeigen an, daß sie diese herrliche Torenia, die so allgemeines Aufsehen erregt hat, jetzt hinlänglich in Vermehrung haben, um sie in den Handel geben zu können. Abgebildet ist diese schöne Pflanze in dem December-Hefte von Henderson's „Illustrated Bouquet" und ist sie unstreitig die schönste Torenia unter allen bekannten Arten.

Lindley sagt von dieser Pflanze (Gard. Chron., Octobr.) „eine herrliche Varietät, die Röhre der Blumen, wie das Auge ist intensiv purpur violett, die beiden Seitenlappen sind von derselben Färbung, nach dem Rande zu in rein violett übergehend, der untere Lappen ist weiß, mit einem purpurn Fleck an der Spitze."

Preis einer Pflanze bei Herren Lee 3 ℳ.

Alstroemeria argenteo-vittata *Lem.*

Eine ganz vorzüglich hübsche, empfehlenswerthe Pflanze, wie es bekanntlich die Mehrzahl der Arten der Gattung Alstroemeria ist. Hr. A. Verschaffelt in Gent erhielt diese Pflanze im Jahre 1851 von Herrn Pinel in Brasilien.

Es ist eine sehr bestimmte Art, deren Blätter in der Mitte einen breiten weißen Streifen haben, neben dem sich nach den Rändern der Blätter zu noch mehrere feine weiße Streifen befinden. Die Blumen sind orangegelb mit hellgelber Zeichnung im Schlunde. (Abgebildet: Illustr. hortic. VI. tab. 192.)

Cattleya pumila *Hook. var.* major *Lem.*

(Cattleya marginata Pinel, C. Pinelli Hort.)

Diese allerliebste auf Taf. 193 der Illustr. Hortic. abgebildete Cattleya pumila v. major, ist, wie auch Herr Professor Lemaire bemerkt die Laelia pumila Bchb. fil. v. major Lem. Lemaire spricht sich jedoch im Texte zu dieser Abbildung entschieden für das Beibehalten der Gattung Cattleya aus, daher er auch diese Art als Cattleya abbildete.

Zuerst wurde diese Orchidee von Herrn Ch. Pinel in Brasilien entdeckt, der sie unter dem Namen Cattleya marginata (im Jahre 1842 oder 1843) an Herrn Morel in Paris einsandte. Im Jahre 1855

erhielt Herr Amb. Verschaffelt in Gent, von demselben Reisenden gleichfalls eine Anzahl Exemplare eingesandt, bei dem sie auch blühte.

Epacris miniata *var.* splendens.

Eine sehr hübsche Varietät des Epacris miniata, die in England aus Samen gewonnen worden ist und noch brillanter ist als die Mutter. Die Blumen sind größer und noch lebhafter gefärbt und gleichen mehr denen des Epacris grandiflora, so daß man annehmen darf, die Pflanze sei eine Varietät zwischen E. miniata und grandiflora. Abgebildet: Illustr. Hortic. tab. 94.)

Lychnis Haageana (*Hybride*) *Hort.*

Ein Bastard zwischen der Lychnis fulgens Fisch. und L. Sieboldi Van Houtt., die Herr E. Benary in Erfurt aus Samen gewonnen und Herrn Haage jun. zu Ehren benannt hat. Die großen Blumen sind von einem ungemein brennenden Zinnoberroth. Die Pflanze gedeiht sehr gut im Freien, sie ist jedoch sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit, namentlich während des Winters, daher man sie an einem trocknen Orte überwintern muß. (Illustr. hortic. tab. 195.)

Gireoudia Ottoniana *Rgl.*

So benannte Dr. Regel eine schöne Begonia, die der k. botanische Garten zu Petersburg als B. conchaefolia aus dem hamburger bot. Garten erhalten hatte. Herr Dr. Regel bemerkt bei Erwähnung dieser Pflanze in der „Gartenflora," Januar 1859 S. 15, daß sie der G. conchifolia Kl. sehr nahe stehe und meint sie sei wahrscheinlich ein Bastard zwischen dieser und Mitscherlichia coriacea Kl. Während aber conchifolia Kl. allenthalben roth zottig behaart ist, 1½—4 Zoll lange Blattstiele besitzt, welche fast ganzrandige, 7 nervige, oberhalb mit langen schwachen Haaren besetzte Blätter tragen, — so besitzt die G. Ottoniana nur eine kurze lose rostbraune Behaarung, die Blattstiele werden bis 9 Zoll lang, sind roth und die Blätter deutlich buchtig gezähnt, oberhalb glänzend, mit einzelnen undeutlichen Härchen bekleidet und außerdem von 8—9 Nerven durchzogen, Vielleicht gehört diese Pflanze mit der Form zusammen, die Klotzsch Beg. pag. 97 als G. conchifolia β. Warscewicziana aufführt. Eine sehr schöne stammlose Art mit kriechendem Rhizom, schildförmigen rundlich-ovalen, schiefen, kurzgespitzten Blättern und wurzelständigen Blüthenstielen, die die reichblumigen Afterdolden rosarother Blumen tragen.

So sehr ich nun auch Herrn Dr. Regel danke, daß er dieser Pflanze meinen Namen beigelegt hat, so wird dieser Name doch wohl nicht beibehalten werden, denn die von hier abgegebene Pflanze ist ein Abkömmling von der Begonia conchaefolia, unterm 16. August 1851 von Otto & Dietrich in der Allgem. Gartenzeitung, IXX. p. 257, schon ausführlich beschrieben. Bei Aufzählung der von Klotzsch aufgestellten neuen Gattungen der Begoniaceen führt Dr. Dietrich die von ihm beschriebene Begonia conchaefolia Otto & Dietr. als Synonym zu

Gireoudia conchaefolia Kl. Allgem. Gartenzeitung XXII. (1854) p. 127 auf.

Die Samen, aus denen diese zierliche, von mir öfters empfohlene Pflanze gezogen wurde, sammelte Herr Warczewicz auf seiner Reise in Central-Amerika in der Provinz Costa-Rica und in den Chiriqui Cordilleren und vertheilte sie 1856 an mehrere Berliner Gärtner unter der falschen Benennung B. Lindleyana (ein Versehen Warscewicz selbst, da W. seine B. Lindleyana als eine der prächtigsten großblumigsten Arten bezeichnete, während B. conchaefolia nur sehr kleine Blumen hat.)

Die an den bot. Garten in Petersburg gesandte Pflanze dürfte mit der von Otto & Dietrich in genannter Zeitschrift gegebenen Beschreibung vollkommen passen, mithin der Pflanze auch nur der Species-Name „conchaefolia" gebühren. Sollte Klotzsch auch eine Begonia oder Gireoudia conchifolia genannt haben, so ist dies jedenfalls später geschehen als 1851 und wäre dann dessen Name einzuziehen. — Auch möchte ich mir noch zu bemerken erlauben, daß es bereits eine Begonia Ottonis Walp. giebt und daher diese ziemlich gleiche Benennung zweier Arten einer Gattung leicht Irrung geben könnte, besonders bei denjenigen Gärtnern und Pflanzenfreunden, welche die Klotzsch'en Gattungen der Begoniaceae nicht angenommen haben. E. O—o.

Fuchsia simplicicaulis *R. et P.*

Sir W. Hooker bemerkt bei Erwähnung dieser hübschen Fuchsie im Bot. Mag. tab. 5096, daß die Gattung Fuchsia eine beträchtliche Anzahl Arten aufweise, daß aber deren Bestimmung ziemlich schwierig sei, in Folge der großen Aehnlichkeit dieser Pflanzen unter sich, in ihrem Blüthenstande, in der Größe und Form der Blumen, wie in Folge der kurzen und unvollständigen Beschreibungen. Die F. simplicicaulis ist eine der vielen prächtigen Arten Peru's, neu für unsere Gärten, die Herr W. Lobb an die Herren Veitch und Sohn zu Exeter eingesandt hat und wohl die F. simplicicaulis von Ruiz u. Pavon sein dürfte, obschon einige getrocknete Originalexemplare sehr an die Fuchsia venusta Hbd. & Kth. erinnern.

Die Abbildung im Bot. Magazine ist nach einer Pflanze gemacht, die im Herbste 1858 im Garten der Herren Veitch blühte, — Eine sehr empfehlenswerthe Art! —

Agave Jacquiniana *Schult.*

(Agave lurida Jacq.)

Die ächte Agave lurida des Hort. Kew., ed. I. v. 1. p. 472 u. Ed. II. v. II. p. 302 ist nach der Original-Pflanze im Kew-Garten (nun eingegangen) von Gawler beschrieben und abgebildet (Bot. Mag, tab. 1522). Dieses ist die ächte Agave Vera-Cruz Miller, Gard. Dict. Ed. 8. No. 7. und Gawler hat genau auf die Unterschiede zwischen dieser und der Agave lurida Jacq. hingewiesen. — Bei der ächten A. lurida stehen die Blumen locker und entfernt, und sind zweimal so groß als die der A. Jacquiniana. Die Blumenröhre (mit dem Ovarium)

ist gestreckt-cylindrisch, zugespitzt, concav. Die Staubfäden sind ganz aufrecht stehend, grün gefärbt wie die Antheren. — Agave Jacquiniana hat dicht gedrängt stehende Blumen, deren Ovarium sechsrillig ist, kürzer als die Sepalen, letztere ganz gerade stehend, fast gegeneinandergebogen. Staubfäden gespreizt stehend, gelb.

Der Garten zu Kew erhielt die Agave Jacquiniana, die im Herbste 1858 in dem prächtigen Palmhause des genannten Gartens zur Blüthe kam, vor etwa 12 Jahren von Honduras. Die Pflanze hat einen etwa 1½ Fuß hohen Stamm. Die an der Spitze desselben befindlichen Blätter sind 2½—3 Fuß lang, schmal lanzettlich, stachelspitzig.

(Bot. Mag. tab. 5097.)

Hibiscus radiatus *Cav.* β fl. purpureo.

Bereits 1780 beschrieb Cavanilles den Hibiscus radiatus, der im gewöhnlichen Zustand meist schwefelfarbige Blumen hat. Das Vaterland dieser Pflanze ist nach Aiton Ostindien. Roxburgh schreibt: Vaterland unbekannt, sehr häufig in den Gärten bei Calcutta. In Dr. Arnott's Herbar befindet sich ein Exemplar dieser Art aus Jamaica und ohne Zweifel stammt diese Pflanze auch aus Westindien, von wo Sir W. Hooker zu öftern Exemplaren erhalten hat. — Die auf Taf. 5098 des Bot. Mag. abgebildete Pflanze ist eine Form mit sehr schön purpurrothen Blumen. — Eine hübsche Pflanze für die Warmhäuser.

Dasylirium Hartwegianum *Zucc.*

(Cordyline longifolia Benth.)

Asparagineae.

Diese schöne Art blühte unlängst im Garten zu Kew und giebt das Bot. Mag. tab. 5099 eine genaue Beschreibung und Abbildung derselben, auf die wir die vielen Verehrer dieser hübschen Pflanzengruppe aufmerksam machen.

Aus einem Privatgarten in Hildesheim erhielten wir im Herbste v. J. einen Blüthenzweig und Blatt einer Dasylirium-Art, die wir nach der Beschreibung als das D. Hartwegianum erkannt zu haben glauben.

Phyllocactus anguliger *Lem.*

Cacteae.

Ein sehr hübscher Cactus mit großen weißen, duftenden Blumen. In Folge der zahlreichen Lappen an den blattähnlichen Stämmen, von denen viele fast regelmäßige Dreiecke bilden, benannte Lemaire diese Art Anguliger, deren Vaterland das westliche Mexico ist.

Vaccinium serpens *Wight.*

(Pentapterygium serpens Kl.)

Es ist dies eine der schönsten Arten der Gattung Vaccinium. Sie wurde zuerst von Griffith in Bhotan und später in reichlicher Menge

von Dr. Thomson in Sikkim gefunden, auf den Stämmen von Bäumen paraſitiſch wachſend, etwa 3—7000 Fuß über die Meeresfläche. — Obgleich ſich dieſe Pflanze in mehreren europäiſchen Gärten lebend befindet, ſo hat ſie bis jetzt doch noch in keiner Sammlung geblüht und die in der Illustrat. Horticole tab. 196 gegebene Abbildung iſt nach der Abbildung im Hook. fil. et Thoms. Illustr. of Himal. Plants Pl. XV. B. angefertigt. — Die Blumen dieſer Art ſind faſt 2 Zoll lang, carminroth und vor dem Oeffnen gelblichroth, in großer Anzahl an den Spitzen der ſchlanken Zweige herabhängend. Eine allerliebſte Pflanze.

Tydaea hybrida 1) Princesse Troubetzkoy
„ „ 2) Grandis
„ „ 3) sanguinea.

Abermals drei neue Hybriden der Gattung Tydaea, welche im Etabliſſement des Herrn A. Verſchaffelt in Gent erzogen worden ſind und die den bereits bekannten herrlichen Hybriden ebenbürtig zur Seite geſtellt werden können, namentlich iſt No. 3 wegen der bluthrothen Färbung ſehr zu empfehlen. Abgebildet ſind dieſe Formen auf Taf. 198 der Illustr. Hortic.

Acer polymorphum palmatum atropurpureum.

(Acer japonicum atrosang. Sieb.)

Nichts übertrifft in den japaniſchen Gärten die Schönheit dieſes Baumes, ſchreibt Herr Dr. von Siebold an Herrn Van Houtte. Der Baum, oder beſſer Strauch, erreicht in ſeinem Vaterlande eine Höhe von 10—15 Fuß und in der Mitte von Rhododendron, Azaleen und anderen Pflanzen angebracht, zieht er in Folge der dunkelblutrothen Färbung ſeiner Blätter und Stengel die Aufmerkſamkeit aller Beſucher auf ſich. — Herr Van Houtte bemerkt, daß dieſer Zierſtrauch eine der beſten Einführungen von Siebold's und eine unſchätzbare Acquiſition für unſere Gärten iſt. Der Baum liebt eine etwas ſchwere Erde und läßt er ſich durch Stecklinge, wie durch Propfen vermehren. (Abgebildet: Flore des serres tab. 1273) — Im neueſten Verzeichniß der Herren James Booth & Söhne finden wir dieſen Ahorn als A. japonicum atropurpureum zum Preiſe von 8 ℳ notirt. Die Redact. —

Rhododendron (*hybrid. max.*) Othello.

Vermuthlich ſtammt dieſe Hybride von Herrn Rinz in Frankfurt a. M. Sie iſt eine ſehr ſchätzbare Form, indem ſie durch ihre violettblutroth gefärbten Blumen von vielen andern Hybriden hervorleuchtet und ſehr gut im Freien aushält. Taf. 1274 der flore des serres giebt eine Abbildung dieſes Rhododendron.

Camellia *jap.* Princess Frederik William.

Eine der neueſten Einführungen des Herrn Fortune aus China, die Herr Glendinning zuerſt im „Floriſt“ abbilden ließ, und nach-

dem Herr Van Houtte im Besitze dieser Pflanze gekommen ist, giebt er auch in seiner vortrefflichen Flore des serres tab. 1277 eine Abbildung dieser lieblichen Camellie.

Coelogyne cristata *Lindl.*

Eine sehr getreue Abbildung dieser sehr empfehlenswerthen im Winter blühenden Orchidee liefert die „Gartenflora“ auf Taf. 245. Obgleich dies keine neue und seltene Art mehr ist, so ist sie doch bisher viel zu wenig beachtet worden und verdient die allgemeinste Verbreitung.

Hoya macrophylla *Bl.*

Fast sämmtliche Arten dieser Gattung zeichnen sich durch die Zartheit ihrer wachsartigen Blumen aus, unstreitig aber gehört diese Art zu den schönsten, die der bot. Garten zu Leiden im Frühjahr 1858 aus Java erhalten hat. Die Pflanze zeichnet sich vor allen andern bekannten Arten durch ihre großen, auf der obern Fläche stark geaderten Blätter aus, der allgemeine Blüthenstengel, wie die der einzelnen Blumen sind carmoisinroth, die Blumen klein, zart weiß, in großen Dolden beisammenstehend. Eine sehr schätzbare Acquisition (Abgebildet: Flore des jard. du Royaume des Plays-Bas II. 9. Livr.)

Areca pumila *Mart.*

(Areca Nenga Bl., Pinanga Nenga Bl.)

Palmae.

Eine sehr hübsche Palme und in den Sammlungen auch nicht mehr selten. Sie verlangt ein sehr heißes und feuchtes Warmhaus, indem im andern Falle ihre schönen saftgrünen Blätter leicht eine gelbe Färbung annehmen. Am besten gedeiht diese Palme in einem Orchideenhause, wo sie eine große Zierde ist. Abgebildet: Flore des jard. du Roy. des Pays-Bas, II. 10 Livr.

Callicarpa purpurea *Juss.*

In Gard. Chronicle pag. 96 ist die oben genannte Pflanze unter der Rubrik: „Neue Pflanzen“ nicht nur abgebildet, sondern auch besprochen, und heißt es daselbst: „Keine Pflanze erregte auf der letzten Herbstausstellung der Horticultural-Society in St. James Hall mehr die Aufmerksamkeit der Besucher als ein kleiner Strauch von Herrn Standish in Bagshot, beladen mit den schönsten dunkel violett scheinenden Beeren. Wenige hatten die Art vorher gesehen oder wußten, welche von den Callicarpa es sei, weil sie nie die Frucht hervorgebracht hatte, wovon sie ihren Namen erhalten hat. Doch herrscht auch noch bei uns Zweifel, ob die gewählte Bezeichnung die richtige ist, da wir nicht die Blumen gesehen haben. Die Form der Blätter, sowie die Stellung der Beerenhaufen, stimmt sehr gut mit der Diagnose von C. purpurea Juss. Ann. Mus. 7. 69. Schauer in DC. XI., pag. 645., aber die Behaarung der Pflanze ist die von C. rubella, einer ganz

anderen Art. Vielleicht könnte auch die oben genannte Pflanze ein Zustand von C. purpurea, die Porphyra dichotoma des Loureiro sein, da gewißlich auch die Callicarpa hinsichtlich der Behaarung zu verschiedenen Zeiten ihres Wachsthums und unter verschiedenen Umständen variiren. Noch liegt die Vermuthung nahe, daß die Pflanze den Namen C. lasiantha führen müßte. Gewiß ist sie aber ein sehr interessanter kleiner Strauch für's Kalthaus, welcher aus China, wahrscheinlich durch Fortune gebracht worden ist. Was den Strauch so sehr empfehlenswerth macht, ist, daß seine Beeren ihre Farbe noch lange nach Weihnacht haben." F. W. Klatt.

(Obige sehr empfehlenswerthe Pflanze ist bei den Herren P. Smith & Co. in Bergedorf zu 8 ℳ zu erhalten. D. Redact.)

Magnolia Campbellii *Hook. et Thom.*

Eine ganz vorzüglich schöne Art von Dr. Griffith in Boston entdeckt. Man findet diesen Baum auch auf der äußern Gebirgskette von Sikkim in einer Höhe von 8—10,000 Fuß. Seltener findet man ihn auf der mittleren Gebirgskette. Der Stamm des Baumes ist gerade, mit einer schwarzen Rinde bedeckt und erreicht eine Höhe von 80 Fuß (engl. Maaß) mit einem Umfang von 12—18 Fuß. Das Holz ist zart und ohne Nutzen. Im April Monat ist der Baum bedeckt mit unzähligen Blumen, die besonders an den Spitzen der Zweige sitzen und ehe der Baum seine Blätter getrieben hat. Die Blumen, wenig duftend, variiren in ihrer Färbung von weiß, dunkelrosa bis in tief Purpur und haben einen Durchmesser von 8—10 Zoll.

Viel Aufsehen erregte die von Herrn Topf in Erfurt gezüchtete Magnolia Lenné durch ihre prächtig gefärbten Blüthen, die jedoch von dieser M. Campellii noch bedeutend an Pracht übertroffen wird.

Die berühmten Naturforscher und Botaniker Hooker fil. u. Thomson haben außer dieser Magnolia noch zwei andere nicht minder schöne entdeckt, nämlich M. globosa Hook. fil. et Thom. u. M. sphenocarpa Roxb., letztere nur in Chittagong, auf den Gebirgen von Khasia und Nepal heimisch.

(Nach Flore des serres tab. 1282—85.)

Delphinium Pompon de Tirlemot.

Delphinium elatum fl. pl. var.

Herr L. Van Houtte hatte die ganze Edition dieser schönen Pflanze von Herrn Millet de Tirlemont an sich gebracht und giebt davon kräftige Exemplare ab. Es ist eine sehr schöne Varietät mit gefüllten Blumen von D. elatum und hält im freien Lande gut aus. Abgebildet in der Flore des serres tab. 1287.

Frucht- und Gemüse-Garten.

Neue Erdbeeren.

Herr Ferd. Gloede zu Salons près et par Moret-sür-Loing. (Seine et Marne) beſitzt, wie wir bereits früher zu bemerken Gelegenheit hatten, eine der größten Erdbeerſammlungen. Folgende ſind die neuen Sorten, die Herr Gloede in dieſem Frühjahre zum Erſtenmale in den Handel bringt:

Bonté de St. Julien (Carré), eine Varietät von großen Vorzügen, ſie iſt äußerſt fruchtbar, die Früchte ſchön, mittelgroß, frühzeitig reifend. Das Dutzend 12 Fr.

La Constante (de Jonghe), nach allen Berichten als eine vorzügliche Frucht empfohlen. Die Frucht groß, ſchön geformt, Farbe lebhaft roth, glaſirt, die Samen hervorſtehend, das Fleiſch weiß, ſehr feſt, der Geſchmack zuckerig und parfümirt, früh reifend. Die Pflanze niedrig, üppig und ſehr fruchtbar.

Nach mehrjähriger Beobachtung wächſt dieſe Erdbeere in jedem Boden gleich gut und entſpricht völlig dem ihr gegebenen Namen. Preis: das Dutzend 15 Fr.

Elisa Champin (Jamin et Durand), eine ſehr gute Varietät, längliche Form, rothgefärbt, das Fleiſch weiß, feſt und wohlriechend. Sehr fruchtbar. Dutzend 12 Fr.

Helene Jamin (Jam. et Dur.), eine andere ſehr intereſſante Varietät. Dutzend 12 Fr.

Impératrice Eugenie (Gauthier), eine ſehr zu empfehlende Varietät. Die Pflanze fruchtbar und üppig wachſend; die Frucht groß von coniſcher Form, Farbe lebhaft roſa, Fleiſch weiß, ſehr zart und parfümirt. Einzelne Pflanze 1 Fr. 50 C.

May Queen (Nicholson), eine der merkwürdigſten Früchte, die ſeit langer Zeit unter den Erdbeeren gewonnen worden iſt, namentlich in Bezug auf die frühzeitige Reife und Feinheit des Geſchmacks der Früchte. Dieſe Erdbeere reifte ſeit 2 Jahren ihre Früchte gegen den 28. Mai im Norden von England, ohne daß die Pflanzen im geringſten geſchützt geweſen ſind, 12 Tage früher als die Black Prince-Erdbeere, die der May Queen in jeder Beziehung nachſteht. Dieſe Frucht läßt ſich gut treiben und erfordert zu dieſem Zwecke nur 4zöllige Töpfe. Das Dutzend Pflanzen in kleinen Töpfen 15 Fr.

Souvenir d'Emilie (Jam. et Dur.) Früchte ſehr groß, Stengel biegſam, Fleiſch fein, erſter Qualität. Sehr fruchtbar und frühzeitig. Dutzend Pflanzen 12 Fr.

Wonderfull (Jeyes), die Pflanze niedrig, dennoch Früchte in unzähliger Menge erzeugend, die von ſehr guter Qualität ſind und 8 Tage nach denen der British Queen reifen. Das Dutzend 15 Fr.

Chili Orange, eine ſchon alte Art, die jedoch faſt ganz aus den Sammlungen verloren gegangen iſt. Die Pflanze iſt ſehr kräftig wachſend und fruchtbar, Früchte groß und abgerundet, die Farbe lebhaft orangeroth, das Fleiſch gelblich, ſehr zuckerig und parfümirt; es iſt die beſte chiliſche Sorte. Die Pflanze 1 Fr.

Barr's, Scotia, Coronation, Psyché, Unique Scarlet sind Varietäten die unlängst aus Nordamerika eingeführt wurden und sich durch frühzeitige Reife, große Fruchtbarkeit und Güte der Früchte auszeichnen. Die Früchte sind jedoch nur von mittler Größe. Das Dutzend 6 Fr.

Lucie, Souvenier de Nantes (Roisselot), zwei Varietäten von Nantes aus der Chilischen Art erzogen. Sie empfehlen sich durch Fruchtbarkeit und Ausdauer. Preis 1 Fr. pr. Stück.

Ananas de Bretagne, eine sehr kräftig wachsende Varietät oder Art und zugleich fruchtbar. Die Frucht groß, verschieden geformt, Farbe blaßrosa, Fleisch gelblich, sehr fest und äußerst angenehm schmeckend. Dutzend 5 Fr.

Außer diesen hier genannten neuesten empfehlenswerthen Erdbeersorten führt Herr Gloede in seinem neuesten Catalog noch gegen 160 neuere und ältere Arten und Sorten auf. Freunden dieser herrlichen Frucht ist die Redaction dieser Zeitschrift gern bereit, den ihr zugegangenen Catalog des Herrn Gloede zur Einsicht und Auswahl zuzusenden.

Darf man Coniferen mit Dung behandeln.

Von Naudin.

(Nach der Flore des serres, übers. v. H. Roese, Hofgärtner in Eutin.)

Diese Frage richtete ein Abonnent des „Gardeners Chronicle (vom 13. Novbr. 1857) an Dr. Lindley. „Ist es wahr, sagt er, daß der Dünger den Coniferen schädlich ist, wie Sie es letzt behauptet haben (Gard. Chron. 26. September 1857) oder folgen wir Alle darin nur einem abgeschmackten Vorurtheil? Ich habe lange genug gelebt und Erfahrungen genug gewonnen, um zu wissen, daß in vielen Fällen die Befürchtungen, die wir, gegenüber gewissen Boden- oder Dünger-Arten, empfanden, rein eingebildet sind, und ich wage es auszusprechen, daß gerade das Düngen des Bodens, in den Coniferen verpflanzt werden sollen, hierher gehört. Vor mehr denn 20 Jahren, ich erinnere mich dessen genau, ließ mich Dr. Knight an einem, von Erfolg gekrönten Versuche Antheil nehmen, welcher darin bestand, daß er Haiden mit einer flüssigen Auflösung von Taubenmist begoß; ein Dünger der damals für so scharf galt, daß man ihn nur nach 2—2jähriger Aufbewahrung anwandte, d. h. also nachdem er alle seine befruchtende Kraft verloren hatte.

Und wie denkt man heute hierüber? Fragen Sie alle großen Kultivateurs London's, die Dood's, Green's, Taylor's, und sie werden Ihnen sagen, daß sie den größten Vortheil darin finden, Haiden, und die übrigen Ericeen mit einer Guano-Auflösung zu begießen, einem Dünger, der noch viel kräftiger, als Taubenmist ist; sie werden

Ihnen zeigen, daß gerade der Guano es ist, dem sie so merkwürdige Kultur-Erfolge verdanken. In der That kenne ich keine Ausnahme von dieser Regel und weiß, daß alle Pflanzen sich bei dieser flüssigen Düngung wohl befinden, vorausgesetzt, daß man sie in richtigem Maaße, und zu passender Zeit anwendet; ebenso kann man sich während zwei Drittheile des Jahres ohne Sorge desselben bedienen. 15 Jahre lang war ich gezwungen, zum Begießen sehr hartes Wasser zu verwenden, und zwar meist aus einem Ziehbrunnen, wo es sehr kalt war; ich trug daher Sorge, es mit einer gewissen Menge Dungwasser zu vermischen. Nur selten habe ich mich in diesen 15 Jahren reinen Wassers bedient und fast immer zum täglichen Begießen dies mit Dung versetzte Wasser gebraucht, ohne jemals Ursache gehabt zu haben, es zu bereuen.

Während dieses Zeitraumes habe ich alle Mode-Pflanzen kultivirt, und hauptsächlich solche an großen Sortimenten, wie Ericen und andere hartholzige Pflanzen, Farrn, Orchideen, annuelle Pflanzen, Fruchtbäume u. s. w. und ich kann versichern, daß ich nicht eine einzige gefunden habe, die vom Gebrauch des flüssigen Düngers gelitten hätte. Im Gegentheil habe ich gefunden, daß die Farrn und Lycopodien, so wie die Orchideen: Dendrobien, Stanhopaea, Cattleya, Aërides, Saccolabium sich dabei sehr wohl befanden; starke Ericen-Pflanzen, die in sehr engen Töpfen standen, feine Azaleen wie die lateritia variegata und viele ähnliche Pflanzen ertragen einen Guß von aufgelöstem Guano sehr gut. Aber welchen Bezug hat dies Alles auf die Coniferen, werden Sie fragen? Ich könnte auf diese Frage mit einer andern antworten: Worin weicht die Organisation der Coniferen, von der anderer Pflanzen ab? Sie werden mir ohne Zweifel sagen, daß die Coniferen den alpinen (steinigen leichten) Boden besonders lieben, daß wenigstens einige, wenn nicht alle zwischen Felsen, auf den Abdrehungen der Schluchten, am besten gedeihen, wo wenige andere Bäume wachsen, und wo sie sich vom Winde schütteln lassen und den Stürmen trotzen können. Alles dies ist wahr, aber eben so wahr ist, daß andere niedrig gelegene feuchte, ja sumpfige Orte vorziehen und ich nenne Ihnen, um nur ein Beispiel anzuführen, den Riesen der Familie die Wellingtonia gigantea (Sequoia). Alle diese Pflanzen gewöhnen sich so weit ich mich in einer langjährigen Praxis davon habe überzeugen können, sehr leicht an einen fruchtbaren Boden. Ebenso gut, wie zwischen Felsen und Gestein, wo kaum etwas vegetabilische Erde sich befindet, können sie auch in einem tieferen leichteren und durch verrottetes Laub oder verwesten Kuhdünger gedüngten Boden gedeihen. Die praktische Erfahrung lehrt täglich, daß nichts ihnen besser zusagt, als das Begießen mit einem leichten Dungaufguß. Befragen Sie über diesen Gegenstand die Baumschulenbesitzer von Bagshot, und Sie werden erfahren, ob Sie sich scheuen, für ihre Samenbeete sich des Düngers zu bedienen; sie wissen sehr wohl, daß sie ohne Dünger bald nicht mehr im Stande sein würden, ihren Kunden diese Millionen junger Pflanzen anzubieten, deren herrliches Grün von aller Welt gerühmt wird. Wenn Sie sich vorgenommen haben, ein Stück Land zur Kultur von Coniferen zu verwenden, so verfahren Sie folgendermaßen; statt es sogleich zu bepflanzen, düngen Sie es zuerst sehr stark und besäen es mit Rübchen oder Runkelrüben, und

wenn deren Erndte eingebracht, ist der Boden ganz vorzüglich vorbereitet um Rosen, Birnen und Coniferen aufzunehmen. Ich habe aus Bagshot amerikanische Tannen empfangen, deren Wurzeln ganz in halbverwes'tem Kuhdünger eingehüllt waren, denn diesem giebt Mr. Standish den Vorzug und ich selbst habe öfter davon Gebrauch gemacht, zum großen Vortheil der verschiedenen, damit kultivirten Bäumen. *)

Uebrigens ist nichts eigenthümlicher als die Launen mancher Pflanzen, in Bezug auf den Dünger. Mischt man z. B. eine Hand voll Kuhdünger auf einen Topf unter die Erde, in welche man Eriken und Epacris pflanzen will, so werden von 1000 dieser Pflanzen 999 ausgehen; thut man dagegen den Dünger in Wasser und benutzt dieses so entstehende Dungwasser zum Begießen, so wird man überrascht von der Ueppigkeit, die er bei denselben Pflanzen hervorbringt. Woran liegt das? Wahrscheinlich daran, daß der Gebrauch des Düngers auf mechanischem Wege den Pflanzen schadet, während die Wirkung auf chemischem Wege (das Auslaugen in Wasser) ihnen vortheilhaft ist. Man hat wohl bisher diese Unterschiede nicht zu machen verstanden, sonst würde man nicht fast überall noch wiederholt behaupten, daß der Dünger bei Coniferen nicht anwendbar sei, weil man so ungeschickt war, die Wurzeln dieser Bäume entweder mit einem zu scharfen Dünger, der sie zerfraß, oder mit einem zu festen zu umgeben, der sie erstickte, so schloß man unverzüglich, daß der Dünger im Allgemeinen ihnen schädlich sei; wäre man dem Vorgange der Baumschulenbesitzer von Bagshot gefolgt und hätte, statt den Dünger in fester Form anzuwenden, seine befruchtenden Bestandtheile durch Begießen ihnen mitgetheilt, so wäre der Erfolg gewiß ein ganz anderer gewesen.

Wenn ich diese Beobachtungen in der Absicht ausgesprochen habe, das, was ich als einen Irrthum erkenne zu bekämpfen, so erwarte ich, daß man den Sinn meiner Worte nicht mißverstehe, und nicht mehr herauslese als was ich wirklich damit sagen will. Zum Beispiel darf man sich nach Obigem nicht erlauben, kranke oder schwächliche Coniferen mit der Dosis Dünger zu behandeln, die man auf ein Spargel- oder Kohlstück verwenden würde. Viele Harzbäume gedeihen in den Baumschulen und anderswo nur in viel zu kleinen Töpfen, oder wenn sie gegen alle Regeln der Vernunft gepflanzt sind, oder wenn die Erde, in welche sie ihre Wurzeln versenken, so ausgesogen ist, daß sie fast darin verschmachten. In diesen verschiedenen Fällen gieße man von April bis October ein Mal in der Woche mit schwachem Dungwasser, und man wird im nächsten Jahre das Gute dieses Raths erkennen. Wenn es zu beschaffen möglich, würde ein um den Fuß der Bäume

*) Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dem hinzufügen, daß sich große Cypressen von 16—18' Höhe und entsprechendem Umfang, die sich in hiesiger Gärtnerei befinden, bei öfterer Wiederholung des Begießens mit Dungwasser ausgezeichnet wohl befinden. Dieselben stehen in, für ihre Größe etwas engen Kübeln, und würden wohl ohne Dunger schwerlich das frische dunkle Grün zeigen, dessen sie sich jetzt erfreuen. Auch kleine Coniferen in Töpfen pflege ich im Laufe des Sommers 12—20 Mal mit einem aus Kuhdünger, Hühner-, Taubenmist und Hornspähnen bereiteten Dungmasse begießen zu lassen und kann nur den besten Erfolg davon sehen. Anmerk. d. Uebersetzers.

gelegter Haufen von gut verrottetem Kuh- oder Pferdedünger ebenfalls von kräftiger Wirkung ſein. Man bilde ſich nicht mehr ein, daß die Coniferen von der allgemeinen Regel eine Ausnahme machen; ſie lieben wie andere Pflanzen einen drainirten, lockeren Boden, in den Luft und Feuchtigkeit eindringen können, dem man, wenn er von Natur mager iſt, durch künſtliche Mittel Dünger zuſetzen muß. Das ganze Geheimniß eines guten Erfolges beſteht darin, die zu verwendenden Mengen nicht zu übertreiben und ſich zu hüten, einen zu friſchen, ſcharfen oder zu feſten Dünger mit den Wurzeln in unmittelbarer Berührung zu bringen.

Madagascar - Orchideen.

(Aus Ellis's Madagascar, nach Gardener's Chronicle überſetzt von F. W. Klatt.)

Orchideen fanden ſich überall reichlich und nahmen Plätze ein, wo die Kultivateure dieſer Pflanzen in Europa ſie zu finden nicht erwarten möchten, wodurch aber der Landſchaft ein ihr eigenthümlicher Reiz verliehen wurde. Die Limodorum's waren an den Wegen häufig und zeigten am Grunde der Knollen ganze Knäuel von verflochtenen Wurzeln. Eine kleine Art, in der Tracht und im Wuchs der Camarotis purpurea ähnlich, aber mir ganz unbekannt, trug eine große Menge gelbgefleckter Blätter und belebte oft die Seiten des Weges, an dem wir entlang gingen. Beide Angraecum's, A. superbum und A. sesquipedale, waren häufig und ſchön. Ich bemerkte, daß ſie am üppigſten auf Bäumen mit dem dünnſten Laube wuchſen und daß A. sesquipedale ſelten unten geſehen wurde, ſondern hoch oben zwiſchen den Zweigen wuchs, indem ſie weitſchweifende Stengel ausſandte, die in ſchmale und ſcheinbar krauſe Blätter endigten. Die Wurzeln waren ſelten äſtig oder ſich theilend, ſondern lang, einfach, zähe und liefen an dem Stamm oder dem Zweige eines Baumes in den Riſſen der rauhen Rinde bis zu der Ausdehnung von 12—15 Fuß hernieder, wobei es beträchtliche Kraft erforderte ſie zu entfernen oder loszureißen. Viele von ihnen waren in Blüthe und ungeachtet der ſcheinbaren Kleinheit der krauſen Blätter, waren die Blüthen groß und die gelbe Farbe recht bemerkbar. Bei mehr als einer Gelegenheit ſah ich ein köſtliches Angraecum sesquipedale auf dem Stamm eines gefällten oder gefallenen Baumes wachſen, wobei es ſeine zähen Wurzeln nach den feuchteren Theilen der Pflanzenwelt des Bodens hernieder ſandte. Ich fand einen gefallenen Baum, welcher am Boden lag, faſt ganz mit Gras und Farnkräuter überwachſen, auf deſſen modernden Stamm die A. sesquipedale am üppigſten wuchs. Die Wurzeln, welche den weichen Stamm dieſes todten Baumes durchdrungen hatten, waren weiß und fleiſchig, während die Blätter länger, ſanft und grün waren, doch waren weder Blüthen

noch Blüthenstiele an irgend einer der Pflanzen, welche in der reichen vegetabilischen Erde wuchsen, die ihnen dieser alte todte Baum lieferte. Die Gewohnheiten des A. superbum waren ganz anders. Bei dieser bildeten die fleischigen Wurzeln am Grunde der Knollen eine Art Netzwerk. Während der Reise bemerkte ich gelegentlich beide Arten nicht nur auf den Zweigen lebender Bäume, sondern sehr oft hoch auf den entrindeten Stämmen der todten Bäume. Oft wächst in dem Winkel, wo sich ein Ast mit dem Stamme eines großen nackten Baumes, dem Anschein nach ohne eine Spur von Rinde, vereinigt, ein Haufe Moos oder ein Büschel Orchideen oder beides mit einander gemischt, sichtlich mit großer Kraft und oft in voller Blüthe. Mehr als ein nackter Stamm, 12—18 Zoll im Durchmesser und 30 Fuß hoch, stand überragt oder nahe seinem Gipfel durch einen Büschel Angraecum's mit ihren langen, schwertgleichen, fleischigen Blättern umgeben oder was noch schöner war, mit einer schönen Art irgend einer Species Vogelnestfarrn da. Der Gegensatz zwischen dem weißen, glänzenden, rindenlosen Stamm und diesem grünenden Pflanzenhaufen an der Spitze war stets überraschend, besonders wenn die Orchideen in Blüthe waren. Unwillkührlich dachte man an den Untergang dieser so hübschen Pflanzen, da die Feuchtigkeit oder der Regen, welche ihre Wurzeln ernähren, ihre Stütze zerstören muß. Diese Verbindung von Leben und Tod, Wachsthum und Verfall war eine der Haupteigenthümlichkeiten unter den vielen und merkwürdigen Erscheinungen, welche meine Reise mir gewährte.

Eine botanische Excursion auf den Berg Ida.

Entdeckung von Muscari latifolium durch Dr. Kirck.

Von Naudin.

(Uebertragen aus der Flore des serres etc. v. H. Roese, Hofg. in Eutin.)

Gegen das Ende des letzten Orientkrieges, beschlossen Dr. Kirck und zwei seiner Freunde, die Doctoren Armitage und Playne, die wie er am Militair-Hospital zu Renkioi an den Dardanellen angestellt waren, die Besteigung des Berges Ida in Phrygien zu versuchen, den man von da aus in etwa 40 Meilen Entfernung gegen S. O. erblickte. Da sich alle drei für Botanik interessirten, so kamen sie überein, bei ihrer Rückkehr die gemeinschaftlich erworbenen Kenntnisse, gleichmäßig zu vertheilen. An einem schönen April Morgen setzten sich unsere Reisenden in Bewegung und nachdem sie die Dörfer Renkeny und Doumeneck rechts und links liegen lassend, ein sehr koupirtes und felsiges Stück Land passirt hatten, kamen sie an eine römische Wasserleitung, die über einer, die zerklüfteten Felsen durchbrechenden Schlucht erbaut war, und vor Zeiten das Wasser nach dem Neu-Ilium hinleitete. Seit vielen Jahrhunderten ist diese Wasserlei-

tung zerfallen und ihre Röhren aus gebrannten Ziegeln, dienen jetzt den Bauern zu Heizungsröhren. Der Gebirgsstrom, welcher im Grunde der Schlucht fließt, trägt den Namen Kemar-Sou (Mondfluß) und ergießt sich in den Mendéré — den alten Scamander — den er jedoch in den trockenen Sommermonaten kaum erreicht. Das unbebaute Land der ganzen Gegend ist bedeckt mit dicken Büschen der Terebinthe (Pistacia Therebinthus), des Storax (Liquidambar styraciflua), der Tanne von Aleppo (Pinus halepensis) und niedrigen oder verkrüppelten Eichen verschiedener Art. Hier und da in der Gegend des alten Troja zeigen sich schöne Bestände der Quercus Vélanis, Q. Aegilops und Q. Cerris. Die Platanen (Platanus orientalis), die Pappeln und der Paliurus, an welchen sich Periploca, Cynanchum, verschiedene Clematis-Arten, und wilder Wein in die Höhe ranken, entfalten in den Thälern eine üppige Vegetation. In den Zwischenräumen war der Boden von verschiedenen Anemonen-, Iris- und Crocus-Arten bedeckt. Nachdem unsere 3 Reisenden den Kemar-Sou überschritten hatten, erreichten sie einen Tannenwald, der alle Höhen bis an die Ebenen von Beyramitsch bedeckte, sie verirrten sich darin und nachdem sie eine Zeit lang aufs Gerathewohl darauf los gegangen waren, zog sie der Anblick der Minarets einer türkischen Stadt und die Stimme des Muezzins, der die Gläubigen zum Abendgebet rief, glücklicher Weise aus der Verlegenheit, die Nacht unter freiem Himmel zubringen zu müssen, was abgesehen von der Gefahr, das Fieber zu bekommen, doch noch dem Aufenthalt in den von Ungeziefer wimmelnden Häusern vorzuziehen gewesen wäre. Den folgenden Tag folgten sie dem Laufe des Mendéré, in einem reich bewachsenen und gut bewässerten Thale entlang. Hopfen und Hanf wuchsen zu beiden Seiten des Weges wild; ebenso trafen sie die Anemone appennina und Scilla bifolia, die durch herabstürzende Gewässer aus höher gelegenen Gegenden dorthin getrieben waren. Indem sie die Stadt Beyramitsch passirten, machten sie Ahmed Bey, dem Herrn dieser Gegend ihre Aufwartung, der ihnen zwei seiner Kawassen mitgab, die ihnen als Führer und Escorte zugleich dienen sollten. Diese Ehre wurde für sie die Quelle großen Aergers. Zwischen der Stadt Beyramitsch und dem Berge Ida, ist das Land sehr zerrissen, von allem Grün entblößt und von Schluchten durchschnitten, in deren Grund der Scamander sich hinschlängelt. Als unsere Reisenden am zweiten Abend in dem Dorfe Ajslar ankamen, hatten sie Mühe, bestimmt wohl wegen ihren Begleitern ein Unterkommen zu finden; als sie sich deßhalb von ihnen losgemacht hatten, versuchten sie es, sich mit Hülfe ihres Kaffee's und Taback's, Freunde im Dorfe zu erwerben, die ihnen denn auch ein Unterkommen verschafften.

Den folgenden Tag fingen sie schon am frühen Morgen an, den Berg zu besteigen und nach einigen Stunden Marschirens erreichten sie eine der Quellen des Scamander, der in einem mächtigen Strahle aus einem schieferigen Felsen hervorbricht. In der Nähe der Quelle auf einem freien Platze, innerhalb eines Gehölzes von Pinus Pinaster, sammelten sie diverse Saxifragen, Geranien, Dentaria bulbifera, Ruscus Hypoglossum und Paeonia decora. Hier entdeckten sie auch — ihr hauptsächlichster Fund — in großer Menge, die neue, am Anfang dieser Notiz erwähnte Muscari, welcher sie wegen der Breite ihrer Blätter

von Nauren latifolium gaben. Zu gleicher Zeit erkannten sie, daß ihre Führer, ihnen einen ganz falschen Weg gezeigt hatten, denn es war, von dem Punkt, auf dem sie sich befanden, beinah unmöglich, weiter den Berg hinauf zu steigen, da sie aber entschlossen waren, bis zum Gipfel vorzudringen, so wählten sie nichts destoweniger, die Führer sich selbst überlassend, einen anderen Weg.

Nahe dem Gipfel lüftete sich der Tannenwald, und der ganz von baumartiger Vegetation entblößte Felsen, welcher aber noch einige krautartige Pflanzen trug, die in den Zerklüftungen des Gesteins wachsen, lag frei zu Tage. Unsere Botaniker erndteten hier Orobus garganicus, Corydalis tuberosa, C. digitata, Viola gracilis, Scilla bifolia und Ornithogalum nanum und umbellatum. Die wenige Erde des kahlen Gipfels war von wilden Schweinen, wegen der Knollen und Zwiebeln ganz aufgewühlt. Die Reisenden hielten dort nur kurze Rast; sie hatten zur Besteigung des Berges 8 Stunden gebraucht und da es schon 3 Uhr Nachmittags war, dachten sie an den Rückweg und traten denselben auf einem bequemeren Wege an, als der war, auf dem sie hinauf gestiegen waren. Unter anderen interessanten Pflanzen, denen sie noch begegneten, fanden sie die Saxifraga sancta, die Grisebach zuerst auf dem Berge Athos entdeckt hatte. Als sie im Dorfe Ayilar anlangten, war die Sonne schon untergegangen. Sie reisten dort den andern Tag ab und kamen so in ihrem Hospital wieder an. Nun folgt in der Flore des serres eine mehr detaillirte Beschreibung, mit welcher Dr. Kirck sein Muscari latifolium charakterisirt: Der Schaft ist aufrecht, ungefähr 1′ hoch; er entspringt aus einer kugelrunden Zwiebel, und trägt nahe an seiner Basis ein einziges, stengelumfassendes, breitlanzettförmiges, an der Spitze ein wenig abgestumpftes Blatt; die Blumen, von denen die unteren fruchtbar und kurzgestielt, die oberen sitzend und unfruchtbar sind zahlreich, und stehen in einer ungefähr 2′ langen Traube; die Blüthenhülle ist röhrig, und bei den fruchtbaren Blumen am untern Theile bauchig aufgeblasen, von blauer Farbe.

Gardener's Chronicle, aus der die Flore des serres diese Details entnommen hat, erwähnt nicht, ob die Pflanze lebend nach England gebracht wurde.

Garten-Notizen.

Die Gärtnerei der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne in Hamm.

Dem vorigen Hefte der hamb. Gartenztg. war ein Nachtrag (No. 19) zum Hauptverzeichniß No. 13 von den Herren J. H. Ohlendorff & Söhne, Eigenthümer der Hammer Baumschulen beigegeben worden. Wir stießen beim Durchblättern dieses Verzeichnisses auf eine so große Menge sehr seltener, werthvoller und schöner Gewächse, daß wir nicht umhin konnten, der Gärtnerei einen Besuch zu machen, um die in dem

Verzeichniſſe aufgeführten ſeltenen Pflanzen theils kennen zu lernen oder uns von deren Schönheit ſelbſt zu überzeugen. —

Daß die Herren Ohlendorff ihre Baumſchulen im vorigen Jahre verlegt und zugleich bedeutend vergrößert haben, glauben wir ſchon früher erwähnt zu haben. Die Anlage der neuen Baumſchulen, die einen Flächeninhalt von 25 Scheffel umfaſſen, iſt nun ſo ziemlich vollendet und enthält einen bedeutenden Zuwachs an jungen Exemplaren der gangbarſten Zierbäume und Sträucher, der beſten und erprobteſten Fruchtſorten jeglicher Art, ganz beſonders viele Coniferen, von denen manche Art in bedeutender Vermehrung vorhanden iſt.

Da Baumſchulen zur Winterzeit weniger anziehend ſind, ſo lenkten wir bei unſerem letzten Beſuche unſere beſondere Aufmerkſamkeit auf die Gewächshäuſer, deren Inhalt von ſeltenen Pflanzenarten uns wahrhaft überraſchte und dies um ſo mehr, wenn wir bedenken, daß die Pflanzenſchätze erſt in dem Zeitraume von kaum zwei Jahren nicht nur angeſchafft wurden, ſondern auch bereits faſt jede Art in reichlicher Vermehrung vorhanden iſt. Die herrliche Amherstia nobilis, die ſo eben erſt wieder in einem Garten Englands in einem kleinem Exemplare geblüht hat; dann Artocarpus incisa (der Brotfruchtbaum), Brownea erecta und grandiceps, Coccoloba quatemalensis und macrophylla ſind werthvolle Pflanzen. Von Aralien fielen uns durch ihre Schönheit die Ar. Brownii, gracilis, Sieboldii, leptophylla, reticulata und papyracea auf, ſämmtlich in ſchöner Vermehrung. Eine ſehr empfehlenswerthe, ſich durch ihre Blätter und ſchönen Wuchs auszeichnende Pflanze iſt die Caulea floribunda, ebenſo die Calypiraria haemantha. Unter allen Gardenien verdient die G. citriodora am meiſten empfohlen zu werden, ſie blüht ſehr leicht und dankbar. Doryanthes excelsa, eine freilich ſchwer blühende Pflanze, iſt in allen Größen vorhanden, ſie ſollte in keiner Sammlung fehlen. Imatophyllum (Clivia) miniatum iſt noch ſehr ſelten und nicht minder ſchön. Die Rhopala-Arten gehören zu den ſchönſten Warmhauspflanzen, auch laſſen ſie ſich ſelbſt in einem mäßig warmen Hauſe mit Vortheil kultiviren. Die Herren James Booth & Söhne in Flottbeck beſitzen bekanntlich die reichſte Sammlung dieſer Pflanzengattung in ausgezeichnet ſchönen Exemplaren, aber auch hier bei Herren Ohlendorff ſahen wir 8 verſchiedene Arten der Gattung Rhopala nämlich: Rh. complicata, corcovadensis, de Jonghei noch die werthvollſte, elegans, heterophylla, magnifica, organensis und Skinneri. Nicht minder empfehlenswerthe Pflanzen ſind die Sciadophyllum (Aralia)- Arten als Sc. palmatum und pulchrum, dann Terminalia mollis, Theophrasta latifolia, Uvaria micrantha, Pisonia alba und sylvestris etc. Das ſo herrliche Cyanophyllum magnificum, die ſchönſte aller Blattpflanzen, iſt bereits in hübſchen Exemplaren zu 5 ℳ zu erhalten. Die Palmen- und Pandaneen-Sammlung enthält nur ſeltene und ſich durch die Schönheit ihrer Wedel auszeichnende Arten für die wir auf das Verzeichniß verweiſen. Pandanus albus ähnlich dem P. javanicus fol. var. hat ganz ſchneeweiße Blätter. Die warmen Gewächshäuſer enthalten noch eine Menge ſehr ſchöner Gewächſe, ſämmtlich in ſehr geſundem Zuſtande und in beſter Ueppigkeit, der gemeſſene Raum erlaubt uns jedoch nicht näher auf dieſe einzugehen. Die kalten Gewächshäuſer ſind nicht minder reich an ſchönen Pflanzen, namentlich

sahen wir viele der zierlichen australischen Papilionaceen, dann Fuchsien und Pelargonien in den neuesten und besten Sorten, ein schönes Sortiment der Rhododendron-Arten von Sikkim und Bhotan (Ericen, Camellien, Azaleen, Epacris wie alle sonst gangbaren Pflanzenarten. — Die schönste Coniffere für das freie Land ist unstreitig wohl die Chamaecyparis nutkaensis Spach (Thuiopsis borealis Hort.), sie ist vollkommen hart und dürfte in einigen Jahren eine eben so ausgedehnte nützliche Verwendung finden, wie die harten Thuia-Arten und hat diese Pflanze noch den Vorzug vor der Thuia, daß sie im Winter ihr schönes Grün behält, während die Thuia meistens sich bräunlich färben,

Arisema Kenjak, serotina und Sieboldii sind drei sehr interessante Aroideen-Arten, von diesen sahen wir die A. serotina in Blüthe, die wir jedoch für die Arisema ringens, abgebildet in der flore des serres II. 10. Liv. (1857) pag. 167 halten, die mit Ar. Sieboldii de Vr. wieder synonym ist. Die Arisema-Arten halten mit leichter Bedeckung sehr gut im Freien aus.

Die nächste Pflanzenausstellung in Hamburg wird ohne Zweifel den Pflanzenfreunden, welche keine Gelegenheit haben die Baumschulen des Herren Ohlendorff zu besuchen, manche seltene und werthvolle Pflanze zur Ansicht bringen und denselben Gelegenheit geben, dieselben kennen zu lernen.

Literatur.

Kühn's Buch über Krankheiten der Pflanzen. Wer sich für die Pflanzenkultur interessirt, wird nicht allein mit Aufmerksamkeit den Erfahrungen folgen, welche diese Kulturen auf mannigfache Weise zu fördern und zu verbessern bestimmt sind, sondern auch den Beobachtungen sich zuwenden, welche man über die Schädlichkeiten gemacht hat, die theils von der Thierwelt ausgehen und eine Zerstörung oder Veränderung und Verunstaltung der Pflanzen hervorzubringen pflegen, theils aber von andern kleinen parasitischen Gewächsen herrühren, die man zum größten Theile erst in neuerer Zeit genauer kennen und unterscheiden gelernt hat, seitdem man mit dem Mikroskope die Bildung und Entstehung so wie die Fortpflanzung derselben untersuchte. Man gewahrt sie mit bloßem Auge gewöhnlich erst dann, wenn sie sich bedeutend ausgebreitet haben und schon im Zerstören begriffen sind, oder wenn sie aus den innern Theilen der Pflanzensubstanz hervortreten, um an der Luft und im Lichte ihre Fruchtbildung zu vollenden, wie es auch die größeren Pilze thun, welche in der Erde oder im Holze fortwuchern, bis sie an der Oberfläche mit dem Körper zum Vorschein kommen, den man gewöhnlich allein als den Pilz bezeichnet, während er richtiger der Fruchtkörper der Pilze benannt werden muß. Bei den Pflanzen, die im Großen gebaut werden ist, das Auftreten dieser kleinen Parasiten oft sehr gefährlich und vernichtet fast gänzlich oder doch zu einem bedeutenden

Theile die Ursache, wie man dies gerade in neuerer Zeit bei verschiedenen, durch solche Parasiten hervorgebrachten Misernbten erfahren hat. Man hat daher diesen Erscheinungen bei den landwirthschaftlich gebauten Pflanzen eine größere Aufmerksamkeit zugewendet und hat ermittelt, daß diese kleinen Gewächse nicht allein mit ihren Saamen (Sporen) keimen und sich aussäen, wie die größeren Gewächse, sondern daß sie zum Theile noch andere Fortpflanzungs- und Vermehrungsweisen besitzen und daher auch im Stande sind, sich unter günstigen Außenverhältnissen durch sofortige Vermehrung viel stärker auszubreiten und unter begünstigenden Umständen in folgenden Jahren einmal von Neuem wieder massenweise aufzutreten. Da nun auch die Gartenpflanzen von ähnlichen Erscheinungen zu leiden haben und diese landwirthschaftlichen Kulturen sich zum Theil mit der Gartenkultur verbinden und in Zusammenhang mit ihr stehen, so werden sich auch wohl die Gärtner bewogen fühlen, ein Buch zu studiren, welches diese kleinen Zerstörer des Pflanzenlebens, diese auf Kosten größerer Gwächse lebenden Schmarotzer kennen lehrt. Dies Buch ist von Dr. Julius Kühn, zur Zeit Wirthschafts-Director der Gräflich Egloffstein'schen Besitzungen in Nieder-Schlesien, früher Lehrer an der landwirthschaftlichen Akademie in Proskau, herausgegeben und führt den Titel:

Die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und ihre Verhütung. Mit 7 Tafeln lith. Abbildungen. Berlin, Gustav Bosselmann, landwirthschaftliche Verlagsbuchhandlung. 1858. 8.

Das Buch ist für den praktischen Mann bestimmt und daher so geschrieben, daß alles deutlich und verständlich ist. Es ist in einem Anhange auch der Gebrauch des Microscops und die Nothwendigkeit von dessen Anwendung für den Landwirth auseinandergesetzt, die Nothwendigkeit dargethan, daß ein Jeder selbst nach der Ursache der Schädlichkeiten suchen und sie ergründen solle, da nur auf diese Weise es möglich ist, ihnen zu begegnen, daß vorgefaßte Ansichten, ohne alle Begründung nachgebetete Angabe über angebliche Ursachen solcher verderblicher Erscheinungen zu nichts führen und keine Mittel zur Bekämpfung des Uebels auffinden lassen. „Die Landwirthe (sagt der Verfasser) wären längst befreit von ihrem leider noch so allgemeinen Aberglauben an „giftige Nebel," „stockende Pflanzensäfte," Ausschwitzungen von Mehl- und Rußthau hervorrufenden Honigthau," und dergleichen Wunderlichkeiten mehr, wenn ihnen das Wesen und die Entwickelungsweise insbesondere der parasitischen Pilzformen bekannt gewesen wären." Wir können diese Worte auch getrost auf die Gärtner übertragen, welche wir oft genug vom „Befallenwerden", von der aus der Luft auf die Pflanzen fallenden Mehl-, Honig- und Rußthau", von den schädlichen Wirkungen „starker Wärme und abwechselnder häufiger Regenschauer" oder höchstens vom „Schimmel" haben reden hören und wodurch von vorn herein alles abgeschnitten wird, was Aufklärung geben kann. Wer vermag der Witterung zu gebieten, was sie bringt muß hingenommen und ertragen werden. Ob aber Thiere oder Pflanzen die Schuld an den Uebeln tragen, wer weiß das?

Was der Verfasser in seinem Buche bietet ist zuerst eine allgemeine Betrachtung der Pflanzenkrankheiten, indem er von der mannigfaltigen

Art und Weise wie das Erkranken sich zeigt ausgeht, dann zu den Ursachen übergeht, welche die Krankheiten hervorrufen: Bodennässe, ungünstige Temperaturverhältnisse, ungünstige Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft, ungünstige chemische Beschaffenheit des Bodens, Entziehung des Lichtes. Dann folgen Krankheiten, deren Ursache wir noch nicht kennen und welche in übermäßiger Ausscheidung, besonders in der Pflanze normal vorkommender Stoffe, oder in einer Umwandlung der normalen Zustände bestehen. Weitere Ursachen von Krankheitserscheinungen sind die Thiere, namentlich die Insekten, welche besonders dadurch, daß sie einen Theil ihres Lebens innerhalb der Pflanze und von ihr zehrend zubringen, eigenthümliche Bildungen (Gallen) oder theilweises Absterben hervorrufen; oder dadurch, daß sie äußerlich ansitzend die Säfte der Pflanzen aussaugen und sich gewöhnlich dabei ungeheuer vermehren, normale Ernährung der Pflanzen behindern und unmöglich machen. Endlich kommen als Ursache des Erkrankens die Pflanzen-Parasiten, welche die Nahrung aus einer andern Pflanze zu ihrer Existenz bedürfen. Unter ihnen sind bei uns nur wenige phanerogamische Pflanzen, aber eine große Anzahl von Kryptogamen, die theils im Innern entstehen und dann hervorbrechen, oder bloß aufsitzen und die lebenden Theile aussaugen. Häufig wird auch noch gegen solche Pflanzen zu Felde gezogen, welche zwar auch nur auf fremden Pflanzen zu finden, aber auf der äußern abgestorbenen Rinde befestigt sind und sich von dem ernähren, was die Luft und dessen Feuchtigkeit ihnen bietet, aber von den Säften der Pflanzen selbst nichts an sich ziehen, sich also nur dann um so stärker vermehren und ausbreiten, je mehr ihnen an Feuchtigkeit durch die Luft und durch Niederschläge aus derselben geboten wird. Diese kryptogamischen unächten Parasiten, Moose, Flechten gedeihen also unter Umständen, welche dem Gedeihen der Pflanze auf welcher sie sich äußerlich ansiedeln schädlich, wogegen die ächten Parasiten, meist, den Pilzen und namentlich den Schimmeln angehörig, nur von den Säften der Pflanzen leben, auf welchen sie sich zeigen und sich an allen Theilen der Pflanzen finden.

In dem zweiten, speciell die Krankheiten der Kulturgewächse behandelnden Theile werden der Schmierbrand am Weizen, die Staubbrande an verschiedenen Getreidearten, besonders an Gerste und Hafer, der Brand der Hirse, des Mais, der Roggenähre und des Roggenstengels, dann der Rost des Getreides und der Hülsenfrüchte, des Mutterkorn, des Mehl-, Roß- und Honigthau, die Blattdürre oder Blattfleckenkrankheit (durch kleine Pilze, welche auf den Blättern wachsen); das Befallen des Rapses und Rübsens, die Kernfäule der Kartoffel, die Gicht- oder Gelbsucht des Weizens, die Krankheiten der Knollen- und Wurzelgewächse, nämlich der Kartoffeln (Kräuselkrankheit, Trockenfäule, Zellenfäule, Blattkrankheit, Schorf oder Grind) der Runkelrüben, der Mohrrüben, der Kohl- und Wasserrüben einzeln durchgenommen und die Parasiten beschrieben, welche diese Uebel hervorbringen. — Wenden wir aber unsern Blicke auf die Kulturgewächse der Gärtner, auf die zahlreichen Schmuckgewächse im Freien und in Häusern, so mehrt sich die Zahl bedeutend oder dürfte wohl der Mühe werth sein, eine vollständige Aufzählung derselben zu machen und die Erscheinungen, welche die Krankheiten darbieten zu verzeichnen und die Ursache, so weit sie

bekannt sein dürften, hinzuzufügen, man würde dann daraus ersehen, was noch zu beobachten ist, und aus der vollständigen Naturgeschichte dieser kleinen feindlichen Wesen lernen, wie man sie am besten zu bekämpfen hoffen könne. D. F. L. von Schlechtendal.

Wredow's Gartenfreund oder vollständiger, auf Theorie und Erfahrung gegründeter Unterricht über Behandlung des Bodens und Erziehung der Gewächse im Gemüse-, Obst- und Blumengarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten. **Neunte Auflage**, nach den neuesten Erfahrungen gänzlich umgearbeitet und vermehrt von **H. Gaerdt** und **E. Reide**. 6. Lief. Berlin. 1858. Rud. Gaertner.

Uns auf unsere frühere Besprechungen der einzelnen erschienenen Lieferungen dieses so empfehlenswerthen Gartenbuchs beziehend, freut es uns mittheilen zu können, daß unlängst die 6. Lief. ausgegeben worden ist und da dieser nur noch 2 Lieferungen folgen werden, das ganze Werk zu Ostern vollständig in den Händen der zahlreichen Subscribenten sein wird. Die ungemein große Zahl der Subscribenten, die diese 9. Auflage dieses Buches sich zu erfreuen hat, spricht mehr für die Brauchbarkeit und Nützlichkeit des Buches, als alle Recensionen, es ist aber unstreitig auch mit als das beste Buch dieser Art allen angehenden Gärtnern, Blumen- und Pflanzenfreunden zu empfehlen.

Diese 6. Lief. enthält die Fortsetzung des »Blumengartens« und reicht bis Fuchsia. E. O—o.

Anbau-Versuche mit neuen oder wenig bekannten Nutzgewächsen, nebst Andeutungen zur Begründung neuer Industriezweige von Dr. **A. Rauch**. Kempten, Tob. Dannheimer, 1859. 8. VI. u. 75 S.

Der Herr Verfasser hat bereits seit einer Reihe von Jahren Anbauversuche mit neuen Nutzgewächsen gemacht und hat keine Kosten gescheut, die seltensten Sämereien, Knollen ꝛc. von solchen Pflanzen zu erwerben, deren Anbau im Großen einigen Nutzen gewähren dürften. Viele Anbauversuche haben sehr günstige Resultate geliefert, doch bleiben die Versuche nur immer Versuche und als solche wünscht sie der Verfasser auch nur betrachtet zu sehen, denn bei vielen Gewächsen läßt sich ein entscheidendes Urtheil über ihre allgemeine Brauchbarkeit erst dann fällen, wenn ihr Anbau auf verschiedenen Bodenarten und in verschiedenen Gegenden versucht worden ist. Solche Versuche zu veranlassen, ist zum Theil der Zweck dieser Schrift. Möge sie diesen Zweck erreichen und Andere zu gleichen Anbauversuchen von neuen wie älteren Nutzpflanzen Veranlassung geben.

Am Schlusse bittet der Herr Verfasser alle jene Herren, die im Besitze von neuen Nutzgewächsen sein sollten, mit ihm in Tauschverhältnisse zu treten und ihn zugleich durch Mittheilung ihrer Erfahrungen über die Kultur derselben zu erfreuen. Auch ist Herr Dr. Rauch stets bereit Sämereien oder Pflanzen von neuen Nutzpflanzen käuflich an sich zu bringen.

Die Pflanzenarten, mit denen der Herr Verfasser Anbauversuche angestellt hat und deren meist interessante Resultate er in obiger Schrift ausführlich mittheilt sind folgende: Dioscorea Batatas Decsn.; D. opposita Thbg.; Convolvulus Batatas (Batatas edulis); Kartoffelsorten; Zucker-Sorgho (Holcus saccharatus); neue Getreide Sorten, als Mormonen-, Oregon-, Mumien-, Bamberger-Weizen; Spanischer Doppel- und Eldanaer-Bastardroggen ꝛc.; Hülsenfrüchte; die persische Kamille (Pyrethrum roseum und carneum); Hordeum bulbosum, diverse Gespinnstpflanzen; Phytolacca esculenta als Gemüse-, Wein- und Farbepflanze. Die schwarze Malve (Althaea rosea, Malva arborea); die japanische eßbare Klettenwurzel (Lappa edulis); Riesenspargel; neue Kulturmethode des Spargels; der japanische Knöterich (Polygonum Sieboldi); bucharischer Honigklee; Schwedischer Bastardklee (Trifolium hybridum); Incarnatklee (Trif. incarnatum); sibirisches Heilkraut (Heracleum sibiricum); Biewitz; Domingo-Tabak; Carviol-Kürbis; Bologneser Fenchel und schließlich Rhabarber.

Die einzelnen Abhandlungen über diese Gemüse sind von vielem Interesse, weßhalb wir sie auch den sich für diese Versuche Interessirenden bestens empfehlen wollen. E. D—o.

Hortus Lindenianus, Recueil iconographique des Plantes nouvelles introduites par l'Établissement de **J. Linden**, à Bruxelles. Groß-8.

Mit großem Vergnügen sieht gewiß jeder Pflanzenfreund diesem Linden'sche Werke entgegen. Dasselbe wird ein- oder zweimal heftweise im Jahre erscheinen und nur die Abbildungen der neuen Einführungen des Linden'schen Etablissement's bringen. Jedes Heft wird 6—8 sorgfältig colorirte Abbildungen nebst den dazu erforderlichen Text geben. Der Preis einer Lieferung oder Heftes ist nur auf 4 Fr., franco à destination, gestellt.

Von **Lindley's „Folia Orchidacea"** ist wieder ein Heft erschienen (Part. VIII. Februar 1859). Dasselbe enthält die Gattungen Stelis mit 133 Arten; Oberonia mit 55 Arten; Alvisia mit 1 Art; Restrepia mit 9 Arten; Brachionidium mit 3 Arten und dann den Anfang der Gattung Pleurothallis mit 23 Arten. Den Schluß des Heftes machen einige Beobachtungen über das Aufspringen der Orchideenfrüchte von Herrn Ed. Prillieux.

Bildende Gartenkunst und Pflanzen-Physiognomik. Ein Vortrag gehalten von Professor Dr. **Karl Koch**, ist der Titel einer kleinen interessanten Broschüre, die wir allen Freunden der bildenden Gartenkunst hiermit bestens empfehlen wollen. Diese kleine, sehr lesenswerthe Abhandlung erschien zuerst in No. 3 sq. 1859 der Wochenschrift für

Gärtnerei und Pflanzenkunde von L. Koch und G. Hantelmann, aus der sie besonders abgedruckt und in Berlin bei Karl Wiegand erschienen ist.

Jahrbuch für die deutschen Haus- und Landwirthe auf das Jahr 1859. Von Dr. Will. Löbe. Separatdruck aus dem Illustr. Kalender für die deutschen Haus- und Landwirthe auf das Jahr 1859. Mit 24 Abbildg. Leipzig, Otto Wiegand. (859. kl. 8. 220 S.)

Die Angabe der monatlichen Verrichtungen in Haus und Hof, auf Feldern, Wiesen und Gärten, Weinbergen, Wäldern ꝛc., wie der unterhaltende und belehrende Kalender, der viele sehr nützliche Bemerkungen enthält, dürfte vielen Landwirthen wie Gartenbesitzer von Nutzen, daher gewiß auch willkommen sein, ebenso nützlich scheint uns der „Verhältnißkalender“, enthaltend eine Vergleichung der Münzen der verschiedenen Länder, wie eine Vergleichung der Gewichte, Maaße ꝛc. Auch ein Adreßkalender der landwirthschaftlichen Lehranstalten, Ackerbauschulen ꝛc. Deutschlands, ferner eine Uebersicht der Kunst- und Handelsgärtnereien, Samenhandlungen und Baumschulen ist in einem solchen Buche von Nutzen, wenn man sich auf die Richtigkeit dieser Adressen verlassen kann, dies scheint hier jedoch keineswegs der Fall zu sein. So heißt es in der Uebersicht der „Kunst- und Handelsgärtnereien, Samenhandlungen und Baumschulen in Deutschland“ unter der Rubrik Preußen, Berlin: Bouché. Welcher von den vielen Bouché's in Berlin ist hier gemeint? Unter Potsdam sind außer H. Ohse, die Herren Lenné und v. Türk genannt, die beiden letzten besitzen weder Handelsgärten, noch Samenhandlungen noch eigne Baumschulen. Unter Hamburg ist ein Herr J. F. Dregé genannt, derselbe hat niemals ein bedeutendes Samengeschäft geführt, sondern meistens nur importirte Samen für Rechnung der Sammler zum Verkauf geboten, dieses Geschäft aber seit 6 Jahren aufgegeben. Unter Wandsbeck ist Herr R. Mettler angeführt. Seit Jahren existirt die Gärtnerei des Herrn Dr. Mettler nicht mehr, weder in Wandsbeck noch anderswo. Dies sind nur einige uns bei Durchsicht des Verzeichnisses der Adressen zufällig in die Augen fallende Unrichtigkeiten, wir fürchten aber fast, daß das an sich sehr unvollkommene Verzeichniß noch mehrere dergleichen unrichtige Adressen enthalten dürfte, und somit aller Zuverlässigkeit entbehrt. E. O—o.

Feuilleton.

Dauryanthes excelsa R. Br. Diese prachtvolle Lilliacee gehört wohl zu den größten Seltenheiten in den Gärten Europas, aber noch seltener ist die Blüthenerzeugung dieser Pflanze, indem sie nur blüht, wenn die Exemplare erst eine beträchtliche Größe erreicht erreicht haben. Es freut uns daher mittheilen zu können, daß ein

schönes großes Exemplar der D. excelsa gegenwärtig im botanischen Garten zu Poppelsdorf bei Bonn in Blüthe steht. Der Blüthenschaft ist 13 Fuß hoch und hat einen Durchmesser von 3 Zoll. Die herrlichen dunkelscharlachrothen, 5 Zoll breiten lilienartigen Blüthen bilden einen Blüthenkopf, der 14 Zoll Durchmesser hat und über hundert Blüthen zählt.

Unsers Wissens hat diese Prachtpflanze bis jetzt, außer in einigen Gärten England's, in Deutschland nur im K. Schloßgarten zu Herrenhausen bei Hannover (im Februar 1843 und im Juni 1848 geblüht. Im Berggarten hatten die Blüthenkegel eine Höhe von 8 und 12 Fuß erreicht, ebenso betrug die Höhe desselben an dem Exemplar, das bei dem Handelsgärtner Sherwood in Philadelphia im Jahre 1843 und an demjenigen, das bei Herrn Charles Jong auf Bromley-Hill in Kent (England) 1845 zum Erstenmale in Europa blühte 12 Fuß.

Die Doryanthes excelsa stammt aus Neuholland und wurde im J. 1800 in England eingeführt. S.

Livistona chinensis Mart. (Latania borbonica Lam.) blühend. Es ist diese Palme eine der bekanntesten und am vielfältigsten verbreitetsten Art, welcher Umstand unstreitig ihrer Schönheit, wie auch, daß sie sich sehr leicht in jedem Warmhause, selbst in Zimmern kultiviren läßt, zuzuschreiben ist. Bereits schon im Jahre 1826 in England zuerst eingeführt, finden sich in mehreren englischen wie deutschen Gärten sehr starke und herrlich gebildete Exemplar vor. Die Exemplare im K. Pflanzengarten zu Herrenhausen, in dem Gewächshause des Herrn Geheim. Hofmechanikus Decker in Berlin wie die in den Baumschulen der Herren James Booth & Söhne zu Flottbeck sind wohl die größten in Deutschland. Wegen Mangel an den erforderlichen Räumlichkeiten sollen die fast gleich großen Exemplare der Latania borbonica derjenigen der zwei letztgenannten Gärten verkauft werden, die des Herrn Decker soll 2000 ℳ! die der Herren Booth dagegen 600 ℳ kosten.

Höchst interessant und gewiß eine große Seltenheit ist es, daß die Latania borbonica bei den Herren Booth gegenwärtig in Blüthe steht, welches Ereigniß wohl auch in keinen Garten stattgefunden hat. Das riesige Exemplar hat einen etwa 8 Fuß hohen Stamm, auf dem die mächtige Wedelkrone sich befindet. Zwei 1—2' lange Blüthenrispen sind aus der Achse der jüngeren (vorjährigen) Blattwedel hervorgetreten. So gut wie wir die Blüthen von unten auf zu erkennen vermochten, scheinen es nur männliche Blüthen zu sein, von einer hell gelblichgrünen Färbung.

Pflanzensammlung. Wegen Mangel an Raum soll leider eine der schönsten Pflanzensammlungen Berlins veräußert werden, nämlich die berühmte Sammlung des Herrn Ober-Hofbuchdrucker Decker, bestehend aus Palmen, Cycadeen, Pandaneen und Baumfarrn. Ein Verzeichniß der zu verkaufenden Pflanzen ist diesen Hefte beigegeben und es befinden sich namentlich unter den Palmen und Baumfarrn theils sehr seltene, theils sehr große Exemplare. Die Livistona borbonica dürfte wohl mit das schönste Exemplar in Deutschland sein, soll aber auch 2000 ℳ kosten. Die Baumfarrn verdienen neben den Palmen

ganz besonders beachtet zu werden. Wir verfehlen daher nicht die Pflanzenfreunde auf das beigegebene Verzeichniß aufmerksam zu machen.

Robinia pseudoacacia L. var. fastigiata. Das Märzheft der Illustrat. hortic. giebt auf pag. 20 eine Beschreibung und Abbildung dieser hübschen pyramidenförmigen Akazie. Es ist dies derselbe Baum, den wir zu verschiedenen Malen in der hamburg. Gartenztg. als Robinia inermis var. pyramidalis empfohlen haben und von dem wir früher, bereits im Jahre 1857 S. 104 der hamb. Gartenz. eine Abbildung gaben, welche auch jetzt die „Illustration Hortic." bringt. Trotz der Schönheit dieses Baumes und trotz der vielfachen Anpreisungen in den verschiedenen Gartenschriften, hat derselbe bisher doch nur wenig Verbreitung gefunden, deren er sich nun wohl mehr zu erfreuen habe dürfte, da er in einer ausländischen belgischen Gartenschrift empfohlen wird. Herr Schickler in Stuttgart, von dem dieser Baum zuerst in den Handel gebracht wurde, nannte ihn Robinia inermis pyramidalis. Als jedoch im Jahre 1857 unsere Exemplare im hiesigen botanischen Garten ihre ersten Blüthen entfaltet hatten, zeigte es sich, daß es nicht eine Pyramidenform der R. inermis, sondern der R. pseudoacacia ist, unter welchem Namen wir sie auch später anempfahlen. Herr Prof. Ch. Lemaire ändert den Namen pyramidata od. pyramidalis in fastigiata um, denn wie derselbe in der Illustrat. hortic. bemerkt, soll es bereits eine Varietät pyramidalis geben, womit vermuthlich der in unserer, wie in anderen deutschen Gartenzeitungen erwähnte Baum gemeint ist. — Bei den Herren James Booth & Söhne, P. Smith & Co. wie im bot. Garten zu Hamburg ist reichliche Vermehrung dieses Zierbaumes vorhanden und je nach der Größe der Exemplare zu verschiedenen Preisen von 2—5 ℔ (24 Sgr. bis 2 ₰) zu erhalten.

E. O—o.

Theophrasta imperialis. Unter den Pracht-Pflanzen, die neuester Zeit eingeführt worden sind, steht dem Cyanophyllum magnificum die Theophrasta imperialis ebenbürtig zur Seite. In den Gewächshäusern der Herren James Booth & Söhne in Flottbeck sahen wir ein Exemplar dieser Pflanze, das wahrhaft imponirend ist und neben einem herrlichen, gleich großen Exemplare von Cyanophyllum magnificum stehend, weiß man kaum, welcher Pflanze man den Vorzug geben soll. Bei letzterer Pflanze ist es nicht nur die Größe der Blätter, als deren herrliche Farbenschattirung, was die Pflanze so anziehend macht. Bei der Th. imperialis, deren Blätter fast eben so groß sind als die des Cyanoph. magnificum, ist es dagegen deren glänzendes Grün und die feste Masse aus der sie bestehen, was der Pflanze ein so imponirendes Ansehen verleiht. Bei Linden kostet diese Theophrasta noch 300 Franken, bei den Herren Booth & Söhne 150 ₰.

Botanischer Garten zu Melbourne. Der begabte und enthusiastische Botaniker Herr Dr. Müller, Director des bot. Gartens zu Melbourne, überträgt seine bedeutende und werthvolle Sammlungen getrockneter Pflanzen an den botanischen Garten genannter Stadt. Dies

Herbarium enthält wohl die bedeutendste Sammlung australischer Pflanzen, die existirt, sie besteht aus gegen 6000 gut benannter Species nebst vielen Varietäten, ferner ein Herbarium von verschiedenen Pflanzen aus allen Theilen der Erde, erhöht noch durch den Werth vieler authentischer Exemplare von den berühmtesten Botanikern. Das ganze Herbarium umfaßt etwa 45,000 gleich gut getrockneter und arrangirter Arten, fast ein Sechstel der bisher entdeckten Pflanzen der Erde.

(G. Chr.)

Thomson's Retorten-Kessel. Im 13. Jahrg. der hamb. Garten- u. Bl.-Ztg. S. 19 machten wir die geehrten Leser auf den von Herrn Thomson, Gärtner im Dalkeith-Park zu Dalkeith erfundenen, äußerst praktischen neuen Retorten-Kessel zu Wasserheizungen aufmerksam, und in Folge unserer, auf Mittheilungen anerkannter Autoritäten gestützte Empfehlungen, sind bereits an einigen Orten Wasserheizungen mit diesem Retortenkessel angelegt worden, die sich auf das vortheilhafteste bewährt haben. Die sehr einfache Construction, bei einer enormen Kraft und großer Sparsamkeit, hinsichtlich des Bedarfs an Feuerrungsmaterials empfiehlt diesen Kessel vor vielen anderen.

Die Herren Alexander Shanks u. Sohn zu Arbroth, Forfarshire haben die Anfertigung dieser Kessel übernommen. Diese berühmten Maschinenbauer liefern auch zugleich die Pläne und Kostenanschläge zu den Röhrenleitungen der zu erheizenden Gewächshäuser, Treibkästen und sonstigen Lokalitäten vermittelst heißen Wassers und liefern den gewünschten Heizapparat mit allen seinen Zugehörigkeiten zu den soldesten Preisen.

So kostet ein Kessel zur Erheizung eines Wasserquantums in 500 Fuß 4zölliger Röhren £ 2. 12 s 6d. Ein einfacher Retortenkessel zu 1000 Fuß 4zöllige Röhren £ 4 5 s. — Ein dreifacher Kessel zu 3000 Fuß 4zölliger Röhren 9 £.

Im Garten des Herren P. Smith & Co. zu Bergedorf wird das im Jahre 1857 erbaute große Warmhaus vermittelst einer Wasserheizung mit einem Thomson'schen Retortenkessel geheizt und können die Besitzer nicht genug die Tüchtigkeit dieses Kessels, sowohl hinsichtlich seiner Kraft und Sparsamkeit in Bezug auf Brennmaterial rühmen. Die Herren P. Smith sind jederzeit bereit, nähere Auskunft zu ertheilen, wie sie auch gern etwaige Bestellungen auf Heizungen übernehmen. Die Redact.

Volks-Pallast. Der Glaspallast hat wahrscheinlich dem Sinn für das Colossale und Großartige, den die Engländer haben, recht sehr entsprochen, so das schon mehrfach von einem neuen Bauwerke im ähnlichen Styl die Rede gewesen ist. Jetzt theilt die Gardner's Chron. im Februarheft mit, daß eine einflußreiche Gesellschaft nicht nur die Absicht hat, ein solches Gebäude unter obigen Titel in Muswell Hill zu erbauen, sondern auch schon daselbst ein Grundstück von 450 Acres, in reizender Lage zwischen Hornsey und Highgate erworben hat. Das fragliche Gebäude soll gleich seinem großen Vorgänger in Hyde Park und Sydenham aus Eisen und Glas zusammengesetzt werden und zwar nach einer Zeichnung des Herrn Owen Jones, welcher sich jedoch beträchtliche Abweichungen von seinem Muster, sowohl hinsichtlich der Höhe als der innern

Einrichtung nach, erlaubt hat, wodurch sein Werk in mancher Betrachtung den Sydenham-Pallast übertreffen wird. Der Mittelpunkt des projektirten Gebäudes, welches etwas über 1200 Fuß lang und 400 Fuß tief wird, besteht aus einem mächtigen gewölbten Dom von 200 Fuß Spannung und 136 Fuß Höhe. Dieser Dom ist vollständig von dem übrigen Gebäude getrennt und soll zum Wintergarten oder als tropisches Conservatorium benutzt werden, wo hohe und schlanke Palmen und andere tropische Formen hinreichend Platz finden werden, ihre äußerste Entwickelung zu erhalten. Der größte Vortheil eines solchen besondern Raumes, welcher durchaus von den andern Räumen getrennt ist, wird der sein, daß man im Stande ist, die feuchte Luft, die durchaus zum Wachsthum der Pflanzen nöthig ist, also einzuschließen, daß sie nicht im Stande ist das ganze Gebäude zu durchdringen und zur Aufbewahrung von Kunsterzeugnissen und zarten Arbeiten, welche von dem geringsten Wasserdampfe leiden würden, untüchtig zu machen. Ein Raum ist nämlich bestimmt zur Aufbewahrung solcher Geräthe und Sachen, die für den Gärtner praktische Wichtigkeit haben, ein anderer Raum soll Kunsterzeugnisse und wissenschaftliche Apparate bergen. Ferner sollen kleinere Abtheilungen zu Museen, Lehrzimmern, Schauzimmern ꝛc. benutzt werden. Ein großes Concertzimmer oder Theater, in der Form eines Kreises soll dem Hauptgebäude an der nördlichen Seite angefügt werden und Sitzplätze für 10,000 Zuschauer enthalten; doch soll dieses Nebengebäude nicht die Einrichtungen im Innern des Hauptgebäudes beeinträchtigen.

Den Pallast sollen dann stufenförmig sich erhebende Gärten umgeben, die in richtiger Stufenfolge den altenglischen, italienischen, holländischen und französischen Styl sowohl, als den neuen englischen Styl und somit den Fortschritt in der Gartenkultur darstellen. Der Zweck der Gründer dieses Etablissements ist ein doppelter, es soll der Pallast ein Unterrichtsetablissement sein, wo ökonomische Botanik, Gartenkunst, Baumzucht und Agrikultur auf populäre Weise gezeigt und gelehrt, wo ein klarer Blick in die Grundsätze jedes Zweiges gewährt wird und zu gleicher Zeit soll er Unterhaltung und Ergötzung gewähren.

Daher soll der Pallast, zu dem man mit Leichtigkeit von London und von den Distrikten nördlich der Thames kommen kann, den höchsten Punkt des Besitzthums, 200 Fuß über der Ebene einnehmen. Von dem Gebäude aus wird man nun eine Aussicht über die zunächstliegenden Gärten und über einen weiten Zirkel haben, der sich über die Hauptstadt nach den Sarrey-Hügeln und dem Sydenham-Pallast, sowie über Kent, Middlesex und Essex erstreckt. Ferner wird sich an die großen Terrassen-Gärten, ein Stück von 40—50 Acres circa anschließen, welches möglichst seine natürliche Beschaffenheit behalten, in einen Park verwandelt, mit Hirschen und anderen Thieren bevölkert und mit Plätzen versehen werden soll, die zu jeder Art von Ergötzung geeignet sind. Endlich soll ein breiter Weg rund um alle Besitzungen zur größten Bequemlichkeit der Fußgänger und Reiter gezogen werden und ein See von 30 Acres soll die Niedrung einnehmen und der Fronte des Pallastes entgegen gesetzt sein.

Ob dieses so ausführlich mitgetheilte Project ausgeführt werde und welche Resultate die Ausfüh-

rung erzielen wird, muß uns die Zukunft lehren; die englische Zeitung ist von demselben ganz entzückt und verspricht der Gärtnerei von der Realisirung recht viele Vortheile.

F. W. Klatt.

Wirkung der Sonnenblumen gegen Wechselfieber. Nach der Mittheilung der „Preßer Morgenpost“ soll der Director der Sternwarte von Washington durch praktische Erfahrungen festgestellt haben, daß die Sonnenblumen in feuchten und sumpfigen Gegenden alle schädlichen Dünste auffangen und die Menschen somit vor dem Wechselfieber schützen. Der französische Armee-Moniteur, welcher hierüber die erste Mittheilung bringt, macht den Vorschlag Sonnenblumenpflanzungen in allen jenen Gegenden anzulegen, wo die Wechselfieber endemisch grassiren.

Altlüneburg, 14. Febr. In hiesiger Gegend — Landdrostei Stade, Amt Bevenstedt — schreibt man der Zeitung für Norddeutschland — klagt der Landmann über eine besondere Calamität, und zwar eine mesmodische, da sie erst seit einigen Jahren bemerklich geworden und dieses Jahr sehr empfindlich ist. In einen raunhaften Gemeinde des gedachten Amtes sollen ganze 30 Morgen Roggensaat von unten abgefressen sein, wenigstens angefressen an den Wurzeln, so daß die Halmpflanzen welk liegen. Und auch von anderen Ortschaften in der Nähe laufen ähnliche Klagen ein. Beim Nachgraben findet sich, wie es der Landmann schlechtweg nennt, ein Wurm, von 3/4 bis gut 1 Zoll Länge und von der Dicke einer Rabenfeder etwa. Der Kopf, das hornartige Bruststück, und die zwei gleichfalls härteren Ringknoten sind tiefschwarz mit blauen Stahlglanz; die übrigen und weicheren sieben Ringknoten, bei jüngeren Exemplaren weißgrau, bei älteren gelbbräunlich nachdunkelnd, die drei Paar Füße an den ersten Ringknoten grau oder bräunlich und dünn nur. Das Schwanz-Ende läuft in zwei kleine Spitzen aus. Der augenlose Kopf besteht nur aus dem Schneidewerkzeuge, das verhältnißmäßig sehr ansehnlich ist, zwei hornharte, nach innen zugeschärfte, zangenartige schwarze Scheeren, ähnlich denen des weiblichen Hirschkäfers oder Schröters, zwischen welchen, wenn man sie mit einer Nadel trennt, das Mikroskop verschiedene gelblich braune Raffelfäden zeigt. Der Ausschuß eines landwirthschaftlichen Vereins, welcher kürzlich darüber in Berathung getreten, hat auf einen „Fremdling“ erkannt, da man diese Creatur früher niemals hier bemerkt.

(H. M. Z.)

Die Kohlraupen vom Kohl abzuhalten. Den so sehr verderblichen Feind des Gemüsebaues, die Kohlraupen abzuhalten, machte der Schloßgärtner Herr Cramer in Kiel im Jahre 1858 den in verschiedenen Zeitschriften empfohlenen Versuch, in die Gemüsefelder von Strecke zu Strecke Hanf zu pflanzen, dessen starker Geruch die Schmetterlinge in Entfernung halte, so daß sie ihre Eier nicht auf die benachbarten Pflanzen absetzten. In der That ist ein Kohlfeld, in welches Herr Cramer einzelne Pflanzen des Riesenhanfes in Abständen von 12—15 Fuß gepflanzt hatte, von dieser Plage verschont geblieben,

während in den benachbarten Gärten fast alle Kohlpflanzen stark zu leiden hatten. Darnach dürfte es wohl gerathen sein, dieses so einfache Mittel weiter zu versuchen.

Neuestes Cactus Verzeichniss pro 1859.

Den zahlreichen Freunden dieser in jeder Hinsicht prachtvollen Pflanzen-Familie empfehle ich dieses Verzeichniss der in meiner Sammlung wirklich vorhandenen Arten und Unterarten zur geneigten Durchsicht. Durch Ankauf einiger grossen Sammlungen im vorigen Herbst habe ich die meinige sowohl durch Prachtexemplare als auch hinsichtlich der Artenzahl bedeutend vergrössert, sowie es mir bei dem jetzigen guten Stand meiner Pflanzen gelungen ist, manche seltene Art in Vermehrung zu bringen. Die Preise habe ich möglichst billig gestellt und gebe dafür nur gesunde, gut bewurzelte Exemplare. Das Verzeichniss, welches ausserdem noch eine Anzahl schöner succulenter Pflanzen enthält, steht auf frankirte Anforderung umgehend zu Diensten.

Erfurt, im Januar 1859.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samen-Offerte.

Mein, diesem Blatte beiliegendes Preis-Verzeichniss, empfehle ich zur gef. Beachtung und bitte unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung ergebenst, werthe Aufträge auf meine **Gemüse-, Oekonomie-, Gras-, Holz-** und **Blumen-Sämereien** u. s. w. mir gefälligst pr. Post zugehen zu lassen.

Heinrich Mette,
Samen-Cultivateur en gros in Quedlinburg
im Königreich Preussen.

Eine Anzahl des neuesten Katalogs (No. 14) der exotischen Pflanzensammlung des Herrn Director J. Linden in Brüssel ist bei der Redaction wie auch in der Expedition (Hrn. R. Kittler) der hamburger Garten-Zeitung deponirt und wird derselbe auf Verlangen franco zugesandt.

Die Redaction.

☞ Diesem Hefte ist gratis beigegeben:

1) Preisverzeichnisse über Gemüse-, Oekonomie- und Sämereien von Herrn H. Mette in Quedlinburg.
2) Verzeichniß verkäuflicher Palmen, Cycadeen, Pandaneen und Baumfarrn bei Herrn Geh. Ober-Hofbuchdrucker Decker in Berlin.

Ein Roſen-Bouquet.

(Von einem Freunde der Hamburger Gartenzeitung.)

Von all' den Roſen, die im Garten prangen,
Iſt keine in ein ſchön'res Roth verwebt,
Als die „Lord Raglan“, die mit brennendem Verlangen
Ein Plätzchen ſich für jedes Beet erſtrebt.

Wie wenn vom ſchönſten Purpurſchein umfloſſen,
Prangt dieſe Roſe noch im ſpäten Abendlicht;
Es können kaum beredt're Wort' der Liebe ſproſſen
Aus ihrem ausdrucksvollen Angeſicht.

Sie ſpricht wie ein von Lieb' berauſchter Jüngling,
Wenn er vor „Louise Odier's“ zarter Schönheit ſteht;
Sie iſt auch unbedingt die ſchönſte Jungfrau,
Um deren Gegenlieb' der ſtolze Britte fleht.

Die reizendſte Contour, die volle Rundung,
Das zarte Roſenroth malt ihre Züge weich;
Mit der erwachten Lieb' hebt ſehnend ſich der Buſen,
Zwar zweifelnd noch, doch voller Hoffnung reich.

Nicht mit dem Feu'r, wie bei achtzehn Jahren
Sich neu geſund'ne junge Herzen freun,
Tritt mit matronenhaft gemeſſ'ner Würde
Ne ält're Schönheit in den Garten ein.

Sie denkt, mag ſich der junge Anwuchs gerne brüſten,
Mein fürſtlich Blut hält mich, ich bin „La Reine“;
Und läßt ſich auch mein Haar ein wenig Grau gelüſten,
So werd' ich doch in jedem Kreis noch gern geſehn.

Es geht mir ſo, wie meinem Freund, „dem Schlachten Rieſen“,
Und meiner „Herzogin von Sutherland“;
Wir werden doch ſo leicht nicht unterliegen
Und halten muthig noch den Jüngern Stand.

Hoho, denkt „Paul Ricault“, was hilft Euch Duft und Form und Hülle,
An Farbe kommt Ihr Alle mir nicht gleich;
Im frühen Sommer leucht' ich in der ſchönſten Kirſchroth-Fülle,
Wie ſchade, daß ich einmal nur die Blumen zeig'.

Ja! wenn ich wär' in „Malmaison“ geboren,
Dem Stammſchloß meiner zarten Buſenfreundin dort,
Und könnt bis ſpät im Herbſt, wie ſie, noch floren,
Dann! — wär' ich Commandant im Roſen-Fort!

Iſt auch nur gut, denkt „Jacqueminot“, der Krieger,
Längſt iſt des Lobes Dir genug gezollt;
Und wenn auch dünn mein Herzblut, leicht mein Mieder,
Mein ſchmächt'ger Leib nicht in der üpp'gen Fülle gebaut;

So prang' ich doch als dunkle Spätherbſtknospe,
Bin mit die Letzte auf dem Blumenfeld,
Und wenn vereinſamt auch ein Blümchen ſproßte,
Bin ich noch da, wenn Reif und Schnee ſchon fällt.

Gönn' auch ein Plätzchen mir, mein Waffenbruder,
Ruft „General von Caſtellan“ ihm zu;
Denk' nicht, daß ganz allein das Ruhmes-Ruder
Im Roſenſee kannſt führen Du.

Denn wiſſe, Du und ich und „Doctor Jullard“
Und Freundinn Incarnat, „die Malmaiſon“,
Sind Glieder jenes edlen ſeltenen Kleeblatts,
Nimm nicht den Ruhm für Dich allein, Fripon! —

Doch ſeht, welch edles Haupt ragt dort mit Würde
Hoch über viele *) Schweſterköpfe ſtolz hinweg;
Mit welchem Adel hebt es ſeine Bürde,
Die ſchwerbeladnen Blumenblätter hoch!

Der „Comte Nanteuil“ iſt es, der ſtolze Sieger,
Noch voller, ſchaalenförmiger, noch edler als „la Reine“;
Und jener Taubenkopf mit roſigem Gefieder?
„Auguste Mie,“ wie zum Verlieben ſchön.

Ach nein, nun ſeh' doch einer jenes Röschen,
Welch reizendes Gebild der Phantaſie,
In Karmoiſin gukt jedes junge Knöspchen,
Ihr Nam'? der „Prinz Léon van Kotſchoubie“.

Wohl ließen kaum ſich ſchön're Roſen denken,
Als dieſe, und die vielen Andern mehr,
In's Reich der Unabſehbarkeit könnt' man ſich ſenken,
Wollt man ſie nennen alle bei der Reihe her.

Wer kennt nicht die rüſtige Bauern-Schöne,
„Baronne Prévost“, plebejiſch rund und groß?

*) Der Accuſativ iſt hier abſichtlich geſetzt; weil es ſich nicht um die Stelle, „wo; ſondern vielmehr um die Richtung „wohin“ handelt. Anm. d. Autors.

Und jene feine reizende Sirene,
Vom ſchlankſten Gliederbau, „Madame Place,“

Wen brächten nicht in's freudigſte Entzücken
Die „Pfingſtröschen“, der Kindheit holdes Pfand;
Wen konnten ſie als Kind nicht reich beglücken,
Wer hätt' ſie nicht gepflegt mit ſorglich-eigner Hand.

Wer dächte nicht mit Wehmuth jener Tage,
Wo man ein jubelnd Kind, die „Centifolien“ brach,
Die ſchöne Zeit iſt hin, 'ne ausgeklung'ne Sage,
Und glücklich, denen Dorn und Stachel ferne lag.

Welch' junges Mädchen könnt' nicht zaubriſch lächeln,
Beim Anblick von „Moosroſen“ für ihr Haar,
Welch mooſig-ſüßen Duft würd' jede Knospe fächeln,
Die der Geliebte ihr zum Balle brächte dar.

Und welch' ein Zauber liegt in jeder Roſe,
Wie wirkt veredelnd ſie auf's menſchliche Gemüth,
Welch' ein Symbol von Adel, Schönheit, Edelſinn und Liebe,
Wenn man entzückt, begeiſtert in ihr Inn'res ſieht.

Ein Meer von traurig-freudigen Erinnerungen
Weckt ihre Poeſie im tiefſten Innern wach,
Wohl dem, dem ſtets auf ſeinen Wanderungen
Die Roſ', als treueſte Freundin, blickte nach.

Pforten.

Ein Blick um hundert Jahre zurück.

Raſtloſen Schrittes eilt die Zeit im Reich der Gartenkunſt vorwärts. Bunt und bunter umgaukeln uns immer wechſelnd ätheriſche Blumengeſtalten, ſchnell wie ein leuchtendes Meteor am Himmel der Pflanzenwelt emporſteigend und verſchwindend, um Erſcheinung an Erſcheinung zu reihen. Was uns geſtern heilig war, heut iſt's enthront, was die Ahnen geliebt und geachtet, nur ein Lächeln vermag's den Enkeln abzugewinnen! Das alte iſt in Trümmer zerfallen und auch die ſtarren, ſteifen Formen des vorigen Gartenſtyls haben ſich längſt geſtreckt und geweitet, und jugendfriſche Sproſſen nach allen Seiten getrieben; überall aus den heutigen guten Gärten lacht uns eine freie veredelte Natur entgegen, und rundum werden der Zeugen einer vergangenen Geſchmacksrichtung weniger. Nur noch einzelne Ueberreſte hat das rollende Rad der Zeit unzermalmt gelaſſen, und eine dieſer immerhin ehrwürdigen Ruinen ſei heut der Vergeſſenheit entriſſen.

Pförten? — hat sich gewiß mancher der Leser gefragt, und wie eine Erinnerung aus alter Zeit ist der Name an ihn herangetreten, ohne daß er ihn zu deuten wüßte und doch ist's heut wie damals dasselbe freundlich gebaute Städtchen der Lausitz, in dem einst der allmächtige Cabinetsminister August's von Polen und Sachsen, der Graf von Brühl, einen schimmernden Luxus entfaltete, worin selbst der große Preußenkönig ein schwacher Mensch war, als er das schon 1745 stark geplünderte Schloß seines unermüdlichen Gegners mit all' seinen Schätzen am 5. September 1758 den Flammen übergeben hieß.

Lange haben die geschwärzten Mauern den Blicken unbehindert gestattet das total ausgebrannte Innere zu mustern, längst sind die hageren Gestalten der Pappeln, wie stumme traurige Schildwachgenossen ringsum postirt, zu gleicher Höhe mit dem Dach emporgeschossen: die jetzigen Besitzer begannen erst im vorigen Jahre eine Restauration des weitläuftigen Gebäudes, nachdem es gerade ein Jahrhundert — ein mahnendes Erinnerungzeichen an jene Zeit — unberührt gestanden.

Der Garten, in jener Zeit auch arg devastirt, ist noch heut zum Theil im französischen Genre gehalten, und manche Scenerie von damals tritt bei einiger Sachkenntniß wieder mit hellen Farben vor den Geist des Beschauers; mit einem sehr übersichtlich angefertigten Plane in der Hand, der sicherlich nach 1746 und vor 1758 aufgenommen wurde, wird es also dem Verfasser möglich sein, den Schleier zu lüften, der bisher auf den Blüthentagen eines fast untergegangenen Prachtwerkes ruhte.

Den Ausgangspunkt desselben bildet, wie es der damalige Styl der Baukunst und Architektur, insbesondere seine Formen entlehnend, überhaupt bedingte, das Schloß, und da wohl anzunehmen ist, daß der Fremde von der Stadt aus den Eintritt sucht, möge es der leichtern Uebersicht wegen auch zuerst erwähnt sein, wobei der freundliche Leser ja eingedenk sein wolle, daß wir uns im Jahre 1756 etwa bewegen.

Durch einen starken und hohen Gitterzaum, in dessen Rundung zu beiden Seiten Cisternen angebracht sind, betritt man den Schloßhof, gebildet durch den im gleichen Styl aufgeführte Gebäude, von denen das mittlere das eigentliche kostbar ausgeschmückte Palais ist, während die beiden anderen*) zur Aufnahme verschiedener Beamtenchargen dienen.

Vier regelmäßige Rasenstücke, gehoben durch bunte Kiesgänge, in denen sich Statuen befinden, füllen diesen Raum, das mit Figuren umgebene und geschmückte Palais selbst zieht indeß doch vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ein breites Portal, dessen Balcon wunderschön gearbeitete Steinbilder tragen, führt in dasselbe, in echt antikem Styl eingerichtet. Das Porzellangeschirr, wundersam aus allerhand mythologischen Gruppirungen gebildet, ist sein werthvollster Schmuck, ohne der sonstigen kostbaren inneren Einrichtung der Zimmer besonders gedenken zu wollen.

Wir verlassen es auf der entgegengesetzten Seite über eine schöne Rampe, und indem wir seine regelmäßige äußere Ausstattung unserer Betrachtung unterwerfen, betreten wir auch die Plätze an den Seitenflügeln des Palastes.

*) Gegenwärtig die Wohnsitze der gräflichen Familie.

Der nördliche Flügel ist an sich interessant durch eine vergoldete Inschrift, welche den 42 Schuh hoch erfolgten glücklichen Sprung des siebenjährigen Reichsgrafen von Promnitz, den 25. August 1682, als merkwürdiges Denkmal göttlicher Güte und Vorsicht der Nachwelt aufbewahrt.

Vor ihm birgt ein heckenumschlossenes Viereck ein größeres beschattetes Bassin, geschmückt mit vielen Bänken und Statuen und einigen arabeskenartigen Blumenstücken, von denen aus man in ein Rondel gelangt, welchem eine schöne Fontaine Kühlung spendet.

Sorgsamer noch ist der südliche Flügel bedacht. Rasenstücke zwischen gut gepflegten Linden-Alleen angelegt, umschließen wiederum eine Fontaine, deren melodischem Fall man von vier Bänken aus lauschen kann, angebracht in regelmäßig wiederkehrenden Rundungen. Weiter hinauf dann sind es Blumenstücke und über einigen kleinen Terrassen eine Bogenveranda, wieder geziert mit Bänken und Statuen, die einen traulichen Aufenthalt gewähren.

Quer vor dem Schlosse mit seiner Rampe nun liegt eine breite Linden-Allee, deren südliches Ende eine der schönsten Ueberraschungen der französischen Anlage aufzuweisen hat.

Unter einer erhöhten Veranda nämlich gelangt man zu einer Fontaine, die ihr Wasser in mehreren Cascaden in geräumige Becken ergießt, und sehr elegant umfriedigt ist.

Von dieser Quer-Allee aus, wenn wir unsern Standpunkt auf der Rampe nehmen, bildet die fernere Anlage ein Quadrat, dreimal der Länge und dreimal der Breite nach in den Hauptmomenten getheilt.

Den mittelsten und schmalsten dieser Abschnitte schließen zwei Alleen ein, die in gerader Richtung mit den Seitenflügeln des Schlosses sich bis an den See fortsetzen, der die Anlage begränzt, und einen eigenthümlich ergreifenden Eindruck bei einer Umschau von der Rampe aus auf unser Gemüth macht.

Ueber eine größere Composition aus tulpenartigen Blumenstücken und zwei Wasserbecken hinweg, hinter welchen uns in vier niedriger belegenen symmetrisch angelegten Quartieren zunächst wieder statuengeschmückte Blumenrabatten und später in zwei Quarre's ein schöner regelmäßig bestandener Lindenhain ergötzen, überrascht uns nämlich nach all' dieser Regelmäßigkeit der weite freie Spiegel des wellengekräuselten See's, der endlich unsern Horizont schließt.

Von den Abschnitten zu beiden Seiten der Seiten-Alleen dieses Platzes enthält der nördlich gelegene wieder viel Unerwartetes.

In größter Nähe des Schlosses birgt der Mittelpunkt von vielen zusammenlaufenden gänzlich überwachsenen Buchenhecken, ein Marmorhäuschen, dessen freundliche blendende Weiße inmitten dieses grünen Blättermeers auf's Angenehmste zum Gemüth spricht.

Das anstoßende eben so große Viereck aber im Weitergehen durch eine Allee betretend, haben wir uns mit Vorsicht zu wappnen. Denn diesmal führt der Weg in ein weitverzweigtes Labyrinth, in dem uns allein das über uns schwebende Himmelblau enthüllt bleibt.

Das Glück indeß ist uns hold, und in der Folge finden wir einen anderen kleineren Raum mit vielen Gängen, an dessen Ende ein stei-

neuer Sarkophag mit der Inschrift: „Manibus amicorum“, unserer Seele Flug in überirdische Regionen lenkt.

Von ihm aus erreicht man auch leicht das Orangeriehaus mit vielen davor postirten Bäumen; hinter ihm sind bedeutende Pläne zur Gewinnung von Gemüse und Obst verwandt.

Doch wir kehren zu unserem Freundschaftsdenkmal zurück und lassen uns an zwei sprudelnden Fontainen und dem kühlen See vorbei, durch das bekannte Grün des Lindenhains in den dritten der genannten Abschnitte locken.

Der Anblick einiger Abtheilungen mit Blumen und Rasenstücken verräth unserer Neugier weniger als ein dahinter liegender terrassenartig emporsteigender Platz. Allerdings auch bietet er uns wieder wesentlich andere Abwechselungen: einen Schießstand und eine Kegelbahn, Schaukeln und andere Vorrichtungen zu Spielen, Sitzplätze von verschiedener Art und Form, alles berechnet für den Comfort einer größeren Gesellschaft.

Auch ein größeres Rondel, zu dem uns der schimmernde Anblick eines Wasserbassins lockt, verspricht uns einen interessanten Fortgang.

Es umgeben dasselbe große Linden und terrassirte Gänge, die sich, immer weitere Bogen beschreibend, endlich in einer Hecke schließen. Diese umkleidet größere Baumpartien, in deren Mitte sich geradeüber vom Bassin als Schlußpunkt dieser Abtheilung ein nettes Zelt erhebt, welches einer Betrachtung seiner Zierlichkeit wegen werth ist.

Der Ausgang von hier aber führt uns wieder an das Schloß, und wer sich durch einen Umgang in dieser Pracht nicht befriedigt fühlen sollte, der möge gern eine nochmalige Durchsicht vornehmen.

Indessen mögen hier noch einige allgemeine Punkte erörtert werden.

Der eigentliche Gründer des Gartens ist wohl kaum mehr zu ermitteln; sicherlich aber mag ihn zuerst wohl die Herzogin Louise Elisabeth von Sachsen Merseburg (Wittwe des 1690 in der Schlacht bei Fleurus gebliebenen Herzogs Philipp von S. M.) erheblich verschönert haben.

Diese hochsinnige Dame bezog im Mai 1704 als Residenzstadt das benachbarte Fabrikstädtchen Forst, mit Pförten eine Herrschaft bildend und brachte dahin unter ihrem Hofstaat auch einen Hofgärtner mit. Vom Forst'ner Garten existirt heut keine Spur mehr, obwohl er damals auch bedeutend zu nennen gewesen sein muß, der zu Pförten aber erreichte seinen Flor erst unter dem Eingangs dieser Blätter genannten Grafen von Brühl. Er muß sein eigentlicher Anleger genannt werden.

Die Einrichtung desselben war mit einem Worte prachtvoll und die Menge verstümmelter Statuen, alle über Lebensgröße gearbeitet, die noch heut hier zu finden ist, zeugt dafür vorzugsweise. Jede davon bildete an sich ein Meisterwerk, aber auch nicht eine ist vom Vandalismus jener Tage verschont geblieben.

Die Fontainen waren auf's Schönste mit Stein und auch Marmor ausgelegt, alle einzelnen Häuschen u. dgl. musterhaft aufgeführt und alte Leute erinnern sich noch so mancher Scenerien, die jetzt gänzlich verschwunden sind, weil sie dem Neuen Platz machen mußten.

Für die Speisung der Wasserkünste war ein besonderer Fontainier

(um 1758, Namens Oſten angeſtellt; die Inſtandhaltung der Baumfiguren, der überaus zahlreichen Hecken und Alleen, der Blumenſtücke und Gänge mußte jährlich ſchon eine hohe Summe erfordern.

Keine Koſten wurden geſcheut, und als Beiſpiel dafür ſei nur angeführt, daß jeder richtig behandelte Lindenbaum aus Holland bezogen und mit einem Ducaten bezahlt wurde. Man bedenke, welche Summen alſo allein dafür aufgewendet worden ſind; denn es mußten viele Hunderte von Bäumen herbeigeſchafft und auch die noch koſtbarere Orangerie erſtanden werden.

An großen Erdarbeiten fehlte es dabei auch nicht; bis an's Schloß erſtreckten ſich ſumpfartige Erweiterungen des See's, die Anfangs kaum ausfüllbar erſchienen, und von denen einige Theile heut wieder morastig geworden ſind. Der Macht aber und dem Reichthum wurde die Herrſchaft auch hier.

Für eine franzöſiſche Anlage war die Fläche übrigens ſehr bedeutend; denn eine halbe Stunde kann ihr Umfang immer geſchätzt werden.

Eine kleinere aber ähnliche Anlage befindet ſich in den Hauptzügen ziemlich erhalten noch in Oegeln bei Pförten, gleichfalls jenem Beſitzer gehörig und von ihm angelegt, obgleich ſein Name heut freilich ſo gut wie verſchollen iſt im Bereich der Gartenkunde. Aber auch ſonſt ſind ſie ja alle, dieſe Reichthümer und Herrlichkeiten, herabgeſunken in's Reich der Vergeſſenheit;

"vergrämt, verwüſtet, kalt und alt,"

wie ein Dichter in anderer Hinſicht ſagt, ſchauen ſie heut zu uns empor, nur der Kümmerlichkeit entriſſen, wo günſtiges Geſchick und Menſchenhand ſie gepflegt und erhalten.

So wenig nun auch dieſer alte ſteife Styl jemals wieder ein Recht in den Gärten erlangen möge und wird, ſo ſehr iſt es doch Pflicht für ſeine Geſchichte Denkmäler zu ſammeln und dafür allein ſollen dieſe Blätter geſchrieben ſein.

Doch nicht mit der Schilderung jener Vergangenheit ſoll der Umblick des freundlichen Leſers geſchloſſen ſein, auch die gegenwärtigen Räume des Gartens mögen kurz Revue paſſiren.

Freilich klingt kein Plätſchern der Springbrunnen mehr melodiſch in unſer Ohr, ſchaut uns keine wunderliche Baumgeſtalt mehr an, freilich liegen rings die Statuen elend verſtümmelt umher, bedürfen wir keines Ariadnefadens mehr im dunklen Irrgang: freier jedoch haben ſich die Linden zu mächtigen ſchattenſpendenden Alleebäumen entwickelt, in deren Grün man angenehm promenirt, freundlicher winkt die breite Glasfläche der neuen pflanzenreicheren Gewächshäuſer, überraſchender endigt unſer Horizont an den Ausgangspunkten der ſchnurgeraden Gänge, bald mit einem freundlichen Gebäude, bald mit dem Spiegel des nahen See's.

Dieſer See iſt das Kleinod der hieſigen Anlagen. Wir übergehen den übrigen Garten — der aber noch immer ſeine Lindenalleen hat, ſeine geſchorenen Buchenhecken, bald Blumen-, bald Gemüſe-, bald Baumſchulland umhegend, hier und da einige Neuerungen im engliſchen

Styl —, um dieſem Theil derſelben eine größere Aufmerkſamkeit zu widmen. So wenig auch hier die Kunſt gethan, verdient er es dennoch.

Nichts könnte geeigneter ſein, ihn effectvoll in Anblick zu bringen, als die alten Linden-Alleen durch die er ſichtbar wird, und wo eine ſo anziehende freie Landſchaft plötzlich wie mit einem Zauberſchlage vor uns auftaucht, da mag der contraſtvollen Wirkung zu Liebe, gern die kleine Ermüdung durch das vorherige Einerlei verziehen ſein.

Unter einem dichtgewölbten Laubdache, ſelbſt im heißeſten Sommer angenehme Kühlung ſpendend, leuchtet uns in der Ferne allein der bläuliche Waſſerſpiegel entgegen. Nach und nach weitet er ſich, die Umgebung ſeiner Ufer zeigt einzelne Standbäume, kleinere geſchloſſene Gehölzparthien, und verſtattet hier und da dem Auge auf dem dunklen Grunde einer Kiefernwand zu ruhen; endlich aber treten wir aus der letzten Baumfaçade hervor, und unter einem weitverzweigten Weidenſtamme enthüllt ſich uns des See's ganze Pracht.

So weit das Auge reicht, Waſſer, leichtgekräuſeltes, lichtgefärbtes, ſchilfumkränztes Waſſer! Uns zur Linken erhebt ſich längs des Sees ein dichtbewaldeter Hügelrücken mit tiefen Einſchnitten, die eine reizende Modulation der Farbentöne des eigentlich einförmigen Holzbeſtandes bewirken; uns zur Rechten iſt das Ufer eben, vielfach mit einzelnen Bäumen und Gruppen geziert, in ziemlicher Entfernung in einem allerliebſten Rahmen die Kirche von Nieder-Jeſer zeigend; im Hintergrunde ziehen ſich in vielen Abſtufungen bläuliche Waldränder hin.

Und nun erſt die Uferberge!

Wild und zerklüftet, nicht eben üppig bewachſen, bieten ſie an und für ſich zwar wenig Intereſſe, um ſo weitere und ſchönere Ausſichten aber über den See und im Verein mit ihm.

Ihr Gipfelpunkt iſt „Chriſtinens Ruhe“, zu Ehren der Gemahlin des verſtorbenen Standesherrn genannt. Die Ausſicht von hier über das Waſſer, reich belebt durch mitunter ſeltene Waſſervögelſchaaren, weithin über zahlloſe bewaldete Hügelketten, freundliche Dorfſitze und Kirchthürme in ihrem Schooße bergend, erinnert annähernd an manche Züge der heitern ſächſiſchen Schweiz, trägt eine innere Aehnlichkeit mit mancher mühevoll hergeſtellten Parthie in den Muskauer Badebergen. Fürſt Pückler ſoll von der ganzen Lage auch ſehr eingenommen worden ſein, als er auf dieſen Höhen ſtand, und nicht ein Künſtlergenius nur, ein jedes empfängliche Gemüth muß es werden.

Der ſchönen Punkte giebt es auch ſonſt noch um den See genug, ein guter Fußgänger kann eine Stunde rechnen, wenn er ihn ohne weiteren Aufenthalt über Chriſtinens Ruh umſchreiten will. Geſchehen iſt im Ganzen bisher wenig für die Verſchönerung dieſer ſo gebotenen Gelegenheit in der ſonſt monotonen Landſchaft, doch findet man reinliche Wege um den See und über die Berge geführt, und eine Hoffnung für ihre Vervollkommnung in dem regeren Intereſſe, mit der das jetzige gräfliche Haus wieder dieſen Orten ſeine Aufmerkſamkeit zuwendet.

Spärlich von Fremden, der ſchlechten Communication wegen beſucht, faſt vergeſſen in der gärtneriſchen Welt, mögen dieſe Zeilen auch dem Touriſten ein Wink ſein, Pförten im Sommer zu beſuchen. In einer Stunde iſt es von Jeſſnitz aus, einer Station der Niederſchleſ. Märk. Eiſenbahn zu erreichen, und der Mann von Fach findet in dem jetzigen

Vorsteher des Gartens, Herrn Groß, einen freundlichen Erklärer, falls er weitere Aufschlüsse wünschen sollte.

Oskar Teichert.

Garten-Notizen.

Der Blasé'sche Garten in Elberfeld.

Es wird ohne Zweifel die vielen Leser der Garten-Zeitung interessiren, Einiges über den Blasé'schen Garten in Elberfeld zu erfahren. Diejenigen, welche denselben schon kennen, werden mit mir darin übereinstimmen, daß sein weit verbreiteter Ruf ein wohl verdienter ist, und gerne von den vielen Bereicherungen des Gartens Kenntniß nehmen, von denen ich nur Einzelnes erwähnen kann.

Wenigen Gärten mag es gelungen sein, in verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit, eine so gewählte Pflanzensammlung darzubieten, wie sie der Blasé'sche Garten besitzt. Es würde dieses Resultat selbst bei der großen Liebe zur Pflanzenwelt des Besitzers, welchem sein ebenso großer Scharfblick für das wirklich Gute und Schöne eigen ist, schwerlich erreicht worden sein, wenn nicht durch die sehr ausgebreiteten commerziellen Beziehungen desselben, ihm aus allen interessanten Zonen und Ländern Kanäle eröffnet wurden, welche ihm die seltensten botanischen Schätze reichlich zufließen ließen.

Wenn ich dazu übergehe, einen Blick in diese Schätze der Gewächshäuser zu eröffnen, so kann es mir nicht einfallen, sie erschöpfend darstellen zu wollen; da es vielmehr nur meine Aufgabe sein kann, die Aufmerksamkeit der Pflanzenfreunde, welche diese Sammlung noch nicht kennen möchten, darauf hinzulenken, um sie zu veranlassen, bei vorkommender Gelegenheit es nicht zu versäumen, sich von der Kultur und dem Reichthum derselben durch eigene Anschauung zu überzeugen. Ein Aufenthalt von wenigen Stunden, zur Besichtigung des in der Nähe der Eisenbahn-Station zu Elberfeld gelegenen Gartens, wird sich gewiß belohnt finden.

Wenn ich mit der reizenden Gattung des Farrn beginne, so glaube ich, nicht unbekannt mit den sonstigen größeren Sammlungen dieser Lieblingspflanze, wohl behaupten zu dürfen, daß selbige die größte auf dem Continent, und wird der Besucher sicherlich über deren Umfang und trefflichen Kultur überrascht werden. Schon vor vielen Jahren, als anderwärts kaum noch die größere Kultur dieser schönen Pflanzen begonnen, sah ich dort schon viele der schönsten Baumfarrn aus Sporen erziehen, welche sich in unglaublich kurzer Zeit zu kräftigen Pflanzen üppich entwickelten und nach vier Jahren schon eine Stammhöhe von einem Fuße zeigten. Auf diese Weise erzog der Garten einige 30 Arten. Was die übrigen Arten dieser begünstigsten Pflanzen-Gattung betrifft, so erlaube ich mir von dem vielen Seltenen und Schönen, von dessen vollständiger Aufzählung ich abstehen muß, Folgendes zu notiren:

Pteris crispa, Polypodium eximium, Asplenium adiantoides; Trichomanes trichoideum, Bancrofti, muscoides, venosum; ferner: Todea rivularis, africana, pellucida; Gleichenia dicarpa, dichotoma, flabellata etc. Endlich darf ich hier einige schöne und seltene Baumfarrn nicht übergehen, namentlich: Alsophila contaminans, compta, elegans, Humboldti, Loddigesi, paleolata, Miqueli etc., besonders ein wahres Prachtexemplar von Cyathea aurea mit 10 Fuß hohen Stamm und reicher sich ganz horizontal ausbreitender Krone, von ganz besonderer Schönheit. Ein riesiges Angiopteris hat 10 Fuß lange Wedel nach allen Richtungen hin ausgebreitet und gedeihen daneben einige hundert kleine Pflanzen vortrefflich.

Zu den königlichen Palmen übergehend, wird der Beschauer nicht weniger überrascht sein über die Menge der älteren und jüngeren Exemplare dieser gesuchten Pflanze. Die echte Livistona rotundifolia in starken Prachtpflanzen fesselt ebenso die Aufmerksamkeit als die schöne L. Diepenhorsti, Hogendorpii etc. An ostindischen Arten hat der Garten eine sehr große Auswahl, von Calamus allein einige 20 Arten, unter andern: Cal. „rottan sago", polembanicus, ciliaris, crinitus, rudentum, javensis, asperrimus, Draco, echt von Sumatra, nicht der in den Gärten vielfach dafür ausgegebene Cal. verus, niger, circinalis, coronatus, Reinwardti, flabellatus, spec hort. Blass No. 2; u. s. w.; ferner: Pinanga javana, superba; Seaforthia gracilis; Pleatocomia spec. von Sumatra, Prachtexemplare von Corypha Gebanga; 2 Thrinax-Arten von Hayti ꝛc.

Die Orchideen finden sich in schönen kräftigen Exemplaren in dem Garten. Im höchsten Grade überrascht wird jeder Besucher aber ohne Zweifel über die glückliche Kultur der reizenden Anecochilus-Arten, welche in Tausenden von Exemplaren aller Art, sich dem erstaunten Auge darbieten und deren Aufzählung ich, da sie hinreichend bekannt, unterlassen darf.

Von sonstigen Warmhauspflanzen sind zu nennen: Nephelaphyllum pulchrum, eine Orchidee, welche der Anecochilus nahe steht, und ganz eigenthümliche orangefarbige metallisch glänzende Blätter, mit heller und dunkler Zeichnung hat. Die viel gerühmte, auch wirklich ausgezeichnete Pogonia discolor ist in 7—8 Exemplaren vertreten, die Kultur ist nach der Versicherung des Obergärtners sehr leicht. Die übrigen Pogonia-Arten: concolor, crispatula, nerviliae sind zwar auch interessant, zeichnen sich aber nicht besonders durch Blatt-Schönheit aus. Nerviliae scheint übrigens von concolor wenig oder gar nicht verschieden. Als Seltenheiten erwähne ich noch: Terminalia mollis mit großen glänzenden Blättern; Fragraea litteralis; Jambosa formosa, Liquidambar Altingia; Paratropia parasitica; Curatella imperialis; Barringtonia macrocarpa und noch eine Menge anderer Pflanzen, deren Aufzählung zu weit führen würde.

Noch erwähnen will ich der Mauritia flexuosa, einer Fächerpalme aus Süd-Amerika, die in zahlreicher Vermehrung und üppigsten Wachsthum steht. Bis dahin soll man sie noch sehr wenig in Kultur gehabt haben, und jedoch scheint sie nicht schwierig zu sein. Alle Reisende rühmen die Schönheit dieser Palme.

Bei der Besichtigung der Gewächshäuser des Blass'schen Gartens

wird sich endlich Jedem ein Bedauern darüber aufdrängen, daß dessen Terrain ein so beschränktes und die Vermehrung der Gewächshäuser, deren vier vorhanden, in der Mitte der industriellen, mit Grund und Boden geizenden Stadt nicht wohl möglich ist. Im andern Falle möchten leicht doppelt so viele Häuser mit dem Inhalt des vorhandenen zu füllen sein und dadurch dem Beschauer die Schönheit der Pflanzen und Reichhaltigkeit der Sammlung, welche trotzdem einen so wohlthuenden Eindruck machen, in seinem noch vortheilhafteren Gewande erscheinen.

Wer Specielleres über den Vorrath der reichen Sammlungen des Gartens zu wissen wünscht, dem sei der eben erschienene Catalog No. 7, welcher bei jenem Umfang von 64 Seiten, nur Warmhauspflanzen umfaßt, empfohlen. Pflanzenfreunde werden darin mehr Veranlassung zu dem Wunsche, diese und jene Schönheit der Pflanzenwelt zu besitzen, finden. Schließlich darf Ref. versichern, daß seine langjährige Erfahrung die Reellität und Loyalität der Garten-Verwaltung bei Beziehungen stets bewährt gefunden hat.

Bericht

über die

von dem Vereine in Schleswig, Holstein und Lauenburg zum Versuche angebauten und einige andere neue Pflanzen. *)

Auch in dem abgelaufenen Jahre hat der Verein in Schleswig, Holstein und Lauenburg eine Anzahl Sämereien aus der renommirten Samen-Handlung von Hr. A. Haage jun. in Erfurt kommen lassen und dieselben dem Herrn Kunst- und Handelsgärtner Dahle in Kiel zum Anbau übergeben. Ueber die Erfolge dieser Versuchskulturen wird hiermit ein kurzer Bericht abgestattet.

1. Zierpflanzen.

Arctotis breviscarpa eine Compositee mit ganz niedrigem Stengel und fest auf dem Boden aufliegender Rosette von ziemlich großen Blättern, die zierlich eingeschnitten sind. Die nur im Sonnenschein sich öffnenden Blumen haben schwarze Scheiben- und schön orangefarbene Strahlenblüthen. Recht schön und für niedrige Einfassungen wohl geeignet.

Bidens ferulaefolia. Gelbe unbedeutende Blumen, zierlich geschlitzte Blätter, aber sperriger Wuchs. Entbehrlich.

Browallia Czarnicowski ist von Br. elata nur durch etwas lebhaftere Farben verschieden und gleich dieser nur zur Topfkultur geeignet.

Chenopodium Anthelminticum eine durchaus unbedeutende Pflanze, die nicht den mindesten dekorativen Werth hat.

---

*) Aus dem so eben erschienenen Jahresberichte des genannten Vereins entnommen.

Charieis Neesii fl. roseo eine ziemlich conſtante Abweichung der ſonſt blauen Ch. N. in Roſa, gleich dieſer zu ganz niedrigen Einfaſſungen zu benutzen.

Calonyction diversifolium zeigte ein ſehr ſchön geſtaltetes, tief geſchlitztes Blatt und brachte bei ziemlich lebhaftem Wuchſe im freien Grunde auch zahlreiche Knospen, die ſich aber doch nicht entwickelten, trotz des ſo warmen Sommers und langdauernden Herbſtes; gehört alſo in das Gewächshaus.

Collinsia multicolor marmorata. Es gingen nur ſehr wenige Pflanzen auf, die wenig Unterſchied von der Stamm-Art zeigten.

Collinsia candidissima conſtant und rein weiß; ſchöne Einfaſſung.

Collinsia heterophylla von C. bicolor nicht verſchieden.

Coreopsis Drummondi grandiflora brachte unter der Mehrzahl gewöhnlicher auch einige Pflanzen, welche allerdings größer als die Species und halb gefüllt waren. Schön.

Clarkia pulchella marginata liefert wieder einmal ein Beiſpiel von der auf gärtneriſchem Gebiete jetzt leider ſo vielfach herrſchenden Uebertreibung. Der Samen dieſer neuen Varietät war von England aus zu ſehr hohen Preiſen in den Handel gebracht und zur Empfehlung waren ſehr ſchön ausgeſtattete Abbildungen in Zeitſchriften und anderweit verbreitet, welche die Pflanze mit ſehr großen Blumen von intenſivem, reinem Karminpurpur mit ſcharf begrenztem breitem, rein weißem Grunde darſtellten. Dagegen ſtachen denn die Blumen in der Wirklichkeit gar ſehr ab, indem ſie klein, trübroth waren und allerdings wohl einen weißen Rand zeigten, der aber ſchmal und in der Grundfarbe verwaſchen war. Die Blumen machten daher bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck, als ob ſie im Verwelken begriffen wären, und ſtehen der alten Stammart an Schönheit bedeuterd nach.

Ceratochloa pendula eine Grasart, welche in decorativer Hinſicht ganz unbedeutend iſt, etwa einem einheimiſchen Bromus gleich.

Cosmidium Burridgeanum iſt recht hübſch, erinnert aber doch ſo ſehr an die bekannte Calliopsis bicolor, daß es neben dieſer wohl entbehrlich iſt.

Celosia cristata macrocarphala zeigte ſich als dem gewöhnlichen Hahnenkamm weit nachſtehend, indem ſie höheren Wuchs und keineswegs breitere Kämme hatte, als jener, ſondern mehr runden Blüthenſtand.

Datura ferox war wohl nicht ächt, da die Pflanzen ſich von der allerdings ſchönen Datura Tatula nicht verſchieden zeigten.

Erysimum Arkansanum iſt mattgelb und viel weniger ſchön als das längſt bekannte E. Peroffskianum. Gleicht etwa dem als Hederich bekannten läſtigen Unkraute.

Gaillardia picta marginata alba brachte nur ſehr wenige weißgerandete Blumen, die keineswegs ſchöner waren, als die Stammart, welche in der Mehrzahl der anderen Pflanzen wieder erſchien.

Ipomea hederacea superba iſt eine ſehr ſchöne dunkelblaue, weißgerandete Trichterwinde, die aber ebenſowenig, als die ähnliche I. limbata hier zur Kultur im Freien ſich eignet.

Ipomea purpurea Burridgii und Diksoni ſind ein paar ſchöne Varietäten der I. p., erſtere dunkelviolett, letztere dunkelcarmoiſin.

Lobelia heterophylla major kaum verſchieden von der allerdings ſchönen **Lob. heterophylla.**

Lobelia gracilis alba lieferte meiſt die alte **L. erinoides**, zwiſchen der ſich einzelne Pflanzen mit mattröthlichweißen Blumen zeigten.

Lobelia Lindleyana ſollte nach Angabe der Verbreiter „dunkelroth und prachtvoll“ ſein, brachte aber ebenfalls meiſt nur die gewöhnliche **L. erinoides** mit einigen Pflanzen die trübroſarothe Blumen hatten.

Lupinus species Texas iſt eine recht hübſche, ziemlich niedrige Lupine von ſehr lebhaft blauer Farbe.

Lupinus nanus fl. albo noch ſehr inconſtant, meiſt zur alten blauen Zwerg-Art zurückkehrend.

Lupinus hybridus insignis iſt das Seitenſtück zu der oben angeführten **Clarkia pulchella marginata**, wurde ebenfalls von England zu hohen Preiſen verbreitet und durch brillante Abbildung empfohlen. Die ziemlich gut roſa gefüllten Blumen verdienen immerhin einen Platz neben **L. Cruikshanski** und ähnliche, aber keineswegs die Anpreiſung, welche ſie in Schrift und Bild gefunden.

Leptosiphon aureum (Gilia) lieferte eine dunkle und lebhaft gefärbte Abart des **L. luteum**, in das viele Pflanzen zurückſchlagen, giebt aber wie dieſes eine zierliche feine Einfaſſung.

Linum Lewisi variegata dürfte wohl nicht echt geweſen ſein, da der erhalte Same nichts Anderes, als das längſt bekannte **L. perenne** lieferte.

Melica ciliata iſt eine im ſüdlichen Deutſchland wildwachſende, durch nichts ausgezeichnete Grasart.

Nepeta Meyeri eine höchſt unbedeutende kleinblumige, etwa fußhohe Labiate.

Oenothera taraxarifolia iſt eine ganz niedrige Nachtkerze mit enorm großen röthlichweißen Blumen, die gegen den Herbſt hin auch den ganzen Tag geöffnet bleiben.

Obeliscaria pulcherrima wurde vor Jahren ſchon als **Rudbeckia Drummondi** kultivirt, und verdient mit ſeinen bald vergänglichen dunkelbraunen Blumen durchaus nicht das vielfach geſpendete Lob.

Ononis pubescens. Noch weniger iſt dies der Fall bei dieſer Pflanze, welche der wildwachſenden **Ononis spinosa** an Schönheit weit nachſteht. Blumen gelb und unbedeutend.

Oxalis tropaeoloides dagegen iſt eine ſehr gute neue Art (oder Varietät?) von Sauerklee mit dunkelblutrothen dicht ſitzenden zierlichen Blättern, auf dem Boden kriechenden, leicht feſtwurzelnden Stengeln und gelben Blumen. Sie ſcheint mehrjährig zu ſein und auch wohl im Freien auszuhalten. Eine ſehr gute Einfaſſungspflanze, namentlich für erhöhte Beete, welche entweder frei im Wege liegen, oder mit hellen Steinen oder Muſcheln zu umgeben ſind.

Petunia Atkinsi iſt nichts weiter, als die alte kleinblumige weiße Stammart unter neuem Namen.

Ricinus Obermanni iſt vielleicht die prächtigſte Varietät des Wunderbaumes und erreicht hier im Freien in einem Jahre die Höhe von 11 Fuß. Stengel und Blattſtiele dunkelpurpurroth, die an 2 Fuß und darüber großen Blätter ſind gleichfalls in der Jugend roth und ſpielen

erſt ſpäter in Grün über. Die Oberfläche zeigt einen ſchillernden Glanz. Eine ſehr zu empfehlende Decorationspflanze.

Ricinus tunicensis ſcheint von R. africanus nicht verſchieden und ſteht dem gewöhnlichen Wunderbaume (R. communis) offenbar an Schönheit nach.

Es mag hier bemerkt werden, daß man die Samenpflanze des R. im erſten Sommer im Topfe behalten und im Kalthauſe durchwintern kann. Werden dieſe dann im zweiten Sommer ins freie Land gepflanzt, ſo erreichen ſie ganz ungewöhnliche Größe und bringen auch reifen Samen, was ſonſt bei dieſer viel Wärme erfordernden Pflanze in unſerem Klima nicht der Fall zu ſein pflegt.

Silene Pseudo-Atocion der bekannten rothblühenden S. pespula ähnlich, aber ihr an Schönheit nachſtehend, alſo entbehrlich.

Salvia Roemeriana eine niedrige Salbei-Art mit ziemlich großen hochrothen Blumen. Kann als Topfgewächs, aber auch im freien Lande, z. B. zu Einfaſſungen (1 Fuß hoch) verwendet werden.

Tropaeolum majus Catell's war als eine beſonders ſchöne neue Spielart der Kapuzinerkreſſe ſehr gerühmt, übertrifft aber manche ältere keineswegs. Blumen dunkelbraunroth.

Veronica syriaca wurde gleichfalls als eine neu eingeführte Pflanze von Epoche machender Schönheit angeprieſen, zeigte ſich aber in Wirklichkeit ſo unbedeutend, daß wohl nicht leicht Jemand ſie zum zweiten Male kultiviren wird. Die Pflanze wird etwa 6 Zoll hoch und könnte allerdings zu zierlichen Einfaſſungen dienen, wenn die blauen Blümchen nicht gar zu klein, ſparſam und vergänglich wären. Die überall als Unkraut vorkommende V. arvensis (Feld-Ehrenpreis) iſt mindeſtens eben ſo ſchön.

Eine nicht unbedeutende Anzahl Sämereien von anderen neuen Zierpflanzen war nicht aufgegangen, obwohl es ihnen an ſorgſamſter Pflege nicht gefehlt hatte.

Unter der ziemlich langen Reihe von meiſtentheils ſehr angeprieſenen Neuheiten, welche in dem abgelaufenen Sommer der Verſuchskultur unterzogen wurden, zeigten ſich alſo verhältnißmäßig nur ſehr wenige, welche ſich eine bleibende Stelle in den Gärten erringen dürfen. Aber auch bei dieſem negativen Reſultate darf wohl demnach der Zweck der unternommenen Kultur als erfüllt angeſehen werden, indem durch Mittheilung darüber doch wohl Mancher ſich wird abhalten laſſen, einen Platz in ſeinem Garten, wie Geld, Zeit und Mühe an Pflanzen zu verwenden, die zwar in den Handels-Katalogen übereinſtimmend gar ſehr angeprieſen werden, in Wirklichkeit aber neben den alten Bewohnern unſerer Gärten ſich gar nicht ſehen laſſen können.

Es bleibt noch übrig zu berichten über einige Pflanzen, die ſchon im Jahre 1857 angebaut waren, aber erſt in dem abgelaufenen Sommer zur Blüthe gelangten.

Dianthus Dunetti superbus iſt, wie ſchon in dem vorigen Jahresberichte die Vermuthung ausgeſprochen wurde, eine Varietät von D. barbatus (Bart- oder Kluſter-Nelke) aber ſehr ſchön durch die in breiten flachen Sträußern erſcheinenden großen Blumen von mehr oder weniger dunkelſammtbrauner Farbe, die bei einzelnen Exemplaren faſt in Schwarz übergeht.

Onopordum tauricum eine bis zu 8 Fuß hoch werdende Distelart, deren große Blätter und Stengel ganz mit weißgrünem Filze bekleidet sind. Diese Färbung, sowie der eigenthümlich starre Habitus machen dieselbe zu einer recht guten Decorationspflanze. Sie treibt im ersten Jahre nur Wurzelblätter und bleibt also ganz niedrig, überwintert aber ohne besonderen Schutz im Freien. Man verwendet sie am besten allein für sich auf Rasenplätzen, indem man entweder einzelne starke Pflanzen, 3 oder 7 dicht in einen Kreis zusammen, so daß sie nur eine zu bilden scheinen, auf kleine runde Beete bringt.

Es mag sich eine kurze Mittheilung hier anreihen über einige neue Pflanzen, die in anderen Gärten kultivirt wurden.

Delphinium formosum ist ein unlängst eingeführter sehr schöner Ritterſporn von kräftigem Wuchse und einer Höhe von etwa 2—3 Fuß. Die zahlreichen sehr dicht sitzenden Blumen sind sehr groß und von dem prächtigsten Ultramarin-Blau mit weißem Centrum. Obwohl die Pflanze perennirend ist, so gelangt sie doch, wenn man den in reicher Menge erscheinenden Samen bald nach der Reife im August, oder zeitig im Frühjahr säet, schon im ersten Jahre zur Blüthe und hält gut im Freien aus. Ist also bei der leichten Kultur und großen Schönheit zu empfehlen, namentlich auch zur Anlage von ganzen Gruppen.

Es sei hierbei auch auf das schon ältere Delphinium chinense empfehlend hingewiesen, das aus Samen gezogen, ebenfalls schon im ersten Jahre zur Blüthe gelangt und meist schöne Varietäten in allen Abstufungen vom Blau bis zum reinem Weiß bringt.

Unter den Astern brachte auch das abgelaufene Jahr wiederum eine Reihe von neuen Formen. Ganz besondere Erwähnung verdient darunter die von Gotthold in Arnstadt erzogene lasurblaue Riesen-Kaiser-Aster, welche bei ziemlich niedrigem, gedrungenem Wuchse Blumen von enormer Größe, regelmäßigem Bau und dichter Füllung trägt. Die übrigen neu aufgetretenen Formen, als Chrysanthemum-, Ranunkel-, Ringel-, imbriquee-pompon-Aster zeigten sich noch etwas zu inconstant, als daß man sie schon zu allgemeinem Anbau empfehlen könnte, versprechen aber noch weitere Mannichfaltigkeit dieser während der letzten Jahre so sehr vervollkommneten Blumenart zuzuführen.

Unter den neuen Ziergräsern verdient Paspalum elegans hervorgehoben zu werden, das bei mäßiger Höhe in Blättern und Blüthen schön ist und sich sehr gut zum Trocknen eignet.

Eine ergiebige Kultur-Methode und empfehlenswerthe Sorten der Himbeeren.

Das mehr feuchte Klima der Küstenländer ist, wie für den Graswuchs, so auch für das Gedeihen des Beeren-Obstes ganz besonders günstig. In England hat man dieses längst erkannt und deshalb diesem

Zweige des Gartenbaues beſondere Aufmerkſamkeit zugewandt. In unſerem Lande, wenn wir die Umgebung von Hamburg ausnehmen, iſt dieſen Früchten noch nicht das Intereſſe gewidmet, welches ihnen wohl gebührt. Finden ſich dieſelben auch überall angebaut, ſo wird häufig doch noch äußerſt wenig Sorgfalt auf die Kultur derſelben verwendet, und die Auswahl der Sorten läßt oft ſehr viel zu wünſchen übrig. Es dürfte alſo wohl nicht unzweckmäßig erſcheinen nach und nach die wichtigſten Gattungen derſelben einer kurzen Beſprechung zu unterziehen, die Grundzüge der Kultur derſelben mitzutheilen und die beſten, hier bereits erprobten Sorten derſelben zu verzeichnen.

Die Himbeere iſt faſt in allen Gärten anzutreffen, aber ſehr häufig in irgend einen dumpfigen Winkel verbannt, oft ganz von Bäumen beſchattet, wo ſie ſich ſelbſt überlaſſen wird. Wenn die an ſolchen Stellen erwachſenen Früchte das Aroma der Wald-Himbeeren nicht haben, ſo kann das nicht Wunder nehmen, denn letztere wachſen im Walde am Rande des Gehölzes, oder in jungen Hauen, auf lichten Schlägen, wo ihnen Luft und Sonne reichlich zukommen und beſonders an ſolchen Stellen, wo das zuſammengewehte und verweſete Laub hohe Humusſchichten abgelagert hat. Will man im Garten gute Himbeeren erziehen, ſo muß man den Pflanzen ebenfalls einen Standort geben, auf dem ſie wenigſtens einen beträchtlichen Theil des Tags die Sonne genießen, wo ferner der Boden tief gelockert iſt und an dem nöthigen Dünger nicht fehlt. Unter dieſen Umſtänden vergütet die Himbeere reichlich den für ihre Kultur gemachten Aufwand durch eine reiche Fülle großer und ſehr wohlſchmeckender Früchte.

In dem Garten des landwirthſchaftlichen Inſtitus zu Hohenheim wurde vor etwa 5 Jahren eine neue Kultur-Methode der Himbeeren eingeführt, welche von dem dortigen Garten-Inſpector, dem um die Pomologie ſo hoch verdienten Herrn Ed. Lucas im erſten Bande der von ihm herausgegebenen Monatsſchrift für Pomologie pag. 57 u. ff. beſchrieben und durch Abbildung erläutert iſt. Referent hatte ſchon im Jahre 1854 Gelegenheit dort den Erfolg dieſer Methode einzuſehen und verdankt zugleich der Güte des Herrn Lucas nähere Belehrung darüber, die ihn in den Stand ſetzte, dirſelben ſpäter hier ebenfalls zu verſuchen.

Die gewöhnliche Kultur-Methode der Himbeeren (wo überhaupt von Kultur die Rede iſt, und man ſie nicht geradezu ihrem Schickſale überläßt) beſteht darin, daß man im Frühjahre die abgeſtorbenen Fruchtſtengel entfernt, dann die jungen Triebe des vorigen Jahres an den Spitzen mehr oder weniger ſtark beſchneidet und an Latten anbindet, welche etwa 3 Fuß über dem Boden horizontal befeſtigt ſind. Um dieſes zu ermöglichen, werden die Pflanzen ziemlich dicht in Reihen geſetzt, die etwa 3—4 Fuß von einander entfernt ſind.

Bei der Hohenheimer Methode müſſen die einzelnen Pflanzen in jeder Reihe wenigſtens 3 Fuß von einander entfernt ſtehen, um zu voller Entwickelung gehörigen Platz zu haben und Luft und Licht zu genießen. Die Pflanzung geſchieht entweder frühzeitig im Frühjahre oder im Herbſte, was bei uns vorzuziehen iſt, wo milderes Wetter im Frühjahre ſpät einzutreten pflegt. Doch iſt es rathſam dann zu Anfang des Winters um die Pflanzen herum kurzen Dünger etwa ½ Fuß

hoch auszubreiten, soweit die Wurzeln reichen, um diese, die nach dem Verpflanzen empfindlich sind, gegen das Erfrieren zu schützen. Beim Einsetzen macht man für jede Pflanze ein Loch von etwa 1½ Fuß Tiefe, bringt auf den Grund desselben eine Lage verrotteten Dünger, darüber wieder etwas Erde, setzt dann auf diese die Pflanze, deren Stengel man auf die Länge von etwa 1 Fuß gekürzt hat.

Im ersten Sommer sollen die Himbeersträuche nicht tragen, deßhalb müssen etwa erscheinende Blüthen zeitig entfernt werden. Von den aus der Wurzel hervorkommenden jungen Trieben läßt man, wenn die Pflanze kräftig ist, die beiden stärksten stehen und entfernt alle etwa weiter noch erscheinenden. Schwache Pflanzen dürfen im ersten Jahre selbst nur einen schwachen Trieb behalten, da es darauf ankommt, diese so hoch und kräftig als möglich zu ziehen. Im folgenden Frühlinge werden Stangen von etwa 10—12 Fuß Länge in die Reihen etwas seitwärts neben jedem Strauch eingesteckt und die im vorigen Sommer erzogenen Triebe daran befestigt. Man läßt dieselben aber ganz unbeschnitten, höchstens wird, wenn die äußerste Spitze etwas durch Frost gelitten haben sollte, diese entfernt. Sobald nun aus den Augen der Triebe sich Seitenzweige entwickeln, werden die untersten bis zur Höhe von 2 bis 3 Fuß über dem Boden ausgebrochen, und dadurch aller Saft genöthigt der Spitze zuzuströmen. Hier bildet sich dann eine große Menge von Blüthen aus, die sich alsbald fast sämmtlich in Früchte verwandeln. Von den in diesem Jahre schon zahlreicher und kräftiger erscheinenden Sommertrieben werden wiederum nur die beiden stärksten stehen gelassen. Sobald im August die Früchte abgeerntet sind, werden die Stengel, welche dieselben getragen, dicht am Boden abgeschnitten und die jungen Sommertriebe dagegen an die Stangen angeheftet. Man kann jetzt denselben etwa noch einen Guß flüssigen Dünger geben, um sie zu möglichst kräftiger Ausbildung zu bringen. Im nächsten Frühjahre wird dann mit dem Ausbrechen der unteren Seitentriebe, Entfernen der überflüssigen Sommerschüsse ganz eben so weiter verfahren und auch in der Folge dieses fortgesetzt, nur daß man besonders kräftigen Sträuchern wohl auch 3 Triebe lassen kann.

Hauptzweck dieser Kultur-Methode ist stets nur einige wenige, aber möglichst kräftige Triebe von jeder Pflanze zu erzeugen, und auch in diesen allen Saft durch Ausbrechen der unteren Seitentriebe nach der Spitze zu leiten, wo die zahlreichsten, größten, wohlschmeckendsten und am frühesten reifenden Früchte entwickelt werden. Die so behandelten Sträuche sind in der That mit einer außerordentlich großen Menge herrlicher Früchte behängt, die einen lachenden Anblick gewähren.

Um ein sicheres Resultat zu haben, wurden hier vergleichende Versuche mit der eben dargestellten und der gewöhnlichen Kultur-Methode an verschieden Pflanzen derselben Sorte angestellt, die von gleicher Stärke waren und dicht neben einander standen.

Den einen wurden die sehr kräftigen, fingerdicken und gegen 8 Fuß und darüber hohen Sommertriebe unverkürzt gelassen, den anderen dieselben 4—5 Fuß über dem Boden abgeschnitten, dagegen die unten erscheinenden Seitentriebe nicht ausgebrochen. Die ersteren brachten, wie alle Augenzeugen einstimmend urtheilten, weit mehr, größere und zahl-

reichere Früchte, die namentlich in den äußersten Spitzen mindestens 8 Tage früher reiften, als die anderen.

Es wurde hier, weil der Garten, in welchem der Versuch angestellt worden, den Winden sehr ausgesetzt ist, eine kleine Abweichung von dem in Hohenheim üblichen Verfahren für nöthig erachtet. Die in einer Reihe stehenden Stangen wurden durch dünne Querlatten mit einander verbunden, die in der Höhe von 3, 5 und 7 Fuß vom Boden festgenagelt wurden, so daß also ein weitläufiges, freistehendes Spalier entstand. An diese unteren Querlatten wurden gleich anfangs die erscheinenden Sommertriebe, sobald sie hinlänglich stark waren, etwas seitswärts festgebunden, um sie vor Beschädigung zu schützen, an die obersten die Spitzen der Haupttriebe, welche die Stangen zum Theil beträchtlich überragten, im Bogen angebunden, auch, wo es anging, die schon mit Früchten beladenen Seitentriebe befestigt, um sie vor der Gewalt des Windes mehr zu schützen. Dieses Umbiegen des oberen Theiles in horizontaler Richtung schien eher einen günstigen Einfluß zu haben, da hier, wie erwähnt, die schönsten und am frühesten reifenden Früchte sich ansetzten.

Die etwas größere Mühe, welche diese Behandlungsweise verursacht, wird sicherlich aufgewogen durch die Menge der gelieferten vorzüglichen Früchte, von denen man durchschnittlich sicher 5 bis 6 ℔ auf jeden Strauch rechnen kann.

Es werden hier gegenwärtig mehr als 20 verschiedene Sorten kultivirt zu dem Zwecke, die besten darunter kennen zu lernen. Von dem Ergebniß dieses Probe-Anbaues dürfte vielleicht später Mittheilung erfolgen.

Einstweilen können als sehr dankbare und gute Sorten zum Anbau empfohlen werden:

Große holländische rothe.
" " weiße.
Fastolff, roth.
Paragon, roth.
Gelbe von Malta.

Merveille des quatre saisons oder zweimal tragende Himbeere mit rother und weißer Frucht. Diese sehr empfehlenswerthe Sorte bringt an der Spitze der jungen Sommertriebe schon im ersten Jahre Blüthen, welche zu Ende Septembers, oder Anfang Oktobers eine unter Umständen ziemlich reiche zweite Ernte liefern. Die Stengel, welche im Herbste Früchte getragen haben, schneidet man am besten darnach ganz hinweg, um eben ein recht frühzeitiges Austreiben und starke Entwicklung neuer Sommertriebe zu veranlassen, die die Ernte des nächsten Herbstes geben sollen. Will man auf die Sommertracht nicht verzichten, so muß man auch von den später erscheinenden Trieben noch einige stehen lassen, welche im Herbste nicht mehr tragen, sondern erst im folgenden Sommer. Hat man aber von anderen Sorten hinlänglich Früchte zur gewöhnlichen Zeit, so schneide man lieber alle Triebe hinweg, um eben eine desto reichlichere Herbsternte zu erhalten.

(3. Jahrsb. d. Ver. f. Gartb. in Schleswig, Holstein und Lauenburg.)

Ueber die Kultur der Rhododendron.

(Nach der Academie d'Horticulture de Gand Nov. und Decbr. 1858.
Von F. W. Klatt.)

Es iſt gewiß nicht nöthig die Rhododendron zu loben, da Jedermann weiß, daß es reizende Blüthenſträucher mit immer grünen, bleibenden Blättern ſind. Durch dieſelben empfehlen ſie ſich im Winter ſchon, wie auch noch mehr durch ihre Knospen, welche ſich im Mai zu Blüthenhaufen entwickeln, die faſt alle Farbenabſtufungen zeigen. Mit Recht beſchäftigt daher die Kultur dieſer Rhododendron manche Gärtner. Für ſie werden insbeſondere zwei Artikel der obigen Zeitſchrift nicht ohne Intereſſe ſein, ja vielleicht ihre Kritik hervorrufen, ſo wie ſie zu eigenen Bemerkungen veranlaſſen. Der erſte Artikel von Herrn Anatole Naſſé beſchäftigt ſich mit der Kultur der harten, im freien Lande ausdauernden Rhododendron. Er ſchreibt:

„Um einen paſſenden Boden für die Rhododendron zu erhalten, gräbt man die Erde zu 0, 40 oder 0, 50 Metre Tiefe aus. Wenn es feucht iſt, bringt man auf dem ausgegrabenen Grund 0, 15 Meter zerſchlagene Steine und darüber 0, 05 Metre Baumzweige, worauf man ihn endlich verhältnißmäßig drainirt, eine Arbeit, die man bei einem trocknen und geſunden Boden nicht vorzunehmen braucht. Den Reſt des Grundes füllt man endlich mit reiner Haideerde, die man jedoch nicht zu zerkleinern braucht, vielmehr kann man ſtarke Raſenhaide auf den Grund legen und wird, wenn man die Dauer des künſtlichen Lagers verlängert, eine vortreffliche Erde, welche recht zuträglich für die Pflanzen ſein wird, durch allmählige Zerſetzung erhalten. Den Boden muß man dann in der Mitte ein wenig erhaben machen und ihm eine für das Auge angenehme Form geben. Die Oberfläche der Erde, welche die Rhododendron aufnehmen ſoll, muß ein wenig gelockert werden, doch braucht dieſelbe nicht aus geſiebter Erde zu beſtehen, wie einige Gärtner noch glauben. Hat man nun den Boden ſo bereitet, ſo pflanzt man die Rhododendron in 1 Metre Entfernung von einander, die größten und ſtärkſten in den Mittelpunkt und an den Seiten die, welche buſchig ſind, oder ſich nur ein wenig erheben. Dabei beachtet man, daß ſich ſoviel als möglich die Farben abſtufen, damit das Auge zur Blüthezeit erfreut werde.

Die Erdaufhäufung muß alle 2 oder 3 Jahre bis zu 3—4 Centimetre mit friſcher Haideerde erneuert werden, auch iſt es gut, die Rhododendron in jedem Jahre an ihren Wurzeln mit einem Lager trockner Blätter zu verſehen, welche, indem ſie ſich zerſetzen, eine ſehr leichte, dem Wachsthum der Rhododendron günſtige Erde bilden. Die Rhododendron verlangen im Beginn ihres Wachsthums, beſonders während des trocknen Wetters, häufige Begießungen, mit denen man aber ſogleich aufhören muß, in dem Augenblick, wo ſie anfangen Blüthenknospen zu bilden, weil dieſe ſich ſonſt ſtets in junge Zweige umbilden würden, was oft genug geſchieht, wenn bei erhöhter Temperatur ſich im Monat Auguſt und September Regen einſtellen. Ein Stück Land, ſo mit Sträuchern bepflanzt, erfordert nur noch Sorgfalt hinſichtlich der

Fortschaffung der Zweige, welche sich zu sehr entwickeln, so wie hinsichtlich der Unterdrückung derjenigen, welche schlecht gestellt, sich oder die Form der Sträucher beeinträchtigen. Die günstigste Zeit für die Pflanzung sind die Monate August, September und October, da die Pflanzen Zeit haben, vor dem Winter zu wurzeln und daher später nicht von Reif und großer Kälte leiden. Der zweite Artikel, von dem Herausgeber der obigen Zeitschrift, Herrn Joseph Baumann, beschäftigt sich mit der Kultur der **Rhododendron** vom Himalaya, von Bhotan ꝛc. Er schreibt folgendermaßen: „Im März pflanze ich in eine gute Laub- oder Haideerde, die ein wenig gelockert ist, in Kasten, von den Stammmüttern, die ich stets ruhig wachsen lasse, ohne sie umzusetzen, so viele Setzlinge als ich unterbringen kann und beschütze dann dieselben durch ein Geflecht von Baumzweigen. Im Herbst, bei der Annäherung der Kälte, nehme ich diesen leichten Schutz weg und wähle dafür die Bedeckung mit Holzladen und über denselben die Leinewand. Sobald sich das Wetter jedoch heiter zeigt, entferne ich diese Bedeckung, nimmt die Kälte indessen zu, so häufe ich auf die Laden und um die Leinewand eine dicke Lage Moos und trockner Blätter. Die Exemplare, welche zum Verkauf bestimmt sind, pflanze ich im Mai ins Freie an sonnige Plätze, wie die gewöhnlichen **Rhododendron**, aber in die oben angegebene Erde. Ich beschatte sie leicht mit Baumzweigen, damit die Sonnenstrahlen nicht die Blätter verbrennen, wobei ich sie häufig begieße. Im Herbst nehme ich sie sorgfältig mit Erdballen heraus, pflanze sie in Kästchen, setze sie neben einander und beschütze sie nach der angegebenen Weise. Die **Rhododendron**, welche man in Töpfen zieht, kann man nach Gefallen in der Blüthezeit zurückhalten.

Die Familie der Kapuzinerkressen.

(Tropaeoleae Juss.)

Ein monographischer Versuch von F. W. Klatt.

Vorwort.

Obwohl sich eine Zusammenstellung der Kapuzinerkressen, die seit De Candolle's Bearbeitung, mit nur zwei Gattungen und 14 Arten, eine bedeutende Erweiterung erfahren hat, in den „Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand IV., 1848, pag. 263“ wo 33 Arten aufgeführt werden, findet, auch eine zweite Arbeit der Art in „Otto u. Alb. Dietrich's Allgemeiner Gartenzeitung,“ Jahrgang 1849, pag. 305 enthalten ist, glaube ich doch hier mit nichts Unnützes zu liefern, da ja 10 Jahre zwischen meiner und der letzten obenerwähnten Arbeit liegen und ich nicht nur eine Aufzählung, sondern auch eine Bearbeitung der Arten liefern will.

1. Vaterland und Verbreitung der Kapuzinerkreſſen.

Sämmtliche Tropaeolum-Arten ſind Pflanzen Südamerika's. Gegen den öſtlichen Punkt dieſes Landes, am Port-Deſir findet ſich verloren ſtehend die Gattung Magellana; in dem Innern von La Plata erſcheint der Chimacarpus pentaphyllus; einige Tropaeolum-Arten verirren ſich dann gegen Oſten in die Bergprovinzen Braſiliens; aber der Kern der niedlichen Familie ſproßt an den verſchiedenen Höhen, welche an den Seiten der großen Cordilleren liegen und geht von da zu den Ebenen und Bergen Chili's, dann quer durch Peru, Bolivia, Ecuador und Neu-Granada, bis in die Nebenketten St. Marta's und Caracas.

2. Benutzung der Kapuzinerkreſſen.

Außer der Anwendung ſämmtlicher Arten als Zierpflanzen, wozu ſich alle, ihrer Schönheit wegen, ſo ſehr eignen, daß die Herausgeber unſerer berühmteſten Gartenſchriften, ſtets die verſchiedenen Arten nicht genug empfehlen können, werden noch die Knollen einiger Arten in ihrem Vaterlande, wie Rabies gegeſſen, andere als Heilmittel angewendet, die Blüthenköpfe und Früchte, wenigſtens von der großen Kreſſe werden hie und da wie Kappern eingemacht und auch die Blüthen und Blätter als Salat gegeſſen.

3. Beſondere Bemerkungen.

Der eigentliche ſcharfe Geſchmack und Geruch aller Kapuzinerkreſſen, von der großen Kapuzinerkreſſe (Tropaeolum majus L.) ja bekannt genug, giebt ihnen eine Aehnlichkeit mit den Cruciferen, die noch beſonders durch ihre Zerſtörerin, der gemeinen Kohlraupe, bewieſen wird.

Weiter jedoch, als auf den Geſchmack, erſtreckt ſich dieſe Aehnlichkeit nicht, da der Bau der Blüthen den Tropaeoleen einen Platz bei den Geraniaceen und Balſamineen angewieſen hat.

Auch müſſen wir noch an die Lichterſcheinungen erinnern, die man bei Tropaeolum majus L., während der Dämmerung bemerkt haben will.

4. Betrachtung der Gattungen.

Sämmtliche Tropaeolum-Arten hat man bis jetzt unter vier Gattungen gebracht. Es ſind das die Gattungen Tropaeolum L., Chimocarpus Don, Rixea Morr. und Magellana Cav. Bei der Gattung Tropaeolum L. iſt der Kelch gefärbt, 5theilig, faſt zweilippig, die Oberlippe 2, die Unterlippe 3theilig, am Grunde in einen Sporn verlängert. Die 5 Kronenblätter ſind dem Kelch eingefügt, mit jedem Einſchnitte abwechſelnd, ungleich, oder eingeſchnitten, mehr oder weniger genagelt, dem Kelch an Länge gleich oder größer. Es finden ſich 8 getrennte, unterweibige Staubgefäße. Die Staubfäden ſind pfriemlich, am Grunde verbreitet, ungleich. Die Staubkolben ſind abwärts geneigt, zweifächrig, der Länge nach aufſpringend. Der Eierſtock iſt ſitzend, dreilappig, dreifächrig, mit einem Ei in jedem Fach. Der dreiſeitige Griffel hat eine faſt dreizähnige Narbe. Die Frucht iſt dreiknöpfig, die Knöpfe ſind ſchwammig oder fleiſchig, nicht aufſpringend, einſamig. Der Same iſt ohne Eiweiß.

Die vollständige Darstellung dieser vorhergehenden Gattungscharaktere macht uns die Schilderung der nun folgenden Gattungen leichter, da wir die gleichen Eigenschaften weglassen können.

Die Gattung Rixea Morren unterscheidet sich von Tropaeolum L. nur durch den krautartigen, beinahe regelmäßigen Kelch, welcher viel kleiner ist als die Kronenblätter; durch die becherförmig ausgebreitete Krone, welcher mit ihrer Basis eine sehr kurze, am Schlunde geschlossene, die Geschlechtsorgane umhüllende Röhre bildet und durch die sehr kurzen Staubgefäße. Alle diese Unterschiede beziehen sich nicht auf Wesentliches genug, da sie die Frucht nicht mit einschließen, sondern sich nur auf den fast regelmäßigen Bau der Krone gründen, die Farbe des Kelches, so wie seine Regelmäßigkeit hervorheben. Daher ist denn auch Rixea azurea Mor., Tropaeolum azureum Miers in der Flore des serres II, 46 genannt worden und ersuche ich die Leser dieser Zeitschr. das Urtheil über die Gattung Rixea daselbst nachzulesen.

Ganz anders verhält es sich mit den nun folgenden Gattungen.

Die Gattung Chimocarpus Don. hat einen ebenso gebauten Kelch, wie Tropaeolum, nur sind die Lappen fast gleich; die Krone jedoch hat nur zwei Blätter, welche dem Sporn leicht eingefügt, spatelförmig und kürzer als der Kelch sind; die Frucht ist eine vom Kelch umschlossene, 3lappige oder durch Fehlschlagen 2- oder 1lappige Beere, die Lappen sind 1samig.

Die Gattung Magellana Cav. hat einen 5lappigen, gespornten Kelch, dessen 2 Lappen tief getheilt, die 3 andern aber in einen dreizähnigen vereinigt sind; die 5 Kronenblätter sind ungleich; die 8 Staubgefäße am Grunde fast vereinigt; die Frucht ist dreiflügelig, durch Fehlschlagen 1fächerig, 1samig.

5. Die Gattung Magellana Cav.

Diese Gattung hat nur eine Art, nämlich M. porrifolia Cav., abgebildet in Cav. Ic. 4. t. 374, deren Blätter dreitheilig sein sollen, so wie ihre Abschnitte linealisch ganz. Mir ist diese Pflanze nur in der Abbildung bekannt, auch habe ich nicht gehört, daß man sie schon irgendwo kultivirte.

6. Die Arten der Gattung Chymocarpus Don.

Die Gattung Chimocarpus enthielt bis jetzt nur das bekannte Tropaeolum pentaphyllum, abgebildet in Lam. Illustr. Pl. 277 Fig. 2, ich bin aber genöthigt, noch eine Art zu dieser Gattung zu ziehen, das Tropaeolum dipetalum Ruiz und Pav. Fl. peruv. III. p. 17. Icon 113, Fig. b. Man vergleiche nämlich folgende Worte aus der Flora peruv. III. p. 77: „Corolla punicea, dipetala. Petala inter laciniam superiorem et laterales calycis inserta, spathulata. Calyx persistentibus cum reliquis floris partibus et drupae tres, magnae, saepe tertia obortiva mit den Worten in Endlicher's Diagnose: „Corollae petala 2, petalis puniceis, Corollae petala calyci inter lobii inferioris lobos laterales et intermendium inserta, spathulata. Baccа calyce aucta, carnoso-cincta veu abortu bi-unilloba, und sage mir, ob diese Worte nicht dasselbe bedeuten? Wenn die übrigen Charaktere nicht aus

einandergingen, so könnte man beide Arten als synonym betrachten. Ich nenne daher dieses Tropaeolum dipetalum Ruiz und Pavon, Chimocarpus stipulaceus. Im Folgenden gebe ich die vollständige Beschreibung beider Arten:

1. Chimocarpus pentaphyllus Don, abgebildet noch ferner in St. Hil. Pl. usuelles 41, Lodd. Cab. 1989, Bot. Reg. 18, tab. 3190, hat eine knollige Wurzel, einen kletternden kahlen Stengel; schildförmige fünftheilige Blätter, deren Lappen elliptisch länglich, ganz, nach dem Grunde hin verschmälert, fast gestielt sind; achselständige, verlängerte, fadenförmige, bracteenlose einblüthige Blüthenstiele; einen Kelch, dessen Röhre röthlich und dessen Sporn trichterförmig, unten zusammengeschnürt und am Grunde keulenförmig, honigführend ist und nach der Blüthe ringsumschnitten schwindet; hochrothe Kronenblätter; und eine dunkel violette Beere, deren Fleisch eßbar und süß ist.

2. Chimocarpus stipulaceus W. Klatt, hat eine ausdauernde Wurzel, einen kletternden kahlen Stengel; abwechselnde schildhandförmig 7lappige Blätter, deren Lappen ganz, länglich verkehrt eiförmig oder eiförmig sind und mit einem kleinen Weichstachel endigen; achselständige, einzelnständige, einblüthige, gestreifte, röthliche Blüthenstiele; am Grunde der Blatt- und Blüthenstiele große gegenständige, kurz gestielte, nierenförmige, dreikerbig-gelappte Nebenblätter, deren Lappen rund sind und mit einem kleinen Weichstachel endigen; einen Kelch, der karminroth ist und dessen Einschnitte lanzettlich, zugespitzt und abstehend sind; hochrothe Kronenblätter; die drei verbundenen Früchte sind groß, verkehrt eikreiselförmig, fast sackartig und verdienen noch der Beachtung, weil sie in der oben angezogenen Stelle: Steinfrüchte genannt werden. In der Flore peruv. wird als Standort angegeben: Andium montibus, ad Pillao tractus silvaticos und die Blüthezeit Mai bis September.

7. Vergleichende Uebersicht der Tropaeolum-Arten.

I. Alle Kronenblätter gefranzt-gewimpert, eingeschnitten.

A. Nebenblätter fehlen.

1) Tropaeolum Moritzianum Klotzsch., Blätter fast kreisrund, 7—9lappig.
2) Tropaeolum Lobbianum Hook. Blätter kreisrund, undeutlich gelappt.
3) Tropaeolum Deckerianum Moritz & Karst., Blätter dreieckig schwach 5—7lappig.
4) Tropaeolum Wagnerianum Karst, Blätter dreieckig spießförmig.
5) Tropaeolum orthoceras Gardn., Blätter fast nierenförmig fünflappig.
6) Tropaeolum Haynianum Bernhardi, Blätter tief fünflappig.

B. Nebenblätter vorhanden.

7) Tropaeolum Smithii DC. Blätter handförmig fünftheilig, Nebenblätter klein aber tief eingeschnitten.
8) Tropaeolum bicolorum Ruiz & Pavon. Blätter 7lappig, Nebenblätter halbmondförmig eingeschnitten gewimpert.

II. Alle Kronenblätter gezähnt, gekerbt, gewimpert, Nebenblätter fehlen.

9) Tropaeolum pendulum Klotzsch. Blätter schildförmig, leicht 5lappig, Lappen weichstachlig.
10) Tropaeolum umbellatum Hook. Blätter herzförmig 5lappig.
11) Tropaeolum Fintelmanni Wagener. Blätter halbmondförmig, schwach nach vorn in 3—5 Lappen gezogen.
12) Tropaeolum digitatum Karst. Blätter 5—7lappig.

III. Untere Kronenblätter gefranzt, gewimpert, eingeschnitten, Nebenblätter ganz, schwindend, Blattfläche groß, fast kreisrund.

13) Tropaeolum Morreanum, W. Klatt. (T. dipetalum Morren.) Blätter drei oder fünflappig.
14) Tropaeolum Brasiliense Casarctto. Blätter fünflappig.
15) Tropaeolum aduncum Smith. Blätter fünf bis siebenlappig.
16) Tropaeolum majus L., Blätter 5 bis 9lappig.
17) Tropaeolum minus L., Blätter 9lappig.

IV. Alle Kronenblätter ohne diese Anhängsel, mehr der ganzen Form sich nähernd.

A. Blattfläche groß, fast ganz.

18) Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. Blätter halbkreisrund, 3- oder 5lappig, Blattstiel wickelrankig, Kelcheinschnitte länglich.
19) Tropaeolum crenatiflorum Hook. Blätter halbkreisrund, 5lappig, Kelcheinschnitte lanzettlich stumpflich.
20) Tropaeolum cirrhipes Hook. Blätter deltaförmig, stumpfkantig; Kelchabschnitte breit eiförmig.

B. Blattfläche tief getheilt.

a) Blätter gestielt, 5theilig, Nebenblätter fehlen.

21) Tropaeolum elegans Don. Blatttheile verkehrt eiförmig, Kelchabschnitte verkehrt eiförmig länglich.
22) Tropaeolum azureum Miers. Blattheile linienförmig-länglich, Kelchabschnitte eirund-spitz.
23) Tropaeolum rhomboideum Ch. Lem. Blattheile eiförmig-stumpf, in der Mitte weichstachlig; Kelchabschnitte fast viereckig, an der Spitze flach rund, weichstachlig.
24) Tropaeolum albiflorum Ch. Lem. Blatttheile eiförmig, zwei eingeschnitten gezähnt; Kelchabschnitte breit deltaförmig.
25) Tropaeolum oxalianthum Morr. Blatttheile lanzettlich, am Grunde keilförmig; Kelchabschnitte eiförmig, am Grunde verbreitert.
26) Tropaeolum Beuthii Klotzsch. Blatttheile verkehrt eiförmig, vorderer Lappen an der Spitze abgerundet, stachelspitzig; Kelchabschnitte elliptisch, kurz gespitzt.

b) Blätter sitzend 5theilig, Nebenblätter vorhanden.

27) Tropaeolum sessilifolium Endl. und Pöpp. Blatttheile länglich; Kelchabschnitte dreieckig-eiförmig; Nebenblätter halbcylindrisch.

c) Blätter 6theilig, Nebenblätter fehlend.

28) Tropaeolum tricolorum Sweet. Blatttheile verkehrt-eiförmig, weichſtachlig; Kelchabſchnitte ungleich, zugeſpitzt.

29) Tropaeolum edule Morr. Blatttheile länglich lanzettlich; Kelchabſchnitte faſt dreieckig ſpitz.

d) Blätter 6theilig, Nebenblätter vorhanden.

30) Tropaeolum brachyceras Hook. Blatttheile längich rund, weichſtachlich; Kelchabſchnitte ungleich, zugeſpitzt; Nebenblätter klein, dreieckig.

31) Tropaeolum speciosum Endl. und Pöpp., Blatttheile länglich verkehrt eiförmig; obere Kelchabſchnitte deltaförmig, untere lanzettlich ſchief; Nebenblätter 3—6theilig, behaart.

32) Tropaeolum ciliatum Ruiz und Pav. Blatttheile verkehrt eiförmig, mit kleiner Spitze; Kelchabſchnitte lanzettlich; Nebenblätter rundlich nierenförmig, gewimpert, faſt deltaförmig.

e) Blätter 6-, 7- und 8theilig, Nebenblätter fehlen.

33) Tropaeolum Bridgesii Gardner. Die 6—7 Blattheile ſind lineaſiſch abgeſtumpft; die Kelchabſchnitte eiförmig, zugeſpitzt.

34) Tropaeolum polyphyllum Cav. Die 6—7 Blattheile ſind lineaſiſch eingeſchnitten oder fiedertheilig; die Kelchabſchnitte ſind ungleicheiförmig ſpitz.

35) Tropaeolum leptophyllum Don. Die 7 Blatttheile ſind lineaſiſch, weichſtachlich; die Kelchabſchnitte eiförmig zugeſpitzt.

36) Tropaeolum Hookerianum Barnéoud. Die 6—8 Blatttheile ſind eiförmig; die Kelchabſchnitte ebenfalls eiförmig.

Mir unbekannt ſind: T. hybridum L., T. pubescens H. B. et Kunth, T. pinnatum Ait., T. quinatum Hellenius, T. quinquelobum Berg.

8. Ausführliche Beſchreibung der Tropaeolum-Arten.

1) Tropaeolum Moritzianum Klotzsch. Moritz'ſche Kapuzinerkreſſe. Sie hat geſtielte, faſt kreisrunde, am Grunde abgeſtutzte, 7—9lappige Blätter, deren Lappen ſtumpf und an der Spitze drüſig ſind. Ihre Kronenblätter ſind länger als der Kelch, die drei unteren ſpatelförmig, glänzend orange mit rothen Adern, tief gewimpert; die zwei oberen kaum länger als die untern, keilförmig, an der Spitze gefranzt. Der Kelch hat 5 eiförmige, glänzend rothe, zugeſpitzte Blätter. Der Sporn hat 2 mal die Länge der Kelchblätter, er verſchmälert ſich allmählig, iſt aber an der Spitze ſtumpf. Abgebildet iſt dieſe Pflanze in Klotzsch. & Link Ic. III. 17; Bot. Mag. 67, tab. 3844; Paxt. Mag. 8, 199. Vaterland Caracas.

2) Tropaeolum Lobbianum Hook. Lobb's Kapuzinerkreſſe. Wurzel, wie auch bei der vorhergehenden Art ohne Knollen; alle Theile der Pflanze, mit Ausnahme der obern Blattfläche und der Blumenblätter behaart; die Blätter ſind kreisrund, undeutlich gelappt, die Lappen endigen mit einer Weichſpitze. Die Kronenblätter ſind orangeroth, die 2 obern breit, verkehrt eirund, undeutlich dreilappig; die 3

untern kleiner, faſt gleichförmig. Der Kelch hat 5 eirund längliche aufrechte Einſchnitte. Der Sporn iſt grünlich, faſt grade, breit pfriemlich und überragt den Kelch dreifach. Abgebildet iſt dieſe Art im Bot. Mag. 70, t. 4097; Paxt. Mag. 11, 271; Fl. des serres 2, 3. Vaterland Columbien. (T. peltophorum Benth. iſt ſynonym.)

3) **Tropaeolum Deckerianum** Moritz & Karst. Decker's Kapuzinerkreſſe. Wurzel, wie bei den vorhergehenden Arten. Blätter, mit behaartem Blattſtiel, dreieckig, ſchwach 5—7lappig, am Grunde quer abgeſtutzt. Kelch grün, weichhaarig, mit 5 eiförmigen Blättern. Sporn länger als der Kelch, lebhaft hochroth, gegen die Spitze grün und faſt gerade. Die blauen ungleichen Kronenblätter ſind gezähnt und lang gefranzt-gewimpert. Abgebildet iſt dieſe Art in „Karſten's Auswahl neuer Gewächſe Venezuela's“ tab. 12, Fl. des serres 5, 490 et Belgique hortic. 2, 43. Vaterland: Venezuela.

4) **Tropaeolum Wagnerianum** Karst. Wagners Kapuzinerkreſſe. Die Blätter ſind dreieckig-ſpießförmig, ſpitz, mit am Grunde oft abgeſtutzten, dann runden Lappen. Die bläulich violetten Kronenblätter ſind an Größe den Kelchabſchnitten faſt gleich und oben gewimpert. Der grüne Kelch hat 5 eiförmige Theile. Der karminrothe Sporn iſt lang kegelförmig, leicht gekrümmt, an der Spitze grün. Abgebildet findet ſich dieſe Pflanze in Fl. des serres 6, 553; Belgique hortic. 2, 1. Vaterland: die Provinz Truxillo.

5) **Tropaeolum orthoceras** Gardner. Geradſpornige Kapuzinerkreſſe. Die Blätter ſind faſt nierenförmig und haben 5 ganz ſtumpfe, weichſtachelige Lappen. Die zwei obern Kronenblätter ſind lappig, weichſtachlig; die drei untern kleiner zerriſſen-gewimpert. Der Sporn iſt aufrecht wenig länger als der Kelch. Eine Abbildung dieſer Art fehlt, die auch noch nicht, ſoviel ich weiß, kultivirt worden iſt. Ihr Vaterland iſt Braſilien.

6) **Tropaeolum Haynianum** Bernhardi. Hayniſche Kapuzinerkreſſe Die Blätter ſind am Grunde abgeſtutzt, faſt 5lappig, jeder Lappen ungleich, faſt dreilappig. Die Blüthenſtiele ſind faſt zweiblüthig. Die orangenfarbigen Kronenblätter ſind keilförmig, eingeſchnitten-vieltheilig, den Kelch an Größe übertreffend, die drei untern ſind kleiner. Der Sporn, welcher viel länger als der Kelch, iſt am Grunde verdünnt, am Rücken gekrümmt. Eine Abbildung dieſer Art fehlt. Ihr Vaterland iſt Peru, wo ſie in der Nähe Lima's aufgefunden ſein ſoll.

7) **Tropaeolum Smithii** DC. Smith's Kapuzinerkreſſe. Die 5lappig-handförmigen Abſchnitte der Blätter ſind zugeſpitzt, weichſtachlig. Die Nebenblätter ſind tief eingeſchnitten. Die ſchön gelborangenfarbige, mit lebhaft rothen Streifen verſehenen Kronenblätter, ſind keilförmig; die 2 obern klein, ſitzend; die 3 untern genagelt und alle eingeſchnitten gewimpert. Der pfriemliche Sporn iſt aufrecht und länger als der Kelch. Abgebildet iſt dieſe Pflanze im Bot. Mag. 74, 4385 und in Fl. des serres 4, 384. Ihr Vaterland iſt Columbien.

8) **Tropaeolum bicolorum** Ruiz & Pavon. Zweifarbige Kapuzinerkreſſe. Die am Grunde quer abgeſchnittenen Blätter haben 6—7 eiförmige, faſt runde Lappen, die ganz weichhaarig ſind und eine kleine Spitze beſitzen. Die Nebenblätter ſind entgegengeſetzt, halbmondförmig, zugeſpitzt, eingeſchnitten gewimpert. Von den verkehrt eiförmigen, am

obern Rande eingeschnitten gewimperten Kronenblättern, sind die 2 obern gelb, die 3 untern, viel kleineren, scharlachroth. Der Kelch ist gelb. Der Sporn ist zweifach länger als die Kronenblätter, pfriemlich-kegelförmig, aufrecht. Eine Abbildung findet sich in Ruiz & Pavon. Fl. peruv., tab. 313. Als Vaterland ist angegeben: Andium nemoribus ad Muna. In Kultur befindet sich diese Art noch nicht.

9) Tropaeolum pendulum Klotzsch. Hängende Kapuzinerkresse. Die oben meer- unten dunkelgrünen Blätter sind am Grunde abgeschnitten rundlich, leicht 5lappig; die Lappen sind kurz zugespitzt, in der Mitte weichstachlig. Die hängenden Blüthen sind gelb, die 2 obern Kronenblätter sind kürzer als der Kelch, die 3 untern eben so lang, spatelförmig, am Rande alle kerbzähnig. Der Kelch ist gelb, seine Lappen sind länglich, die drei obern zurückgekrümmt, die 2 untern fast aufrecht. Der Sporn ist aufrecht, an der Spitze grün. Eine Abbildung der Pflanze, als deren Vaterland Mittelamerika angegeben ist, fehlt. —

10) Tropaeolum umbellatum Hook. Doldige Kapuzinerkresse. Blätter herzförmig, 5lappig. Die lebhaft orangerothen, mit Grün durchstreiften Kronen, haben spatelförmige zugespitzte Kronenblätter, von denen 3 den Kelch an Größe übertreffen, 2 aber nur klein, schuppenförmig sind, alle sind kerbig gezähnt. Der Kelch ist walzenförmig, länger als der stumpfe fast gekrümmte Sporn. Diese Art ist abgebildet im Bot. Mag. 73, 4397; Fl. des serres 3, 302; Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1848, tab. 178. Das Vaterland ist Pitzhum.

11) Tropaeolum Fintelmanni Wagner. Fintelmann's Kapuzinerkresse. Die Blätter sind halbmondförmig, vorne in 3—5 abgerundete Lappen mit einer kurzen Spitze vorgezogen. Von den länglich ovalen kurz gespitzten Kelchblättern sind die obern kürzer als die untern. Die Krone ist gelb, ihre Blätter sind am Grunde keilförmig, an der Spitze abgerundet, durch kleine, in eine lange Borste ausgehende Zähne gewimpert. Die Pflanze ist nur in Regel's Gartenflora 2, 58 abgebildet und wächst auf den Bergen Columbiens wild.

12) Tropaeolum digitatum Karst. Gefingerte Kapuzinerkresse. Die schildigen Blätter sind 5—7lappig, ihre Lappen rundlich ganz. Die Kronen sind dem Kelch fast gleich und haben gezähnt-gewimperte Kronenblätter. Der gelbe Kelch hat an seinen Blättern Anhängsel. Eine Abbildung der Pflanze fehlt. Ihr Vaterland ist Venezuela. Kultivirt wurde sie in den botanischen Gärten zu Berlin und Jena.

13) Tropaeolum Morreanum Klatt. Morren's Kapuzinerkresse. Da, wie ich in dem Vorhergehenden gezeigt habe, das Tropaeolum dipetalum Ruiz. & Pav. zu der Gattung Chilocarpus Don gehört, bin ich genöthigt, diese von Morren zuerst als T. dipetalum Ruiz & Pav. beschriebene Art, ihm zu widmen, der sie unterschieden hat. Die Blätter sind auf der Unterseite meergrün, am Grunde abgestutzt, kreisförmig, 3—5lappig; ihre Lappen sind stumpf weichstachlig. Die gelben Kronen haben 2 große obere Kronenblätter, die spatelförmig, eingeschnitten gekerbt sind und am Nagel Anhängsel haben; die drei untern Kronenblätter sind keilspatelförmig gewimpert. Die Kelchabschnitte sind breit oval mit stumpflicher Spitze. Der Sporn ist länger als die Kelchabschnitte, aus breiter Basis kegelförmig gekrümmt.

Abgebildet iſt dieſe Art in den Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 2, tab. 57. Sie hat die größte Aehnlichkeit mit T. aduncum Sm., abgebildet im Bot. Reg. 9. tab. 718, Ganz beſonders aber ſtimmt mit ihr die Abbildung im Bot. Mag. 33, tab. 1351; die das T. peregrinum L. darſtellen ſoll. Ihr Vaterland iſt Chili.

14) **Tropaeolum Brasilienſe Casaretto.** Braſilianiſche Kapuzinerkreſſe. Die Blätter ſind ſchildnervig, handförmig gelappt, am Grunde abgeſchnitten; von den 5 ganzen abgerundeteten Lappen ſind die drei untern weniger breit als lang. Die hellgelben Kronen haben 2 obere eingeſchnittene Kronenblätter und 3 untere etwas kleinere, ſpatelförmige. Die Kelchlappen ſind inwendig zerſtreut, roth punktirt. Der Sporn iſt aufrecht, 2mal länger als die Krone. Das Vaterland iſt Braſilien, eine Abbildung fehlt.

15) **Tropaeolum aduncum Smith.** Hakenförmig gebogene Kapuzinerkreſſe. Die faſt ſchildförmigen Blätter ſind 5lappig, die runden Lappen weichſtachlig; die unteren Blätter ſind jedoch 7lappig. Die Kelcheinſchnitte ſind länglich eiförmig. Die blaßgelbe Krone hat 2 obere große 5theilige Blätter, deren Theile einen Weichſtachel haben und die mit ihrem Nagel den oberen Kelcheinſchnitten eingefügt ſind; die drei untern Kronenblätter ſind kürzer als der Kelch ſpatelförmig zerriſſen-gefranzt. Der Sporn iſt pfriemenkegelförmig, kurz zurückgerollt. Der Unterſchied dieſer Art, (die von Ruiz & Pav., ſo wie in dem Bot. Reg. Vol. 9, tab. 718. T. peregrinum L. genannt wird), mit T. Morreanum beſteht nur in der Blatttheilung und in den Einſchnitten der obern Kronenblätter. Vaterland: Peru.

16) **Tropaeolum majus L.** Große Kapuzinerkreſſe. Dieſe 1685 aus Peru nach Europa gebrachte allbekannte Zierpflanze hat faſt kreisrunde, 5—9lappige Blätter, deren Lappen bis auf den mittelſten zugeſpitzten rund, ohne über den Blattrand hervorſtehenden Nerven ſind. Die Kelchzipfel ſind orangegelb, eirund-lanzettlich, ſpitz. Der Sporn iſt ziemlich gerade, pfriemlich, am Grunde etwas zuſammengedrückt. Die Krone iſt hochroth-orange. Von den ſtumpfen Kronenblättern ſind die 2 obern verkehrt eirund, die 3 untern mit oval-rundlicher, am Grunde gefranzter Platte. Von den vielen Abbildungen dieſer Art führe ich nur die des Bot. Mag. tab. 23 auf.

17) **Tropaeolum minus L.** Kleine Kapuzinerkreſſe. Sie iſt noch früher in Europa eingeführt worden, als die vorhergehende Art, mit der ſie die größte Aehnlichkeit theilt; jedoch hat ſie als Zierpflanze nicht ſo viel Glück gehabt. Sie unterſcheidet ſich von der großen Kapuzinerkreſſe durch die Hauptnerven des Blattes, die über den Blattrand hervortreten und durch die Kronenblätter, die ſo zugeſpitzt ſind, daß die Spitze faſt eine Borſte bildet. Eine Abbildung der Pflanze findet ſich im Bot. Mag. 3, tab. 98.

18) **Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.** Knollige Kapuzinerkreſſe. Knolle groß ei-birnförmig. Blätter halbkreisrund, am Grunde quer abgeſchnitten, die 3 oder 5 Lappen der Blätter ſind ſtumpf. Von den geſättigt orangengelben Kronenblättern, die den Kelch kaum viel an Größe übertreffen, ſind die 2 obern ſitzend, die 3 untern genagelt und alle ſchwach gekerbt. Der purpurrothe Kelch hat längliche Einſchnitte. Der verlängerte hutförmige Sporn iſt dunkelorangengelb. Die ſchwin-

beuden Nebenblätter ſind klein, gegenſtändig, pfriemlich und rückwärts gebogen. Abgebildet iſt dieſe Art außer in Ruiz. & Pav. fl. peruv. im Bot. Mag. 66, 3714; Belgique hortic. 2, 36, Hook. Jc. pl. Vol. 7, tab. 653; Fl. des serres 5, tab. 452. Das Vaterland iſt Peru.

19) **Tropaeolum crenatiflorum Hook.** Kerbblütige Kapuzinerkreſſe. Die kleinen Blätter ſind halbkreisrund, am Grunde abgeſchnitten und haben 5 zugerundete, ſehr ſtumpfe, weichſpitzige Lappen. Der gelb mit grün überlaufene Kelch hat lanzettförmige ſtumpfe Einſchnitte. Der Sporn, ebenſo gefärbt, wie der Kelch, iſt zweimal länger als der Kelch, ſtachelſpitzig. Von den gelben Kronenblättern ſind nur die zwei obern mit dunkelpurpurfarbigen Linien durchzogen, ſie ſind faſt gleichförmig, verkehrt eirund, an der Spitze abgeſchnitten mit zwei Einſchnitten verſehen, deren jeder drei ſtumpfe Zähne hat. Abgebildet iſt dieſe Pflanze aus Peru: Fl. des serres 2, 166; Bot. Mag. 72, tab. 4245; Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1848, tab. 207.

20) **Tropaeolum cirrhipes Hook.** Rankenfüßige Kapuzinerkreſſe. Dieſe in Hooker's Icon. pl. Vol. V. tab 411 abgebildete Kapuzinerkreſſe, von den Anden Peru's bei Chacapoyas geſammelt, hat einen gelbgrünen Kelch und eben ſo gefärbte kurze Kronenblätter und einen orangenrothen langen Sporn. Die langgeſtielten ſchildförmigen Blätter ſind deltaförmig, ſtumpfkantig. Die ſehr langen windenden Blüthenſtiele haben der Pflanze den Beinamen verſchafft. Der Kelchrand iſt aufrecht und der Kelch in den langen pfriemlich-cylindriſchen Sporn verſchmälert.

21) **Tropaeolum elegans Don.** Zierliche Kapuzinerkreſſe. Von den 5 verkehrt-eiförmigen Lappen der ſchildigen Blätter ſind die untern ſchmal. Die gelben Kronenblätter ſind ſpatelförmig und übertreffen den Kelch nicht ſehr an Länge. Dieſer iſt roth oder purpurfarbig und hat 5, verkehrt-eiförmig lanzettliche zugeſpitzte Abſchnitte. Eine Abbildung der Pflanze, die in Chili wächſt, fehlt.

22) **Tropaeolum azureum Miers.** Himmelblaue Kapuzinerkreſſe. Dieſe aus der Nähe von Valparaiſo gekommene Art hat eine knollige Wurzel, einen windenden Stengel; fünfſpaltige Blätter, deren Lappen linienförmig ſtumpf ſind; ſchön blaue, in der Mitte weiße Blumen, mit faſt gleichen verkehrt eirunden Lappigen Kronenblättern; einen purpurrothgefleckten Kelch mit 5 eirunden ſpitzen Einſchnitten und einem kurzen kegelförmigen Sporn. Abgebildet iſt ſie im Bot. Reg. 28, tab. 65; Bot. Mag. 69, tab. 3985; Fl. des serres 2, tab. 46; Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1845, tab. 22; Paxt. Mag. 9, tab. 247. (T. violaeflorum A. Dietrich iſt ſynonym.)

23) **Tropaeolum rhomboideum Ch. Lem.** Rautenförmige Kapuzinerkreſſe. Dieſe aus Chili ſtammende Art, welche in Van Houtte's Garten kultivirt wurde und nicht abgebildet iſt, hat eine knollige Wurzel, einen kletternden Stengel, 5lappige ſchildige kleine Blätter, deren Blättchen eiförmig-ſtumpf, in der Mitte mit einem kleinen Weichſtachel verſehen ſind; gelbe, faſt gleiche Kronenblätter; einen weitglockigen zugeſpitzten breit 5eckigen Kelch, mit faſt 4eckigen, an der Spitze flachrunden, weichſtachligen Abſchnitten und einem erſt bauchigen, dann zuſammengezogenen Sporn, der dem Kelch an Länge gleich iſt.

24) **Tropaeolum albiflorum Ch. Lem.** Weißblüthige Kapuzinerkreſſe. Die knollige Wurzel treibt einen klimmenden Stengel, an

dem an kurzen Blattſtielen kleine meergrüne 3—5 fingerförmig getheilte Blätter ſitzen. Die einzelnen langen Blattſtiele tragen große weiße Blüthen mit großen gefalteten welligen Blüthenblättern, die im Grunde goldgelb purpurroth gefleckt ſind, einen 5eckigen Kelch, der breite deltaförmige Abſchnitte hat und einen ſchlanken, aufrechten langen Sporn. Dieſe Art, aus Peru oder Chili, abgebildet in Flore des serres 3, Tab 241, wurde in Van Houtte's Garten kultivirt.

25) **Tropaeolum oxalianthum** Morr. Oxalisblüthige Kapuzinerkreſſe. Dieſes Tropaeolum, abgebildet in den Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1848, tab. 207 und kultivirt von Herrn Baumann, hat einen ſchlanken windenden Stengel; ſchildförmige Blätter, die 5 lanzettliche, am Grunde keilförmige Blättchen haben; 5 Kelcheinſchnitte, die eiförmig und am Grunde verbreitet ſind; 5 eiförmige, nach dem Grunde hin keilförmige, faſt gleiche Kronenblätter, die zweimal länger als der Kelch ſind und einen ſtumpfkegelförmigen, ein wenig gekrümmten Sporn, von der Länge der Kelcheinſchnitte. Die Pflanze iſt wahrſcheinlich aus Chili.

26) **Tropaeolum Beuthii** Klotzsch. Beuth's Kapuzinerkreſſe. Dieſe nicht abgebildete Art aus Bolivien hat ſcheibenförmige Knollen, windende Stengel, faſt kreisrunde Blätter, mit 5—6 verkehrt-eiförmigen, an der Spitze abgerundeten Lappen, wovon der vordere an der Spitze ſtachelſpitzig iſt. Die gelben Kronen haben verkehrt herzförmige, ausgerandete Blumenblätter, die zweimal den Kelch an Länge übertreffen. Die 5 grünen Kelchabſchnitte ſind elliptiſch, kurz geſpitzt. Der Sporn iſt grade und eben ſo lang als der Kelch.

27. **Tropaeolum sessilifolium** Endl. & Pöpp. Die Kapuzinerkreſſe mit ſitzenden Blättern. Abgebildet iſt dieſe Chiliſche Art in Endl. Nova Genera tab. 38. Sie hat ſitzende 5 lappige Blätter, deren Einſchnitte länglich ſind. Die violettrothen Blüthen haben gleichförmige, ſpatelförmig längliche, ausgerandete Kronenblätter; dreieckig-eiförmige, zugeſpitzte faſt gleiche, grüngelbe und bleibende Kelchabſchnitte, die den ſchief glockenförmigen Kelch bilden und vorne einen ſackartigen, hinten allmählig kegelförmig verſchmälerten, aufrechten Sporn, welcher die Kelchabſchnitte an Länge übertrifft.

28) **Tropaeolum tricolorum** Sweet. (T. tricolor Lindl.) Dreifarbige Kapuzinerkreſſe. Dieſe Art iſt gar vielfältig abgebildet worden, ſo wie im Bot. Reg. tab. 1935, in Sweet. Brit. flow. Gard. III., tab. 270; in Rchb. Fl. exot. t. 347; Flore des serres IV., tab. 368 u. 369; Bot. Mag. tab. 3169. Poepp. & Endl. Nova Gen. & Sp. Chil. tab. 38. fig. a. b. c. Der Stengel iſt kletternd, ſehr ſchlank. Die ſchildförmigen, 5—6theiligen Blätter haben verkehrt-eiförmige oder länglich runde, ſtumpfe, weichſtachlige Einſchnitte. Die ſehr kleinen goldgelben Kronen haben ganze, verkehrt eiförmig abgerundete Kronenblätter, die kaum den Kelch überragen und unter ſich faſt gleich groß ſind. Der kreiſelförmige Kelch hat einen dunkelviolettfarbigen Rand, der in 5 ſehr kurze Zähne eingeſchnitten iſt. Der Sporn iſt kurz, ſchlank und verdünnt. Das Vaterland der Pflanze iſt Chili.

29) **Tropaeolum edule** Morr. Eßbare Kapuzinerkreſſe. Der Stengel iſt kletternd, zart. Die 6 Blattabſchnitte ſind länglich-lanzettlich; allmählig verſchmälert. Die großen und zahlreichen gelben Blüthen ſind faſt gleich, ihre Blätter ſind verkehrt herzförmig, wellig gebogen und am Rande ausgebuchtet. Die Kelchabſchnitte ſind faſt dreieckig

spitz und der Sporn ist zugespitzt. Abgebildet ist diese Pflanze in Paxt. Mag. 9, tab. 127 und in den Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1846, tab. 88.

30) **Tropaeolum brachyceras** Hook & Arnott. Kurzspornige Kapuzinerkresse. (T. tenellum G. Don; T. chilense Bert.) Die schildförmigen Blätter haben 6—7 länglichrunde oder verkehrt-eiförmige, weichstachlige Abschnitte. Die Nebenblätter sind klein, dreieckig, am Rande kaum gezähnt. Die 5 goldgelben Kronenblätter sind viel größer als der Kelch, die beiden obern sind kleiner keilförmig und am Grunde rothgestreift, die drei untern verkehrt-eiförmig, gleichfarbig. Der Kelch ist fast glockig, grün und hat einen Rand, der in 5 ungleiche zugespitzte Theile getrennt ist, so wie einen kurzen kegelförmigen Sporn. Diese chilesische Art ist abgebildet: Bot. Mag. tab. 3851, Bot. Reg. t. 1826; Poepp & Endl. Nov. Gen. & Spec. pl. Chil. t. 36, Fl. des serres 4, tab. 168; Paxt. Mag. 4, tab. 55; Sweet Fl. Gard. II., tab. 370.

31) **Tropaeolum speciosum** Pöpp. & Endl. Ansehnliche Kapuzinerkresse. Diese Art aus Chili und Peru hat windende Stengel, fast schildförmige 6theilige Blätter, deren Theile länglich verkehrt-eiförmig, stumpf und kurz gestielt sind. Die Nebenblätter sind 3—6theilig, behaart. Die schönen rothen Blüthen haben 2 obere spatelförmige stumpfe tief ausgerandete und 3 untere, fast gleiche, deltoidisch eiförmige Kronenblätter. Der schief glockenförmige Kelch hat einen Rand mit 5 ungleichen spitzen Einschnitten. Der Sporn ist kegelförmig, allmählig verschmälert, leicht gekrümmt und 3fach länger als die Kronenblätter. Die Abbildungen dieser Pflanze finden sich in: Pöpp. & Endl. Nov. Gen. & Spec. pl. Chil. tab. 35, Annales de la Soc. d'Hortic. de Gand 1847, p. 169; Fl. des serres 3, tab. 281. Bot. Mag. tab. 4323.

32) **Tropaeolum ciliatum** Ruiz & Pav. Gewimperte Kapuzinerkresse. Von dieser chilesischen Art ist nur eine Diagnose in Pöpp. & Endl. Nov. Gen. & Sp. pl. Chil. tab. 38, fig. d—g. abgebildet. Sie ist kletternd und hat abwechselnde, lang gestielte, schildig tief 6lappige Blätter. Die untern weichhaarigen oben kahlen Lappen sind ungleich, verkehrt-eiförmig, mit einer kleinen Spitze versehen. Die Nebenblätter sind gegenständig, rundlich nierenförmig, klein gewimpert. Die Blüthenstiele haben in der Mitte 2 gegenständige Deckblätter. Die gelben Kronenblätter sind kaum länger als der Kelch, ganz; die 2 obern sind verkehrt-eiförmig, breit; die drei untern herzförmig, stumpf, lang genagelt. Der Kelch ist fünfeckig, tief 5theilig, seine Einschnitte sind lanzettlich. Der Sporn ist klein, kegelförmig.

33) **Tropaeolum Bridgesii** Gardner. Bridges'sche Kapuzinerkresse. — Soll eine brasilianische Art sein und ist abgebildet in Gardn. Sertum plant. tab. 39. Sie ist aufsteigend, klimmend. Ihre Blätter sind tief schildtheilig und haben 6—7 linealisch-stumpfe, an der Basis verschmälerte Theile, wovon ein Theil oft größer und weichstachlig ist. Die Kronenblätter sind verkehrt herzförmig. Die Kelchabschnitte eiförmig zugespitzt und der mit den Kronenblättern fast gleich lange Sporn, ist aufrecht und verdünnt.

34) **Tropaeolum polyphyllum** Cav. Vielblättrige Kapuzinerkresse. Die handförmig getheilten Blätter haben 6—7 linealisch-lanzettliche zugespitzte, eingeschnittene oder fiedertheilige Abschnitte. Von den gelben gestreiften Kronenblättern sind die obern länglich verkehrtei-

förmig, an der Spitze schwach ausgerandet, die untern sind eiförmig zugespitzt zweizähnig. Der offene glockenförmige Kelch hat 5 ungleiche eiförmig spitze Einschnitte. Der kegelförmige aufrechte Sporn ist 2fach länger als die Kelcheinschnitte. Das Vaterland dieser Art, die sich in Cav. Ic. tab. 395, in Pöpp. & Endl. Nov. Gen. tab. 37 und im Bot. Mag. tab. 4042 abgebildet findet, ist Chili.

35) **Tropaeolum leptophyllum** Don. Zartblättrige Kapuzinerkresse. Die Wurzel dieser nicht abgebildeten chilesischen Art ist knollig, der Stengel zart, die schildförmigen Blätter haben 7 linealische weichstachlige Abschnitte. Die gelben Kronenblätter sind 2- oder 3theilig und länger als der Kelch, der 5 eiförmige zugespitzte Blätter hat. Der Sporn ist zart und verdünnt.

36) **Tropaeolum Hookerianum** Barnéoud. Hooker's Kapuzinerkresse. Sie ist nicht abgebildet und wächst in Chili. Ihre knollige Wurzel treibt Stengel, die am Grunde ästig, dann einfach, kletternd und zart sind. Die kleinen schildförmigen Blätter haben 6—8 eiförmige oder verkehrt eiförmig-stumpfe, kaum zugespitzte Läppchen. Die kleinen gelben Blüthen bilden immer, zu 5—8, Büschel und haben 5 gleichförmige, kaum ausgerandete Kronenblätter. Die Kelchabschnitte sind kürzer als die Krone und eiförmig. Der Sporn ist kurz sackartig.

9. Kultur der Kapuzinerkressen.

Hinsichtlich der Kultur der verschiedenen Kapuzinerkressen muß man die Arten in drei Klassen theilen, nämlich 1. in solche die Knollen tragen wie z. B. Tropaeolum tricolor, brachyceras etc., 2. in solche die keine Knollen tragen, aber deren Stämme mehr holzig werden und mehrere Jahre halten als z. B. T. Lobbianum, mit seinen Varietäten, Wagneri u. a. und 3. in einjährige, die zum Herbste absterben und durch neue Aussaaten alljährlich erneuert werden müssen, als T. majus, minus u. dgl.

Diejenigen Arten, die mit Knollen oder fleischigen Wurzeln versehen sind, pflegen an ihrem natürlichen Standorte während der trockenen Jahreszeit, wo kein Regen fällt, einzuziehen und in einem Zustand der Ruhe versetzt zu sein. Es muß nun die Aufgabe des Kultivateurs sein das natürliche Verhalten der Pflanzen zu erforschen und so viel als möglich nachzuahmen und so mögen folgende zwei Regeln bei der Kultur dieser Pflanzen besonders zu beherzigen sein:

1) Während der Zeit der Ruhe wird durch ein allmähliges Vermindern der Bewässerung die Vegetation aufgehalten.

2) Nach dieser Zeit muß die unterbrochene Entwickelung eines jeden Pflanzentheils durch sorgsames Verpflanzen, Bewässern und andere Aufmerksamkeit unterstützt werden.

Die meisten Arten mit Knollen treiben schon sehr zeitig im Herbste, oft schon im October von Neuem aus, sobald man dies bemerkt, werden die Knollen umgepflanzt in eine Erdmischung, bestehend aus leichtem Lehm, Laub- und alter Dungerde mit einem Theil feinen Sand untermischt. Eine gute Unterlage im Topf zum Abzug des Wassers ist durchaus nöthig. Der geeignetste Platz, den man diesen Pflanzen zur weiteren Entwicklung nun giebt, ist ein luftiger, heller Standort in

einem Kalthause. Haben die jungen Triebe einige Zoll Länge erreicht, so befestigt man im Topfe ein Spalier, an dem sich die Pflanzen dann von selbst anhalten und dasselbe sehr bald überziehen.

Die bekannte Schönheit dieser zarten Pflanzen wird durch jede Mühe und Sorgfalt, die man auf sie verwendet, und die sie während der Zeit des Wachsens so sehr bedürfen, belohnt.

Gleich den übrigen Arten lassen sich die mit knolligen Wurzeln leicht durch Stecklinge vermehren, wenn man dieselben in Sand oder sandige Erde steckt, und ihnen eine mäßige Bodenwärme angedeihen läßt. Auch aus Samen, den diese Arten oft gern ansetzen, lassen sie sich vermehren.

Die Arten, deren fleischige Stämme sich mehr oder weniger verholzen, lassen sich in einem halbwarmen Hause leicht durchwintern und halten sich mehrere Jahre hindurch. Um jedoch immer gute, kräftige Pflanzen zu haben, ist es nöthig sich solche durch Anzucht aus Stecklingen zu verschaffen. Die zu dieser Abtheilung gehörenden Arten sind es besonders, die sich mit großem Vortheil während des Sommers im Freien zur Bekleidung von Spalieren, Mauern ꝛc. verwenden lassen.

Die Kultur der einjährigen Arten bietet durchaus keine Schwierigkeiten, man säet die Samen im März oder April in Töpfe, stellt diese auf ein Warmbeet und pflanzt die jungen Pflanzen, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, ins Freie, wenn man es nicht vorzieht sie in großen Töpfen oder sonstigen Gefäßen zu kultiviren.

Gartenbau - Vereine.

Hamburg. Die diesjährige große Pflanzen- und Blumenausstellung findet am 5. und 6. Mai hierselbst statt.

Kiel. Der Verein für Gartenbau in Schleswig, Holstein und Lauenburg, der so eben seinen Jahresbericht pro 1858 veröffentlicht hat, ist in das 4. Jahr seines thätigen Wirkens getreten und es ist nicht zu leugnen, daß der junge Verein durch seine Ausstellungen, seine Prämien und Publicationen das Interesse für den Gartenbau belebt und zu Anlagen, Kulturen und Unternehmungen in der Gärtnerei angeregt hat. Es muß dankend anerkannt werden, daß der Verein hauptsächlich auch seine Hauptthätigkeit auf die Verbesserung des Oestbaues richtet, auf einen Zweig der Volkswirthschaft, der bisher sehr vernachlässigt worden und gewiß einer besonderen Berücksichtigung werth ist.

Außer dem Verzeichnisse der Mitglieder des Vereins, deren Zahl bereits 435 beträgt und der Abrechnung pro 1858, enthält der letzte Jahresbericht dieses Vereins einen Bericht über die von dem Vereine zum Versuche angebauten und einige andere neue Pflanzen. Wie im abgelaufenen Jahre hatte der Verein eine Anzahl Sämereien aus der renomirten Samenhandlung von Fr. A. Haage jun. in Erfurt kommen lassen und

dieſelben dem Herrn Handelsgärtner Dahle in Kiel zum Anbau übergeben. Ueber die Erfolge dieſer Verſuchskulturen ſtattet der Jahresbericht einen kurzen Bericht ab, den wir unſern Leſern auch nicht vorenthalten wollten, und ihn oben pag. 203 mitgetheilt haben, denn man erſieht daraus, was von ſo mancher „als ſchön“ angeprieſenen Neuheit zu halten iſt.

Nächſtdem werden im Jahresberichte mehrere neue Varietäten von einigen beliebten Florblumen empfohlen, die wirklich ſchön ſind, als von Fuchſien, Pelargonien, Verbenen, Heliotropen ꝛc., ferner wird eine ergiebige Kulturmethode und empfehlenswerthe Sorte der Himbeeren angegeben und dann folgt der Bericht über die Obſt-, Gemüſe- und Blumenausſtellung vom 10—12. October 1858, über die in der hamburg. Gartenztg. früher berichtet worden iſt.

Möge dem ſo thätigen Vorſtande dieſes Vereins auch ferner die Theilnahme und Unterſtützung der Vereinsmitglieder zu Theil werden, die derſelbe bei Befolgung ſeines Zweckes „Förderung des geſammten Garten- und Obſtbaues“ bedarf und die guten Erfolge werden dann nicht ausbleiben.

Kiel, den 17. März 1859. Unter heutigem Datum hat der Verein für Gartenbau in Schleswig, Holſtein und Lauenburg ein Programm der Ausſtellung, die am 4., 5. und 6. Juli d. J. abgehalten werden ſoll, veröffentlicht und ſind darin für die Preisbewerbung folgende Prämien ausgeſetzt:

I. Zierpflanzen.

	1. Preis.	2. Preis.	
1)	10 ℛ	5 ℛ	für die beſte Sammlung von Roſen in wenigſtens 24 Sorten.
2)	8 „	4 „	für die beſte Sammlung von Pelargonien in wenigſtens 24 Sorten.
3)	6 „	3 „	für die beſte Sammlung von Fuchſien in wenigſtens 12 Sorten.
4)	8 „	4 „	für die beſte Sammlung von Warmhauspflanzen in wenigſtens 12 Sorten.
5)	5 „		für die beſte Sammlung von neuen Verbenen in wenigſtens 12 Sorten.
6)	4 „	2 „	für die beſte Sammlung von Freilandpflanzen, ſowohl annuellen, als Stauden und Sträuchern.
7)	8 „	4 „	zur freien Verfügung der Preisrichter, insbeſondere für Neuheiten.
8)	3 „	2 „	für den geſchmackvollſten Blumenſtrauß.

Freilandpflanzen und Roſen können auch in abgeſchnittenen Exemplaren ausgeſtellt werden, von letztern zählen aber in dieſem Falle dann immer je 2 Sorten nur ſoviel, als eine im Topfe gelieferte.

II. Gemüſe.

	1. Preis.	2. Preis.	
1)	6 ℛ	4 ℛ	für die beſte Aufſtellung von Gemüſen.
2)	4 „	2 „	für den beſten Blumenkohl.
3)	4 „		zur freien Verfügung der Preisrichter.

III. Früchte.

1. Preis. 2. Preis.
1) 4 ℳ 2 ℳ für die besten Erdbeeren in wenigstens 12 Sorten.
2) 4 „ 2 „ zur freien Verfügung der Preisrichter.

Die Preise können auch getheilt werden, wozu insbesondere dann die Preisrichter ermächtigt sind, wenn eine aus sonst preiswürdigen Exemplaren bestehende Sammlung die vorgeschriebene Sortenzahl nicht erreicht.

Die demnächst zu ernennenden Preisrichter sind von jeder eigenen Concurrenz bei der Preisbewerbung ausgeschlossen.

Pesth. Der „ungarische Gartenbau-Verein“ hält seine zweite Gartenindustrie Ausstellung am 6., 7. und 8. Mai in den Räumlichkeiten des National Museums ab. Nach dem zu dieser Ausstellung entworfenen und festgestellten Programm, sind eine Menge Prämien ausgesetzt, so 12 Preise auf Blumen und Pflanzen-Collectionen; 7 auf Obstsorten, 10 auf diverse Gartengewächse und 2 auf Gartenrequisiten und Decorationen. Die Preise bestehen aus goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen und Belobungsdekreten. Mit der Ausstellung ist, wie dies bei mehreren Vereinen Mode ist, eine Verloosung verbunden, in Folge dessen werden sowohl in Verbindung mit den Eintrittskarten, als auch ohne dieselben Loose ausgegeben, für das hierfür einlaufende Geld werden während der Ausstellung Gewinnste zur Verloosung angekauft.

Petersburg. Die zweite öffentliche Blumen- und Pflanzen-Ausstellung, welche der erst seit vorigem Jahre bestehende „Russische Gartenbau-Verein in St. Petersburg“ in diesem Jahre abhält, findet vom 30. April bis 5. Mai statt. Leider ging uns das für diese Ausstellung veröffentlichte sehr interessante und mannigfaltige Programm erst vor wenigen Tagen zu, um jetzt noch näher darauf eingehen zu können. Es enthält daſſelbe mehrere zur Concurrenz sehr geschickt gestellte Preisaufgaben, die sich mancher Verein zum Muster nehmen sollte. *)

Ohne Zweifel hat der wissenschaftliche Director des kaiserlichen botanischen Gartens, unser verehrte Freund Herr Dr. E. Regel, mit das meiste Verdienst diesen Verein ins Leben gerufen zu haben. Es ist gewiß auffallend, daß sich in Petersburg nicht schon längst ein Verein zur Vertretung der Interessen des Gartenbaues gebildet hatte, denn es ist allgemein bekannt, daß es in Petersburg nicht an Freunden des Gartenbaues fehlt, daß daselbst jährlich ungeheure Summen für die Produkte desſelben, für Ausschmückung von Wohnungen und Gärten ausgegeben werden. Diesem Umstande zufolge traten, wie Herr Dr. Regel in einem Berichte über „die Verhandlungen der Versammlungen,

*) Auf Verlangen wird dies Programm von der Redaction dieser Zeitung den sich dafür Interessirenden gern zugesandt.

welche der Bildung und Allerhöchsten Bestätigung des Russ. Gartenbauvereines in Petersburg vorausgingen," mittheilt, nach Neujahr 1858 im Einverständniß mit Sr. Excellenz Herrn Peter Casimirowitsch von Meyendorff, eine Zahl von Freunden des Gartenbaues zusammen, um die Bildung eines solchen Vereins zu besprechen und nachdem zu den Statuten, Reglements und zur Veranstaltung einer Blumenausstellung Projecte ausgearbeitet waren, ward eine größere Versammlung von Freunden des Gartenbaues am 5. Feb. 1858 zusammengerufen. Mit der Leitung dieser ersten Versammlung wurden die Herrn Akademiker von Geleznoff, Dr. Regel, Staatsrath Mollerius, Prof. Cienkowsky und Dr. Körnicke beauftragt. Dr. Regel eröffnete dann die Versammlung mit einer sehr vortrefflichen Rede, er schilderte den Zustand des Gartenbaues in Petersburg, sprach von der großen Nützlichkeit eines Gartenbau-Vereins wie über die Zwecke desselben und das Resultat war, daß sich ein Verein gebildet hat, der für den Gartenbau in ganz Rußland von sehr gewichtigen Folgen sein dürfte. Die Genehmigung der Statuten erfolgte am 25. Juli 1858.

Am 27. Mai 1858 veranstaltete der Verein seine erste Ausstellung, die als etwas durchaus Neues allgemein überraschte und ein sehr günstiges Resultat lieferte, denn der Verein erzielte durch dieselbe nach Abzug aller der bedeutenden Einrichtungskosten, Prämien ꝛc. einen Baarüberschuß von 1820 Rub. Silb.

Berlin. Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues hielt, wie seit einer Reihe von Jahren am 1. Sonntag im Aprilmonat seine Frühjahrsausstellung, eine freilich nur kleine, aber desto ausgesuchtere Ausstellung, denn der Jahresbeitrag des erhabenen Protektor des Vereins, Sr. Majestät des Königs, kommt für Pflanzen oder kleinere Gruppen, wie solche vor dem Vereine vorgeschrieben sind, in 20 Preisen zur Vertheilung. Nur Gutes und Auserlesenes kann eingesandt werden und in Folge dessen ist diese Ausstellung als eine höchst gelungene zu betrachten, denn man sah in der That nur Ausgesuchtes und Vorzügliches. Außer vielen alten bekannten, stets gern gesehenen Pflanzen in meist herrlichen Exemplaren enthielt der zweite Saal eine Menge neue Pflanzen. So sah man gleich am Eingange einige neue Hyacinthen. Allgemeine Bewunderung erregte das „Aurikel-Auge" und Prinzeß Victoria", erstere tief azurblau mit weißer Mitte, letztere roth und gefüllt. Herr Director Linden in Brüssel hatte seine neuesten, erst am 1. Mai in den Handel kommenden Pflanzen eingesandt, nämlich die 4 von uns erwähnten neuen herrlichen Begonien, dann mehrere Blattpflanzen als 3 Rhopala und die Crecentia regalis mit 2 Fuß langen Blättern. Herr Van Houtte hatte seinen Blendling Imatophyllum cyrtanthiflorum eingesandt. Die Chantin'schen Caladien, die Herr L. Mathieu ausgestellt hatte, gefielen allgemein und erregten sogar die lebhafteste Bewunderung. Aus dem Nauen'schen Garten, Obergärtner Gireoud, sah man hier das prächtige Rhododendron alstroemeriaeflorum und das neue Goldfarrn (Gymnogramma Laucheana). Von Herrn Danneel erfreute jeden das Rhod. Roi des Belges, die

Azalea Etendard de Flandre, Begonia Reginae und ein hübſcher Blendling zwiſchen B. splendida und annulata. Neue Azaleen, Camellien, Rhododendren ſah man noch aus dem Hertz'ſchen Garten (Obergärtner Göring), dann Azaleen von Herrn Barrenſtein, Hoffmann, wie von Herrn Univerſitätsgärtner Sauer die neu eingeführte Acacia Pawlikoffskiana. (Es iſt dies die A. celastrifolia Benth., welche der verſtorbene Herr J. H. Ohlendorff als A. Pawlikowskyana beſchrieben hat. Vergl. Seemann, die in Europa eingeführten Acacien, pag. 28. E. D—o.)

Trotz der vielfältigen Einſendungen waren von den 17 im Programme ausgeſprochenen Aufgaben doch nur 9 gelöſ't.

München. In der erſten Verſammlung am 11. Jan. 1859 des ſich in München gebildeten Gartenbau-Vereins iſt Herr Hofrath Dr. von Martius zum erſten und der Herr Hofgärtner Löwe zum zweiten Vorſtande erwählt worden. Der Verein zählt bereits 120 Mitglieder und ſollen die beſten deutſchen, engliſchen und belgiſchen Gartenjournale angeſchafft und im Vereinslokale zur Benutzung der Mitglieder aufgelegt werden. (Bot. Ztg.)

Abgebildete Camellien

in Amb. Verſchaffelt's Nouvelle Iconographie des Camellias.

Liv. 11. (November 1858.)

Taf. 1. Cam. Boromeo. Herr Verſchaffelt erhielt dieſe Camellie im Herbſte 1856 aus Italien, ſie iſt eine Blume erſten Ranges, ſowohl in Bezug auf ihre Größe, Regelmäßigkeit wie Färbung. Die Blumen ſind faſt ½ Fuß groß, von zarter roſa Färbung; jedes Blumenblatt geziert durch weiße breite Streifen, zu einander ſtrahlenförmig geſtellt. Die zahlreichen Blumenblätter liegen dachziegelförmig, ſind abgerundet und gleich groß. Eine herrliche Blume.

Taf. 2. Cam. Virgine Calubini. Um dieſe lieblichſte aller Camellienblumen in getreuer Abbildung den Blumenfreunden vorzuführen, wurde die Blume vermittelſt eines Daguerreotyp aufgenommen. Die mäßig großen Blumen ſind rein weiß, die Blumenblätter ſtehen in 8 vom Mittelpunkt der Blumen ausgehenden ſpiralförmigen Reihen regelmäßig dachziegelförmig. Ein jeder, der dieſe Blumen ſah, war über die Schönheit derſelben erſtaunt. Außerdem beſitzt ſie noch die gute Eigenſchaft, daß die Blumen ſich leicht öffnen und ſehr reichlich in Menge erſcheinen. Herr Verſchaffelt erhielt dieſe prächtige Camellie 1857 aus Italien.

Taf. 3. Cam. Gloria del Verbano. Eine ältere, aber den-

noch sehr beachtenswerthe Blume. Die kleinen Blumen bestehen aus sehr großen, flach ausgebreiteten, im Centrum jedoch mehr gedrängt stehenden, brillant carminrothen Blumenblättern. In Folge der brillanten Färbung erinnert die Blume an eine Bourbonrose. Wie schon der Name anzeigt, stammt sie ebenfalls aus Italien.

Taf. 4. Cam. Ettore Fieramosca. Ebenfalls eine schöne und gute Camellie, ausgezeichnet durch die doppelte Stellung der Blumenblätter, wie durch die hübsch panachirte Färbung der letzteren. Der Herausgeber der vortrefflichen Iconographie erhielt diese Camellie 1857 aus Italien. Die Blumen sind nur mittelgroß, sie bestehen aus großen Blumenblättern, von denen die äußeren sehr regelmäßig gestellt und ausgebreitet sind, sämmlich von zarter rosa Färbung, in der Mitte durch einen blasseren Längsstreifen geziert. Die übrigen Blumenblätter und namentlich die im Centrum stehenden sind spiralförmig, ein wenig unregelmäßig und gleichen einer zweiten Blume in der Blume, auch diese Blätter sind rosa, gleichmäßig panachirt mit weiß.

12. Liv. (December 1859.)

Taf. 1. Cam. La Speranza. Herr Verschaffelt erhielt diese Camellie 1857 aus Italien, wo sie aus Samen gewonnen wurde, und im Frühjahre 1858 blühte sie prächtig beim Besitzer.

Die herrlichen Blumen sind groß, zweifarbig und bestehen aus ungleich großen, jedoch regelmäßig gestellten Blumenblättern. Die an der Peripherie der Blume befindlichen sind groß, abgerundet, oft gelappt, herrlich carminroth, unterbrochen durch breite weiße Längsstreifen. Die im Centrum befindlichen sind kleiner, ein kleines Herz bildend, einfarbig kirschroth.

Taf. 2. Cam. Comtesse du Hainaut. Diese liebliche Camellie wurde auf einem Zweige eines starken Exemplars der C. Il Cygno erzeugt und sofort abgepfropft und hat sie sich seit 4 Jahren als ganz constant erwiesen. Die Form, das frische, jungfräuliche, zarte Colorit, wie die totale Schönheit der Blume, macht diese Blume zu einer der schönsten.

Die Blumenblätter stehen sternförmig in 6 Reihen, und in diesen ganz regelmäßig. Die Farbe der mittelgroßen Blume ist zart rosa, jedoch blasser mehr nach der Mitte zu, während das eigentliche Centrum der Blume wieder dunkler gefärbt ist.

Taf. 3. Cam. Triomphe de Lombardie. Wie der Name schon andeutet, stammt diese Camellie aus der Lombardei, von wo sie Herr Verschaffelt vor mehreren Jahren erhielt. Die Blumen sind sehr groß, lebhaft kirschroth, die im Centrum stehenden Blumenblätter zuweilen mit weißen feinen Streifen geziert. In jeder Beziehung eine empfehlenswerthe Camellie.

Taf. 4. Cam. Calypso nova. Eine kleine Blume von lebhaft rosa Farbe, ganz regelmäßig gebaut, sehr zu empfehlen.

---

1. Liv. (Januar 1859.)

Taf. 1. Cam. Ugo Foscolo. Der Herausgeber der Nouv. Iconograph. des Camellias, Herr Amb. Verschaffelt, erhielt diese

Camellie im Herbste 1857, und hatte das Vergnügen sie bereits im Frühjahre des nächsten Jahres in ihrer Pracht bei sich blühen zu sehen, so daß derselbe im Stande ist deren Schönheit zu garantiren.

Der Habitus der Pflanze ist elegant, pyramidalisch, die Blätter sind mittelgroß, schön grün. Die Blumen von mehr als 5″ im Durchm., sind schön rosa, im Centrum mehr carmoisinroth gefärbt und bestehen aus sehr zahlreichen Blumenblättern, von denen die im Centrum oval, die nach der Peripherie der Blumen zu abgerundet und mit großer Regelmäßigkeit gestellt sind.

Taf. 2. Cam. Duchesse de Brabant. Diese liebliche Varietät ist durch ein Naturspiel im Etablissement Verschaffelt auf einem Zweige der Camellia Marquise Elise entstanden. Dieser Zweig wurde sogleich abgepfropft und hat sich diese so entstandene Varietät als ganz beständig bewiesen. Sie zeichnet sich durch eleganten Habitus, schönes Laubwerk, leichtes Blühen, durch die Regelmäßigkeit ihrer zarten Blumen aus. Die Blumen sind ganz zart matrosa und jedes einzelne Blumenblatt am Grunde zartcarminroth getuscht. Es ist jedenfalls eine Blume ersten Ranges.

Taf. 3. Cam. Vincento Carducci. Eine prachtvolle Varietät, die Herr Verschaffelt im Jahre 1857 aus Italien erhielt und die zwei Jahre hintereinander ihre herrlichen carminrothen großen Blumen in sehr reichlicher Menge entfaltete. Die Blumen sind außerdem von großer Regelmäßigkeit.

Taf. 4. Vittoria Pisani. Es ist dies wohl eine der lieblichsten Camellien, die Blumen von der größtmöglichsten Regelmäßigkeit, von der brillantesten carminfarbenen Färbung und jedes Blumenblatt mit einem weißen Längsstreifen geziert.

Herr Verschaffelt erhielt sie ebenfalls aus Italien zu derselben Zeit wie die vorige, und hat sie seit der Zeit alljährlich sehr reichlich bei ihm geblüht, so daß er sie den Camellien- wie Blumenfreunden bestens empfehlen kann. Der Abbildung nach gewiß eine reizende Blume.

Die Balsamine.

Diese einjährige, aus Ost-Indien stammende Pflanze ist zu allgemein bekannt, als daß wir nöthig hätten sie hier näher zu beschreiben. Die älteste, 1596 eingeführte Urform, mit einfachen rothen Blumen, hat unter den Händen der Gärtner eine Menge Varietäten mit verschiedenartig gefärbten, sehr großen, mehr oder weniger gefüllten Blumen hervorgebracht, welche in drei verschiedene Gruppen getheilt werden können, nämlich in die der gewöhnlichen Balsaminen, welche Jedermann kennt, in die der Zwergbalsaminen, merkwürdig durch die Art ihrer Verzweigung und endlich in die der Camellien-Balsaminen, die schönsten von allen, welche sich durch sehr große, regelmäßig geformte Blumen auszeichnen, die zugleich noch von ganz besonderer Farbenpracht sind.

Die Varietäten mit marmorirten Blumen, als weiß mit rothem Grunde, feuerroth, karmoisinfarbig oder blaßlilla, sind besonders die, welche den größten Effekt erzeugen, sie übertreffen alle übrigen an Schönheit.

Die Balsamine läßt sich in Töpfen und noch allgemeiner im freien Lande ziehen, wo sie einen großen Theil des Sommers die Zierde eines Gartens sind.

Um immer wieder schöne Formen zu gewinnen, werden die Samen von den schönsten Blumen gesammelt. Diejenigen, welche von den schönsten, am meisten gefüllten Blumen herrühren, werden die besten sein und den schönsten Erfolg geben, denn die gefüllten Blumen haben immer noch genug Staubgefäße, daß eine Befruchtung vor sich gehen kann.

Man säe den Samen zu verschiedenen Perioden von Mitte März bis Ende April unter Glasfenster auf ein lauwarmes Beet, mit gut zersetzter Dung- und einem kleinen Theil gewöhnlicher Erde. Die jungen Pflanzen müssen mit Sorgfalt gepflegt werden, man suche es namentlich zu vermeiden, daß sie nicht von der Trockenheit leiden, und muß man sie daher an heißen Tagen öfters überbrausen, um sie stets in einer feuchten Atmosphäre zu erhalten. Haben die Pflanzen 4 Blätter getrieben, so muß man daran denken sie zu verpflanzen. Zu dieser Periode unterscheiden sich jedoch die Verfahrungsarten je nachdem man die Pflanzen in Töpfen oder im freien Lande ziehen will. Gedenkt man die Pflanzen in Töpfen zu ziehen, so verfahre man folgendermaßen: Sobald die Pflanzen 4 Blätter getrieben haben, so verpflanze man sie einzeln in Töpfe von 3--4 Zoll Durchmesser, beim Einpflanzen sorge man dafür, daß der Stamm ein wenig tiefer in die Erde zu stehen kömmt als er früher stand. Beim Pflanzen bediene man sich einer Erd-Mischung aus gleichen Theilen gut zersetzter Dung- und Lauberde. Ist das Verpflanzen geschehen und sind die Pflanzen gut begossen, so setze man sie wieder unter ein Glasfenster und grabe die Töpfe in die Erde des Beetes, doch so, daß die Pflanzen recht nahe an die Scheiben zu stehen kommen. Die Balsaminen lieben viel Wärme, Feuchtigkeit und Düngung, daher versäume man nie das Begießen, und gebe ihnen von Zeit zu Zeit einen Guß von flüssigem Dünger und die auf diese Weise gezogenen Pflanzen werden bald ein üppiges Wachsthum entfalten.

Sowie die Wurzeln die inneren Seitenwände der Töpfe berühren, was schon nach Verlauf von einigen Wochen geschehen kann, verpflanze man sie in Töpfe von 6—8 Zoll im Durchmesser, jedoch ohne die Wurzelballen zu zerstören, wobei man sich wie vorher derselben Erde bedient und darauf achtet, daß der Stamm noch etwas tiefer in die Erde zu stehen komme; dann werden die Pflanzen wieder auf ein Beet unter Fenster gesetzt, wo man fortfährt sie mit derselben Sorgfalt zu pflegen.

Einige Wochen später werden sie abermals in noch größere Töpfe umgepflanzt, wobei man sich einer Erdmischung aus 3 gleichen Theilen Laub-, Mist- und guter reiner Gartenerde bedient. Je nachdem die Pflanzen nun wachsen, verpflanze man sie zum vierten und fünften Male in Töpfe von 8—12 Zoll Durchmesser und wenn es die Stärke der Pflanze erlaubt, nehme man noch größere Töpfe. Das letzte Verpflanzen geschieht zur Zeit, wo die ersten Blumen erscheinen. Bei jedem

Umpflanzen ſorge man dafür, daß der Stamm 1—2 Zoll tiefer in die Erde zu ſtehen kömmt, um ihn zu zwingen an dem tiefer in die Erde gekommenen Theil friſche Wurzeln zu treiben, welche dem Wachsthum der Pflanze größere Stärke verleihen werden. Man überbrauſe die Pflanzen an heißen Tagen reichlich, gieße häufig, gebe ihnen von Zeit zu Zeit etwas Guanowaſſer, Tauben- oder verdünnten Kuhdünger, Luft bei guter Witterung ſoviel wie möglich. Iſt die Witterung ſehr heiß, ſo kann man die Fenſter von den Pflanzen ganz weg nehmen. Dies kann man auch thun, wenn es ſanft regnet, was den Pflanzen von großem Vortheil iſt. Gegen Ende Mai bringt man nun die Pflanzen auf eine Stellage in einem Gewächshauſe, wo ſie reichlich Licht haben und wo ſie dann mit derſelben Sorgfalt gepflegt werden. Auf dieſe Weiſe wird man Pflanzen von ungewöhnlicher Stärke erzielen, welche eine große Menge der ſchönſten Blumen entwickeln werden.

Die Pflanzen, die für das freie Land beſtimmt ſind, werden was das Ausſäen betrifft, wie die erſteren behandelt. Dann werden ſie 3 oder 4 Mal verpflanzt, wobei man darauf achtet, daß der Stamm jedes Mal etwas tiefer in die Erde zu ſtehen kommt, damit ſich ein guter Wurzelballen bildet. Wie bei den erſteren, ſo wird auch hier tüchtig begoſſen und reichlich Luft gegeben, ſobald die Pflanzen an Stärke gewinnen und die äußere Temperatur zunimmt. Ende April od. Anfang Mai nehme man die Pflanzen bei einem wo möglich trüben Himmel mit ihren Ballen heraus, pflanze ſie, ohne die Wurzeln zu beſchädigen, auf ein warmes aus leichter gut gedüngter Erde beſtehendes Beet, ſorge für reichliche Feuchtigkeit und vernachläſſige das Begießen mit flüſſigem Dünger nicht, denn man hat es hier mit einer Pflanze zu thun, die viel Waſſer und Dünger verlangt.

Auf dieſe Weiſe wird man herrliche Pflanzen erzielen, die ſich ſtark verzweigen und große ſchöne Blumen hervorbringen werden und vom Juli bis zu den Herbſtfröſten eine Zierde der Gärten bilden.

(Journ. de la Soc. d'Hortic. et d'Agric. de Huy.)

Literatur.

Der Hausgarten in Stadt und Land, leichtfaßliche Anleitung zum Gartenbau für Beſitzer ſtädtiſcher und ländlicher Hausgärten. Von **Fr. B. Hoffacker.** Mit 78 Holzſchnitten in 4 Lieferungen à 18 Kr. (5 Sgr.) Lahr, Verlag J. H. Geiger. 1859. 8. 1. u. 2. Heft, 128 S.

An Anleitungen zur Erziehung und Kultur von Pflanzen und Blumen, zur Ausſchmückung von Luxusgärten und Parks fehlt es durchaus nicht, und ſo mancher Pflanzenfreund wie Gärtner von Profeſſion würde mehr Vergnügen an ihren Pflanzen haben, wenn ſie die in den Gartenzeitſchriften warm empfohlenen Bücher dieſer Art mehr beachteten und zu Rathe zögen. Es würden dann viele von den häufigen Klagen über das Mißlingen dieſer oder jener Pflanzenart wegfallen.

Die uns vorliegende kleine Schrift hat es sich zur Aufgabe gestellt, eine leichtfaßliche Anleitung zur Anlage und Pflege der Hausgärten in Städten, und auf dem Lande zu geben, die wir als eine der besten dieser Art empfehlen können. Der sachkundige Verfasser hatte bei Bearbeitung dieser Schrift besonders solche Gärten ins Auge gefaßt, die bei weitem mehr zum Nutzen und Vergnügen dienen, ohne daß ein ungewöhnlich großer Kapitalaufwand gemacht, und ohne daß ein besonderer Kunstgärtner angestellt wird; die Pflege durch die Hausfrau und übrigen Glieder der Familie mit einiger Nachhülfe durch Tagelöhner soll genügen, mithin keine Lust-, sondern Nutzgärten. Daß aber viele dieser Hausgärten weder den Nutzen abwerfen, wie sie es thun sollten, noch an Schönheit das sind, was sie sein sollten, kann man jeder Zeit wahrnehmen; insbesondere könnten viele Gärten auf dem Lande besser ausgebeutet und mehr für das Schöne gethan, dem Besitzer mehr Genuß gewährt sein, ohne den geringsten Mehraufwand. Wie dies zu bewerkstelligen, sowohl im Gemüse-, als im Obst- und Ziergarten, lehrt der Verfasser auf eine sehr klare und anschauliche Weise, nicht etwa durch Aufzählung von Regeln und Schilderung von Handgriffen, sondern durch faßliche Darlegung der Grundsätze, so daß der Gartenfreund in allen Lagen und Verhältnissen sich zu helfen und selbstbewußt zu handeln weiß.

Einen großen Werth hat dieses Buch noch, daß die in demselben abgehandelten Gegenstände möglichst kurz und dennoch genügend vollständig abgefaßt sind, so daß der gesammte Gartenbau auf wenigen Bogen abgehandelt und das Buch dadurch äußerst wohlfeil ist. Wir besitzen ganz vortreffliche deutsche Gartenbücher von Christ, Förster, Jühlke, Lucas, Metzger, Rubens, Schmidlin ꝛc., die der Verfasser auch sämmtlich verglichen und benutzt hat, dieselben umfassen jedoch theils nur einzelne Zweige, theils sind sie zu hochgehalten und sehr umfassend, daher auch theuer, es dürfte daher der „Hausgarten in Stadt und Land“ nicht zwecklos erscheinen und vielen Nutzen stiften.

Das Buch zerfällt seinem Inhalte nach in 5 Theile, von denen die ersten vier eine vollständige Darstellung der Technik umfassen und der fünfte den Gartenbaubetrieb behandelt, nämlich.

I. Theil: Allgemeiner Gartenbau (Pflanzenernährung, Boden-Klima, Bodenbearbeitung, Pflanzenvermehrung und Verpflanzen, Pflege der Gewächse, Erndte und Samengewinnung.)

II. Theil: Gemüsegarten. (Bau im freien Lande, Gemüsetreiberei und Aufbewahrung der Gemüse.)

III. Theil: Obstgarten. (Kultur der Obstbäume, Sträucher und Reben, insbesondere auch Schnitt- und Erziehungsart für feines Tafelobst; Eintheilung der Obstpflanzungen, Obsterndten und Obstnutzung.)

IV. Theil: Ziergarten. (Kultur einzelner Zierpflanzen und der Zierrasen, Eintheilung der Ziergärten, Gruppirung der Zierpflanzen und sonstige Gartenverzierungen.)

V. Theil: Betrieb des Gartenbaues. (Garteneinrichtung nach Größe, Zweck ꝛc.; Gartenbewirthschaftung mit Rücksicht auf Wahl und Aufeinanderfolge der Gewächse, auf Kulturaufwand, Ertrag und Bewirthung der Erzeugnisse.)

Der billige Preis von 17½ Sgr. für das ganze Buch ermöglicht auch den Unbemittelſten ſich dieſes ſo nützliche Gartenbuch anzuſchaffen.

E. D—o.

Die **Anlage von Feldwegen** und die **Güterzuſammenlegung**. Ein zeitgemäßes Wort an alle Landwirthe, Gemeindebehörden und landwirthſch. Vereine von einem Vereinsmitglied. Lahr. J. H. Geiger. 1858. 12. 31 S. Preis 6 Kr.

Ein kleines anſpruchloſes aber ſehr beachtenswerthes Schriftchen, deſſen erſte Auflage ſo ſchnell vergriffen war, daß bereits eine zweite nothwendig wurde. Es werden in derſelben mit großer Sachkenntniß auf eine ſehr klare Weiſe die Nachtheile des Mangels an Feldwegen und Güterzerſplitterung behandelt und zugleich wird eine Anweiſung zur Anlage neuer Feldwege, zur Eintheilung der Fluren ꝛc. gegeben. Recht große Verbreitung dieſer Schrift und Förderung der Sache würden von wahren Segen für jedes Land ſein.

E. D—o.

Hortus Lindenianus. Recueil Iconographique des plantes nouvelles introduites par l'établissement de **J. Linden**, directeur du jardin roy. de Zoologie et d'Horticulture, Bruxelles. 1. Liv. Avril 1859. Preis 4 Fr.

Im vorigen Hefte machten wir die geehrten Leſer auf das baldige Erſcheinen dieſes Werkes, von dem jährlich 1 oder 2 Hefte erſcheinen ſollen, aufmerkſam. Die erſte Lieferung liegt uns vor und enthält die Abbildungen und Beſchreibungen von 8 neuen Pflanzen, nämlich die der Begonia amabilis, argentea und Victoria, dann Arachnothrix rosea, Beloperone violacea, Centradenia grandifolia, Cuphea ocymoides und Lindenia rivalis, acht Pflanzen, die wir bereits im vorigen Hefte erwähnt haben. Von jeder der in dieſem Hefte abgebildeten Pflanze iſt der Charakter der Gattung, wie der Art in lateiniſcher Sprache angegeben, ebenſo die Familie zu der ſie gehört. Das Geſchichtliche und ſonſtige Intereſſante zu jeder Pflanze, wie die Kulturangabe iſt in franzöſiſcher Sprache angeführt. Die Abbildungen ſelbſt ſind ſehr getreu und ſchön ausgeführt, nur hätten wir es gern geſehen, wenn zugleich auch einige Analyſen beigegeben worden wären, das Werk würde dadurch noch einen bedeutend größeren Werth erhalten.

Von Herrn Linden's neueſtem Pflanzenverzeichniſſe (No. 14) ſind noch Exemplare bei der Redaction oder bei dem Verleger dieſer Ztg. zu erhalten. Die Erfahrenheit und der Unternehmungsgeiſt dieſes unermüdlichen Naturforſchers haben ihn längſt an die Spitze derjenigen Männer geſtellt, die unſeren Gärten ſo viele herrliche Pflanzen zugeführt haben und denen wir deshalb vielen Dank ſchuldig ſind. Der Linden'ſche Katalog rechtfertigt vollkommen den europäiſchen Ruf, den der Herausgeber ſich zu verſchaffen verſtanden hat. Außer den von uns bereits erwähnten Neuheiten, die in dieſem Jahre zum erſtenmale in den Handel kommen, enthält der Katalog noch 96 Pflanzenarten mit bunten Blättern, 159 mit ſchönen Blattformen, 620 Warmhauspflanzen, die ſich mehr oder weniger durch ſchöne Blumen empfehlen, 105 Arten

tropiſche Fruchtbäume. Von techniſchen, mediziniſchen oder ſonſt nützlichen Gewächſen 150 Arten, unter denen viele Seltenheiten, ferner gegen 40 Araliaceen, 50 Bromeliaceen, 350 Farrn und Lycopodiaceen, darunter viele Neuheiten und über 600 Orchideen. — Wie Herr Linden bemerkt, hat derſelbe ſeine Reiſenden aus Centralamerika zurückgezogen und ſie nach Cochinchina, Celebes und Mindanäo beordert, von woher alſo neue Schätze zu erwarten ſein dürften. E. D—o.

Feuilleton.

Verwüſtung durch Dünenſand. Wie mehrere Zeitungen berichten, ſind an einigen Punkten der pommerſchen Küſte, namentlich in der Gegend bei Leba und Schmolſin zwiſchen Jershöft und Stopmünde, an der Mündung der Rega ꝛc., durch den Dünenſand große Verwüſtungen angerichtet worden; derſelbe iſt zu 100 Fuß Höhe angehäuft und wird bei Stürmen, gleich dem Schnee in Wolken, die die Luft verdunkeln, landeinwärts getrieben, wo er Acker, Wieſen und Länder überſchüttet und in unfruchtbare Steppen verwandelt; auch ſoll das Anſchlagen des Flugſandes dem Wuchſe der Pflanzen, namentlich des Getreides und der Kiefern ſchädlich ſein. Dieſes Vorrücken der Wander-Dünen geht, namentlich an dem lebaer und ſchmolſiner Strande, ſo ſchnell voran, daß ein jährliches Vorſchreiten der Sandwüſten von durchſchnittlich einem Fuß, an einigen Punkten von 15 Fuß, und mehr angenommen werden kann. Daß trotzdem die Wander-Dünen keinen breiteren Gürtel haben, kann entweder in dem entſprechenden Nachrücken des Geſtades oder darin ſeinen Grund haben, daß das Vorſchreiten der Dünen erſt in neuerer Zeit begonnen hat. Wahrſcheinlich hat ein unvorſichtiges Zerſtören der Strandwaldungen zur Bildung der Verſandungen Veranlaſſung gegeben. Nach der Angabe des Strandvogts Woggon, welcher ſeit etwa 30 Jahren den ſchmolſiner Strand beaufſichtigt, haben zu Lebzeiten ſeines Vaters an Stelle der jetzigen Sandwüſten Eichen- und Buchenwälder geſtanden. Von den Dünen an der Rega-Mündung iſt die Urſache der Verſandungen durch den Oberförſter Roſenhain nachgewieſen worden. Die dortigen, jetzt durch Kultur von Strandhafer und Kiefern größtentheils feſtgelegten Wander-Dünen nehmen auf eine Länge von 2¾ Meilen eine Fläche von 8603 Morgen ein, die Dünenberge erreichen eine Höhe von 100 Fuß und ſind von regelmäßig verlaufenden, mehr oder weniger verſandeten Sümpfen und Sandflächen durchzogen. Der Dünengürtel, der jetzt an der breiteſten Stelle 525 Ruthen breit iſt, war bis zum 17. Jahrhundert noch mit den ſchönſten Eichen- und Erlenwaldungen bedeckt, welche hier und da Torfflächen und kleine Landſeen enthielten.

Erbſenlinſe. Die von Herrn Dr. Rauch in ſeinem Buche „Anbau-Verſuche mit neuen oder wenig bekannten Nutzgewächſen ꝛc.“ S. 40 erwähnte Erbſ-

linse, eine zwischen Erbse und Linse stehende Frucht, von der selbst Herr Lindley in Garden. Chronicle Notiz nahm und sich eine große Zukunft versprach, hat sich als Vicia sativa leucesperma herausgestellt.

Auction von Orchideen und Farrn in London. Am 12. April wurde durch den bekannten Herrn Stevens eine Sammlung herrlicher Orchideen und Farrn in London in Auction verkauft, meistens Dubletten einer bekannten Sammlung. Die hohen Preise, die für die meisten dieser Pflanzen bezahlt wurden, liefern einen Beweis, daß die Liebhaberei für diese Art Gewächse noch nicht im Verlöschen ist. So bezahlte man für ein Prachtexemplar von Aerides Schröderi die Summe von 31 £, ein anderes Exemplar derselben Art wurde mit 27 £, ein drittes mit 15 £ 10 s, bezahlt. A. maculosum majus erhielt 18 £; A. Lobbi 17 £ 10 s, A. Larpentae 9 £ 10 s; A. nobile 9 £ und so weiter. Ein schönes Exemplar der Vanda suavis var. wurde mit 13 £ 10 s, Vanda suavis aurea mit 7 £ 10 s, ein 4 Fuß hohes Exemplar der Vanda tricolor mit 5 £ 10 s., ein Cymbidium eburneum mit 14 £ bezahlt. Für Phalaenopsis amabilis zahlte man 12 £ 10 s.; für ein schönes Exemplar der reizenden Cattleya marginata £, Saccolabium praemorsum 8 £ 10 s. Die Farrn, bestehend aus Gleichenia, Todea, Gymnogramma, Cheilanthes, Diplazium, Marattia und Cyathea wurden von 1—3 £ pr. Exemplar bezahlt. Fremontia californica erlangte die enorme Summe von 27 £ 16 s., und wurde von E. G. Henderson erstanden. Die ganze Auction ergab eine Summe von über 500 £.

Personal-Notizen.

Die Reisenden **Carl Ferd. Appun & Horn** sind nach uns eingesandten Mittheilungen fortwährend mit dem Aufsuchen und Sammeln von Pflanzen, Samen und sonstigen Naturalien beschäftigt. Die Gegend, welche genannte Herren zuletzt durchforschten, war die bei Ciudad de Bolivar (Angostura) in Venezuela, dieselbe war jedoch wider Erwarten in botanischer Hinsicht sehr dürftig, dennoch wurden 4 neue Palmenarten dort gefunden, deren Samen im Juni reifen und dann sofort versandt werden sollen.

Herr Buchhändler Carl Friedr. Appun in Bunzlau in pr. Schlesien, zeigt an, daß er von seinem Sohne eine große Parthie kräftiger blühbarer Amaryllis Belladonna solandriflora erhalten habe, wie mehrere andere Naturalien und ethnographische Gegenstände, worauf derselbe Aufträge entgegennimmt. Specielle Verzeichnisse und Preise muß Herr Appun sich noch kurze Zeit vorbehalten.

Die oben genannten Reisenden stehen in Begriff eine größere botanische Excursion ins Innere zu verschiedenen Indianerstämmen, so wie zu den berühmten Wasserfällen des Caroni und nach britisch Guyana anzutreten, woselbst sie sich eine reiche Ausbeute seltener Sämereien, Pflanzen, besonders Orchideen ꝛc. versprechen und hofft Herr Appun in Bunzlau bereits im Juni in den Besitz dieser neuesten Sammlungen zu gelangen.

Herr **L. Schroeter**, dem die hamburger Gartenzeitung für mehrere schätzenswerthe Beiträge zu danken hat, wird in kurzer Zeit eine Handelsgärtnerei in Coswig (Anhalt) eröffnen. Herr Schroe-

ter war bekanntlich lange Zeit Obergärtner in Eckersdorf, welche Stelle er am 1. Septbr. v. J. freiwillig aufgab um sich zu etabliren, wobei derselbe das richtige Princip im Auge hat, nur gewisse Artikel zu ziehen, diesen aber seine ganze Sorgfalt und Aufmerksamkeit zuzuwenden und steht demnach zu erwarten, daß Herr Schroeter Tüchtiges leisten dürfte. Ananastreiberei, Anzucht von Camellien, Rhododendron, Azaleen und hochstämmigen Rosen sind diejenigen Artikel, denen Herr Schroeter anfänglich seine ganze Aufmerksamkeit widmen wird.

Herr **Dr. Ph. Fr. v. Siebold**, welcher früher sieben Jahre in Japan zugebrachte und dem wir schon die Einführung mehrerer japanischer Gewächse in unsere Gärten verdanken, hat der bot. Zeitung zufolge, einen ehrenvollen Auftrag an der Seite des holländischen Gesandten nach Japan erhalten (Herr v. Siebold lebte seit einigen Jahren in Bonn). Es steht demnach zu erwarten, daß er bei den günstiger sich gestaltenden Handels- und Verkehrsverhältnissen mit jenem Inselstaate, noch bedeutendere Pflanzenschätze erzielen werde.

Herr Hofgartendirector **Schnittspahn** zu Darmstadt hat von Sr. k. Hoheit dem Großherzoge v. Hessen das Ritterkreuz des Verdienst-Ordens Philipp's des Großmüthigen erhalten.

Im Verlage des Herren Louis Quien in Berlin ist das sehr gelungene Bildniß des 86jährigen, noch in aller Wirksamkeit stehenden Königl. Oberhofgärtners **J. A. F. Fintelmann** zu Charlottenburg erschienen. Dasselbe ist von Hrn. Prof. Krüger gemalt und vortrefflich lithographirt, welche Notiz gewiß manchem Verehrer dieses würdigen, hochgeachteten Mannes willkommen sein dürfte. Der Preis des Bildnisses ist 1 Sgr.

Der bekannte deutsche Reisende, **Adolf Schlagintweit** ist nicht mehr am Leben. Ueber sein trauriges Ende geben Depeschen, welche Lord Stanley der londoner geographischen Gesellschaft mitgetheilt hat, einige Auskunft. Aus dem obern Pendschab war er auf einem Wege, der viel westlicher als der von seinen Brüdern Hermann und Robert eingeschlagene liegt, nach Turkistan gegangen. Durch einen seiner Begleiter (Abdulah), der über Bockhara und Cabul nach Peschawur zurückgekehrt ist, und durch einen an Oberst Edwards gerichteten Brief eines andern seines Gefolges (Mahomed Emir) scheint es sich herauszustellen, daß Ad. Schlagintweit nach großen Mühseligkeiten die Stadt Jarkand erreicht und daselbst freudige Aufnahme gefunden hatte. Als er sich von dort in nordwestlicher Richtung nach Kokau auf den Weg machte, gerieth er mitten in einen Haufen fanatischer Muselmänner bei Kargasch (41° n. Br. 72° 50′ östl. L.) und auf Befehl des grausamen Synd Wullee Khan wurde er Angesichts dieser Stadt enthauptet. Da sämmtliche brittische Behörden Oberindiens sich für das Schicksal dieses unternehmenden Reisenden — wahrscheinlich des ersten Europäers, der seit Marco Polo diese entlegenen Gegenden besucht hat — sehr interessiren, darf man füglich hoffen, einige seiner Notizbücher unter den Eingeborenen ausfindig zu machen. (H. R.)

Correspondenz-Notizen.

Beiträge für die Hamburger Gartenzeitung werden auf Verlangen honorirt und können entweder dem Verleger, Hrn. R. Kittler, oder der Redaction eingesandt werden. Diejenigen der geehrten Mitarbeiter, welche Extraabdrücke ihrer Aufsätze zu haben wünschen, werden gebeten ihren Wunsch bei Einsendung des Manuscriptes uns anzuzeigen, da er später nicht berücksichtigt werden kann. Anonyme Einsendungen finden keine Aufnahme.

Die der Redaction versprochenen oder etwa zugedachten Berichte über Blumen- und Pflanzenausstellungen, bittet dieselbe rechtzeitig einsenden zu wollen.

Herrn O. T. Ihre schätzenswerthe Abhandlung kam zu spät, so daß sie nicht mehr mit dem vorigen Hefte veröffentlicht werden konnte. Alle nach der Mitte des laufenden Monats eingehenden längeren Original-Abhandlungen müssen für das dann zunächst erscheinende Heft der Gartenzeitung liegen bleiben. Kleinere Notizen finden dagegen sofortige Aufnahme.

Herren H. J.; H. J. C. N.; H. K.; A. B. Besten Dank, daß Sie meiner schriftlichen Aufforderung Folge geleistet haben. Leider sind Sie aber die Einzigen, welche mir die Notizen Ihrer Gärtnereien mittheilten und ist es nicht gut mög'ich nach diesen allein eine allgemeine Uebersicht der hiesigen Treibereien geben zu können, dennoch sollen die mir gewordenen Notizen nicht vergeblich niedergeschrieben sein und nächster Zeit benutzt werden.

Es sind an die Redaction zu wiederholten Malen Anfragen geschehen und zwar des Inhaltes „ob Herrn Alfred Topf, Director der Gärtner-Lehranstalt und Handelsgärtner in Erfurt, wegen grober Fahrlässigkeiten gegen viele Geschäftsfreunde in Betreff seines Banquerotts keine Strafe treffe?“ Wir theilen hier im Interesse der öffentlichen Meinung die Thatsache mit, daß Herr A. Topf nunmehr seine Strafe im Criminal-Gefängniß zu Erfurt abgebüßt hat.

Herrn C. Schickler's Sonnenuhr.

Herr Carl Schickler in Stuttgart hat eine „horizontale Sonnenuhr mit Kanone“ erfunden, die den allgemeinsten Beifall findet und als höchst interessante und nützliche Gartenverschönerung dient.

Diese Sonnenuhr ist mittelst einer Blei- oder Wasser-Waage horizontal auf einem Postament von beliebiger Höhe aufzustellen, und zwar so, daß die aufrechten Gestellflächen in die Mittagslinie oder den Meridian zu stehen kommen und die Kanone nach Norden sieht.

Die Eintheilung ist von je fünf zu fünf Minuten, so daß Raum genug vorhanden ist, um bei etwas geübtem Augenmaß jede einzelne Minute zu jeder Tageszeit genau absehen zu können. Diese direkt von der Sonnenuhr abgelesene Zeit ist nur die wahre Zeit; sie ist aber nicht das ganze Jahr hindurch die gleiche, sondern muß wie bei allen andern Sonnenuhren, in die mittlere (astronomische) Zeit umgewandelt werden. — Zu diesem Behuf wird die Zeitgleichungstafel beigegeben, welche für jeden Tag des Jahres die Zahl der Minuten angiebt, die zur Sonnenuhrzeit hinzugezählt (+) oder von derselben abgezogen (—) werden müssen, um die mittlere Zeit zu erhalten. Die Zeitgleichungstafeln für die kleinen Sonnenuhren können hiezu auch gebraucht werden.

Damit nun die Kanone zur mittleren Zeit durch das Brennglas gelöst werde, sind die beiden krummen Linien (Curven) für je ein halbes Jahr angebracht, in dessen Verlauf die Sonne entweder im Steigen oder im Sinken begriffen ist. Die Curven sind hierfür genau bezeichnet. Die eine von ihnen wird mit zerriebenem Schießpulver, das man teigartig anmäßt, eingerieben, und zwar je näher der kürzeste Tag ist, um so höher hinauf, und umgekehrt je näher der längste Tag ist, um so kürzer von unten herauf. So brennt die Kanone um so viele Minuten als der Unterschied zwischen der wahren und der mittleren Zeit gerade beträgt, bald vor, bald nach der wahren Zeit ab.

Nur muß man darauf Bedacht haben, daß die richtige Curve eingerieben wird, sonst geht die Kanone früher oder später, je nach der Jahreszeit los.

Derartige Sonnenuhren werden unter Leitung des Herrn C. Schickler in Stuttgart angefertigt und sind stets vorräthig bei demselben zu haben. Der Preis beträgt für

eine Sonnenuhr mit Kanone nach der Abbildung	22 fl.	— kr.	= 12 ℛ 19 sgr.
" " " " ohne Fig., einfacher	18 "	— "	= 10 " 10 "
kleine Sonnenuhr zur Regulirung	2 "	30 "	= 1 " 15 "

Neuestes Cactus-Verzeichniss pro 1859.

Den zahlreichen Freunden dieser in jeder Hinsicht prachtvollen Pflanzen-Familie empfehle ich dieses Verzeichniss der in meiner Sammlung wirklich vorhandenen Arten und Unterarten zur geneigten Durchsicht. Durch Ankauf einiger grossen Sammlungen im vorigen Herbst habe ich die meinige sowohl durch Prachtexemplare als auch hinsichtlich der Artenzahl bedeutend vergrössert, sowie es mir bei dem jetzigen guten Stand meiner Pflanzen gelungen ist, manche seltene Art in Vermehrung zu bringen. Die Preise habe ich möglichst billig gestellt und gebe dafür nur gesunde, gut bewurzelte Exemplare. Das Verzeichniss, welches ausserdem noch eine Anzahl schöner succulenter Pflanzen enthält, steht auf frankirte Anforderung umgehend zu Diensten.

Erfurt, im Januar 1859.

***Friedrich Adolph Haage* jun.**

Die
Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Academie
betreffend.

Bekanntlich versammelten sich die dem Präsidium adjungirten Mitglieder der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Academie der Naturforscher auf Convocation des Präsidenten — S. R. J. Nobilis, Archiatre et Comes Palatinus — Herrn Geheimen Hofrath Dr. von Kieser, am 2. Mai d. J. in Jena zu Berathungen über die Angelegenheiten der Academie.

Die Resultate dieser Berathungen, soweit sie sich schon jetzt zur Publication eignen, werden in der Buchhandlung des Herrn Frommann in Jena in einer besonderen Schrift, welche unter dem Titel: „Amtliche Mittheilungen der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Academie der Naturforscher“ in einzelnen Bogen in Quarto (wovon 15 Nummern den ersten Band bilden sollen) bekannt gemacht werden.

Wenn der Zweck dieser Zeilen auch kein anderer ist, als auf diese „amtlichen Mittheilungen“ aufmerksam zu machen, so dürfte es doch gestattet sein, bei dieser Veranlassung dem Herrn Präsidenten von Kieser nochmals den Dank öffentlich zu wiederholen, der ihm beim Schluß der Conferenzen von allen Anwesenden mit warmer herzlicher Anerkennung dargebracht ward, für die umsichtige tactvolle und in jeder Beziehung ausgezeichnete Leitung der Berathungen, welche derselbe ohne zu ermüden mit jugendlicher Frische und Lebendigkeit, in 4—6 Stunden täglich, bei nicht selten divergirenden Ansichten der Einzelnen, doch stets und zur allgemeinen Befriedigung, zu einem gedeihlichen Resultate zu bringen verstand, so wie für die echte Humanität, womit selbst solche Gegenstände der Berathung und Beschlußfassung unterbreitet wurden, worüber dem Herrn Präsidenten die alleinige Bestimmung und Entscheidung zusteht.

Hamburg, den 7. Mai 1859. L.

Pflanzen für das Kalthaus.

Die meiſten der Gewächſe, die in den Kalthäuſern, d. h. in einer Temperatur von 6—10° R. im Winter kultivirt werden und die man gewöhnlich als „capiſche und neuholländiſche“ Pflanzen bezeichnet, empfehlen ſich wenig durch imponirende Blattformen. Dagegen läßt ſich nicht leugnen, daß dieſelben zur Blüthezeit einen ſehr erfreulichen und lieblichen Anblick gewähren, indem die meiſten Arten, zu den Familien der Leguminoſen, Papilionaceen, Diosmeen, Rutaceen und anderen Familien gehörend, zierliche und ſchön gefärbte Blumen beſitzen. Iſt die Blüthezeit dieſer Gewächſe vorüber, ſo machen dieſelben keinen beſonderen Eindruck, denn die Blätter ſind mehr oder weniger nur klein, oft von matter, grau-grüner Färbung und iſt dies gewiß auch ein Hauptgrund mit, daß dieſe ſogenannten Kalthauspflanzen ſeit den letzten 10 bis 15 Jahren im Verhältniß zu den Warmhauspflanzen im Allgemeinen an Werth verloren haben und viel weniger kultivirt werden, als dies in früheren Jahren geſchehen iſt. Ganz beſonders ſind ſie vernachläſſigt worden, ſeitdem ſo viele Pflanzenarten mit ſo herrlichen, auffälligen Blattformen eingeführt worden ſind, die jedem auch noch ſo kleinen Gewächshauſe während des ganzen Jahres zur Zierde gereichen. Es iſt daher auch nicht zu verwundern, daß man jetzt unter zehn kleinen Gewächshäuſern gewiß ſieben findet, die mit Warmhauspflanzen angefüllt ſind, während es früher gerade umgekehrt der Fall war; ja ſelbſt in den Wohnzimmern werden jetzt mehr Warmhauspflanzen, als Palmen, Maranten, Cordylinen, Begonien, Farrn ꝛc. kultivirt, als früher.

Da nun die meiſten ſogenannten Blattpflanzen aus den Tropenländern zu uns gekommen ſind, ſo ſind die Pflanzenfreunde auch der Meinung, daß dieſe nur in einem Warmhauſe kultivirt werden können, und da ein Warmhaus in der Regel koſtſpieliger zu unterhalten iſt als ein Kalthaus, ſo verzichten viele Pflanzenfreunde auf die Kultur dieſer Gewächſe.

Es giebt jedoch unter dieſen ſogenannten tropiſchen Blattpflanzen eine Menge von Arten, die ſich mit großer Leichtigkeit während des Winters in einem Kalthauſe, in einer Temperatur von 6—10° R. kultiviren laſſen und dieſen Häuſern, wenn die neuholländiſchen und capiſchen Pflanzenarten noch nicht in Blüthe ſind, ein mehr tropiſches Anſehen geben würden. Ein geſchmackvolles und kunſtgerechtes Arrangement dieſer verſchiedenen Gewächſe in einem Hauſe würde natürlich mit eine Hauptbedingung ſein.

Um den Pflanzenfreunden die Auswahl ſolcher Blattpflanzen zu erleichtern, wollen wir hier nachſtehend einige Arten namhaft machen, die ſich entweder mit anderen Kalthauspflanzen vereint oder für ſich in einer niedrigeren Temperatur, als man ſonſt gewöhnlich in den Warmhäuſern antrifft, ohne Nachtheil kultiviren laſſen:

Aralia papyrifera Hook. wird meiſtens als Warmhauspflanze gefunden, ſie hält jedoch ſehr gut im Kalthauſe aus, ſelbſt in einer Temperatur von nur 5—7° R.

Stadtmannia australis R. Br. (Cupania Cunninghami), St. Fraseri, Jonghii und pubescens ſind herrliche Pflanzen für's Kalthaus.

Arundinaria glaucescens Beauv. gedeiht ſehr gut im Kalthauſe, ebenſo die ſchönen

Aspidistra punctata Lindl. und Plectogyne variegata Otto.

Charlwoodia rubra Pl., Cordyline Rumphii Eck. & Zeyh., Draecaenopsis australis Pl. und indivisa Pl. (Dianella australis) ſind Pflanzen, die in keinem Kalthauſe fehlen ſollten.

Strelitzia Reginae Ait. ſahen wir häufig kalt kultivirt im üppigſten Kulturzuſtande.

Unter den Farrn giebt es bekanntlich eine Menge Arten, die ſehr gut im Kalthauſe gedeihen, ſelbſt unter den Baumfarrn.

Die Encephalartus-Arten, ſämmtlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung ſtammend, ſind durchaus nicht difficil in einer niedrigen Temperatur und können ganz kalt kultivirt werden.

Aber auch unter den ächten Palmen ſind mehrere, die in einer Temperatur von 6—10° R. ganz vortrefflich gedeihen und den Häuſern mit ihren leichten Wedeln eine große Zierde ſind. Zu dieſem Zweck können wir empfehlen:

Chamaerops excelsa Thbg. von China und Japan.
— humilis L.
— Hystrix Fras.
— Martiana Wah.

Ceroxylon Andicola H. & B., die Wachspalme der Anden, aus Quito.

Phoenix dactylifera L.
— reclinata Jacq.

Rhapis flabelliformis Ait.

Sabal Adansoni Guerns. aus Carolina.
— mexicana Mart.
— Palmetto Lodd.
— serrulata R. & Sch.

Seaforthia elegans R. Br. aus Neuholland.

Trithinax? aculeata Liebm.

Unter den Chamaedorea-Arten giebt es mehrere, die ſich vorzüglich gut kalt kultiviren laſſen und den Häuſern ganz beſonders einen großen Reiz verleihen in Folge ihrer meiſt langen, gefällig geformten Wedel, ſo z. B.:

Ch. atrovirens Mart.
— desmoncoides H. Wendl.
— elegans Mart.
— lepidota H. Wendl.
— Karwinskiana H. Wendl. (elatior h. Berol.)
— pygmaea H. Wendl.
— resinifera H. Wendl.
— Schiedeana Mart. und mehrere andere.

Dieſe kleine Liſte ließe ſich noch bedeutend erweitern, es ſcheint uns dieſe Anzahl von Arten jedoch ſchon zu genügen, um den Pflanzenfreunden zu zeigen, wie groß die Zahl derjenigen Pflanzenarten iſt, welche

man in einer hohen Temperatur zu kultiviren pflegt, nur aus dem Grunde, weil ſie aus den Tropenländern ſtammen.

Bambusa.

Die Gattung Bambusa iſt ſeit einer Reihe von Jahren nur durch die Art arundinacea W., 1720 in England eingeführt, in den Gärten vertreten geweſen. B. verticillata W., 1802 nach Loudon in England eingeführt, ſcheint wieder aus den Gärten verſchwunden zu ſein. Dagegen ſind im Laufe der letzten Jahre einige andere Arten hinzugekommen, die ſich bereits in mehreren Sammlungen vorfinden, von denen es jedoch noch ſehr fraglich iſt, ob es wirklich richtig benannte Arten ſind. Der hieſige bot. Garten beſitzt außer der B. arundinacea noch Bambusa aurea Hort., B. Metake Sieb. und B. nigra Loddig. Durch einen gefälligen Habitus und durch das ungemein ſchnelle Wachsthum empfehlen ſich ſämmtliche Arten und eignen ſich ganz vorzüglich zu Decorationen großer Warmhäuſer.

Ueber das ungemein ſchnelle Wachſen der einzelnen Triebe des Bambusrohrs gaben wir im V. Jahrg. S. 570 der Hamburg. Gartenztg. ſehr intereſſante Notizen, die Dr. Wallich an Bambusa-Pflanzen im bot. Garten zu Calcutta aufgezeichnet hatte. Nach dieſen Mittheilungen erreichte ein Schaft der Bambusa gigantea Wall. in 31 Tagen eine Länge von 25′ 9″. Triebe der B. Tulda Roxb. erheben ſich ungetheilt in ihrer vollen Länge von 20—70′ und von 6—12″ im Umfang in einem Zeitraum von 30 Tagen. — Ein Schaft der B. arundinacea im Garten zu Shatsworth erreichte eine Höhe von 42′, dieſer Schoß zeigte ſich am 19. Auguſt 1846, am 1. September war er bereits 8′ hoch, bis zum 7. September wuchs er täglich 1′ 10″, bis zum 30. Septbr. täglich 1′, ſo daß er an dieſem Tage eine Höhe von 42′ hatte. (Allgem. Gartztg. 18, S. 112.)

Im vergangenen Jahre wurden von Herrn M'Nab im botaniſchen Garten zu Edinburgh Meſſungen über das ſchnelle Wachſen des Bambusrohres an einer im großen Palmenhauſe dieſes Gartens befindlichen Pflanze vorgenommen. Die Meſſungen fanden jeden dritten Tag ſtatt, bis der Schoß der Pflanze eine Höhe von 15 Fuß erreicht hatte. Die mittlere Temperatur im Palmenhauſe variirte zwiſchen 12 und 16° R.

Der beobachtete Trieb wuchs:

Datum.	Mittlere Temper. im Freien.	Wuchs während 3 Tagen.
vom 3.— 6. Juli	bei 10° R.	1½ Zoll.
6.— 9. „	6,4 „	2½ „
9.—12. „	5 „	3¾ „
12.—15. „	7,2 „	7 „

vom 15.—18.	Juli	bei 8° R.	9½ Zoll.
18.—21.	„	5,8 „	10¾ „
21.—24.	„	5 „	13¾ „
24.—27.	„	8,8 „	17 „
27.—30.	„	10 „	18½ „
30. — 2.	August	9 „	19¾ „
2.— 5.	„	7 „	17½ „
5.— 8.	„	7 „	18½ „
8.—11.	„	5 „	19½ „
11.—14.	„	5,8 „	20½ „

Vom 14. August bis zum 24. September erreichte der Schoß eine Länge von 25 Fuß, durchschnittlich also 2 Fuß in drei Tagen. Am 24. September war die ganze Länge 40 Fuß, die derselbe in Zeit von 81 Tagen gewachsen war. Die Pflanze wurde im Frühjahr 1858 in einen Kübel gepflanzt mit einer aus torfigem Lehm bestehenden Erdmischung. Ueber die Scherbenunterlage im Kübel zum freien Abzug des Wassers war eine 4 Zoll hohe Lage zerstoßener Knochen gelegt.

Herr Dr. Hunter berichtete in der Versammlung der botanischen Gesellschaft in Edinburgh am 13. Januar (Gard. Chron. No. 17), daß die verschiedenen Bambusrohr-Arten erstaunlich in Größe variiren, je nachdem der Boden, auf dem sie stehen, ist, ob mager oder fett, ob trocken oder feucht. Auf trocknen hügeligen Stellen erreicht das Bambusrohr nur eine Höhe von 8—10 Fuß, während dieselbe Art auf feuchten sumpfigen Stellen, namentlich an den Ufern von Flüssen, eine Höhe von 90—100 Fuß erreicht. Es ist bekannt, daß das Rohr oft 18 Zoll in Zeit von 24 Stunden wächst. Die größten und höchsten Bambusrohrstauden werden wohl in Burmah gesehen, woselbst die einzelnen Schöße einen Durchmesser von 10 Zoll haben, und die einzelnen Gelenke 20—24 Zoll von einander entfernt sind. Die Pflanze wird häufig angebaut, sie bildet prachtvolle Bogengänge und wird sehr oft zu Alleen benutzt.*) Auch zu Befriedigungen läßt sich das Bambusrohr verwenden, man biegt die Schöße nieder und verwebt und verflechtet sie unter einander. Es giebt in den Tropen kaum eine andere Pflanze, die so vielfältig benutzt wird als das Bambusrohr. Die jungen zarten Blätter werden vom Vieh gefressen. Ein Decoct aus den Samen dient als Mittel gegen Fieber beim Vieh. Die jungen Schöße der weiblichen oder falschen Pflanze werden zur Anfertigung von Bogen benutzt, die der männlichen oder soliden Pflanze werden in Massen in Europa importirt, wo sie zu Stöcken, Angelruthen ꝛc. verwendet werden. Die scharf gespitzten Seitentriebe dienen im jungen Zustande den Eingeborenen als Nadeln. Die starken Stämme dienen als Balken, Ständer, Dielen ꝛc. ꝛc., viele Häuser sind nur aus Theilen der Bambusstaude gebaut. Papier und Zeug wird aus den Fasern der Pflanze bereitet und die ganz jungen Triebe zu „Pickles“ benutzt, machen eine Hauptingredienz des berühmten Conservs „Chow-Chow“ aus.

*) Eine Bambusrohr-Allee von dem Wohnhause eines Pflanzers nach dem nahe gelegenen Flusse auf der Insel Cuba gewährt einen prächtigen Anblick. Die einzelnen Stauden zu beiden Seiten des Weges hatten wohl 14—20 Fuß im Durchmesser und die Höhe der Schöße betrug 40—50 Fuß, gefällig nach allen Seiten herabhängend. E. O—o.

Körbe und Kiſtchen aller Art aus Bambus ſind allgemein bekannt, wie ſich dann noch eine ſehr große Anzahl von Gegenſtänden anführen ließe, zu deren Herſtellung das Bambusrohr das Material geliefert hat.

Bäume und Sträucher,

die in den Gärten in und bei St. Petersburg hart ſind und zur Anpflanzung verwendet werden.

Wir verdanken Herrn Dr. E. Regel die gütige Mittheilung der nachfolgenden Aufzählung der in den Gärten in und bei Petersburg im Freien aushaltenden Bäume- und Sträucherarten, aus der man erſehen wird, daß manche Arten daſelbſt im Freien aushalten, von denen man es nicht erwarten ſollte. Nach dieſem, erſt im vorigen Jahre angefertigten Verzeichniſſe zu urtheilen, ſind die Petersburger Gärten keineswegs ſo arm an ſchönen Gehölzarten, als vielleicht mancher der geehrten Leſer geglaubt haben mochte.

So ſind nach der Mittheilung des Herrn Dr. Regel in Petersburg hart:

Acer campestre L., dasycarpum Ehrh. (A. eriocarpum Mx.), pensylvanicum L., platanoides L. und pl. var. laciniatum, Pseudoplatanus L., rubrum Ehrh., spicatum Lam., tataricum L.

Aesculus Hippocastanum L. und flava Ait., dieſe wie mehrere der nachbenannten unter Bedeckung oder an ſehr geſchützten Lagen.

Alnaster fruticosus Ledb. und A. viridis DC.

Alnus glutinosa W. und v. quercifolia, incana W. nebſt den Varietäten sublaciniata und laciniata, und A. pubescens.

Amelanchier Botryapium DC. und vulgaris Moench.

Ampelopsis hederacea DC.

Amygdalus nana L.

Andromeda calyculata und polifolia L.

Arctostaphylos uvaursi Spr.

Aristolochia Sipho Herit.

Atragene alpina var. sibirica.

Atraphaxis lanceolata Meisn.

Azalea nudiflora L. und pontica L.

Berberis sibirica Pall. und vulgaris L.

Betula alba L. mit ihren Varietäten vulgaris, carpathica, dalecarlica (asplenifolia Hort.), papyrifera Spach (B. papyracea Ait., labifolia Hort.), populifolia Spach (Bet. populifolia Ait.), pubescens Spach. — B. davurica Pall., Ermanni Chms., excelsa Spach, fruticosa Pall., Gmelini Rgl. und var. incisa Rgl. (B. Socolowii h. Petrop.), humilis Schrnk. und var. latifolia Rgl., lenta L., nana L. und nigra.

Calluna vulgaris Salisb.

Calyptrostigma Middendorfiana Trautv.

Caragana arborescens Lam. (frutescens DC., jubata Poir.), microphylla DC., pygmaea DC. und spinosa DC.

Chamaecyparis nutkaensis Spach (Thuiopsis borealis).

Clematis Viticella L., orientalis L. und Vit. alba L.

Cerasus alba L. und var. sibirica, C. alternifolia L., sericea Herit., sanguinea L. und stricta Lam.

Corylus Avellana L.

Cotoneaster multiflora Bunge., Nummularia F. & M., tomentosa Lindl., vulgaris Lindl. und vulg. var. laxiflora Ledb. (C. laxiflora Jacq.), uniflora Rgl.

Crataegus coccinea L. nebst var. mollis Walp. (C. subvillosa Schrad.), C. Crus-galli L., monogyna Jacq., nigra W. K., Oxyacantha L. nebst den gefüllt blühenden Varietäten, sanguinea Pall. und var. xanthocarpa Rgl.

Cytisus falcatus W. K., austriacus L., capitatus Jacq., elongata W. & K., hirsutus L., multiflorus Lindl., purpureus Scop., sessilifolius L., ratisbonensis Schaef.

Daphne altaica Pall., Cneorum L. und Mezereum L.

Elaeagnus argentea Pursh.

Evonymus europaeus L., latifolius Mill., nanus M. B. und verrucosus Scop.

Fraxinus excelsior L. und var. pendula, lentiscifolia Desf. und rotundifolia Ait.

Genista tinctoria L.

Hippophaë rhamnoides L.

Juglans cinerea L. und nigra L.

Juniperus communis L., nana W., Sabina L.

Larix dahurica Lawa., europaea DC., pendula Salisb., sibirica Nois.

Ledum palustre L.

Lonicera alpigena L., altaica Pall., Bungeana Ledeb., Caprifolium L., coerulea L., chrysantha Turcz., iberica M. B., microphylla W., nigra L., Periclymenum L., sempervirens L., tatarica L. nebst mehreren Varietäten und L. Xylosteum L.

Mahonia Aquifolium Nutt. und repens G. Don.

Menispermum dahuricum DC.

Myrica Gale L.

Paeonia arborea Don.

Periploca graeca.

Philadelphus coronarius L. und var. nanus Mill., Ph. Gordonianus Lindl., latifolius Schrad. und speciosus Schrad.

Pinus Abies L., ajanensis Fisch., alba Ait., balsamea L., Cembra L., Laricio Poir. und var. austriaca Endl., P. nigra Ait., Mughus Scop., obovata Ledb., orientalis L., Picea L., Pichta Fisch., Pumilio Hänk., rubra Lamb., Strobus L., sylvestris L.

Populus alba L. und var. hybrida M. B. und nivea Ait., P. angulata Ait., balsamifera L. canadensis Mx., candicans Ait., canescens DC., dilatata Ait., Fischeri Rgl. & Rach, graeca Ait., laurifolia

Ledb., nigra L. und var. pendula (P. tremula pendula Hort.), suaveolens Fisch. var. pyramidalis und tremula L.

Potentilla dahurica Nutt. und fruticosa L. (parviflora Hort.), fruth, grandiflora Lehm. (fruticosa Hort.), frut. floribunda Lehm. (floribunda Hort.), frut. tenuifolia Lehm. (glabra Hort.).

Prunus Avium L. und fl. pl., P. Cerasus L. und fl. pl., P. Chamaecerasus L., microcarpa C. A. M., Padus L., virginiana Mx.

Pyrus arbutifolia L., baccata L. nebſt den Varietäten macrocarpa Rgl., praecox Rgl. und oblonga Rgl., P. cerasifera Tausch und var. Callvillea Rgl., macrocarpa Rgl. und xanthocarpa Rgl., P. floribunda Lindl., Malus L., prunifolia W. nebſt var. intermedia Rgl. und oviformis Rgl.

Quercus coccinea Wngnhm., iberica Stev., Robur W., pedunculata W., rubra L.

Rhamnus cathartica L., dahurica Pall. und Frangula L.

Von Ribes halten eine Menge Arten aus, nämlich: R. aciculare Sm., affine Dougl., alpinum L. nebſt var. bacciferum DC., bacc. pilosum Rgl. und alp. pilosum Rgl., R. aureum Pursh, cuneatum Kar. & Kir., Dikuscha Fisch., diacantha Pall., divaricatum Dougl., floridum L., Grossularia L., heterotrichum C. A. M., lacustre Poir., nigrum L., orientale Poir., petraeum Wulf, procumbens Pall., rubrum L., saxatile Pall., triflorum W. und triste Pall.

Rhododendron chrysanthum L., dahuricum L., ferrugineum L. und hirsutum L.

Rosa acicularis Lindl., alpina L., centifolia L., cinnamonea L., Gmelini Bge., pimpinellifolia L. und var. fl. pl.

Rubus odoratus L.

Salix acutifolia W., alba L., arctica Pall., Caprea L., daphnoides Vill., Lapponum L., myrsinites L., pentandra L., sibirica Pall. (Napoleonis Hort.), triandra L. und viminalis L.

Sambucus canadensis L., racemosa L., nigra L. und pubens Mx.

Solanum Dulcamara L. und persicum W., Sorbus americana W., Aria Crtz., Aucuparia L. und var. pendula, hybrida L., domestica L. und spuria Pers.

Spiraea iſt ſehr zahlreich vertreten, ſo durch Sp. alpina Pall., amurensis Max., bella Sims, (hält hier nur unter Bedeckung aus), callosa Thbg., cana W. K., canescens Don, crenata L., carpinifolia W., chamaedrifolia L. und var. angustifolia Rgl. und ulmifolia Kgl., confusa Rgl. & Kcke., Douglasii Hook., expansa Wall. und β ovata b. Turic., hypericifolia L., laevigata L., lanceolata Boh., mollis Koch & Bché., Pallasii Rgl., obovata W. K., opulifolia L. und var. tomentella Rgl., salicifolia L. und var. Billardieri Rgl., sorbifolia L., tomentella L. und triloba L.

Symphorea racemosa Mx.

Syringa chinensis W., Josikaea Jacq. fil., persica L. und vulgaris nebſt Varietäten.

Tamarix gallica L.

Tilia glabra Vent. (americana L.) und var. pendula, argentea DC., grandifolia Ehrh. und var. laciniata, parvifolia Ehrh. und var. asplenifolia.

Thuia occidentalis L.

Ulmus campestris L., crispa W. und effusa W.

Vaccinium Myrtillus L. und Oxycoccos L., uliginosum L. und Vitis Idaea L.

Viburnum Lantana L., Lentago L., Opulus L. mit var. roseum Roem., Oxycoccos Pursh. und pennifolium L.

Bemerkungen über ſchön oder ſelten blühende Pflanzen im botaniſchen Garten zu Hamburg.

Uroskinneria spectabilis Lindl. Von dieſer hübſchen Pflanze gaben wir bereits im 13. Jahrg. S. 572 der Hamburg. Gartenztg. eine kurze Notiz nach der Abbildung dieſer Pflanze in dem Bot. Mag. tab. 5009. Im Januar d. J. hatten wir das Glück die Pflanze ſelbſt hier in Blüthe zu ſehen und können dieſelbe mit vollem Recht allen Blumenfreunden, die im Beſitze eines Warmhauſes ſind, empfehlen.

Die Einführung dieſer, zu der natürlichen Familie der Scrophularineae gehörenden Pflanze verdanken wir Herrn G. U. Skinner, durch deſſen eifrige Forſchungen im weſtlichen Mexico und Guatemala unſeren Gärten ſchon ſo viele neue und ſeltene Pflanzen zugeführt worden ſind. Herr Profeſſor Lindley glaubte keine Pflanze würde ſich beſſer als dieſe eignen den Namen ihres Entdeckers zu führen, denn ſie iſt nicht nur eine Seltenheit, ſondern auch eine Zierde unſerer Gewächshäuſer. Da es jedoch bereits eine Skinneria benannte Pflanze giebt, ſo hat Herr Lindley aus den beiden Namen Uro Skinner den Gattungsnamen Uroskinneria gebildet, ein Name, der ſo leicht nicht mit dem eines anderen Skinner verwechſelt werden dürfte und ſomit den Namen des Entdeckers der botaniſchen Nomenclatur ſichert.

Die Uroskinneria iſt eine weichholzige, krautige Pflanze, im Habitus gewiſſen Gesnerien nicht unähnlich, alle Theile dicht beſetzt mit feinen Härchen. Die Blätter ſind länglich, gezähnt, geſtielt, 2—4 Zoll lang. Die Blüthen erſcheinen in ſitzenden, endſtändigen, gedrängten, 3 Zoll langen Riſpen. Die Blumen, jede von einer fadenförmigen, haarigen Bractee unterſtützt, ſind blaßviolett, 1—1½ Zoll lang, trichterförmig, mit einem fünfgelappten, zweilippigen Saum. Das Innere der Blume iſt mehr weißlich. — Blüthezeit unbeſtimmt, denn während dieſe Pflanze zum erſten Male in England im Juli blühte, zeigte ſie ihre erſten Blumen hier im Januar und dann nochmals im April. —

Wie viele ähnliche krautartige Pflanzen muß auch dieſe während der trüben Winterzeit vor Feuchtigkeit geſchützt werden, indem bei zu großer Feuchtigkeit die Blätter und jungen Triebe ſehr leicht abſtocken. Eine nahrhafte Erde aus gleichen Theilen Laub- und Dungerde beſte-

hend, ſagt der Pflanze am beſten zu, und läßt ſie ſich auch leicht durch Stecklinge vermehren.

Stackhousia monogyna Labill. Eine niedliche halbkrautige Pflanze aus Auſtralien, von der der hieſige botaniſche Garten im vergangenen Jahre Samen von Herrn Dr. Müller in Melbourne erhielt. Die aus dieſen Samen erzogenen Pflanzen blühten hier zum erſten Male im April. — Nach Angabe des Bot. Reg. V. XXII tab. 1917 ſoll dieſe Art in Van Diemensland heimiſch ſein, von wo ſie zuerſt durch Herrn James Backhouſe im Jahre 1835 in England eingeführt und dem zu Ehren die Gattung auch benannt worden iſt.

Dieſe Pflanze bildet den Typus der ſehr kleinen natürlichen Familie Stackhousiaceae, von der jetzt 14 Arten bekannt ſind. Vergleiche Linnaea XXVI, pag. 1, woſelbſt dieſe intereſſante Familie von Herrn Dr. Schuchardt monographiſch bearbeitet iſt. Sämmtliche Arten ſind in Neuholland oder auf Van Diemensland heimiſch und iſt unſere Art von mehreren Botanikern ſowohl auf Van Diemensland als in Auſtralien gefunden und geſammelt worden.

Die Pflanze ſcheint mehr ſtaudig als holzig zu werden und dürfte dem Anſchein nach ſelbſt nur zweijährig ſein oder nach dem Blühen eingehen, doch läßt ſie ſich leicht durch Stecklinge vermehren und erhalten. Der beblätterte, wenig veräſtelte und etwas niederliegende Stamm erreicht eine Höhe von 4 - 6 Zoll. Die Blätter ſind linien-lanzettförmig, unten zugeſpitzt und trägt eine dichte Blüthenriſpe, die vor dem Aufblühen an der Spitze roth gefärbt iſt, während die Blumen rahmweiß ſind.

Tulipa cornuta Red. Eine wegen der langen, ſchmalen Blüthenhüllenblätter ganz eigenthümliche Blüthe. Nach Redouté Liliacées t. 445 ſtammt dieſe Art aus Perſien, von wo ſie im Jahre 1811 direkt in die Pariſer Gärten eingeführt ſein ſoll. Die im hieſigen Garten blühende Pflanze iſt die Varietät α petalis longioribus, angustioribus, quid quam undulatis laete rubris, basi flavis. Die Blüthenhüllenblätter ſind nach unten zu kaum $^1/_4$ Zoll breit und haben eine Länge von faſt 5 Zoll, ganz ſpitz auslaufend. Die Farbenzeichnung der Blume ſcheint auch bei dieſer Art zu variiren, im Bot. Reg. Vol. II, tab. 127 ſind drei Varietäten abgebildet, eine roſafarbene, eine gelbe mit wenig rother Zeichnung und eine weiß und roth gefleckte, bei allen dreien ſind die Blüthenhüllenblätter jedoch viel breiter angegeben als ſie es an unſerer Pflanze ſind. — Nach Kunth Enum. Plant. 4, p. 221 iſt es die T. turcica Roth, Syn. T. sylvestris β Willd., T. acuminata Vahl. in Hornm. Hort. Hafn. t. 328, T. pumila Moench mit den Varietäten α, β und γ.

E. D—o.

Die Edeltanne von Pawlowsk.

Die Edeltannen im Parke zu Pawlowsk sind eine lokale, noch wenig bekannte Merkwürdigkeit, welche verdient, schriftlich aufgezeichnet und einem weiteren Kreise übergeben zu werden. In No. 401 des „Bull. de la Classe Physico-mathématique de l'académie de St. Petersbourg“ befindet sich von Herrn F. J. Ruprecht eine genaue Beschreibung dieser interessanten Bäume, die wir im Auszuge unsern Lesern hier mittheilen.

„Einzelne merkwürdige Bäume“ schreibt Herr Ruprecht „haben in demselben Grade, wie Experimente, dazu beigetragen, die Gesetze des Wachsthums aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten und irrige Ansichten zu beseitigen oder schwankende zu befestigen.“

„Ich erinnere an die berühmt gewordene Linde von Fontainebleau, welche 44 Jahre ihre vollkommene Entrindung überlebte und zuletzt durch den Ansatz neuer Holzschichten über und unter der Verletzung eine gar abentheuerliche Gestalt erhielt. Herr Kreeul hat eine Abbildung dieses Baumes in der Ann. de sc. natur. 1855 geliefert und Näheres darüber mitgetheilt. Ist durch diesen Fall nicht das Aufsteigen des rohen Saftes im alten Holze bewiesen?

Als ich zufällig erst im Jahre 1857 den Baum zu Pawlowsk bemerkte, welcher einen andern lebenden von seiner Wurzel getrennten hoch emporhielt, unterließ ich nicht, sogleich unsern vor Kurzem leider verstorbenen verdienstvollen Botaniker Weinmann, welchem bereits vor 41 Jahren die Aufsicht über die Gärten und den Park zu Pawlowsk anvertraut wurde, darüber zu befragen. Weinmann erklärte, daß er ebenfalls erst kürzlich zum ersten Mal diesen Fall gesehen habe und nichts Näheres darüber mitzutheilen im Stande sei.

Besser ausgerüstet zu einer genaueren Untersuchung im August 1858, brachte ich bald in Erfahrung, daß diese merkwürdigen Zwillingsbäume mehreren Personen in Pawlowsk und besonders dem Dienstpersonal des Gartens und Parkes lange bekannt waren, ja man nannte mir die Person, welche das jetzt fehlende Stück ausgesägt hatte, daß dies vor mehr als 15 Jahren geschehen sei, wurde von mehreren Seiten her bezeugt.

Alle diese unbestimmten Angaben und Vermuthungen über die Zeit der ausgeführten Resection sind jetzt überflüssig geworden. Es ist mir jetzt bekannt, daß auf Verlangen S. K. H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch, eine Sammlung aller Holzarten des Parkes von Pawlowsk durch Weinmann für die hiesige K. Akademie der Wissenschaften zusammengestellt und im Jahre 1834 abgeliefert worden ist. Ein zu diesem Baume gehöriges Stück befindet sich unter dieser Sammlung im bot. Museum der Akademie zu Petersburg. Man muß annehmen, daß Weinmann zufällig bei der Resection dieses Baumes nicht gegenwärtig war und aus Schonung der überflüssige Stamm gewählt wurde. Auf diese Weise war ohne eine besondere Absicht ein interessantes Experiment ausgeführt worden.

Das im Jahre 1834 überschickte Stück war von Weinmann

als Pinus balsamea L. bezeichnet. Nach Loudon wird diese Art selbst in ihrem Vaterlande Nordamerika selten über 20—30 Fuß hoch und nur ebenso viele Jahre alt; der Durchmesser des Stammes in einer Höhe von 6 Fuß beträgt 7—8 Zoll, mehr über dem Boden 1 Fuß. Wenn wir auch, nach andern Angaben, die Höhe einiger gepflanzten Bäume bis auf 40 und selbst 50 Fuß annehmen, müssen wir doch bemerken, daß diese Dimensionen nicht gut auf unsern Baum passen, welcher an 10 Faden Höhe und bei 4½ Fuß Höhe über dem Boden 4 Fuß 2 Zoll Umfang, also im Durchmesser beinahe 17 Zoll hat; in seiner Nähe stehen aber noch andere bedeutend dickere und wie wir später sehen werden, hat ein dünner unter beengenden Verhältnissen aufgewachsene Baum bereits ein Alter von 73 Jahren. Pinus Picea L. oder die westeuropäische Edeltanne hält den hiesigen Winter nicht aus und hat eine mehr zweizeilige Stellung der Nadeln an jüngeren Zweigen. Bei den Edeltannen im Parke zu Pawlowsk sind die Nadeln deutlich mehrreihig und nach aufwärts gekrümmt; diesen Charakter hat die amerikanische Edeltanne oder Balsamtanne mit der sibirischen oder Pichta gemein *)

Bevor nicht die reifen Zapfen untersucht sind, wird noch ein Zweifel übrig bleiben dürfen, um so mehr als ein daneben stehender Lärchenbaum, nach den Zapfen, zu Larix sibirica gehört. Für den Zweck dieser Zeilen kömmt es indessen auf eine genauere Bestimmung vorläufig nicht an und wir bezeichnen die fraglichen Bäume von Pawlowsk mit dem allgemeinen Namen: Edeltanne oder Weißtanne, Sapin blanc, *JINXTA* (Pichta), wofür der Deutsche, Franzose oder Russe sie ansehen wird. Loudon hält die sibirische Pichta für eine Varietät der nordamerikanischen Balsamtanne. Beide bilden mit der westeuropäischen Edeltanne, nach der Ansicht Vieler eine wenig von unserer gemeinen Tanne und Kiefer verschiedene Gattung, welche D. Don Picea genannt hat, Link und Andere aber Abies, weil Linné diese zwei Namen grade entgegengesetzt gebraucht, als die älteren Botaniker. Allerdings wurden sie richtiger Abies pectinata Dec., Ab. Pichta Tisch. und A. balsamea Poir. heißen.

Daß das im Jahre 1834 ausgeschnittene Stück wirklich zu dem dünnen Baume gehört, beweist: **)

1. Die eigenthümliche Farbe und Glätte der Rinde, die Beschaffenheit der Astnarben und die mehr oder weniger bedeutenden mit Harz gefüllten blasenförmigen Auftreibungen.

2. Die Dicke des Stückes, 4 Zoll im Durchmesser, was sehr gut mit der Fläche des Stumpfes übereinstimmt. Die Entfernung zwischen dem Stumpfe und dem Ende des abgeschnittenen Stückes beträgt 4′ 3″; das ausgeschnittene Stück vom Jahre 1834 hat nur 9½″, ist also

---

*) A. Pichta erkennt man zwar gewöhnlich durch lange an den jungen Trieben angedrückte grade Nadeln, wie solche in Ledebour's Icon. Fl. Alt. tab. 500 dargestellt werden. In Baumschulen kommen jedoch unter A. Pichta und A. balsamea Exemplare vor, bei welchen, wie mir Herr Buck zeigte, eine Unterscheidung schwierig wird. Zweige der Pichta von den Zuflüssen der Petschora haben sehr kurze Nadeln, die alle nach aufwärts gekrümmt sind.

**) Die dieser Beschreibung beigegebene Abbildung konnten wir leider nicht mitgeben. Die Redact.

beinahe der 5. Theil des ursprünglich ausgesägten Stammes; es ist der Gleichförmigkeit mit dem übrigen Holzgaben halber nicht länger ausgefallen.

Eine dünne vom untern Stumpfe abgesägte Platte stellte den Beweis bis zur Evidenz her, denn es ließ sich erkennen:

3. daß die Markscheide an beiden Stücken stark excentrisch gestellt war, so daß der kleinste Halbmesser des Holzkörpers an beiden 17 Par. Linien, der größte Halbmesser 31—32 Linien betrug; auch an den übrigen Stellen war die Uebereinstimmung der Art, daß beide Stücke auf einander gelegt, bis auf die später zu erwähnende Neubildung am untern Ende des unteren Stumpfes, so vollkommen an ihren Rändern schlossen, daß nur eine sehr dünne (durch die Säge und das Schabeisen verbrauchte) Platte dazwischen gelegen sein könne.

4. Am Ende des unteren Stumpfes zählt man 49 Jahresringe im ausgetrockneten und etwas verwitterten Holze. An der untern geschabten Fläche des Stückes vom Jahre 1834 machte ich in verschiedenen Richtungen 2 Zählungen, von welchen eine 47, die andere 48 Ringe gab; ich vermuthe jedoch, daß 1 oder 2 Ringe übersehen wurden, weil an der oberen sorgfältiger bearbeiteten und polirten Fläche desselben Stückes ganz deutlich 49 Jahresringe vorhanden waren, also dieselbe Zahl, wie am untern Stumpfe. Aus dem jüngsten Ringe könnte man schließen, die Operation sei im Winter gemacht worden.

5. Die Jahresschichten waren nicht gleich dick; die ersten 10 maßen an beiden Stücken 7 Par. Linien nach der Richtung des kleinsten Halbmessers, die folgenden 10 nur je 3 Linien, die letzten nur 2 Lin.; der unterdrückte Baum wuchs unten mehr an der von dem andern Baume abgewandten Seite. Die Ringe selbst hatten an einer Stelle eine Eigenthümlichkeit, durch welche auch der letzte mögliche Zweifel an dem ehemaligen Zusammenhange beider Stücke beseitigt wird. Der 37. bis 39. Ring (vom Centrum aus gezählt, oder der 11.—13. von der Peripherie aus gerechnet), waren so überaus fein und zusammengedrängt, daß sie nur mit einiger Mühe unter der Loupe gezählt werden konnten.

Hieraus ist zu ersehen, daß der eine größere Baum im Jahre 1785 gepflanzt wurde und im bevorstehenden Winter (1859) sein 73. Jahr vollendet haben wird. Die seit dem Jahre 1834 gewaltsam aufgehobene Verbindung mit der Wurzel hinderte nicht sein Fortleben seit nun mehr 24 Jahren, weil vor dieser Zeit bereits eine Verwachsung mit den Zweigen des benachbarten Baumes eingetreten war und die Ernährung durch denselben ausschließlich übernommen wurde.

Man könnte versucht sein, diesen Fall für ein sinnreich ausgedachtes Experiment zu halten, die Verwachsung mit den 4 Zweigen des kleineren Baumes absichtlich herbeigeführt durch eine Art Pfropfung, welche einige Gärtner Ablactiren nennen. Diese Verwachsungen sind indessen viel eher auf natürlichem Wege bewirkt worden. Sie sind bereits in dichten Waldbeständen bei der europäischen Edeltanne beobachtet worden.

Die Rinde der Edeltanne ist bekanntlich von den übrigen Nadelbäumen dadurch ausgezeichnet, daß nicht vor dem 50., zuweilen erst nach dem 100. Jahre Borkenbildung eintritt. Die Rinde ist, bis

auf die Aſtnarben, glatt und ohne Riſſe. Bei der ſpäteren Zunahme an Dicke leidet endlich der Zuſammenhang der Rinde und es tritt Wucherung des neuen Rindengewebes und Harzerguß ein. Etwas ähnliches bemerkt man an vielen Aeſten der Edeltanne von Pawlowsk, näher zum Stamme zu. Wo alſo ein Baum, wie in gegenwärtigem Falle nahe ſolchen Aeſten zu ſtehen kommt, kann (beſonders durch Reibungen bei ſtürmiſchem Wetter), die Rindenſchicht ſtellenweiſe beiderſeits verloren gehen und ſpäter eine Verwachſung an dieſen Stellen erfolgen. Ich fühle jedoch ſehr wohl, daß im vorliegenden Falle, vielleicht auch andere Urſachen dabei im Spiele geweſen ſein konnten. Am ſtärkſten iſt die Verwachſung an unſeren Bäumen am unterſten Aſte; ein dicker knolliger Auswuchs beſtehend (ſo viel zu ſehen war) aus Harz vermiſcht mit Rindenparenchym, hat die unverletzte Rinde des Aſtes von außen bald vollſtändig eingeſchloſſen. Ich erlaubte mir nicht, eine dieſer Verwachſungen genauer zu unterſuchen, um nicht das geſammte Bild zu zerſtören.

Eine zweite, nicht weit entfernte etwas dickere Edeltanne zeigte dieſelbe Verwachſung an zwei Aeſten mit einem nebenſtehenden ſchmächtigen Baume derſelben Art, hier iſt die Verbindung mit der Wurzel noch ungeſtört. Dieſes Exemplar könnte zu Experimenten dienen und lehrreich werden; es vegetirt kräftiger als der zuerſt beſchriebene Baum; der Umfang beträgt 1 Fuß über dem Boden 1′ 11″ engl., bei 3 Fuß Höhe 1′ 7″; die geſammte Höhe etwa 6 Faden; die Entfernung von dem dicken Baume mehr oder weniger 1 Fuß. Auf 2 Faden Höhe iſt die 1. Verwachſung, von da an nimmt der Stamm eine etwas ſchiefe Richtung und entfernt ſich immer mehr.

Der erſt beſchriebene Baum iſt an verſchiedenen Stellen 4—6 Zoll engl. von dem mit ihm verwachſenen ſtärkeren Baume entfernt und 2 oder 2½ Faden lang; das ausgeſägte Stück ſammt dem an der Wurzel ſtehengebliebenen Stumpfe an 4½ Fuß. Das untere Ende war von der erſten oder unterſten Verwachſung 1′ 8″ entfernt, unten angeſchwollen 1′ 3½″ im Umfang, ein Fuß höher nur 1′ im Umfang und von da aus ſehr gleichmäßig und allmählig bis zur Krone verdünnt. Ueberall hin treten Aeſte hervor. Die dicken Bäume haben an der N.- und O.-Seite bis hoch hinauf keine Aeſte. Von der oberſten Verwachſung floß Harz herab, desgleichen aus dem untern Ende an der Vernarbungsſtelle des Stummels. Da Wurzelſchößlinge bei Nadelbäumen ſchwerlich vorkommen, ſo bin ich geneigt die dicht neben dem ſtarken Baume ſtehenden ſchmächtigen Stämme für ſelbſtſtändige von erſterem unabhängige Individuen zu halten, wahrſcheinlich von demſelben Alter wie jener, aber in ihrer Entwickelung durch ihn gehemmt und ſpäter in ihren unterſten Theilen anſcheinend verwachſen.

Bereits durch Loiſeleur-Deslongchamps iſt eine Eigenthümlichkeit der Edeltanne zur Sprache gekommen, nämlich die Lebensfähigkeit der Stumpfe nach Fällung des Baumes, durch welche Neubildung von Splint und Rinde zuletzt Vernarbung und Schließung der Wundfläche bewirkt wird. Dieſe Erſcheinung, Ueberwallung genannt, viel ſeltener bei der gemeinen Schwarztanne und Lärche, hat Herr Prof. Göppert 1842 genauer beſchrieben und die Anſicht von Raum beſtätigt, daß

hierbei eine Verwachſung der Wurzel mit jenen benachbarter geſunder Edeltannen ſtattfinde.

Die abgeſchnittene dünne Platte von dem Stummel des durchſchnittenen Stammes zeigte, wie zu erwarten war, den beginnenden Ueberwallungsproceß durch ausgebildeten Splint, der aber nur theilweiſe die äußere dem nebenſtehenden Baume abgewandte halbe Peripherie einnahm und noch nicht den Rand der Wundfläche erreicht hatte. Die neue Holzbildung war 5 Linien tiefer von dieſem Rande, an verſchiedenen Stellen 2—3 Linien dick; es ließen ſich 16 oder auch 18 Schichten darin zählen, hierauf folgte nach innen eine undeutliche braune Schicht von 1/4 Linie, welche nicht mehr in einzelnere aufgelöſt werden konnte und darauf die etwas verwitterten 49 Jahresringe des vor der Reſection gebildeten Holzes. Die neue Schichtenbildung erfolgte nicht gleichmäßig und ununterbrochen in der ganzen Ausdehnung der halben Peripherie, ſondern urſprünglich wenigſtens an drei Bildungs-Graden unabhängig von einander, Schicht auf Schicht, wobei beide Ränder einen bogenförmigen Verlauf und Zunahme an Dicke zeigten. Erſt bei dem ſpäteren Zuſammenſtoßen beider benachbarten Ränder erfolgte die Ablagerung neuer Schichten ununterbrochen in der ganzen Ausdehnung beider Bildungsherde.

Es bleibt noch übrig, das untere Ende des emporgehaltenen Baumes zu betrachten, zu welchem Zwecke ein 4 1/2 Zoll langes Stück abgeſägt wurde und im bot. Muſeum der Academie für künftige Zeiten zur Anſicht und Prüfung zu Gebote ſteht.

Am augenfälligſten iſt an dieſem Stummel die weit vorgeſchrittene Vernarbung an der dem großen Baume zugewandten Hälfte. Die neue Holzbildung nach der Reſection hat bereits den Rand des alten Holzes überſchritten und bedeckt beinahe die Hälfte der Schnittfläche des Stummels. Die callöſe Maſſe beſteht aus zwei Theilen, der innere wird durch den Splint gebildet, der um den Rand des alten etwas verwitterten Holzes gerollt iſt und der Schnittfläche deſſelben hart anliegt; der äußere Theil beſteht aus dem neueren etwas ſchwammartig lockeren Rindenparenchym, getränkt und überzogen mit flüſſigem und feſtem Harze. Die Oberfläche des Callus hat ein borkenartiges Ausſehen angenommen, beſonders gegen die alte Rinde. Dieſe zeigt noch in ihrer äußeren in der urſprünglichen Lage gebliebenen Schicht die Spuren des Durchſchnittes; die innere Rindenſchicht iſt aber durch die Callusbildung etwas heraus- und herabgedrängt worden und bildet ziemlich dicke Borken; auch hier ſind die Spuren des ehemaligen Schnittes erkennbar, ſtehen aber 4—6 Linien tiefer als an der äußeren Rinde.

Etwa ein Viertel der Peripherie des alten Holzes in der Höhe der Schnittfläche iſt im alten Zuſtande, wie vor 24 Jahren geblieben; ein anderes Viertel iſt blos von 2—3 dicken Splintlamellen und der alten Rinde bedeckt, ſo daß an der dem größeren Baume abgewandten Hälfte keine beſondere auffallende Neubildung von Rindenſubſtanz zu bemerken iſt.

Die alte untere Schnittfläche des Stummels zeigt ganz deutlich 42 Jahresringe, alſo eine Verminderung um 7 gegen die Baſis des

unten an der Wurzel stehen gebliebenen Stummels; hieraus folgt, daß der junge 7jährige Baum eine Höhe von 4—5 Fuß hatte. Der 11.—13. Ring von der Peripherie waren ebenso charakteristisch wie an dem 1834 ausgesägten Stücke und an dem Stumpfe.

Die Untersuchung der oberen frischen Schnittfläche des Stummels war nicht so leicht und sicher, weil das alte Holz schon bedeutend faul war, weshalb ich es stellenweise mit rothem heißen Wachs tränkte und ausfüllte, wodurch die Jahresringe nach Schnitten deutlicher wurden. Die Gränze zwischen dem alten und neuen, vor und nach dem Jahre 1834 gebildeten Holze war nicht überall deutlich. An der dicksten Stelle konnte man 21 oder auch nur 19 frische neue Holzschichten von der Peripherie aus zählen und dies in derselben Parallele, weil sich stellenweise 1—2 Ringe allmählig mit den benachbarten vereinigten. Man kann hieraus schließen, daß die neue Schichtenbildung nicht gleichförmig in der ganzen Länge von der ersten Verwachsung bis zum unteren Ende des Stummels erfolgte, sondern einige Schichten kürzer ausfielen.

Nach der aufgehobenen Verbindung des jüngeren Baumes mit seiner Basis ist alljährlich im Frühlinge bei dem Aufsteigen des rohen Saftes dem nebenstehenden größeren Baume ein Theil desselben durch den Ast und die unterste Verwachsung auch in den jüngeren Baum aufgestiegen, und ausgearbeitet nicht wieder oder nur zum geringen Theil auf demselben Wege zurückgeflossen, sondern zur Ernährung und Bildung von neuen Holzschichten in dem hängenden Stummel des durchsägten Baumes verwendet werden, wie leicht einzusehen, besonders an der Verwachsungsseite. Hierbei ist in Folge der Schwerkraft verhältnißmäßig mehr platischer Saft in dem untersten Theile des Stummels und besonders in dem Vernarbungstheile angesammelt und verbraucht worden, als in den höher gelegenen Theilen des durchsägten Stammes, was auch der Augenschein zeigt, da der Stummel 1 Fuß lang von der Schnittfläche angeschwollen ist, von da aber weiter aufwärts, noch 8 Zoll unter der Verwachsung schmächtiger wird.

Dieses merkwürdige Zwillingspaar könnte Stoff einem Dichter darbieten. Es ist etwas Poetisches in diesem Falle, daß der Unterdrücker zuerst von der Natur und später vom Menschen gezwungen wurde, auf eigene Kosten seinen schwächeren Bruder zu ernähren.

Es wäre allerdings möglich, daß irgendwo ein ähnlicher Fall beschrieben ist. In Loudon's reichhaltigem Arboretum finde ich nichts dergleichen. Schacht spricht von Verwachsungen bei Linden, Buchen und Edeltannen und erklärt sie durch die große Lebensfähigkeit der Rinde; er führt aber kein Beispiel an für eine ausschießliche Ernährung eines solchen Baumes durch seinen Nachbar.

Soviel mir bis jetzt bekannt ist, steht diesem Beispiele zunächst jenes von Herrn Graff an Pinus sylvestris im Kasan'schen Gouvernement beobachtete, abgebildete und in russischer Sprache veröffentlichte. Hier war der schmächtigere Baum ebenfalls von seiner Wurzel gewaltsam getrennt und oben mit einem einzigen Aste des stärkeren Baumes verwachsen. Drei Aeste unter der Verwachsung waren am Leben. Es blieb unbestimmt, wann die Trennung erfolgt war. Es scheint noch

keine Verwarbung eingetreten zu sein; gegen das untere Ende des hängenden Stammes waren blos 3 oder 4 Splint-Schichten an der Peripherie frisch.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Bromelia Commeliniana *de Vris.*

(Agallostachys Commeliniana Beer.)

Eine, sich sowohl durch ihren Blüthenstand, wie durch ihren Habitus auszeichnende Art. Einige Wochen vor dem Erscheinen des Blüthenschaftes färben sich die Herzblätter der Pflanze, wie dies bei mehreren Arten dieser und anderer Gattungen der Fall ist, schön purpurroth, mit welcher Färbung dann die purpurfarbigen, blauen mehligweißen Blüthenstiele hübsch contrastiren. Die Blumen selbst sind lilafarben. Eine sehr empfehlenswerthe Art, abgebildet in der Flore des jardins du Roy. des Pays-Bas 1858. pag. 177.

Odontoglossum maxillare *Lindl.*

(Odontoglossum nebulosum Hort. non Lindl.)

Wie die Illustration hortic. bemerkt, ist dies die erste Abbildung dieser herrlichen Orchidee, welche dieses Journal auf Taf. 200 von derselben giebt. Wegen der großen, zahlreichen, herrlich weißen, auf allen Blumensegmenten rothbraun punktirten Blüthen, die sich auch noch durch einen köstlichen Geruch empfehlen, verdient diese Orchidee die allgemeinste Beachtung.

Diese Art steht dem O. Cervantesii Lindl., wie dem O. nebulosum nahe, unterscheidet sich jedoch von beiden hinlänglich. Es ist eine liebliche Pflanze, sie verdient allgemein kultivirt zu werden.

Berberis Jamesonii *Hort. Angl.*?

Ein kleiner Strauch, verästelt, mit sehr lederartigen, glänzend grünen, großen, ovalen oder länglichen, am Grunde zugespitzten Blättern, deren buchtige Ränder mit langen Dornen versehen sind. Die ziemlich großen gelben Blumen stehen in sehr verästelten Rispen, diese sind endständig an den Zweigen und hängend.

Herr Verschaffelt fand diese auf Taf. 201 der Illustr. hortic. abgebildeten Art in einer englischen Handelsgärtnerei, konnte jedoch das Vaterland nicht erfahren.

Torenia asiatica *L. var.* pulcherrima.

Eine herrliche Varietät mit viel größeren, dunkel violett blauen und auffallenden weiß gefleckten Blumen der so allgemein beliebten

Torenia asiatica, welche durch diese Varietät leicht in Vergessenheit gerathen könnte. Wir erwähnten sie bereits im vorigen Hefte S. 165.

Nach der Aussage Sir W. Hooker's soll die Pflanze einjährig sein, dürfte sich jedoch jedenfalls durch Stecklinge erhalten lassen.

Die Herren Lee zu Hammersmith haben diese mit Recht pulcherrima genannte Varietät aus ostindischem Samen erzogen und brachten sie zuerst in den Handel. Herr A. Verschaffelt, in dessen prächtiger Illustr. hortic. diese Pflanze auf Taf. 199 abgebildet ist, bietet Pflanzen davon zu billigen Preisen an.

Begonia xanthina *Hook. var.* pictifolia.

(Begonia picta Hort. Jackson non Smith.)

Abermals eine herrliche Begonie, welche Herr Jackson zu Kensington unter dem Namen B. picta in Handel gebracht hat, die jedoch nicht mit der B. picta von Smith zu verwechseln ist. Sir W. Hooker hält sie für eine Varietät der B. xanthina oder für eine Hybride dieser, welche durch Kreuzung mit einer buntblättrigen Art entstanden ist. Sie hat viel Aehnlichkeit mit der allbekannten B. Rex, diese hat jedoch gelblich weiße Blüthen mit einem röthlichen Anflug.

Nachdem obige Notizen im Bot. Mag. zu dieser auf Tafel 5102 abgebildeten Begonie gedruckt waren, erhielt Sir W. Hooker Herrn Linden's neuesten Catalog (No. 14) neuer, exotischer Pflanzen, in dem, wie auch wir im vorigen Hefte mittheilten, drei neue Begonien von Assam beschrieben sind, von denen, wie Hooker sagt, die B. Victoria ohne allen Zweifel dieselbe Pflanze ist als die auf der citirten Tafel des Bot. mag. abgebildete.

Epigynium leucabotrys *Nutt.*

Vaccinaceae.

Eine hübsche Art der Gattung oder besser Untergattung Epigynium Kl., zu der auch das E. acuminatum Kl. (Bot. mag. tab. 5010) gehört. Herrn Nuttall verdankt man in England die Einführung dieser Pflanze von den Dupplahügeln im westlichen Bengalen, woselbst sie auf Eichenstämme wächst. Sie ist, wie Nuttall bemerkt, ein immergrüner Strauch, der eine Höhe von 7—8 Fuß erreicht und knollenartige Wurzeln bildet, ähnlich einer Yamswurzel, doch viel härter. Die weißen kugelförmigen Blumen erscheinen in endständigen Rispen. Sie ist eine hübsche Kalthauspflanze, deren Blüthezeit im Sommer fällt; nach dem Blühen ist der Strauch mit hübschen weißen Beeren geziert. Abgebildet Bot. mag. tab. 5103.

* Sonerila margaritacea *Lindl.*

Von dieser allgemein bekannten Zierpflanze giebt das Bot. Mag. tab. 5104 eine Abbildung. Die Pflanze ist zu bekannt, als daß es nöthig wäre, hier noch näher auf sie einzugehen.

Plectocomia Assamica *Griff.*

(Plectocomia Khasiyana? Griff., P. Himalayana? Griff., Zalacca Assamica Wall.)

Palmae.

Dieſe intereſſante und ſchöne Palme blühte unlängſt im Königl. Garten zu Kew. Die Wedel dieſer Art erreichen eine Länge von 30 Fuß, aber nur das obere Ende des Blattſtengels iſt gefiedert. Der ſchlanke Stamm erreicht eine Höhe von 60—70 Fuß, ſelbſt im kultivirten Zuſtande und iſt, wie die Unterſeite der Wedel und deren Stengel, mit handförmigen Stachelbüſcheln bewaffnet. Eine Abbildung dieſer empfehlenswerthen Palme befindet ſich im Bot. Mag. tab. 5105.

Dipteracanthus calvescens *Nees.*

Acanthaceae.

Eine Pflanze von unbedeutendem Werthe von Rio Janeiro, wo ſie von v. Martius, Riedel, Schott, Sellow und Gardner häufig gefunden wurde. Ihr einziger Werth beſteht vielleicht darin, daß ſie ihre ziemlich großen hellvioletten Blumen im Winter zum Vorſchein bringt. Abgebildet in Bot. Mag. tab. 5106.

Das Januar-Heft des Botanical Magazine, das uns erſt ſpäter zuging, enthält die Abbildungen einiger ſehr empfehlenswerther Pflanzen, unter anderen die

Spathodea campanulata *Beauv.*

(Spathodea tulipifera G. Don., Bignonia tulipifera Schum.)

Bignoniaceae.

Ein herrlicher Blüthenbaum vom weſtlich tropiſchen Afrika. Herr Beauvais fand ihn zu Olgare und Herr Osborne, Beſitzer der Handelsgärtnerei zu Falham erzog dieſe Prachtpflanze aus Samen, den er von Aſſantre erhalten hatte. Schuhmacher fand den Baum in Guinea und Sir W. Hooker beſitzt Exemplare durch Dr. Irving von Abeakouta; es ſcheint dieſe Art demnach in Afrika eine ziemlich weite Verbreitung zu haben. — Der Baum erreicht eine beträchtliche Höhe. Die großen, ſchön glänzend grünen Blätter ſind gefiedert. Die über 4 Zoll großen Blüthen ſind von der brillanteſten zinnoberrothen Farbe, etwas blaſſer im Innern der Röhre. Der Baum gelangt nur höchſt ſelten in den Gewächshäuſern zur Blüthe, weil er erſt eine beträchtliche Größe erlangen muß, bevor ſich ſeine Blüthen zeigen. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5091.

Juanulloa? eximia *Hort.*

Solaneae.

Eine Solaneae, welche die Herren Henderson von dem Continent unter der Benennung Brugmansia eximia erhalten haben. Hinsichtlich der Blätter hat sie jedoch keine Aehnlichkeit mit irgend einer Brugmansia oder baumartigen Datura-Art, während die Blumen viel Aehnlichkeit mit der Blume dieser Gattungen besitzen, jedoch ist dann der Kelch wieder ganz abweichend und hat ganz den Charakter einer Juanulloa. Sollte diese Pflanze vielleicht eine Hybride sein und wenn dies der Fall, welches mögen die Eltern sein? Die Farbe der Blume ist gelblich grün, wie die bei einigen Solandra-Arten. Bot. Mag. tab. 5092.

Sanseviera cylindrica *Boj.*

(Sanseviera Angolensis Wellwitsch.)

Asparagineae.

Unter dem Namen „Jfé" wurden vor einigen Jahren durch die „foreign Office" in London eigenthümliche Fäden und Tauwerk aus der Portugiesischen Niederlassung bei Angola, West-Küste von Afrika, in England eingeführt, gleichzeitig einige Pflanzenreste, aus der diese Fäden gewonnen sein sollten. Einige dieser Pflanzen erholten sich bald im Garten zu Kew und als sie auch zur Blüthe kamen, erwiesen sie sich als eine Sanseviera und zwar als die S. cylindrica Bojer. Die große Ausstellung zu Paris im Jahre 1858 hatte gleichfalls in der Portugiesischen Abtheilung mehrere sehr schöne Proben dieses Materials zu Geflechten und Geweben unter der Bezeichnung „Erzeugnisse von Angola" ausgestellt und bei dieser Gelegenheit war es, wo Sir W. Hooker erfuhr, daß sie von der S. Angolensis oder richtiger S. cylindrica stammen. Die aus den Blattfasern dieser Pflanze angefertigten Taue sind von ungeheurer Stärke und dauerhafter als alle bekannten Sorten. Daß auch die Blätter der übrigen Arten der Gattung Sanseviera (namentlich S. zeylanica und guineensis) gute Fasern liefern, ist bekannt. Außer des Nutzens wegen ist die Pflanze auch noch ihrer hübschen aloeartigen Blätter und zierlichen Blüthen wegen zu empfehlen. Bot. Mag. tab. 5093.

Tachiadenus carinatus *Grisb.*

(Lisianthus carinatus Lam.)

Gentianeae.

Ein Bewohner von Madagascar, von wo derselbe durch den Rev. W. Ellis mit so vielen Seltenheiten eingeführt worden ist. Es ist eine halbholzige Pflanze mit hübschen, großen blauvioletten Blumen und verdient allgemein beachtet zu werden. Bot. Mag. tab. 5094.

Chrysanthemum carinatum *Schousb. var.* pictum.

(Chrysanthemum tricolor Andr., Ismelia versicolor Cass.)

Compositae.

Die Urform dieser Pflanze wurde bereits vor 60 Jahren durch Broussonet von der Küste der Berberei in Kew-Garten eingeführt. Es ist eine harte einjährige Pflanze, die sich durch ihre großen weißen Blumenköpfe sehr empfiehlt und daher auch häufig gezogen wird. Die Varietät pictum erzog Herr Burridge in Colchester und kann sie als eine schöne Acquisition gelten. Die Scheibenblumen sind violettpurpur, die Strahlenblumen, die eine Hälfte (obere) purpur, die andere gelb.

Bot. Mag. tab. 5095.

Von der „Flore des serres", die mit der Ausgabe ihrer Hefte noch über ein ganzes Jahr im Rückstande ist, liegt uns das Januar-Heft für 1858 (ausgegeben im März 1859) und das Februar-Heft für 1859 (ausgegeben April 1859) vor.

Von den in diesen Heften abgebildeten Pflanzen sind mehrere schon früher nach den Abbildungen in anderen Werken in der Hamb. Gartenztg. besprochen, resp. empfohlen worden, so z. B. das

Pentstemon Jeffreyanus, Flore des serres tab. 1290, Bot. Mag. tab. 5045, Hamburg. Gartz. XIV, p. 253.

Tydaea mehrere neue Varietäten, Fl. des serres tab. 1291, Hambg. Gartztg. XIV, p. 178.

Muscat-Hamburgh Traube, Fl. des serres tab. 1292—1293, Hambg. Gartz. XIV, S. 13 und 69.

Amygdalus persica var. sinensis, camelliaeflora et dianthiflora, Hambg. Gartztg. XIV, pag. 255, 377 und 508.

Außer diesen enthalten die beiden Hefte der Flore des serres noch:

Nolana paradoxa *Lindl. var.* violacea.

Eine hübsche einjährige Pflanze mit niederliegenden Zweigen und großen violett-rosa Blüthen. Dieselbe wurde durch Herrn J. Carter in den Handel gebracht und dürfte wie die Nolana paradoxa den Blumenrabatten während einiger Wochen des Sommers zur Zierde gereichen. Abgebildet tab. 1294 der Flore des serres.

Camellia jap. Bonomiana *Sangalli.*

Herr Giovanni Sangalli zu Mailand erzog diese reizende Camellie aus Samen und erhielt sie Herr Van Houtte von Herrn Vital Rosazza. Es ist eine prächtige Varietät, die Blumenblätter regelmäßig dachziegelförmig gestellt, rein weiß und jedes derselben mit einem, auch zwei carminrothen Bracteen geziert. Taf. 1295 der Flore des serres zeigt uns eine getreue Copie dieser Schönheit.

Azalea Van Houttei *fl. plen.*

Eine schöne Azalee fürs freie Land mit gefüllten Blüthen. Es ist eine derjenigen Azaleen, die in Deutschland unter der Bezeichnung

„Genter Azaleen“ bekannt sind und seiner Zeit viel Furore machten, aber auch noch jetzt zu den schönsten Ziersträuchern der Gärten gehören. Abgebildet Flore des serres tab. 1298.

Die Tafeln 1301, 1302 und 1303 der Flore des serres bringen die Abbildungen dreier Varietäten der Azalea indica, nämlich:

Azalea Gloire de Belgique,
— Le Geánt und
— Étendard de Flandre.

Drei Azaleen von unbestreitbarer Schönheit, die von Herrn Vervaene zu Ledeberg in den Handel gebracht wurden. Andere nicht minder schöne Varietäten heißen: Belle Jeannette, Gloire de Ledeberg, papillonacea, pelargoniaeflora und Rubens. Sämmtliche Azaleen haben bereits die Medaille auf der Genter Ausstellung erhalten und sind von Herrn Van Houtte zu beziehen.

Azalea *var.* Magnifica *(Rollisson)*.

Diese auf Taf. 1306—1307 der Flore des serres abgebildete Azalee ist ebenfalls wie die oben genannte A. Van Houttei eine Varietät fürs freie Land, englischen Ursprungs. Es ist eine sehr zu empfehlende Art.

Gartenbau - Vereine.

Bremen. Der Gartenbau-Verein für Bremen hat so eben seinen zweiten Jahres-Bericht veröffentlicht. Derselbe enthält außer dem Mitglieder-Verzeichniß, deren Zahl bereits bis auf 300 angewachsen ist, Mittheilungen über das Wirken und über die Thätigkeit des Vereins und die Berichte über die im vorigen Jahre von dem Verein veranstalteten Ausstellungen, nämlich über die am 24.—26. April (siehe Hamburg. Gartztg. XIV. p. 257) und über die am 18.—20. Septbr. 1858 nebst den Prämienvertheilungen.

Der Bremer Gartenbau-Verein fand gleich bei seinem Entstehen die allgemeinste Theilnahme des dortigen Publikums und machte derselbe mit seiner ersten Ausstellung, die in der That eine glänzende war, Furore. Sie bot, wie wir früher berichteten, des Schönen sehr viel, so wohl in Bezug auf Blumen, wie auf Kultur und wie auf getriebene Gemüse, außerdem war das Arrangement ein äußerst gefälliges und ein sehr gelungenes.

Die Herbstausstellung war dagegen weniger brillant, wie dies in der Regel die Herbstausstellungen auch nie sind, noch sein können, dennoch lieferte sie einen Beweis von der großen Rührigkeit und Umsicht des gegenwärtigen Vorstandes des jungen Vereins.

Die diesjährige Frühlingsausstellung war nach den uns gewordenen mündlichen wie schriftlichen kurzen Mittheilungen wiederum eine sehr

glänzende gewesen. Die Wände des großen Lokals waren sehr geschmackvoll, theils mit den schönsten Coniferen und Akazien geziert, namentlich aus den Gärten der Frau von Lengerke und der Frau Aeltermann Lürmann geliefert, theils mit ansehnlichen Cypressen und Lorbeerbäumen, welche die Herren Heinke, Heins, Karich, Kommer und Andere so bereitwillig eingesandt hatten.

Die Azaleen und Rhododendron waren prachtvoll, die Cinerarien gut kultivirt, aber leider noch nicht völlig erblüht, Camellien trotz der vorgerückten Jahreszeit in noch sehr schönen Exemplaren vorhanden. Hyacinthen waren in mehreren Sortimenten aufgestellt, von denen drei auf so gleichem Niveau standen, daß es schwer hielt, dem einen oder dem andern den Vorzug zu geben. — Blüthensträucher, namentlich getriebene, zeichneten sich gleichfalls aus.

Eine Aufgabe (die 10.) hatte der Vorstand für das „schönste Blumenbouquet“ gestellt. Es ist diese Aufgabe eine sehr würdige, der beste Prüfstein des Geschmackes eines Gärtners, aber sie ist nicht leicht und deshalb findet man auch unter Gärtnern kaum zwei, die ein Bouquet von leichtem, gefälligen Aussehen zu binden verstehen. Die jetzige Mode, Bouquette zu binden, in Form der sogenannten französischen, ist eine der abgeschmacktesten und passen diese Bouquette vortrefflich zu — der Crinoline. Möchte nur jeder Verein Prämien für Bouquette, aber nur für leicht und gefällig gebundene aussetzen, Bouquette, in denen die dazu verwendeten Blumen ihre Form behalten, nicht vorher theilweise zerrissen oder die einzelnen Blüthen auf Draht gezogen werden, um dieselben dichter an einander pressen zu können.

Herr Retemeyer hat auch diesmal wieder, wie Herr Rothermundt eine Fülle der reizendsten exotischen Pflanzen eingeliefert, und mit dem Herrn Suling für seine Gesammtlieferung der besten getriebenen Bohnen, Erbsen und Carotten den ersten Preis erhalten.

Preisvertheilung.

Von den Preisrichtern, Herren Hofgärtner Erblich aus Hannover, Herrn Lüdeking, Herrn Carl Melchers, Herrn Th. Ohlendorff aus Hamburg, Herrn P. Smith aus Bergedorf und Herren Grormann wurden nachbenannte Gartenerzeugnisse auf der letzten Ausstellung prämirt:

1) Für 6 Sorten der schönsten Topfgewächse in vorzüglichem Kultur- und Blüthenzustande erhielt als 1. Prämie die goldene Medaille Herr Retemeyer, als 2. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ die Herren Gebrüder Meet.

2) Für eine Collection von 12 Sorten der schönsten und bestkultivirten Camellien in Blüthe erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Karich, als 2. Prämie 5 ℳ Herr Heincke.

3) Für eine Collection von 6 Sorten der neuesten und schönsten Camellien in Blüthe erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Heincke, als 2. Prämie 5 ℳ Herr Freitag.

4) Für eine Collection von 8 Sorten der schönsten indischen Azaleen im besten Kultur- und Blüthenzustande erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Karich, als 2. Prämie 5 ℳ Herr Kommer.

5) Für eine Collection von 6 Sorten der schönsten und bestkultivirten Rhododendron in Blüthe erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Retemeyer, als 2. Prämie 5 ℳ Herr Heincke.

6) Für eine Collection von 12 Sorten Cinerarien in Töpfen erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 2½ ℳ die Herren Gebrüder Meet, als 2. Prämie Herr Karich, als 3. Preis 2½ ℳ Herr Korte.

7) Für eine Collection von 18 Sorten Hyacinthen in Töpfen erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ die Herren Gebr. Meet, als 2. Prämie 5 ℳ Herr Bremermann.

8) Für 6 Sorten der schönsten getriebenen Sträucher in voller Blüthe erhielt als Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Karich.

9) Für eine Collection von 12 Sorten der schönsten blühenden Frühlingsblumen in Töpfen konnte der Preis, die silberne Medaille, aus Mangel an Bewerbern nicht vergeben werden.

10) Für das schönste Blumenbouquet erhielt als Prämie die silberne Medaille die Herren Gebrüder Meet.

11) Für die Gesammtlieferung der schönsten getriebenen Bohnen, Carotten und Erbsen erhielt als Prämie die goldene Medaille Herr Suling.

12) Für die besten Gurken erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 2½ ℳ Herr Retemeyer, die 2. Prämie, 2½ ℳ, konnte aus Mangel an Bewerbern nicht ertheilt werden.

13) Für den besten Kopfsalat erhielten als 1. Prämie Herr Retemeyer, als 2. Prämie 2½ ℳ Herr Suling.

14) Für das beste Sortiment Gemüse, gleichviel ob frisch oder conservirt erhielt als 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Suling, die 2. Prämie, 2½ ℳ, konnte aus Mangel an Bewerbern nicht ertheilt werden.

15) Für die besten Erdbeeren erhielt als Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Suling.

16) Für die besten Himbeeren erhielt als Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ Herr Suling.

Herrn Retemeyer für seine Collection Orchideen und Herrn Heins für seine Collection Hyacinthen wurde die lobende Anerkennung ausgesprochen.

Die nächste Ausstellung findet am 25., 26. und 27. Juni d. J. statt und hat der Vorstand nachstehende Preisaufgaben gestellt:

1) Für eine Collection von 24 Sorten der ausgezeichnetsten Remontantrosen (Rosa hybrida remontans, die sogenannten Rosomeneroſen eingeschlossen) in tadellosem Kultur- und Blüthenzustande: Prämie die goldene Medaille.

2) Für eine Collection von 12 Sorten der ausgezeichnetsten Rosen, und zwar von je 6 Thee- und Bourbonrosen in tadellosem Kultur- und Blüthenzustande: Prämie die silberne Medaille und 5 ℳ.

3) Für 6 Sorten der schönsten Topfgewächse in vorzüglichem Kultur- und Blüthenzustande: 1. Prämie die silberne Medaille und 7½ ℳ, 2. Prämie 2½ ℳ.

4) Für eine Collection von 12 Sorten schöner Blattpflanzen im

besten Kulturzustande: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

5) Für eine Collection von 12 Sorten schöner, großblühender Pelargonien, sowohl englischer als obierscher: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

6) Für eine Collection von 6 Sorten schöner, blühender Fancy-Pelargonien: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

7) Für eine Collection von 12 Sorten schöner, blühender Scarlet-Pelargonien: die silberne Medaille.

8) Für 24 Sorten schön kultivirter, blühender Nelken: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

9) Für 12 Sorten der besten Nelken und zwar 6 Sorten Remontantnelken (Dianthus Caryophyllus semperflorens) und 6 Zwergnelken von Berviers (Dianthus Caryophyllus nanus) in schönen, blühenden Pflanzen: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

10) Für 24 Sorten der schönsten, blühenden Stiefmütterchen (Pensées) in wohlkultivirten Pflanzen: die silberne Medaille.

11) Für 12 Sorten der schönsten, blühenden Petunien in wohlkultivirten Pflanzen: die silberne Medaille.

12) Für eine Collection von 12 Sorten der schönsten, in vorzüglichem Kultur- und Blüthenzustande befindlichen Gloxinien: 1. Prämie die silberne Medaille und 5 ℔, 2. Prämie 2½ ℔.

13) Für 12 Sorten der schönsten, blühenden Verbenen in wohlkultivirten Pflanzen: die silberne Medaille.

14) Für die besten, reifen Melonen: 1. Prämie die silberne Medaille, 2. Prämie 2½ ℔.

15) Für die besten, reifen Erdbeeren: 1. Prämie die silberne Medaille, 2. Prämie 2½ ℔.

Für die Concurrenz gelten folgende Bestimmungen:

a) Bei der dritten Preisaufgabe dürfen keine Pflanzen concurriren, die schon unter anderen Nummern als zu prämirende aufgeführt sind.

b) Wenn mehrere Prämien für eine Preisaufgabe bestimmt sind, darf derselbe Aussteller nur mit Einer Lieferung concurriren.

c) Die zu prämirenden Pflanzen oder Früchte müssen vom Aussteller selbst kultivirt oder doch mindestens die drei letzten Monate im Besitze desselben gewesen sein, und muß dieses auf Verlangen nachgewiesen werden.

d) Jede Pflanze muß mit ihrem richtigen besonderen Namen oder doch mit einer Nummer versehen sein, die der Nummer des richtigen Namens im einzuliefernden Verzeichnisse der concurrirenden Pflanzen entspricht.

Hamburg. Am 5. und 6. Mai hielt der Garten- und Blumenbau-Verein für Hamburg, Altona und deren Umgegend seine diesjährige Pflanzen- und Blumenausstellung ab.

Leider ist es dem Vereine noch nicht gelungen, ein eigenes Lokal zu besitzen und da in dem großen reichen Hamburg sich kein einziges zu Pflanzenausstellungen geeigneteres Lokal befindet, als der große Saal im Gebäude der patriotischen Gesellschaft, der eben wegen Mangel

eines besseren, helleren und größeren Saales dazu benutzt werden muß, so ist sich das Arrangement der Ausstellungen im Allgemeinen seit einer Reihe von Jahren fast immer gleich und haben wir nicht nöthig dasselbe näher zu besprechen.

Was nun aber die Einsendungen von einzelnen Pflanzen und Pflanzensammlungen betrifft, so haben wir seit einigen Jahren keine so große Elite von Schaupflanzen, Blattpflanzen und Pflanzen mit bunten Blättern auf unseren Ausstellungen gesehen als diesmal. Vorzüglich schön waren mehrere Kulturpflanzen der Herren James Booth & Söhne, unübertrefflich mehrere Blattpflanzen und Pflanzen mit bunten Blättern der genannten Herren, wie mehrere Exemplare der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne und aus den Gewächshäusern der Frau Senatorin Jenisch (Obergärtner Herr Kramer). Die Azaleen des Herrn C. H. Harmsen sind wohl kaum irgendwo besser gesehen worden.

Der botanische Garten hatte eine sehr interessante und belehrende Pflanzengruppe aufgestellt; dieselbe bestand nämlich aus über 60 officinellen oder technisch wichtigen Gewächsen. Unter diesen waren die hervorragendsten: Bixa Orellana L., die Orleans-Farbe liefernd; Phormium tenax L., neuseeländischer Flachs; Amomum Cardamomum L., Cardamom, namentlich in Hamburg ein sehr beliebtes Gewürz an vielen Gebäcken; Phoenix dactylifera L., Dattelpalme; Cycas inermis Lour., Sagopalme Cochinchinas; Cedrus Libani L., Ceder vom Libanon; Phyllocladus trichomanoides Don, in Neuseeland zum Rothfärben benutzt; Dacrydium cupressinum Lab., die jungen Sprossen werden in Neuseeland zur Bierbereitung verwendet; Chloranthus inconspicuus Sw., aromatisch; Antiaris toxicaria L., der Upas- oder Giftbaum; Gunnera scabra R. & P., in Bahia gegen Dysurie gebraucht; Camphora officinarum N. ab E., Cinnamomum Cassia N. ab E. und C. aromaticum N. ab E., Cassia und Zimmt; Oreodaphne foetens Nees, von den Canarischen Inseln, liefert ein Holz von höchst unangenehmem Geruch; Lagetta lintearia Juss., der Spitzenbaum, liefert Bast zu Geweben; Isoloma longiflora Presl., sehr giftige, scharfe Pflanze; Serissa foetida L., deren Samen adstringirend; Kaffeebaum und Theestrauch; Burchellia capensis R. Br., das sogenannte Büffelholz liefernd; Jasminum nudiflorum Sieb., eine Medicinalpflanze Chinas; Olea europaea und fragrans, von letzterer Art werden die Blüthen zum Wohlgeruch des Thees in China verwendet; Cerbera Lactaria Hamilt., sehr giftige Milch enthaltende Pflanze; Allamanda cathartica L., deren Blätter in Guiana purgirend sind; Cithaerexylon quadrangulare Jacq., liefert das weiße Eisenholz oder Geigenholz; Crescentia Cujete L., deren große Früchte im ganzen tropischen Amerika sehr vielfältig benutzt werden; Theophrasta Jussieui L., die Samen dieser in den Sammlungen noch immer ziemlich seltenen, schönen Pflanze werden in Südamerika zu Brot benutzt; Aralia papyrifera Hook., die bekannte Pflanze, deren Mark die Chinesen zur Papierfabrikation verwenden; Illicium anisatum L., Sternanis; I. floridanum L., Surrogat der Caskarille, und I. religiosum Sieb. & Zucc.; Drimys Winteri L., liefert eine vorzügliche Gewürzrinde in Südamerika; Xanthorrhiza apiifolium Herit, gelber Farbestoff; Orocoxylon excelsum Eckl. & Zeyh., das Gelbholz vom Cap; Colletia spinosa Lam., deren Beeren purgirend; Myrtus Ugni Molin und M. Pimenta L., Caeni-

pina Sappan L., Sappanholz oder falſches Sandelholz und mehrere andere. Sämmtliche Pflanzen waren in geſunden und kräftigen Exemplaren vorhanden.

Aus den Gewächshäuſern der Frau Senatorin Jenisch (Obergärtner Herr Kramer) waren herrliche Pflanzen zur Schau geſtellt, unter dieſen 31 Orchideen, nämlich: Anguloa purpurea, Cattleya amethystina, Mossiae, intermedia, die liebliche Acklandiae und die herrliche Skinneri mit 80 Blumen, ein Prachtexemplar; das noch ſeltene und reizend ſchöne Colax jugosa; Calanthe veratrifolia, Epidendrum Hanburi, Gongora atropurpurea, Lycaste aromatica und arom. multiflora, Kefersteinia sanguinea, das wundervolle Odontoglossum naeviem mit 64 Blumen, Ehrenbergii und hastatum; Oncidium ciliatum, Papilio limbatum und sanguineum, die hübſchen Trichopilia marginata β gloxiniaeflora und suavis, das reizend hübſche Rhynchostylis praemorsa Bl. (Saccolabium) mit 4 ſchönen Blüthenrispen und Rh. guttatum, Bolbophyllum Hénshallii, das ſchöne Selenipedium caudatum und Brassavola Cebolleta, die herrliche Laelia purpurata var. praetexta, Cyrtochilum flavescens, Dendrobium macranthum und das eigenthümliche Nanodes discolor.

Nächſt dieſen Orchideen waren untermiſcht mit Blattpflanzen aufgeſtellt 25 Stück indiſche Azaleen, unter denen mehrere ſehr ſchöne Sorten, als: A. pelargoniaeflorum, Iveriana, alba delicatissima, Etandart de Flandre, belle Jeanette, petuniaeflora, Martha u. a.

Unter den buntblättrigen Pflanzen zeichneten ſich durch Schönheit und vortreffliche Kultur am meiſten aus: Aphelandra Leopoldi, ein ſchönes Exemplar mit 2 Blüthenrispen, Begonia Rex, ſehr ſchön, die lieblichen Anectochilus argenteus (Physurus pictus β bolargyreus), cordatus Hort. (setaceus Bl.), pictus (Physurus), Lobbianus Pl. (Roxburghii Lindl.), Lowii Hort. (Cheirostylis marmorata) und striatus, Macodes Eldorado, ein ſchönes Exemplar von Cissus discolor, Caladium discolor, pictum, agyrostigma und marmoratum; Eriocnema aenea marmorea, Haemaria discolor rubro-venia; Lecheria magnifica, Maranta micans und variegata, Sonerila margaritacea und marg. superba, Senecio Farfugium (Farfugium grande), Pandanus javanicus fol. variegat. u. a. m. Außerdem ſahen wir noch: Aechmea fulgens, Laportea crenulata, eine neue hübſche Blattpflanze, und Pinocnecticia glauca, letztere ſtand in der Mitte eines runden Tiſches, umgeben von zwanzig und einigen ſehr ſchönen im üppigſten Kulturzuſtande befindlichen und ſehr reichblühenden Gloxinien. Ein Näſchen mit in Flottbeck gezogenen Vanille-Früchten fand allgemeine Bewunderung.

Aus dem Garten des Herrn Dr. Abendroth ſahen wir diesmal nur wenige Pflanzen, unter dieſen Clianthus puniceus, mehrere Cytisus, einige hochſtämmige Roſen, merkwürdiger Weiſe die einzigen auf der Ausſtellung, obgleich zwei Prämien dafür ausgeſetzt waren, Edwardsia microphylla, Azaleen und Cinerarien.

Die Herren James Booth & Söhne hatten diesmal mehrere ausgewählte Collectionen aus ihren reichhaltigen Sammlungen aufgeſtellt. So eine Collection Schaupflanzen des Kalthauſes, faſt ſämmtlich Prachtexemplare in ſchönſter Blüthenfülle, dann eine Sammlung ganz vorzüglicher Blattpflanzen und eine Sammlung ausgezeichnet ſchöner Pflanzen

mit bunten Blättern, darunter viele Neu- und Seltenheiten, und endlich eine Collection ſchöner Orchideen.

Die Sammlung der Kalthauspflanzen beſtand aus 2 Pultenaea subumbellata, 2 Eriostemon nerifolium, E. cuspidatum und intermedium, 2 Diosma microphylla, alba und Ventenantiana, Aphelexis humilis, purpureo-macrantha, 2 Epacris miniata, grandiflora und onosmaeflora, Hardenbergia longiracemosa und andaramensis, Erica elegans, Podolobium staurophyllum und Cytisus Attleanus. Von dieſen Pflanzen hatte faſt eine jede einen Durchmeſſer von 2—3 Fuß und eine faſt gleiche Höhe und war in ſchönſter Blüthenfülle. Zu bedauern iſt es, daß eben ſolche Pflanzen nicht frei nebeneinander aufgeſtellt werden können, in welchem Falle ſie ſich um ſehr vieles ſchöner präſentiren, als wenn ſie dicht aneinander zu einer Gruppe vereint ſind.

Unter den Blattpflanzen war es die Theophrasta imperialis, welche am meiſten hervortrat und einen impoſanten Anblick gewährte, aber auch Theophrasta minor, latifolia, macrophylla und Jussieui, wie Stadtmannia australis, de Jonghii, Fraserii und integrifolia zeichneten ſich durch prächtige Blattformen aus, denen dann wieder die von uns öfters genannten Rhopala-Arten würdig zur Seite ſtanden. Sämmtliche bis jetzt bekannte Arten dieſer Gattung haben die Herren Booth & Söhne aufzuweiſen und waren davon 14 Arten incl. zweier unbeſtimmten ausgeſtellt. Von Aralia Sieboldii präſentirte ſich ein Prachtexemplar, auch von Tacca pinnatifida, Croton discolor und Hippomane speciosa, ſah man Exemplare in vorzüglicher Kultur.

Ein großer runder Tiſch enthielt eine Collection von gegen 40 verſchiedenen Pflanzen mit bunten Blättern, welche der Obergärtner Herr Boyſen, wie die zuerſt genannten Gewächſe aus den Flottbecker Baumſchulen, mit vielem Geſchmack arrangirt hatte. Das Mittelſtück dieſer Gruppe bildete ein äußerſt ſtattliches Exemplar des unübertrefflich ſchönen Cyanophyllum magnificum, dieſe Pflanze war unſtreitig die Krone der ganzen Ausſtellung und wurde einſtimmig als die ſchönſte Pflanze erklärt, ſowohl in Bezug auf ihre eigene Schönheit, wie in Bezug auf ihren Kulturzuſtand. Prächtig war aber auch noch Campylobotrys argyroneura, dann C. discolor, Sonerila margaritacea, Maranta pulchella, fasciata und regalis, Phrynium pumilum und zebrinum, Cassignea borbonica, ſehr ſchön, Pavella borbonica, Yucca gloriosa fol. var., Aristolochia leuconeura. Die neuen Chantin'ſchen Caladien, wie mehrere ältere Arten gefielen ungemein, namentlich Caladium argyrites, Chantinii, Verschaffeltii, Brongnartii, Neumanni und argyrospilum, wie dann noch die älteren, aber deshalb nicht weniger zu empfehlenden Arten, als: Cal. picturatum, bicolor splendens, haematostigmum und marmoratum. Die von Herrn Linden ſo eben erſt ausgegebenen drei neuen Begonien ſahen wir hier zum erſten Male lebend. Unſtreitig iſt die B. argentea die ſchönſte von dieſen, dennoch ſcheinen uns die Blätter nicht ſo weiß, als ſie in der Abbildung angegeben ſind, die beiden anderen ſind hübſch, aber kommen der viel verbreiteten B. Rex nicht gleich und werden dieſe drei Arten ſchwerlich ein ſolches Glück machen als die B. Rex. Neben dieſen Neuheiten waren in ſchönen Exemplaren vorhanden: B. Lazuli, Miranda, Mad. Wagner, splendens argentea, xanthina marmorea und Reichenheimi, latimaculata picta und annulata (Griffithii). Senecio

Farfugium (Farfugium grande), wie Hortensia japonica fol. var. fehlten in dieser Sammlung natürlich auch nicht.

Es bleiben nun noch die Orchideen übrig anzuführen, welche die Herren J. Booth & Söhne aus ihrer Sammlung eingesandt und zur Schau gestellt hatten; es waren: Acanthophippium bicolor, Cattleya Skinneri, Trichopilia coccinea und gloxiniaeflora, Vanda insignis, Rhynchostylis retusum (Saccolabium), die schöne Vanda teres, Cypripedium barbatum und barb. superbum, Calanthe Massuca, Coelogyne Lowii Paxt. oder richtiger asperata Lindl. und zwei neue Arten, Epidendrum armeniacum, leucochylum und variegatum. Sobralia macrantha und mac. β pumila (humilis Hort.), Oncidium sphacelatum und ampliatum, Cyrtochilum stellatum, Odontoglossum nebulosum, Bolbophyllum Henshallii, Brassia Josstiana und Bifrenaria atropurpurea, sämmtlich in reicher Blüthenfülle.

Zu erwähnen wäre endlich noch ein gedrungenes blühendes Exemplar der Meyenia erecta und eine Bromeliaceae, vermuthlich eine neue Billbergia.

Die Herren J. H. Ohlendorff & Söhne hatten einen großen Tisch mit sehr schönen Blattpflanzen und Pflanzen mit bunten Blättern aufgeziert. Sämmtliche Pflanzen zeugten von einer vortrefflichen Kultur, wie sich denn auch sehr seltene Arten unter denselben befanden. So sahen wir hier wieder die schöne Aralia Sieboldii und papyracea, Panax frutiosa, Rhopala corcovadensis, de Jonghii und magnifica, Pandanus reflexus, japonicus fol. var. und den noch schöneren P. albus; Sciadophyllum pulchrum und farinosum, Caulea floribunda, Rhodea marginata, Terminalia angustifolia, Seaforthia elegans, Carludowica humilis und mehrere bekanntere Arten in schöner Kultur, wie mehrere Dracänen. Unter den buntblättrigen Pflanzen Begonia Rex, die jetzt unvermeidliche, Xanthosoma versicolor fol. varieg., Campylobotrys argyroneura, Aspidistra punctata, Maranta bicolor und zebrina, Begonia annulata und Reichenheimii, Tradescantia discolor lineata, Croton variegatum, Yucca aloifolia fol. varieg., Phrynium pumilum, Pavetta borbonica, Senecio farfugium und Maranta borussica, nur wenig oder gar nicht verschieden von M. fasciata. — In der Mitte der Gruppe stand ein herrliches Exemplar der Dracaena arborea vera.

Die Herren P. Smith & Co. hatten einen kleinen Tisch mit zwei neuen strauchigen Calceolarien, als: Calc. Dr. Lawington und Prinz Napoleon, die sehr hübsch waren und 15 recht hübschen Cinerarien besetzt, es waren die Cinerarien Magna, Flora Mc Ivor, Amy Robsart, Catharina Hayes, Optima, Cerito, Carminata, Beauty, Duke of Cambridge, Mrs. Gerard Leigh, Rosy Morne, Admiral Dundas, Beauty of St. Johns und Admiral Lyons besetzt. Außer diesen war noch ausgestellt die sehr hübsche und empfehlenswerthe großblumige Bellis perennis fol. variegatis.

Herr Friedr. Pabst, Handelsgärtner, hatte nur indische Azaleen geliefert, in mittelgroßen, sehr reich blühenden und gut gezogenen Exemplaren, es waren: Napoleon, Exquisite, Prinz Albert, Baron Hügel, Friedrich August, Bettina, Princeps, Cornelia, Gabriele, alba grandiflora, lactea grandiflora, purpurea superba, Königin Maria, Optima, amaranthina, decora, Elvina und Rosa perfecta.

Herr Handelsgärtner Szirovi hatte außer einigen Azaleen 25 Stück ganz vorzüglich gezogener Myrthenorangen-Bäumchen in Blüthen-knospen und Früchten ausgestellt, die man so leicht in solcher Vollkommenheit nicht wieder finden dürfte.

Herr Kunst- und Handelsgärtner C. H. Harmsen, der Matador unter unseren Blumisten, hatte sich diesmal sehr reich an der Ausstellung betheiligt und waren es ganz besonders seine Azaleen, die wir seit langer Zeit nicht in so herrlicher Blüthenfülle gesehen haben, auch wohl schwerlich anderwärts schöner gesehen worden sind. Die Exemplare waren größtentheils niedrige mit breiten flachen Kronen und so blüthenreich, daß im wahren Sinne des Wortes kein Blatt an den Pflanzen zu sehen war. Es waren im Ganzen 52 Töpfe in 41 Sorten, nämlich: Exquisite, Martha, Gledstanesii, Verschaffeltii, alba delicatissima, variegata, Susanna, alba striata, Napoleon, Baron Hügel, Bella, rosea-punctata, princeps, Prince Albert, cuprea elegans, Rosetta, decora, Boeckmanni, alba, Elvira, Hammonia, lateritia elegans, lactea floribunda, Saturna, Adelaide, Grandville, Apollo, Göthe, Roi Leopold, Herzogin von Sagan, Heloise, Mad. Lamorcière, Beauté de l'Europe, Reine des Belges, Numph, Favorite, Desdemona, Fenela, nitida, robusta, refulgens und alba multiflora. Außer diesen prachtvollen Azalen waren noch in blühenden Exemplaren aufgestellt: Rhododendron arb. coccineum, Deckerianum, Exquisitum, hybridum, Lady Molly, Reichenbachianum und splendidissimum, Rhod. azaleoides, Vervaeneanum fl. pl., Queen Victoria und Rhod. (Sikkim) Edgeworthii, herrlich duftend.

Allgemeines Aufsehen erregte ein kaum $^3/_4$ Fuß hohes Exemplar des Viburnum macrocephalum mit einem Blüthenkopf von über $^1/_2$ Fuß im Durchmesser haltend.

Eine von Herrn Hartmsen aufgezierte Blattpflanzen-Gruppe enthielt nur gewöhnlichere Arten, jedoch in gut kultivirten Exemplaren, in Ganzen 22 Stück.

Von vorzüglicher Schönheit waren noch 7 Orangen-Bäumchen in schönster Blüthe, darunter einer mit gefüllten Blumen, und Ceanothus papillosus, sehr reich blühend.

Die Herren Ernst & von Spreckelsen hatten einen Tisch mit hübschen Cinerarien und einen anderen mit Aurikeln bestellt, und

Herr Handelsgärtner Wobbe in Altona hatte eine Sammlung blühender Pflanzen, als Heliotrop, Orangen, Alazien, Azaleen ꝛc. aufgestellt.

Schöne Rhododendron, Varietäten des Rh. maximum in buschigen reichblühenden Exemplaren, Citrus, Dicentra spectabilis und andern Zierpflanzen hatte Madame Meyer, Besitzerin eines schönen Blumengartens in Hamburg, aufstellen lassen.

Von Früchten und Gemüsen sah man leider nur sehr wenig.

Aus dem Garten des Dr. Abendroth waren eingeliefert 1 Körbchen mit Gurken, ein dito mit Carotten und ein drittes mit frischen Aepfeln von sehr gutem Aussehen.

Von der Madame Meyer 6 Töpfe Erdbeeren, Princesse Alice, und 6 Töpfe Erdbeeren, Raseberry, letztere mit nur zu wenigen Früchten, ferner ein mit Blumen, gelben Himbeeren, Erdbeeren, Wein, einigen Kirschen, Orangen und einer Ananas geschmackvoll aufgezierter Korb.

Von dem Gärtner Herrn E. H. Münges im ehemaligen berühmten Steer'schen Garten in Hamm, ein Korb mit neuen Kartoffeln, 2 Töpfe mit sehr reich tragenden Himbeer-Stauden (gelbe) und 6 Töpfe mit Princesse Alice Erdbeeren, sehr schön.

Herr Kunst- und Handelsgärtner Th. v. Spreckelsen hatte ein Körbchen mit abgeschnittenen, sehr schönen Stiefmütterchen und eine Portion des als „vorzüglich schön" anerkannten Rhabarbers „neuer aromatischer" ausgelegt, wie auch die von ihm hier eingeführte Schwefelfackel zum Beschwefeln der von der Weinkrankheit befallenen Weinstöcke und anderen Gewächsen.

Die Herren J. A. Kehr Nachfolger in Hamburg hatten eine große eiserne Laube aufstellen lassen und Herr J. E. R. Waitz hieselbst mehrere zierliche Gartenbänke und Stühle.

Preisvertheilung.

ad 1. Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection Orchideen von 25 Species, den Preis von 30 ℛ, Herrn Kramer, Obergärtner der Frau Senatorin Jenisch, und den Herren J. Booth & Söhne.

ad 2. Für Schaupflanzen des Warmhauses ꝛc. (Nicht eingeliefert.)

ad 3. Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 25 indischen Azaleen in 12 Varietäten den Preis von 25 ℛ, Herrn C. H. Harmsen, Herrn Kramer, Obergärtner der Frau Senatorin Jenisch und F. W. Pabst. (Herrn Harmsen wurde außerdem für die vorzügliche Kultur und außerordentliche Blüthenfülle der eingelieferten Exemplare eine Extra-Prämie von 15 ℛ bewilligt.)

ad 5. Für eine Collection Neuholländer Pflanzen ꝛc.,

ad 6. für eine Collection von 12 Rhododendron arboreum ꝛc., und

ad 7. für eine Collection von 40 Roses remontantes ꝛc., fand keine Concurrenz statt.

ad 8. Für eine Collection schöner Blattpflanzen des Warm- und Kalthauses in 20 verschiedenen Species den Preis von 15 ℛ, Herren J. Booth & Söhne, Herren J. H. Ohlendorff & Söhne in Ham, und Herrn C. H. Harmsen.

ad 9. Für eine Collection von 20 buntblättrigen von einander verschiedenen Pflanzen den Preis von 15 ℛ, Herrn Kramer, Obergärtner der Frau Senatorin Jenisch, Herren J. Booth & Söhne und Herren J. H. Ohlendorff & Söhne in Ham.

ad 10. Für eine Collection von 20 Roses remontantes ꝛc.,

ad 11. für eine Collection von 15 Thee-, Bourbon- und Noisette-Rosen ꝛc., und

ad 12. für eine Collection von 10 Neuholländer Pflanzen fand keine Concurrenz statt.

ad 13. Für 6 schön und reichlich blühende Orangenbäumchen den Preis von 10 ℛ, Herrn C. H. Harmsen, Herrn F. Czirski, und Herrn H. Wobbe.

ad 14. Für Pelargonien ꝛc., und

ad 15. für Zwiebelgewächse ꝛc., fand keine Concurrenz statt.

ad 16. Für eine Collection von schönblühenden Cinerarien in 12 Sorten, den Preis von 8 ℛ, Herrn Müller, Gärtner des Herrn

Dr. A. Abendroth, Herrn Peter Smith & Co. in Bergedorf, und Herrn Ernst & von Spreckelsen.

ad 17. Für Calceolarien, und
ad 18. Für Verbenen, fand keine Concurrenz statt.
ad 19. Für Weintrauben,
ad 20. Für Ananas, und
ad 21. Für Erdbeeren. (Nicht genügend gelöst.)
ad 22. Für Schnittbohnen. (Nicht eingesandt.)
ad 23. Für wohlgezogene Gurken den Preis von 5 ℳ, Herrn Müller, Gärtner des Herrn Dr. A. Abendroth.

Die ausgestellten Früchte genügten den Vorschriften des Programmes nicht, da eines Theils die vorgeschriebene Zahl nicht eingehalten, anderntheils die Früchte nicht den genügenden Grad der Reife und Vorzüglichkeit erlangt hatten; jedoch ertheilte die Administration der Madame Meyer für die ausgestellten Früchte, so wie dem Herrn P. H. Münges, aus der Gärtnerei des Herrn Schlicker in Ham, früher Steer'scher Garten, für 6 Töpfe Erdbeeren und 2 Töpfe Himbeeren einen Anerkennungs-Preis von 8 ℳ.

Ebenfalls wurden den Herren Ernst & von Spreckelsen für eine Collection von etwa 40 vorzüglichen Aurikeln; so wie Herrn Kramer, Obergärtner der Frau Senatorin Jenisch, für etwa 20 treffliche Gloxinien außerordentliche Prämien von 15 ℳ Crt. zuerkannt.

Endlich wurde den Gehülfen unseres botanischen Gartens (welcher auf jede Concurrenz verzichtet hatte), für eine ausgezeichnete Gruppe lediglich officineller Pflanzen, ein außerordentliches Gratial von 25 ℳ Crt. bewilligt.

Hamburg, den 5. Mai 1859.

Alexander von Humboldt.

Von Carl Wach in Hamburg.

Die Familie Humboldt, früher Hombold, wurde zu Ende des 17. oder zu Anfang des 18. Jahrhunderts in der Person des Erdmann Ludwig Humboldt, welcher 1723 als k. preußischer Legationsrath und Amtshauptmann zu Drabheim starb, in den Adelstand erhoben. Der Großvater desselben, Johann Hombold, war 1638 als Bürgermeister zu Königsberg in der Neumark gestorben. Die beiden berühmten Brüder, der Staatsmann, Sprachforscher und Philosoph Carl Wilhelm v. Humboldt (geb. 22. Juni 1767, † 8. April 1835) und der große Naturkundige Friedrich Heinrich Alexander v. Humboldt (geb. 14. September 1769 im Schlosse zu Tegel bei Berlin, † 6. Mai 1859 in Berlin), waren Urenkel des zuvor genannten Erdmann Ludwig. Ihr Vater, Alexander Georg,

diente im siebenjährigen Kriege als Major und Adjutant des Herzogs Ferdinand von Braunschweig und war später Königl. preußischer Kammerherr. Er erwarb die Güter Ringenwalde und Tegel, von welchen das letztere, nahe bei Berlin in schöner Gegend gelegen, als Wohnsitz Wilhelm's v. Humboldt, in der Geschichte des geistigen Lebens der Berliner Kreise einen bekannten Namen hat. In den beiden Söhnen des Staatsministers Wilhelm v. Humboldt lebt das Geschlecht fort. Alexander von Humboldt war nie verheirathet.

Kaum hat, so weit die Geschichte der Menschheit zurückreicht, irgend eine Zeit einen auf so wohlthuende Weise hervorragenden Geist besessen, wie die Gegenwart in Alexander v. Humboldt. In seinem Streben und in seiner Wirksamkeit findet die umfassende Thätigkeit unseres Jahrhunderts auf allen Gebieten der Naturwissenschaften ihren vollen Ausdruck. In einer noch nie gekannten Weise knüpft sich fast an alle naturwissenschaftlichen Errungenschaften der jüngst vergangenen Periode, die sich durch Beseitigung des Autoritätsglaubens auszeichnet, die große Autorität seines Namens. — Hinter dem Greise liegt ein gedanken- und erfahrungsreiches Leben, das ihn in Verbindung mit beinahe allen Theilen der Erde und in Beziehung zu den größten Männern seiner Zeit brachte, und ihn in den Stand setzte, sich die umfassendsten Kenntnisse über den Kosmos zu erwerben, dessen Darstellung er sich zur hohen Lebensaufgabe gemacht hat.

Friedr. Heinr. Alex. v. Humboldt verlor den Vater schon im 10. Lebensjahre. Das hinderte die sorgfältige Ausbildung des Knaben und Jünglings nicht, der sich mit seinem Bruder Carl Wilhelm unter der Leitung tüchtiger Gelehrter und der geistig und gemüthlich hochbegabten Mutter theils zu Berlin, theils auf dem elterlichen Schlosse Tegel für die Universität vorbereitete. Im 18. Lebensjahre bezog er die Universität zu Frankfurt a. d. O., wo er sich mit Pflanzenkunde, dann mit Technologie und alten Sprachen beschäftigte. Schon im nächsten Jahre, 1789, siedelte er auf die Universität Göttingen über, sich dort hauptsächlich den Naturwissenschaften unter Blumenbach, Lichtenberg, Gmelin und Link widmend. Das Erstlingswerk des 21-jährigen Jünglings: „Ueber die Basalte am Rhein, nebst Untersuchungen über Syenit und Basanit der Alten“ (Berlin 1790) war das Ergebniß einer Vergnügungsreise durch den Harz und das Rhönthal. Dann folgte in Gemeinschaft mit dem Weltumsegler Georg Forster eine Reise durch Belgien, Holland, Frankreich und England. Nur kurze Zeit verweilte er auf der Handels-Academie zu Hamburg, um alsdann acht Monate lang auf der Berg-Academie zu Freiberg in Gemeinschaft mit Leopold v. Buch den Unterricht des berühmten Geologen Werner zu genießen. Die Frucht dieses Unterrichts war zunächst sein Buch: Ueber die vorweltlichen Pflanzen, welche zu Freiberg und Umgegend gefunden werden.“ (Berlin 1793.) Schon mit seinem 23. Jahre erhielt er das Amt eines Ober-Bergmeisters am Fichtelgebirge. Seine productive Kraft zeigte sich recht deutlich in den fünf Jahren, während deren er diese Stelle bekleidete. Er stiftete nicht nur eine Bergschule zu Steben, sondern untersuchte auch insbesondere die chemische Zusammensetzung der Grubenwetter, erdachte eine nicht ver-

löschende Grubenlampe und eine Respirationsmaschine. Vor Allem aber regten ihn Galvani's Entdeckungen zum Vergleiche der electrischen Strömung mit derjenigen der Nerven an, so daß er nach Niederlegung seines bergmännischen Amtes das bedeutende physiologische Werk „über die gereizte Muskel- und Nervenfaser" (Berlin 1797—1799) herausgeben konnte. Die in dem Buche befolgte ächt wissenschaftliche Forschungs-Methode, welche bis dahin auf dem Gebiete der Nervenphysiologie so wenig zur Geltung gekommen war, machte das Werk zu einer für alle Zeiten ruhmvollen Erscheinung.

So sehen wir Humboldt schon in dem Zeitraume vom 20.—30. Lebensjahre, bei einem vielseitigen Wissen und rastlosen Streben in außerordentlich mannigfaltiger Thätigkeit, bei der ihn seine gewissenhafte Methode zu arbeiten und seine weise Benutzung der Zeit vor Zersplitterung bewahrte und zur herrlichen Erfüllung großer Aufgaben führte. Eine sorgenfreie Existenz, häufiger Wechsel des Aufenthaltes, innige Beziehungen zu interessanten Kreisen und Lebensverhältnissen, die natürliche Gabe der Darstellung, der sich immer glänzender entwickelnde Sinn für das Schöne und Große in der Natur — das Alles trug dazu bei, dem Wirken des jungen Mannes durch frühzeitig gewordene Lebenserfahrung und Menschenkenntniß, durch sorgfältige Verwerthung schöner Talente schon den Stempel der Reife aufzudrücken. Als ihm die Mutter gestorben, er seine dienstlichen Verhältnisse aufgegeben hatte, besuchte er nach einem kurzen Aufenthalte bei seinem Bruder in Jena, Italien, um die geologische Beschaffenheit der Vulkane zu studiren, stellte dann mit L. v. Buch meteorologische Studien zu Berchtesgaden an, und ging endlich nach Paris. Dort brachte er in Erfahrung, daß die englische Expedition nach Ober-Aegypten, welcher er sich anschließen wollte, nicht zu Stande kam; er reiste deshalb mit dem Botaniker Aimé Bonpland nach Spanien. Mit größter Bereitwilligkeit unterstützte man hier seinen Plan, alle spanischen Besitzungen in Amerika und im indischen Ocean wissenschaftlich zu durchforschen. So trat er mit Bonpland am 5. Juni 1799 seine Reise nach Südamerika an. Mit großer Genauigkeit und Umsicht sammelten Beide einen ungeheuren Wissensschatz, eben so wichtig für die Geographie und Klimatologie wie für Statistik, Ethnographie und Botanik. Nach 5 Jahren, am 3. August 1804, traf Humboldt, reich an naturwissenschaftlichen Sammlungen, zu Bordeaux wieder ein, blieb von nun an bis in das Jahr 1810 fast ausschließlich in Paris, und gab daselbst seine umfassenden Werke heraus, die seinen Ruhm in alle Theile der Welt getragen haben. Eine ostindische Papilionaceen-Gattung widmete Bahl schon 1794 Humboldt's Andenken, weil er ein Jahr früher durch sein „Specimen Florae Freibergensis plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens" und die mit dieser Arbeit verbundenen „Aphorismi ex doctrina Physiologicae chemicae plantarum", sich als einen eifrigen vielseitig gebildeten Botaniker gezeigt hatte. Im Vereine mit seinem berliner Freunde Carl Ludwig Willdenow, dem jene Flora zugeeignet wurde, hatte er dem Studium der einheimischen Pflanzen neben seinen anderweitigen Berufsarbeiten schon früher obgelegen. Während H. auf seiner großen amerikanischen Reise einen bedeutenden Theil des Sammelns und Beschreibens der

Pflanzen seinem Gefährten Aimé Bonpland überließ, verwendete er selbst seine besondere Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse, unter denen die Pflanzenwelt auf dem Erdballe verbreitet ist. Seine Fürsorge erstreckte sich auf die Herausgabe der nach Europa gebrachten Pflanzen, die er in Verbindung mit Bonpland gesammelt hatte. Einen Theil der Sammlung mußte Willdenow in Paris auf seine Veranlassung durchmustern, sie mit den Pariser Sammlungen vergleichen, ein anderer Theil wanderte mit diesem Botaniker zur genaueren Analyse nach Berlin. Durch Willdenow's Tod wurde die Arbeit unterbrochen und Kunth damit betraut, der in Paris längere Zeit unter Leitung des älteren Richard und anderer Pflanzenkundigen das Studium der Botanik auf Humboldt's Veranlassung betrieben hatte und die Bearbeitung von Humboldt und Bonpland's Pflanzen-Sammlungen aus Amerika vollendete. Sie bildet ein Hauptgegenstand der amerikanischen Aequinoctialflora. Humboldt selbst hatte keinen Antheil an ihrer Beschreibung, aber er besitzt das große Verdienst, diese Pflanzenschätze in einer vorzüglichen Bearbeitung den Botanikern zugänglich gemacht zu haben.

Die wissenschaftlichen Hülfsmittel der französischen Hauptstadt, der Verkehr mit den Gelehrten, die mit Humboldt dieselben Gebiete der Wissenschaft bearbeiteten, fesselten ihn jahrelang in Paris. Nach Berlin 1826 zurückgekehrt, hielt er im Winter 1827—28 im 58. Lebensjahre vor einem zahlreichen Zuhörerkreise Vorträge über die physische Beschaffenheit der Erde, welche später bearbeitet als Humboldt's geniales Werk „der Kosmos“ seinen Namen zu einem unsterblichen machten. In diesem vielumfassenden Werke von der Natur, in dem die Leichtigkeit des Verständnisses und Klarheit des Totaleindruckes einzig in seiner Art auftritt, sind die Composition und Gliederung in der Anordnung des Ganzen fast noch bewunderungswürdiger als die Reichhaltigkeit seines Inhaltes. Humboldt's reiches, der Wissenschaft geweihtes Leben, machte sich nach vielen Richtungen hin geltend. Als 1828 die deutschen Naturforscher und Aerzte ihre siebente Jahresversammlung zu Berlin hielten, wurde er und Professor Lichtenstein zum Vorstand gewählt, wo sich sein fördernder Einfluß in der neuen Einrichtung der naturwissenschaftlichen Sectionen besonders Geltung verschaffte. Humboldt eröffnete die Sitzungen durch eine gehaltvolle Rede, worin er über den Geist und den Nutzen der Naturforscherversammlungen sprach. Im Sommer 1829 trat der 60-jährige Mann unter besonderen Begünstigungen der russischen Regierung, welche eine geographische Untersuchung des Uralgebirges wünschte, von Prof. Dr. Ehrenberg und Prof. Dr. Gustav Rose begleitet, seine Reise nach Sibirien und dem kaspischen Meere an, und legte im Laufe eines Jahres einen Weg von beinahe 2900 Meilen zurück. Er schiffte sich mit seinen Begleitern zu Nischnei-Nowgorod auf der Wolga ein, fuhr bis Kasan, zu den tartarischen Ruinen von Bolgari, über Perm nach Jekaterinenburg auf dem asiatischen Abhang des Ural. Dann besuchte die Reisegesellschaft im Laufe eines Monates die inneren und nördlichen Gegenden des Uralgebirges, die reich an Alluvionen, Gold und Platin enthalten; die Malachit-Gruben zu Gumeitschefskoi, den großen magnetischen Berg Blagodad, die berühmten Topas und Beryll

Lager von Murzinsk. Von Jekaterinenburg nahmen die Reisenden ihren Weg über Tiumen nach Tobolsk, über Tara und die Baraba-Steppe nach Barnaul am Oby zu dem malerisch gelegenen See Kolywan und zu den reichen Silbergruben Schlangenberg, Ridbersk und Zyrianowsky, am südwestlichen Abhange des Altai, dessen höchster Gipfel von den Kalmücken Ziktu Gottesberg genannt wird, der fast die Höhe des Pik auf Teneriffa erreicht. Von Ridbersk gingen die Reisenden südlich über Bukhtarminsk an die chinesische Grenze. Um den mongolischen Posten Baty zu besuchen, wurde ihnen die Erlaubniß das chinesische Gebiet zu betreten. Von hier aus nahm die Expedition ihre Tour nach Ust-Kamenogorsk, die sich längs der Steppe der mittleren Kirgisenhorde, über Semipalatinsk und Omsk, über die Kosackenlinie: von Ischim und Tobol nach dem südlichen Ural erstreckte. Die Reisenden begaben sich dann längs diesem Gebirge zu den schönen Brüchen von grünem Jaspis bei Orsk, wo der fischreiche Jaik die Bergkette durchbricht, gingen über Guberlinsk nach Orenburg zu den berühmten Salzminen Iletzki in der Steppe der kleinen Kirgisenhorde zu dem Hauptstationsplatze der uralischen Kosacken, besuchten die deutschen Ansiedlungen in Saratow am linken Wolgaufer, den großen Salzsee Elton in der Kalmückensteppe, und steuerten dann ihren Cours über Sarepta nach Astrachan. Die Hauptzwecke dieses Besuches der Ufer des kaspischen Meeres waren die chemische Analyse seines Wassers, welche G. Rose ausführte, barometrische Höhenmessungen und Sammlungen von Fischen aus jenem Meere für Cuvier und Valenciennes. Von Astrachan kehrten die Reisenden über die Landenge, welche den Don und die Wolga bei Tischinskaja trennt, durch das Gebiet der donischen Kosacken nach Moskau zurück. Im Laufe dieser Reise wurden durch den Grafen von Polier und den Mineralogen Schmidt aus Weimar, der in Nischnei-Nowgorod zu Humboldt's Reisegesellschaft kam, die wichtigen Diamantgruben im Ural entdeckt. Die geognostischen Aehnlichkeiten in der Gebirgsbildung Brasiliens und des Urals hatten Humboldt zu der Ueberzeugung von dem Vorkommen der Diamanten in den Gold und Platin führenden Alluvionen des Urals gebracht. Während das große Ergebniß seiner Reise nach Amerika, die Schöpfung einer neuen Wissenschaft, der Klimatologie und Pflanzengeographie war, hatte die Reise in Asien die Begründung der noch wenig gekannten Lehre vom Erdmagnetismus und der Witterungskunde zur Folge. Für diese Wissenschaften breitete sich auf v. Humboldt's Veranlassung über alle Theile der Erde ein Netz von Beobachtungs-Stationen aus. Während er die reichen Ergebnisse dieser Reise 1830–31 bearbeitete, las er mehrere Abtheilungen seines Berichtes in den Sitzungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und denen des französischen Instituts vor. Eine derselben über die Gebirgssysteme (des Altai, des Tianschan, des Küenlun und des Himalaya) und die vulkanischen Erscheinungen im Innern Asiens wurde in deutscher Sprache gedruckt. Eine reichere Ausbeute erschien unter seiner Aufsicht in den Fragmens de géologie et de climatologie asiatique. 2 Bde. Paris 1831. Deutsch von Löwenberg, Berlin 1832. In dem Werke über Asien von Humboldt, ist das geognostische und physische Gemälde von ihm selbst, die auf chemische Untersuchungen gegründeten mineralogischen

und geognostischen Beobachtungen von Gustav Rose, die botanischen und zoologischen Ergebnisse der Reise von Ehrenberg bearbeitet enthalten. Nebenher blieb dem großen Universalisten noch Zeit, auch als Diplomat im Dienste des Vaterlandes thätig zu sein. Nachdem Humboldt im Jahre 1830 am letzten Reichstage zu Warschau anwesend, während der folgenden 17 Jahre zu sieben verschiedenen Malen mit politischen Aufträgen nach Paris gesendet worden war, auch kleinere Ausflüge nach England und Dänemark unternommen hatte, lebte er nur den wissenschaftlichen Studien obliegend in Berlin. Dem mächtigen Bau seiner naturwissenschaftlichen Thätigkeit gab er von hier aus den würdigsten Schlußstein im Kosmos, diesem Riesenwerke, auf das noch spätere Geschlechter mit der größten Bewunderung blicken werden. Der vierte Band dieser umfassenden Weltbeschreibung erschien erst vor Kurzem im Cotta'schen Verlage. Stuttgart und Tübingen 1848. Das reiche Inhaltsverzeichniß enthält: Einleitung zu den speciellen Ergebnissen der Beobachtungen in dem Gebiete tellurischer Erscheinungen.

I. Abschnitt: Größe, Gestalt und Dichte der Erde. Innere Wärme der Erde. Magnetische Thätigkeit der Erde. Historischer Theil. Intensität. Declination. Polarlicht.

II. Abschnitt: Reactionen des Inneren der Erde gegen die Oberfläche. Erdbeben, dynamische Wirkung, Erschütterungs-Wellen. Thermalquellen. Gasquellen, Salsen, Schlammvulkane, Naphthaquellen. Vulkane mit und ohne Gerüste (Kegel und Glockenberge).

Humboldt's kleinere Schriften enthalten die Umrisse von Vulkanen der Cordilleren von Quito und Mexico, die als Vorarbeiten zu diesem 4. Bande des Kosmos von ihm benutzt wurden, ebenso erschienen früher als dieser Schlußband seine Ansichten der Natur. 2. Bd. Außerdem war er Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften (Hertha).

Durch seine mächtige, ihm bis in das höchste Alter treue Geistes- und Thatkraft, durch seinen unermüdlichen Fleiß in Auffammlung einer Fülle von Kenntnissen, durch seine seltene Klarheit in ideenreicher Verarbeitung des Aufgesammelten, durch die glänzende Entfaltung seines bevorzugten Genius bei Entzifferung der Geheimnisse und Gesetze der Natur, durch den unvergänglichen Werth der von ihm geschaffenen Werke glänzt Humboldt unter den größten Männern unserer Zeit. Die Naturwissenschaften trug er, wie Atlas den Erdball, auf seinen Schultern ein tüchtiges Stück vorwärts, neue Wissenschaften schuf er, viele Wissenschaften brachte er in engste Verbindung mit einander. Seine Naturbetrachtung zeichnet sich besonders durch den Sinn für das gesetzmäßige Zusammenwirken der verschiedensten Einflüsse aus. Diesen Geist, der das im ganzen Reiche der Schöpfung waltende Gesetz zur Geltung kommen läßt, machte er zum herrschenden in der modernen Auffassung der Natur, fortwirkend wird derselbe maßgebend für alle Jahrhunderte sein.

Der preußische Staat und mit ihm die ganze wissenschaftliche Welt haben durch den Tod Alexander von Humboldt's einen unersetzlichen Verlust zu beklagen.

Aimé Bonpland, der Dioskur Alexander von Humboldt's im Reiche der Naturwissenschaft, sollte dem Jugendfreunde die Stätte in den elysäischen Gefilden bereiten. Am 4. Mai 1858 starb Bonpland in demjenigen Theile des Continents, welchen beide zuerst gründlich wissenschaftlich durchforschten, auf seiner Besitzung St. Anna in der südamerikanischen Provinz Corrientes, ein Jahr später folgte Humboldt dem Rufe in die Ewigkeit.

Einem unvergleichlich wirkungsreichen und ausdauernden Leben, das bis zum höchsten Greisenalter in unverwelkter Geistesfrische strahlte, wurde nach rastloser Thätigkeit ein für die Nachbleibenden wie für die Wissenschaft immer noch zu frühes Ziel gesetzt. Der Hochgefeierte verschied am 6. Mai, Nachmittags 2½ Uhr eines sanften Todes, nachdem er mehrere Tage krank darnieder gelegen, im 90. Jahre seines Alters. Er ist mit der freudigen Genugthuung dahingegangen, noch in seinen letzten Lebensjahren das größte seiner Werke, die naturwissenschaftliche Darstellung des Weltalls, als die Frucht der umfassendsten Forschungen, zur Vollendung gebracht zu haben. Seine Nichte, Frau Ministerin Freiin von Bülow, geborene von Humboldt, und sein ihm seit 50 Jahren befreundeter Neffe, der General der Cavallerie von Hedemann, waren an seinem Lager, als er seinen hohen Geist aushauchte. Seine Neffen, zwei Herren von Humboldt, waren aus Schlesien herbeigeeilt, um ihn in seinen letzten Tagen noch zu sehen. Die Prinzessin Karl von Preußen erschien noch am Abend seines Todes im Trauerhause, ebenso Se. K. Hoheit der Prinz-Regent. Beide höchste Personen verweilten längere Zeit in tiefer Bewegung am Sterbebette des Dahingeschiedenen.

Die sterblichen Ueberreste Alexander von Humboldt's waren am 8. Mai in einem eichenen Parade-Sarge, umgeben von Topfgewächsen, in seinem Bibliothekzimmer zu Jedermanns Ansicht ausgestellt. Dem verehrten Todten wurde an seinem Sarge manche Thräne geweint, die Verehrung Einzelner ging so weit, daß sie des großen Mannes Hände und Wangen küßten. Mit welcher unendlichen Herzensgüte und thatkräftigen Hülfe Humboldt, ohne Unterschied, Jedermann entgegentrat, davon sind tausend Beweise bekannt. Während Humboldt sich schon auf seinem Krankenlager und in hohem Grade leidend befand, ließ sich ein Bildhauer aus St. Petersburg vorstellen, welcher die Büste Humboldt's nach einer Photographie modellirt hatte und von ihm mit großer Freundlichkeit empfangen wurde. Der dem Tode Geweihte gab dem Künstler, so schwer es ihm auch wurde, dennoch einige schriftliche Zeilen der Empfehlung mit seinem Siegel versehen mit auf den Weg, welche Beweise der Liebe von dem Künstler mit thränenden Augen entgegen genommen wurden. Seine Empfehlung hatte so manchem Genie die Bahn gebrochen.

Alexander von Humboldt hatte unlängst dem Hofmaler Prof. Hensel zur Zeichnung seines Porträts für das Album des Künstlers gesessen und schrieb mit Bleistift, außer seinem Namen, den Sinnspruch aus Dante's Purgatorio XXXIII, 4.: „Viver ch'é un correre à la morte“ (Leben ist nur Eilen zum Tode) darunter. Das Brustbild ist so gelungen, daß auf Wunsch Humboldt's für hohe Personen einige Photographien davon genommen wurden. Der Maler Michaelis hat

eine Zeichnung Humboldt's auf seinem Sterbelager verfertigt, ebenso ist die Todtenmaske in Gyps durch den Bildhauer Glaeser abgenommen.

Schon im vorigen Jahre hatte von Humboldt es schriftlich ausgesprochen, daß er in diesem Jahre sterben werde; seine trübe Ahnung sollte sich erfüllen.

Am 10. Mai Morgens hat Berlin der irdischen Hülle Alexander's von Humboldt, des Ehrenbürgers der Welt, das Geleite in den Dom gegeben und seinen palmenumzweigten Sarg an den Stufen des Altars hingestellt, an welchem der Abgerufene vor fast neunzig Jahren das Bad der Taufe empfing. Von dort wurde er nach Tegel geführt und in der Familiengruft beigesetzt, wo die Ueberreste Wilhelm's des noch lange nach ihm zum Stolz seines Jahrhunderts in rüstiger Wirksamkeit auf Erden gebliebenen Bruders harrten. Einfach und schlicht in seiner äußeren Entfaltung, drückte der Leichenzug desto gewichtvoller seine Bedeutung durch die Anwesenheit der Vertreter des geistigen Lebens aller Kreise aus. In dem weltbekannten Arbeitszimmer, wo man den Verfasser des Kosmos sitzen zu sehen pflegte, stand der einfache Eichensarg unter grünen Gewächsen, zugänglich für Jeden, der sich den Eindruck dieser Geisteswerkstatt bewahren wollte. Aus den Häusern hingen Trauerfahnen, der Trauerflor rankte sich von Fenster zu Fenster. Als der Sarg von k. Dienern auf den Wagen gehoben war, intonirte die Trauermusik den Choral. Die Umgebung des Wagens bildeten Studenten mit grünen Palmenzweigen in den Händen. Die übrige Studentenschaft zog, von Marschällen geführt, voraus, eine Andeutung, daß hier ein Fürst der Wissenschaft zu Grabe gehe. Die zahlreich anwesende Geistlichkeit führte der General-Superintendent Hoffmann. Dann folgten als Träger der irdischen Ehrenzeichen der Kammerherr Graf von Fürstenberg-Stammheim, assistirt vom Kammerherrn Grafen Taczanowski und begleitet von den Kammerjunkern Grafen von Dönhof und Freiherrn von Zedlitz; sie trugen auf rothen Sammetkissen die Ordenssterne, welche die Brust des großen Heimgegangenen zierten. Hinter dem Sarge gingen die nächsten Leidtragenden, geführt von Rittern des Schwarzen Adler-Ordens. Die schönste Entfaltung des feierlichen Zuges fand auf dem Opernplatze statt. Man erblickte zunächst hinter dem Sarge die beiden Neffen des Heimgegangenen, die Söhne Wilhelms, die Rittergutsbesitzer von Ottmachau und Friedrichseck in Schlesien, geführt von dem Fürsten von Salm-Horstmar und dem Feldmarschall Freiherrn von Wrangel. Der General von Hedemann, Tochtermann Wilhelm's, wurde vom Fürsten Wilhelm Radziwill und dem General Grafen von der Gröben begleitet. Neben Herrn von Bülow, dem Enkelsohn Wilhelm's, gingen der General von Neumann und Fürst Adolf Hohenlohe. Es folgten die Spitzen der Staats-Verwaltung, die Generalität und die Würdenträger des Hofes in Gala, die Mitglieder des Herrenhauses und des Hauses der Abgeordneten in sehr zahlreicher Vertretung, denen sich, gleichfalls in Gala-Uniform, die Räthe der Ministerien und die Directoren der Anstalten für Kunst und Wissenschaft anschlossen. Was die preußische Hauptstadt an berühmten und gefeierten Persönlichkeiten auf denjenigen Gebieten des Lebens, die der Pflege seiner höchsten Güter gewidmet

sind, zu seinen Mitbürgern zählen darf, Alle hatten sich eingefunden, Ihm die letzte Ehre zu erweisen. So erblickte man unter Vorausschreitung der Stadtdiener die Repräsentanten der Stadt, den Ober-Bürgermeister und Bürgermeister mit dem Fürsten Bogislav von Radziwill in ihrer Mitte, gefolgt von dem ganzen Magistrat und den Stadt-Verordneten, mit dem Amtszeichen der goldenen Kette geschmückt, umgeben von Marschällen, welche schwarzbeflorte weiße Stäbe trugen. Dann folgte das sämmtliche Lehrerpersonal aller Schulen. Ihnen schloß sich eine große Anzahl von Männern aus allen Ständen der Bevölkerung an. Auch bemerkte man den nordamerikanischen Gesandten mit je einem Vertreter der nordamerikanischen Staaten, die aus verschiedenen Plätzen des Continents herbeigeeilt waren. Selbst Afrika und Asien hatten ihre Vertreter. Auf der Freitreppe des Gotteshauses erwarteten den Trauerzug Se. K. Hoheit der Prinz-Regent, die Prinzen Friedrich Wilhelm, Albrecht, Vater und Sohn, Georg, Adalbert, Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen, der Erbprinz von Sachsen-Meiningen und der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen. Vor dem Haupt-Portal der Domkirche angekommen, wurde der Sarg von den K. Hof-Lakaien heruntergehoben und auf die Estrade vor den Altar gestellt. Ebendahin geleiteten die höchsten und hohen Herrschaften die Leidtragenden. Vier silberne, reichflammende Kandelaber umstanden den Sarg. Zu seinen Füßen und zu beiden Seiten standen Tabourets, auf welche die Ordenskissen niedergelegt wurden, neben denen sich die Träger derselben aufstellten. Der Altarraum grünte im Laube hochragender Cypressen und Palmen, zwischen denen die Kerzen erglänzten, in ihrer Mitte das goldene Bildniß des Erlösers am Kreuze. Zu Häupten des Sarges auf den Stufen des Altars war die Geistlichkeit versammelt. Im Halbzirkel gegenüber dem Sarge standen die beiden Neffen und der Enkel, in ihrer Mitte der General von Hedemann, rechts von ihm Se. K. Hoheit der Prinz-Regent, links von der Familie Prinz Friedrich Wilhelm, hinter ihnen die übrigen anwesenden prinzlichen Herrschaften, so wie die Ritter vom Schwarzen Adler-Orden. Zu Seiten des Sarges nahmen rechts vom Altare die Minister, höheren Staats-Beamten und vornehme Fremden, ihnen gegenüber links vom Altare die Mitglieder der Akademie und der gelehrten Körperschaften ihren Platz. In der Prinzessinnen-Loge links vom Altare befanden sich JJ. KK. HH. die Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm, die Frau Prinzessin Karl und die Frau Prinzessin Anna von Hessen; in der anstoßenden Loge die verwittwete Frau Ministerin von Bülow, die Tochter Wilhelm von Humboldt's. Das sehr zahlreich vertretene diplomatische Corps hatte eine Loge auf der Tribüne rechts vom Altare eingenommen. Die Trauer-Versammlung erfüllte das Schiff und die Chöre des Domes. Die kirchliche Feier wurde durch den Gesang der Gemeinde: „Jesus meine Zuversicht“ eröffnet. Der General-Superintendent Hof- und Dom-Prediger Dr. Hoffmann, den der Verewigte selbst aufgefordert, hier und in Tegel das Wort des Herrn an seiner Leiche zu reden, trat auf die Estrade und sprach: „Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben,“ welches von dem Halleluja des Chors beantwortet wurde. Dann folgte die gehaltvolle und warme Rede des Geistlichen. Der Redner hob hervor, wie dieser universelle Geist, dessen sterbliche Reste

man umstand, nicht nur die allgemeinste Achtung, sondern auch die allgemeinste Liebe der Mitwelt theilte, der Liebe, die nur durch Liebe gewonnen wird. In scharfer und lebendiger Charakteristik wurde ein Bild seines reichen Lebens und Wirkens gegeben, worin auch die Mittheilung über die letzten Tage und das Verscheiden nicht fehlten, welche man bei den Lieblingen der Menschheit so gern genau und ausführlich vernimmt. Der Redner schloß mit der Hindeutung darauf, wie der Verstorbene „mit jener Liebe im Herzen, die sich wie ein blauer Himmel über seine wissenschaftlichen Anschauungen wölbte," vor allem auch die sittlichen Interessen der Culturwelt umfaßt und die erkannten Wunder der physischen Welt in Demuth vor denen der geistigen nicht vergessen habe. „Seine Liebe soll bei uns bleiben, als die Liebe, welche Alles glaubt und Alles hofft; die Liebe hört nimmer auf." Chor und Gemeinde sangen das Amen nach dem Segen und der Domchor schloß mit dem herrlichen Choral: „Christus, der ist mein Leben!" —. Während die Orgelklänge in einem feierlichen Nachspiel austönten, legten die Jünger der Wissenschaft ihre grünen Palmenzweige um den kleinen Schrein, der den vergänglichen Theil des Mannes birgt, welcher mit seinem unvergänglichen Wesen den Erdball umspannte.

Alexander von Humboldt, dessen sterbliche Ueberreste in einer Weise bestattet worden sind, wie sie in diesem Glanze und in dieser allgemeinen Theilnahme nicht häufig in Bezug auf einen Mann der Wissenschaft in den Jahrbüchern der Geschichte verzeichnet ist, hat seine Bibliothek und seinen schriftlichen Nachlaß der Königl. Bibliothek vermacht. Vermögen hinterläßt der große Todte nicht. Die vorgefundene Baarschaft würde, wie man sagt, nicht einmal hingereicht haben, die Begräbnißkosten zu bestreiten. Die großartige Bestattung in wahrhaft fürstlicher Weise hat auf Anordnung des Prinz-Regenten stattgefunden. Die Haltung der Bevölkerung bei der Leichenfeier drückte sich in der Verehrung für den Dahingeschiedenen dadurch aus, daß sie das Haupt entblößte, als der Königl. Leichenwagen mit dem einfachen Sarge vorüberzog. Eine feierliche Stille herrschte überall, wo der unabsehbare Zug sich bewegte.

Alexander von Humboldt's Kammerdiener wird Castellan eines K. Schlosses werden. Schon Friedrich Wilhelm III. hat dies so bestimmt. J. Seiffert, der 33 Jahre hindurch sein treuer Pfleger und Reisebegleiter gewesen, ist in dem Besitze einer gerichtlichen Schenkungsurkunde, Inhalts deren demselben alle Prätiosen, Gold- und Silbersachen, Betten, Wäsche, kurz das gesammte Mobiliar zugewendet worden sind. Ausgenommen sind die ungedruckten Manuscripte und einige Gegenstände, die dem Verewigten aus den höchsten Kreisen schenkungsweise überkommen sind, wie z. B. die Büste des Königs und dergleichen. Ueber diese letzteren hat er mittelst kleiner Zettel, deren Befolgung nach dem Inhalte der Schenkungs-Urkunde zu Gunsten befreundeter Personen stattfinden soll, besondere Dispositionen getroffen. Unter den ungedruckten Manuscripten befindet sich ein vollendetes geographisches Werk. An baaren Geldern und geldwerthen Papieren sind nur 400 und einige Thaler vorhanden gewesen. Von diesen hatte der Verstorbene, der eine Pension vom Staate bezog, bereits bei Lebzeiten 400 Thaler seinem alten Diener mit der schriftlichen Ermächtigung,

damit die Kosten seines Begräbnisses zu bestreiten, überlassen. Die ihm aus aller Herren Länder zugeströmten Orden fanden sich ungeordnet in einem ziemlich vernachlässigten Schrank aufbewahrt. — Das Haus, Oranienburgerstraße 67, worin Alexander von Humboldt lebte und starb, zählte insofern schon zu den historischen Häusern der Residenz, als es früher dem Vater des Dichters Theodor Körner, des Sängers des Befreiungskrieges, gehörte. Jetzt ist es im Besitz des Banquiers Mendelssohn. Als Zierde soll es eine Gedächtnißtafel mit v. Humboldt's Namen erhalten. Die Stadt Berlin wird ihm ein Denkmal setzen.

Am 11. Mai, Morgens um 10 Uhr, fand im Schloßgarten zu Tegel in der von Humboldt'schen Familiengruft die Beerdigung Alexander's von Humboldt statt. Es hatten sich im Schlosse Tegel die nächsten Freunde des Verewigten eingefunden, um seine sterblichen Ueberreste zur letzten Ruhestätte zu geleiten. Dieses Trauergefolge wurde von der Familie des Verstorbenen empfangen. Auch die Behörden und Corporationen waren vertreten. Bald nach 10 Uhr wurde der mit Blumen reich geschmückte Sarg in den von 4 Pferden gezogenen Leichenwagen gehoben. Von da ab begab sich der Trauerzug von dem Schlosse durch die Linden-Allee nach jener in dem Schatten dichter Tannen belegenen berühmten Fürstengruft in folgender Ordnung: voraus schritt die Schuljugend des Dorfes Tegel, welche Palmzweige trug, hierauf folgten der General-Superintendent Hoffmann mit den Pfarrern der nächstgelegenen Dörfer, demnächst ein starkes Musik-Corps und diesem der Leichenwagen, umgeben von der Dienerschaft des Verstorbenen und der Familie desselben, dicht hinter dem Leichenwagen schritten die Leidtragenden und zwar zunächst die Frau Staatsminister von Bülow, geführt von dem Fürsten Wilhelm Radziwill, mit ihren Kindern und Enkeln, daran schlossen sich der General von Hedemann, die Freiherren Herrmann von Humboldt, Sohn, und Wilhelm von Humboldt, Enkel Wilhelm's von Humboldt, und der Hauptmann von Loën. Endlich folgten die übrigen im Trauerhause erschienenen Personen und eine große Anzahl von Landleuten aus Tegel und der Umgegend. Unter den Tönen des Chorals: „Alle Menschen müssen sterben", begab sich dieser Zug zur Begräbnißstätte. Nachdem die Schuljugend die letzten Verse des Chorals gesungen, hielt der General-Superintendent Hoffmann die Rede. Darauf folgte das Gebet und der Segen. Mit dem von dem Musik-Corps geblasenen Choral: „Jesus meine Zuversicht", schloß die Feier. Jeder der Anwesenden beeilte sich, als letztes Liebeszeichen eine Hand voll Erde auf den Sarg zu streuen.

In der Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Berlin vom 7. Mai widmete Carl Ritter den unsterblichen Verdiensten A. v. Humboldt's herzliche Worte; nach ihm sprach der Gesandte der Ver. Staaten von Nord-Amerika, um den Dank zu bekunden, den auch die neue Welt dem großen Manne schuldet.

Durch Kais. Decret vom 9. Mai hat der Kaiser Napoleon die Errichtung einer Statue zum Andenken an Alexander von Humboldt in den Gallerien des Schlosses von Versailles befohlen. Der Bericht des Staatsministers Fould an den Kaiser lautet: „Sire! Der Tod des

Herrn von Humboldt ist ein trauriges Ereigniß für die gelehrte Welt; aber nach Deutschland, zu dessen höchsten Berühmtheiten Herr von Humboldt gehörte, findet sein Verlust in Frankreich den schmerzlichsten Wiederhall. Dieses Genie hat in unserer Mitte viele Jahre zugebracht, unsere berühmtesten Gelehrten waren seine Mitarbeiter; er hat seine wichtigsten Werke in französischer Sprache herausgegeben. Er gab für unser Land eine solche Sympathie und Anhänglichkeit zu erkennen, daß er fast unser Landsmann geworden war. Ich schlage Ew. Majestät vor, das Andenken des Herrn von Humboldt durch eine seiner würdige Anerkennung zu ehren und zu beschließen, daß seine Statue in den Gallerien von Versailles aufgestellt werde. So wird der Tod ruhmvolle Männer, die seine Bewunderer und seine Freunde waren, nicht trennen."

Frankreich ehrt sich selbst, indem es das Standbild eines der größten Männer unsers Jahrhunderts in den Gallerien von Versailles aufstellt. Humboldt's Verdienste um die Wissenschaft und für den Fortschritt sind für alle Nationen gleich fruchtbringende. Er erkannte sie von der höchst cultivirtesten bis zur geistig am schwächsten entwickelten alle als Verbrüderte und Gleichberechtigte an. Er sagte es selbst: „Es giebt bildsamere, höher gebildete, durch geistige Cultur veredelte, aber keine edleren Volksstämme. Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt; zur Freiheit, welche in roheren Zuständen dem Einzelnen, in dem Staatenleben bei dem Genuß politischer Institutionen der Gesammtheit als Berechtigung zukommt." Wenn wir eine Idee bezeichnen wollen, die durch die ganze Geschichte hindurch in immer mehr erweiterter Geltung sichtbar ist, wenn irgend eine die vielfach bestrittene, aber noch vielfacher mißverstandene Vervollkommnung des ganzen Geschlechtes beweist, ist es die Idee der Menschlichkeit: das Bestreben, die Grenzen, welche Vorurtheile und einseitige Ansichten aller Art feindselig zwischen die Menschen gestellt, aufzuheben, und die gesammte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und Farbe, als einen großen nahe verbrüderten Stamm, als ein zur Erreichung eines Zweckes, der freien Entwicklung innerlicher Kraft, bestehendes Ganzes zu behandeln, das letzte äußerste Ziel der Geselligkeit (Kosmos Bd. I, S. 385—386). „Wo Wissenschaft und industrielle Künste in regem Wechselverkehr miteinander stehen, werden die Staaten in erneuerter Jugendkraft vorwärts schreiten. Wo unter dem Schutze weiser Gesetze und freier Institutionen alle Blüthen der Cultur sich kräftig entfalten, da wird im friedlichen Weltkampfe kein Bestreben des Geistes dem andern verderblich." Wo aber die Freiheit vernichtet, Legionen von Volksschaaren im verderbenbringenden Kriege aneinander gehetzt werden, da stocken Wissenschaft, Künste, Handel, Gewerbe und Ackerbau, da ist die Fortentwicklung der Nationen gehemmt, und ihr Weheruf verfolgt als rächende Nemesis den Urheber dieser störenden staatlichen Verhältnisse. Humboldt starb zu einer Zeit, wo der Blick des greisen Staatsmannes, des Nestors der Naturwissenschaft, mannigfach durch die europäischen Wirren der Gegenwart getrübt wurde. Auch er hatte neben den höchsten Tributen der Huldigung, von den Vorurtheilen und der Intoleranz unserer Zeit unverdiente Schmähungen und Kränkungen zu erdulden, welche mit ihrem Gifthauche die letzten Lebens-

jahre des Fürsten der Wissenschaft mannigfach verbitterten; doch ihm galten Wissen und Erkennen als Freuden und Berechtigung der ganzen Menschheit, als Theile des National-Reichthums, die oft ein Ersatz sind für die Glücksgüter, welche die Natur dem Einzelnen in allzu kärglichem Maße gespendet hat. Humboldt ist gestorben, aber sein Geist, fortzeugend in seinen Werken, wird als die Frucht seines Wirkens noch nach Jahrhunderten die Entwicklung des Menschengeschlechtes auf der Bahn des Fortschrittes vorwärts treiben.

Unter den in Paris erschienenen Werken des Baron Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt sind bemerkenswerth:

Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum per decursum annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab Alex. de Humboldt, astronomice observatorum. Calculo subjecit Jabbo Oltmanns. Lutet-Parisiorum. F. Schoell, 1808, in 4 de 16 pag.

Distributione de geographica plantarum, secundum cocli temperiem et altitudinem Montium, Prolegomena. Aeced. tabula aenea Parisiis, Schoell, 1817, in 8.

Essai geognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. Strasbourg, Lévrault, 1823 et 1826, in 8.

In deutscher Sprache: Versuch über die Lagerung der Gebirgsarten, bearbeitet von Karl Cef. Ritter von Leonard. Straßburg, Levrault, 1823, in 8.

Essai politique sur l'Ile de Cuba avec une carte et un supplément, qui renferme des considérations sur la population, la richesse territoriale et le commerce de Archiple, des Antilles et de Columbia. Paris, Smith; Gide fils; Jul. Rénouard, 1826, 2 vol. in 8 avec une carte. Diese Abhandlung ist ein Auszug aus Humboldt und Bonpland's Reise in Amerika.

Dieselbe Arbeit erschien im Spanischen als: Ensayo politico sobre la isla de Cuba, traducid al castel, por D. J. B. de V. Y. M. Con un mapa. Paris, J. Rénouard, 1827, in 8.

Evaluation numérique de la population du nouveau continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiômes. Paris, impr. de Dondey Dupré, 1825, in 8 de 8 pag.

Expériences sur le Galvanisme, et en général sur l'irritation des fibres musculaires et nerveuses; (ins Deutsche übertragen von Grävel, mit Beiträgen von J. F. N. Jadelot, Arzt). Paris, Fuchs, 1799, in 8 avec pl.

Lignes (des) isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe. . . .

Nivellement barométrique, fait dans les régions équinoxiales du nouveau continent, en 1799—1804, par Alex. de Humboldt. Toutes les mesures ont été calculées par M. Oltmanns, d'après la formule de M. Laplace et le coëfficient barometrique de M. Ramond. On y a ajouté au nom des hauteurs mesurées quelques observations physiques et géologiques. Paris, 1809, in 4. Auszug aus dem 4. Theil der Reise Humboldt's und Bonpland's.

Observations sur quelques phénomènes peu connus qu'offre le goître sous les tropiques, dans les plaines et sur les plateaux des Andes. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1824, in 8 de 12 pag.

Rapport verbal fait à l'Académie roy. des sciences: séance du 9 mai 1825, sur le „Tableau des corps organisés fossiles“ par M. Defrance. Paris, de l'impr. de Fain, 1825, in 8-de 4 pag.

Rapport verbal sur la Flore du Brésil meridional, de M. Aug. de Saint-Hilaire, fait à l'Académie des sciences, sa séance du 19 septembre 1825. Paris, de l'impr. de Belin, 1825, in 4 de 4 pag.

Rapport fait à l'Académie des sciences (séance du 19 janvier 1824) sur l'Atlas de M. Bruée. Paris, de l'impr. de Crapelet 1826 in fol. de 2 pag.

Sur la variation du Magnéstisme terrestre à différentes latitudes 1804 in 4 Fig. (avec M. Biot.)

Tableaux de la nature, ou Considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, et sur les cataractes de l'Orénoque, sur la structure, et l'action des volcans dans les différentes régions de la terre. Ins Deutſche übertragen von J. B. B. Eyriès. Paris. F. Schoell 1802 2 vol. in 12 v.

Eine neue von Humboldt revidirte und verbeſſerte Auflage hiervon erſchien 1826 in Deutſchland.

Voyage dans l'intérieur de l'Amérique dans les années 1799 à 1804, par M. M. le Baron Alex. Humboldt, Aimé Bonpland. (Jobbe Oltmanns et C. S. Kunth) Paris. Schoell Dufour, et autres, 1807 et ann. suiv. 11 vol. in 4 et 17 gr. in fol. dont 4 d'atlas.

Le même voyage (Sec. ovit). Paris 1809 et ann. suiv. 7 vol. in 4 et 22 in 8.

— 1°. Voyages aux regions équinoxiales Vol. I—XII. Paris, Gide fils. 1815 et ann. suiv. 12 vol. in 8. — Vues des Cordillères et Monuments des peuples indigènes de l'Amerique. Paris 1816 2 vol. in 8 ornés de 19 pl. dont plusieurs color.

Daſſelbe Werk erſchien in ſpaniſcher Sprache: Viage a las regiones equinocciales del nuevo continente hecho en 1779 hasta 1804; com mappas geograficos y fisicos. Vol. I—V. Paris, Rosa 1826, 5 vol. in 8.

— 2°. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Paris, Schoell 1811. 5 vol. in 8 avec une carte et une coupe; edit. Paris, A. A. Renouard 1825—26, 4 vol. in 8.

— 3°. Nova Genera et Species plantarum quas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt descripserunt partim adumbaverunt A. Bonpland et Alex. de Humboldt, e schedis autographis Amati Bonplandi ordinem digessit C. S. Kunth. Paris, Fr. Schoell, 1815 et ann. suiv. 7 vol. in 4.

A. v. H. Examen critique de l'histoire de la geographie du nouveau continent et des progrès de l'astronomie nautique au 15. 16. siècles. 5 vol. Paris 1836—39. Mit Karten.

A. v. H. Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée. 3 vol. Paris 1843. Mit Karten.

Literatur.

Von Wredow's Gartenfreund, (9. Auflage) welches vortreffliche Gartenbuch wir bereits mehrere Male ausführlich besprochen haben, ist unlängst die 7. Lieferung erschienen, der nun auch sehr bald die achte Lieferung folgen dürfte, welche das so nützliche Buch complet macht. Wir machen nochmals alle Blumen- und Pflanzenfreunde wie Gärtner auf dasselbe aufmerksam, da es für Jeden ein nützlicher Rathgeber in Gemüse-, Obst- und Blumengarten, in Wohnzimmern und Gewächshäusern ist.

Der Hausgarten in Stadt und Land, leichtfaßliche Anleitung zum Gartenbau für Besitzer städtischer und ländlicher Hausgärten. Von Fr. B. Hoffacker. 3. u. 4. Heft. Mit 78 Holzschnitten. Preis für 4 Lief. 17½ sgr. = 1 fl. Lahr. J. H. Geiger. 1859.

Im vorigen Hefte machten wir die geehrten Leser unserer Zeitung auf die ersten beiden Lieferungen dieser kleinen Schrift aufmerksam, von dem uns jetzt die beiden letzten Lieferungen vorliegen. Wir empfehlen diese Schrift nochmals ganz besonders allen Besitzern städtischer und ländlicher Hausgärten, dieselben finden in diesem Buche eine leicht faßliche Anleitung zur Anlage und Pflege der Hausgärten in Städten und auf dem Lande. Der Verfasser hat von den sogenannten Luxus-Gärten ganz abstrahirt und nur die Anlage und Pflege von eigentlichen Nutz-Gärten ins Auge gefaßt. Mit Hülfe dieses Buches wird jeder unkundige Gartenbesitzer und Gartenfreund sich in allen vorkommenden Lagen und Verhältnissen zu helfen wissen.

E. D—o.

Der rationelle Pflanzenbau von J. G. Meyer. V. Theil, oder „die landwirthschaftlichen Nutz- und Handelspflanzen. Ihre Kultur, Eigenschaften, Nutzen und Anwendung mit besonderer Berücksichtigung auf die neuesten, ertragreichen und werthvollsten landwirthschaftlichen Producte, nach den neuesten Entdeckungen, Verbesserungen und dem Fortschritte der gegenwärtigen Zeit zur practischen Nutzanwendung. Für Landwirthe, Gärtner, Gutsbesitzer, Gärtnerlehranstalten, landwirthschaftliche Fortbildungs- und Landschulen. II. Abth. C. Specielle Pflanzenkultur. Lexikonformat, Erlangen 1859. Ferd. Enke.

Der Herr Verfasser hat sich durch die Herausgabe der ersten 4 Bände seines „rationellen Pflanzenbaues“ (I. die Lehre von der Entwässerung des Bodens (Drainirung), II. Populäre practische Geometrie und die Guts-Taxation; III. Bodenkunde und Düngerlehre, IV. Die landwirthschaftl. Nutz- und Handelspflanzen a) die Lehre von der Bearbeitung des Bodens und b) allgemeine Pflanzenkultur) in der Gartenliteratur einen bedeutenden Ruf erworben und haben die bereits erschienenen Bände dieses Werkes sich der wohlverdienten Anerkennung von Seiten der Gärtner, Landwirthe und dahingehörenden Lehranstalten zu erfreuen.

Der Inhalt des jetzt erschienenen V. Theils geht schon aus dem

Titel desselben hervor, dieser Theil behandelt nämlich die landwirthschaftlichen Nutz- und Handelspflanzen, deren Kultur, Eigenschaften, Nutzen und Anwendung auf eine sehr deutliche und leicht fassliche Weise. Um diese Pflanzenarten nach einer gewissen Ordnung aufzuführen, hat der Verfasser sie eingetheilt in: Hackfrüchte, wohin die Kartoffeln, Kohlsorten, Helianthus tuberosus, Apios tuberosa, Dioscorea Batatas etc. gerechnet sind, dann in Körnerfrüchte, als: alle Getreidearten mit ihren Varietäten, in Hülsenfrüchte, wie Phaseolus, Pisum, Ervum, Vicia, Lupinus etc. und endlich in Futterpflanzen, wozu mehrere Arten von Trifolium, Medicago, Melilotus, Astragalus, Poa, Holcus, Avena, Agrostis, Zea, Polygonum, Brassica etc. etc. gehören. Schliesslich bespricht der Verfasser noch eine sehr beträchtliche Anzahl Arten von technischen Pflanzen und sind diese eingetheilt in a) Oelgewächse, b) Gespinnpflanzen, c) Farbepflanzen, d) Gerbepflanzen, e) Fabrikpflanzen und f) Gewürzpflanzen. Ein fast 20 Seiten starkes Inhaltsverzeichniß läßt die gesuchte Pflanzenart, über die man Auskunft zu haben wünscht, mit Leichtigkeit auffinden. Die Pflanzenarten sind außer mit ihrer lateinischen Benennung, auch noch mit den verschiedenen deutschen Benennungen aufgeführt und bei den meisten ist auch noch die französische, englische, italienische und andere Bezeichnung hinzugefügt. — Die einzelnen Arten einer jeden Gattung sind kurz, in deutscher Sprache beschrieben, dann folgt deren Kultur, Eigenschaften, Nutzen und Anwendung. Wir halten diesen Theil des gesammten Werkes für einen sehr nützlichen und wollen dasselbe hiermit zur Beachtung Vieler bestens empfohlen haben.

E. D—o.

Feuilleton.

***Imantophyllum miniatum** Hook., eine erst seit wenigen Jahren in den Handel gekommene Zierpflanze, steht gegenwärtig in dem Etablissement der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne zu Ham bei Hamburg in Blüthe. Da diese Art viel schöner ist, als das allgemein bekannte und stets gern gesehene Imantophyllum Altonii Hook., als Clivia nobilis Lindl. noch bekannter, so ist es zu bewundern, daß diese Pflanze nicht schon allgemeiner geworden ist. Der Blüthenschaft erreicht eine Höhe von fast 1 Fuß und trägt eine Blüthendolde von 12—15 gestielten, dunkel orangerothen Blumen, die bei völliger Entwickelung oft 3 Zoll im Durchmesser halten.

Schöner noch als diese Art ist das von Herrn Van Houtte gezüchtete ganz neue, noch hoch im Preise stehende I. cyrtanthiflorum, ein Blendling zwischen I. Altoni und I. miniatum. Herr Van Houtte erhielt diesen Blendling dadurch, daß er den Blumenstaub der I. Altonii auf die Narbe des I. miniatum übertrug.

Bei Erwähnung des I. cyrthanthiflorum von Herrn Professor Koch in der „Wochensch. für Gärtnerei und Pflanzenk.“ No. 17 heißt es, daß der Gattungsname richtiger Himantophyllum geschrieben werden

müsse, denn der Riemen heißt nämlich im Griechischen Himas und nicht Imas.

---

* **Cycas revoluta.** Ein Prachtexemplar dieser so beliebten Cycadee befindet sich in der rühmlichst bekannten Treibgärtnerei des Herrn G. Geitner zu Planitz, welches derselbe vor einiger Zeit importirt hat. Das Exemplar hat eine Stammhöhe von 8 Fuß und hält der Stamm am unteren Ende 18 und am oberen Ende noch 12 Zoll im Durchmesser und ist kerzengerade. Als Herr Geitner diese Pflanze erhielt, wog sie ohne Wurzeln und ohne Wedel 6 Centner. Gegenwärtig ist das Exemplar im Treiben begriffen und zeigen sich neben dem Haupttriebe oben am Kopfe noch acht ganz kleine Triebe. Der Preis dieses Cycas ist auf ca. 700 ℛ gestellt.

---

* **Garcinia Mangostana.** Die Mangostane der Malayen. Dieser tropische Baum liefert eine Frucht, die der Ananas an Feinheit des Geschmackes nicht nachstehen soll. Die Blume ist ähnlich einer einfachen Rose und die Frucht hat die Größe einer Orange. In einigen Privatgärten Englands hat dieser Baum öfters Früchte zur Reife gebracht, weniger ist uns dies in deutschen Gärten bekannt und freut es uns mittheilen zu können, daß in Herrn Geitner's Treibgärtnerei zu Zwickau ein 10 Fuß hohes buschiges Exemplar mit 13 Früchten geschmückt steht.

Personal-Notizen.

Die durch den Tod des bisherigen Hofgärtners Herrn Carl Knicke erledigte Leitung der Verwaltung der Gräflichen Gärten zu Stolberg-Wernigerode ist dem Hofgärtner **H. Fintelmann** übertragen worden.

Der Betrieb der dortigen Gärtnerei wird in keiner Weise eine Aenderung oder Störung erleiden, sondern vielmehr in ausgedehnterem Maßstabe den Anforderungen der Zeit entsprechend fortgeführt und erweitert werden.

Der bisherige Stellvertreter der Gräflichen Gärten Herr **Scharrer** ist mit der Correspondenzführung beauftragt.

Correspondenz-Notizen.

E. C. in A. Ihr geehrtes Schreiben nebst Anlage vom 24/3 erhielt ich am 11/5. Ich danke Ihnen bestens und würden Sie mich zu großem Dank verpflichten, wenn Sie mir auch ferner dergleichen Mittheilungen zukommen lassen wollten. Die gewünschten Farrn-Samen sollen Ihnen werden und habe ich bereits angefangen zu sammeln.

R. — Entin. Das Uebersandte richtig erhalten und angenommen, bei etwas mehr Zeit brieflich ausführlich.

Ein neues Verzeichniß der verkäuflichen **Gewächshauspflanzen, Staudengewächse, Bäume und Gesträuche des botanischen Gartens zu Hamburg** ist erschienen und wird auf Verlangen **franco** zugesandt.

Hamburg, Mai 1859.

Eduard Otto,
Inspector.

Russische Gärtnerei.

Im Februar-Heft der „Hamburger Garten- und Blumenzeitung“ gaben wir eine oberflächliche Beschreibung der Gärtnerei des Herrn von Potemkin zu Abrotschne und erwähnten zugleich der vielen und mannigfachen Schwierigkeiten, die dem Gärtner in Nord- und Mittel-Rußland die Ausübung seines Faches erschweren; vielleicht wird es nun für einige Leser nicht ohne Interesse zu hören sein, auf welche Weise man diese Hindernisse zu beseitigen und die Gefahren von den Pflanzen abzuhalten sucht; welche Mittel man anwendet, um das, was das Klima Einem versagt, durch Kunst, Nachdenken und Arbeit zu ersetzen.

Der Hauptfeind des Gärtners ist die Kälte; diese muß vor allen Dingen abgehalten werden; werfen wir also zuerst einen Blick auf die Gewächshäuser, um uns mit ihrer Lage, Bauart und Heizung bekannt zu machen. Die beste Lage, die man den Gewächshäusern hier geben kann, ist gegen Süd-Süd-Ost, da man vor allem darauf bedacht sein muß, während der 7 Wintermonate die Licht- und Sonnenstrahlen so viel wie möglich aufzufangen; man baut deshalb meistens Satteldächer und bildet die vordere aus einem Fundament, auf welchem aufrecht stehende Fenster angebracht werden, an die sich dann das Dach in einem Winkel von 50—60° anschließt. Doppelfenster sind natürlich unerläßlich; indessen werden die äußeren Rahmen so breit gemacht, daß sie über den Sparren zusammenstoßen, weil man auf diese Weise der Luft den Eingang erschwert; doch dürfen sie nicht genau aneinander passen, damit sie theils Platz genug behalten, um sich bei der mit strenger Kälte abwechselnden Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen zu können, theils damit man die Fugen calfatern kann. Dies besteht in dem Einstampfen von Heede und einem aus Kuhhaaren verfertigten Stoffe in die Fugen der Fenster, denn nie würde ein Zimmermann, besonders ein Russe, so genau arbeiten, daß die Rahmen so dicht schließen, wie man es durch das Calfatern erreicht. Mit Laden werden nur die Obsttreibereien gedeckt, da man auf diesen natürlich kein Doppelglas anbringen darf. — Die Mauern der Gewächshäuser haben eine Dicke von drei Ziegelsteinen-Länge, ohne dies würde der Frost durchdringen und sich Eis an der inneren Seite der Wände ansetzen. Es ist demgemäß ein bedeutendes Quantum von Material zum Bau erforderlich und die Kosten eines Gewächshauses sind bedeutend; ein solches ca. 60 Fuß lang und 20 Fuß breit kostet immerhin 2000 Rubel Silber. — Die Heizung besteht, wie schon früher erwähnt, in Canälen, die ebenfalls sehr dick aufgeführt werden, die Seiten aus sogenannten Brandmauern, die Deckung aus einer Steines-Dicke. Diese Canäle werden mit Holz geheizt, und zwar beginnt man damit, je nachdem die Witterung und die Jahreszeit, um 2, resp. 3 und 4 Uhr Nachmittags. Das Holz verbrennt sehr rasch;

in 2 Stunden sind die Kohlen ausgebrannt und man schließt den Ofen durch ein Schott. Nun erst fängt er an zu heizen. Die Steine wurden durch die rasche Hitze des Holzfeuers stark erwärmt und da der Schornstein jetzt geschlossen, strahlt diese bedeutende Steinmasse alle Wärme ins Gewächshaus. Natürlich hält dies sehr lange vor, so, wie ein Jeder weiß, die in Deutschland gebräuchlichen Kachelöfen, einmal ordentlich erwärmt, ein geräumiges Zimmer 24 Stunden warm halten. Dasselbe ist hier der Fall. Man heizt nur einmal in 24 Stunden. Bei Eintritt des Abends und der strengeren Kälte, die er mit sich bringt, fängt der Ofen an seine Hitze von sich zu geben und diese genügt bis zum Nachmittage des folgenden Tages, wo dann der auf der andern Seite gelegene Canal geheizt wird; denn da man täglich nur einen Ofen heizt, so wechselt man mit den zweien, die sich in jedem Gewächshause befinden, ab. Sollte dennoch ein sehr kalter Wind die Temperatur zu tief sinken machen, so öffnet man eine in der Mitte des Canals zu diesem Zweck angebrachte Thür, und die ganze Wärme strömt aus dieser heraus. Zwischen je zwei Gewächshäusern befindet sich gewöhnlich ein Schauer, in welchen die Oefen liegen; diese sind also vollkommen im Schutz und die Vertiefungen, in denen sie sich befinden, dem Zuschneien nicht ausgesetzt, außerdem gewährt es aber den Vortheil, daß die kalte Luft beim Oeffnen der Thüren nicht so unmittelbar in die Gewächshäuser eindringt. Uebrigens hält man die Häuser während des Winters hier nicht sehr warm. + 10° R. in den Warmhäusern, + 2—3° in den Kalthäusern ist ihre höchste Temperatur, und die Pflanzen befinden sich ausgezeichnet dabei; besonders den Palmen scheint diese mäßige Wärme sehr zuzusagen; sie bauen sich kräftig und gedrungen und conserviren ihre Wedel viel länger, als wenn man sie im Winter durch übermäßige Wärme und Feuchtigkeit in die Höhe treibt, wie dies in einigen Gärten Deutschlands der Fall ist. Die Kalthauspflanzen werden im Sommer ins Freie an einen geschützten Ort gebracht, doch darf man hiermit nicht eher wie in der letzten Hälfte des Monat Juni anfangen; Mitte August muß man sie aber schon wieder hineinnehmen, so daß ihnen also nur zwei Monate zum Reifen ihres Holzes bleiben. Dann muß man mit der größten Sorgfalt darauf sehen, daß die Pflanzen nicht wieder an zu treiben fangen; dies ist in Deutschland gefährlich, hier aber ohne Zweifel verderblich. Die Erde, die man anwendet, darf ja nicht zu schwer sein, da viel darauf ankommt, daß sie möglichst rasch austrocknet; humusreicher Torf, wenig Rasenerde und viel Sand bildet in verschiedenen Zusammensetzungen, ab und an mit ein wenig Mist oder Lauberde vermischt, die Composition, deren man sich gewöhnlich bedient. So viel über die Cultur der Gewächshaus-Pflanzen.

Wenden wir uns zu den Sommergewächsen, die hier in Rußland mit ungleich größerer Mühe erzogen werden als bei uns. Man säet den Samen gegen Ende des Monats März in Töpfe und stellt ihn in ein 5—8° warmes Gewächshaus; hier keimt er bald und erreicht rasch die hinreichende Größe, um wieder in Töpfe piquirt werden zu können; aus diesen wird dann jede einzelne Pflanze in einen Topf gesetzt (von denen man dann manchmal 8—10,000 hat) und im kalten Kasten gehalten bis sich die Knospen zeigen. Dann bringt man die Pflanzen auf die für sie bestimmten Beete, doch kann dies ebenfalls nicht eher geschehen

hon als Mitte Juni, da man vor dieſer Zeit nicht vor Froſt geſichert iſt. Eben wegen dieſes ſpäten Hinausbringens muß man die Pflanzen erſt ſo lange in Töpfen cultiviren, bis ſie faſt in Blüthe ſind, ſonſt würden ſie erſt im Herbſt, wenn bald der Froſt wieder eintritt, anfangen zu blühen. Auf dieſelbe Weiſe muß man mit manchen Gemüſen verfahren, wie z. B. Artiſchocken, Blumenkohl ꝛc., alles Arbeiten, die viel Zeit und Mühe erfordern und von deren Nothwendigkeit man ſich in Deutſchland keinen Begriff macht.

Georginen werden ebenfalls erſt in Töpfen zur Blüthe gebracht und dann auf die Gruppen gepflanzt, wobei man allerdings den Vortheil hat, daß man ſie gleich in hübſcher Farbenzuſammenſtellung arrangiren kann. Auch die Baumſchulen erfordern eine weit größere Sorgfalt als bei uns, doch kann man nicht ſagen, daß die Mühe, die man auf ſie verwendet, unbelohnt bleibt. Man zieht z. B. Apfelwildlinge in einem Jahre zu der Stärke, daß ſie veredelt werden können und zwar geſchieht dies auf folgende Weiſe. Im Monat November werden die Kerne in Käſten geſäet, im Februar wieder in Käſten piquirt; aus dieſen kommen ſie dann Ende Mai ins freie Land, wo ſie bis zum Herbſt bleiben; diejenigen, auf welche man franzöſiſche oder kurz ſolche Sorten pfropfen will, die der Kälte nicht widerſtehen, alſo für die Obſtorangerie beſtimmt ſind, werden nun in Töpfe gepflanzt und im Januar gepfropft, worauf ſie im nächſten Sommer wieder in die Schulen kommen. Diejenigen, welche im Lande blieben, werden im Frühjahre gepfropft oder im Sommer oculirt.

Auf dieſe Weiſe iſt hier ſchon in 5 Jahren eine mehrere Tonnen große Apfel-Schule gebildet, da man aus Mangel an Platz natürlich nicht zu viele Sorten veredeln darf, und es ſtehen jetzt ſchon wieder 20,000 junge Stämmchen bereit, die auf den Monat Mai hoffen, um dann ihre Kräfte im freien Grunde zu ſtärken. Birnen ertragen den Winter hier nicht, eben ſo wenig Pflaumen und von Kirſchen nur einige wenige ſchlechte Sorten. Für Kirſchen hat man hier ein eigenes Haus eingerichtet, wo die Bäume im freien Grunde ſtehen. Im Winter wird das Haus mit Laden gedeckt und dann dieſe und die Seiten mit einer 4—5 Fuß dicken Strohſchicht umgeben, die bei kräftigem Froſt mit Waſſer getränkt eine herrliche Schutzwehr gegen die Kälte bildet. Zum Mai nimmt man die Deckung fort, ſpannt Filet-Netze über die Oeffnungen und erntet auf dieſe Weiſe die ſchönſten Kirſchen. Geſträuche und Bäume werden ebenfalls meiſtens in Töpfen veredelt und dann zum Frühjahre ausgepflanzt, viele jedoch muß man immer in Töpfen cultiviren. Manche halten nur unter einer ſtarken Deckung im Freien aus, andere wieder ganz ohne Schutz, wie z. B. Syringa, Symphoria, Caragana, Lonicera u. A. Cytisus wollen ſorgfältig bedeckt ſein, ebenſo manche Crataegus, ebenſo Aesculus, Fagus, Salix, Spiraea ꝛc.; alle Roſen, ausgenommen die pimpinellblättrigen, ſo daß ein ruſſiſcher Park in ſeinem Winterkleide ganz eigen ausſieht. Hohe, magere Geſtalten ragen uns von allen Seiten entgegen und ſehen in ihren grauen Schilf- und Strohkleidern eher traurigen Geſpenſtern als lieblichen, zierlichen Pflanzen gleich. Und dieſen öden Anblick genießen wir hier volle ſechs Monate, denn jetzt, im Anfang April nach ausländiſcher Rechnung, wo dort der junge Frühling ſchon ſein leiſes Weben und Wirken wieder

anfängt und Einem die Berichte, wie's in den südlichern Ländern schon Alles treibt und sproßt, mit einer gewissen Wehmuth erfüllen, sind wir hier noch im tiefen Schnee begraben und müssen noch fast zwei Monate auf den ersehnten Frühling warten. Kommt er dann endlich, so dauert er 14 Tage, um rasch der brennenden Sonnenhitze Platz zu machen, die dann, nachdem sie das junge Laub seiner zarten Jungfräulichkeit, die Sträucher ihrer Blüthen und die Erde ihres frischen Rasens beraubt hat, ihrerseits eben so schnell vorüber eilt, um den Herbststürmen und den frühen Frösten nur wenig mehr zu zerstören übrig zu lassen.

Das ist das Loos des Gärtners in diesem Theile von Rußland, ein fortdauernder Kampf mit den Einflüssen der Witterung, ein Kampf auf Leben und Tod, in dem Manche ermüden, Andere aber überwinden und dann mit um so größerer Liebe und so größerem Stolze auf ihre Schützlinge herabschauen, für deren Wohl sie sich oft den brennenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, manche kalte Winternacht durchwacht und manchem Schneesturm Trotz geboten haben.

C. Clauſſen.

Einige Pflanzen zu Einfassungen.

In jedem Frühjahre sind die Nachfragen nach Pflanzen zu Einfassungen der Blumenbeete und Rabatten an der Tagesordnung, aber nie ist hier ein größerer Begehr nach denselben gewesen, als in diesen beiden letzten Frühjahren, denn die anhaltende Dürre der Jahre 1857 und 1858 hat in den meisten Gärten um Hamburg und vermuthlich auch an andern Orten unter sämmtlichen Einfassungen von perennirenden Gewächsen eben solche Verheerungen angerichtet wie auf den Staudenquartieren. Die Zahl der im Laufe des Winters 1857/58 und des Sommers 1858 in Folge der Dürre eingegangenen Staudenarten beläuft sich allein im botanischen Garten zu Hamburg auf nahe an 500, gleiche Klagen gingen uns aber auch aus anderen Gegenden zu und es werden Jahre vergehen, ehe die verloren gegangenen Arten wieder ersetzt sein werden. Es ist eigenthümlich, wie spurlos manche Art, die 15—20 Jahre gedauert hat, verschwunden ist.

Sämmtliche Saxifraga, die allerdings hier im Garten einen ihnen nicht geeigneten Standort haben, sind total vertrocknet, ebenso sind die Einfassungen von Aurikeln, Primeln, Bellis perennis, selbst Nelken fast ganz verschwunden, diese lassen sich jedoch sehr bald wieder durch neue Aussaat heranziehen und ersetzen.

Um mehreren an uns ergangenen Anfragen wegen passender und theils dauernder Pflanzen zu Einfassungen entgegenzukommen, wollen wir hier einige wenige namhaft machen, die wir bestens empfehlen können und die unsers Erachtens nach viel zu wenig zu Einfassungen verwendet werden.

Die beliebtesten Einfassungen, die man deshalb auch am meisten findet, sind immer noch die von Bellis perennis fl. pl., mehrere Saxi-

fraga-Arten, namentlich S. umbrosa, Vinca minor, Dianthus plumarius u. a., welche Pflanzen jedoch faſt ſämmtlich den Nachtheil haben, daß ſie auslaufen und eine ſchlecht ausſehende Einfaſſung bilden. Vinca minor bildet eine ſehr ſchöne Einfaſſung, jedoch nur um große Beete oder zur Begränzung von kleinen Gebüſchpartheien, die Pflanze liebt Schatten und gedeiht unter Bäumen vortrefflich.

Eine ſehr hübſche Einfaſſung bildet ferner das Sisyrinchium anceps Lam.; die feinen gras- oder ſchilfartigen Blätter werden ungefähr 4—5 Zoll hoch und blühen die Pflanzen außerdem auch noch ſehr dankbar mit hübſchen blauen Blumen. Die Pflanzen laſſen ſich vielfältig theilen und in ein Paar Jahren kann man in den Beſitz von ſehr vielen Pflanzen gelangen.

Oxalis tetraphylla Cav., esculenta Lk. & Otto und O. Lasiandra Zucc. bilden die ſchönſten Einfaſſungen während des Sommers um nicht zu kleine Beete. Die Zwiebeln dieſer Sauerklee-Arten halten jedoch nicht im Freien aus und müſſen jedes Frühjahr gelegt und im Herbſte, wenn das Kraut abgeſtorben iſt, wieder aus der Erde genommen werden. Bekanntlich treiben die Zwiebeln dieſer Arten während des Sommers oft mehrere Zoll lange Waſſerrüben ähnliche Wurzeln, die in Mexico gegeſſen werden ſollen. Beim Herausnehmen der Zwiebeln im Herbſte läßt man dieſe Rüben an den Zwiebeln ſitzen, wirft ſie auf einen Haufen an einem trocknen Ort oder thut ſie in einen großen Topf. Nach Verlauf einiger Wochen fangen die Rüben an zu verfaulen und müſſen ſie dann von den eigentlichen Zwiebeln abgelöſt werden. Iſt dies geſchehen, ſo bewahrt man die Zwiebeln an einem trocknen Orte bis zum Frühjahre auf. — Dieſe Oxalis vermehren ſich ungemein ſtark und da ſie ſich auch ſehr bequem und leicht überwintern laſſen, ſo ſind ſie nicht nur eine ſehr hübſche, ſondern zugleich auch eine ſehr billige Einfaſſung.

Eine nicht minder hübſche Einfaſſung liefert ein anderes Zwiebelgewächs, nämlich der Zephyranthes candida Herb. Die Zwiebeln dieſer Pflanze werden Ende Mai gelegt, ungefähr 1—2 Zoll von einander entfernt. Die ſchmalen, pfriemenförmigen, dunkelgrünen Blätter zeigen ſich bald und bilden eine ſehr hübſche Einfaſſung, die dann noch durch die vielen während des Sommers erſcheinenden Blüthen der Pflanze gehoben wird. Die Blätter bleiben bis zum Eintritt des Froſtes im Herbſte grün, zu welcher Zeit die Zwiebeln dann aufgehoben und in trocknen Sand oder Erde eingeſchlagen und im Keller oder in einer ähnlichen Räumlichkeit überwintert werden. Die Zwiebeln ſetzen ungemein viel Brut an und vermehren ſich auf dieſe Weiſe ſehr ſtark. —

Eine ſehr dauerhafte und hübſche Einfaſſung giebt das Omphalodes verna, namentlich an etwas feuchteren und ſchattigeren Stellen, denn große Trockenheit iſt dieſer Pflanze auch nachtheilig, wovon jetzt Beweiſe vorliegen, indem faſt ſämmtliche Einfaſſungen verſchwunden ſind, ſowohl ältere als friſch angelegte, reich gedüngte. Bei dieſer Gelegenheit möchten wir noch bemerken, daß gerade von denjenigen Staudenarten die meiſten zurückgegangen ſind, die im Frühjahre 1858 umgelegt wurden; Dünger und gute Miſterde, die den Stauden gegeben wurde, vermochte nicht die Pflanzen vor der Dürre zu ſchützen, überhaupt hat der Dünger auf einem total ausgetrockneten Boden wenig oder keinen Nutzen.

Außer den erwähnten Pflanzen giebt es noch viele, die sich zu Einfassungen verwenden lassen, die meisten sind jedoch hinlänglich bekannt, so z. B. eine Menge von Sommergewächsen; wir beabsichtigten auch nur auf einige wenige Arten aufmerksam zu machen, die wohl werth sind, eine größere Verwendung zu erhalten.

Wirkung des tropischen Klimas auf Pflanzen der gemäßigten Zonen.

Von Sir Robert Schomburgk, Englischem Consul auf San Domingo.*)

Frei nach der Flore des serres etc. von H. Roese, Hofgärtner in Eutin.

Die nachstehenden Notizen, welche die Flore des serres etc. aus dem „Journal der Gartenbau-Gesellschaft in London“ entnommen hat, scheinen uns geeignet, sie auch unseren Lesern mitzutheilen. Man hat so viel von der Acclimatisation von Gewächsen in Ländern, die von denen verschieden sind, welche die Natur ihnen angewiesen hat, gesprochen, und so Viele halten sie noch für möglich, daß es gut ist, ihnen die Beobachtungen vor Augen halten zu können, die vor wenig Jahren zu San Domingo ein Botaniker gemacht hat, dessen richtiges Urtheil und dessen physiologische Kenntnisse nicht an seinen Schlüssen zu zweifeln erlauben. Man wird daraus ersehen, daß es den Pflanzen aus kälteren Ländern eben so wenig möglich ist, im tropischen Klima zu gedeihen, als denen der tropischen Zone, sich an kältere Klimate zu gewöhnen. Dieser Beobachter ist Sir Robert Schomburgk, welcher sich als Botaniker durch seine Entdeckungen in Engl. Guyana berühmt gemacht hat. Seine Mittheilungen wurden dem Gartenbau-Verein zu London im Jahre 1852 gemacht, und obgleich sie schon vor 6 Jahren geschahen, haben sie doch noch heute ihre ganze Gültigkeit.

„Die Stadt San Domingo,“ sagt Sir R. Schomburgk, „kann sich, obgleich die älteste Stadt der neuen Welt, weder sehr großer noch gut unterhaltener Gärten rühmen; aber die Liebe, welche die Spanier für die Blumen empfinden, ist eine wahre Leidenschaft, und es giebt wenig Häuser, die so ärmlich wären, daß sie nicht ihre Gärtchen bepflanzt mit Rosen, Nelken und Heliotrop, hätten.

„Die Lieblingsblumen der spanischen Damen sind die Rosen, von denen man vorzugsweise folgende Arten oder Varietäten kultivirt: Rose de Dames blêre ou de tous les mois, Rose centfeuilles, deren weiße Varietät sehr selten ist; Roses multiflores de Banks et de l'Inde. Die

*) Sir R. Schomburgk ist bekanntlich gegenwärtig englischer General-Consul in Siam. Die Redact.

Varietäten der Thee-Rose sind vor Kurzem auf der Insel eingeführt worden; es sind die Devoniensis, Général Lamork und Magnolia. Alle drei sind besonders gut gediehen und blühen unaufhörlich, vorzüglich die Devoniensis, deren Geruch sich in dem tropischen Klima verfeilt zu haben scheint.

„Die Schönheit der Blüthenrispe der Lagerstroemia indica übertrifft Alles, was man sich nur vorstellen kann, wenn man nichts von dieser ausgezeichneten Pflanze als die unglücklichen Exemplare unserer Warmhäuser gesehen hat. Hier auf San Domingo erreicht sie die Stärke eines mittleren Baumes.*) Die Spanier nennen sie Almira. Die anderen kultivirten Pflanzen sind: Balsaminen, Jalappen (Mirabilis Jalappa), Spanische Kressen (Tropaeolum); viele Varietäten der gemeinen Gartennelke, das rothe und weiße Wintergrün (wohl Vinca rosea L. und fl. alba), die indischen Rosen, chinesische Astern, sowie Chrysanthemum, Zinnien, Tuberosen (Polyanthes tuberosa), Amaryllis formosissima und einige andere tropische Zwiebeln, alles Pflanzen, die man als völlig eingebürgert ansehen kann, von denen aber keine einzige einem Klima eigenthümlich angehört, welches man ein kaltes nennen könnte.

„Als ich im Jahre 1848 England verließ, empfing ich vom Director des königlichen Gartens zu Kew eine gewisse Anzahl Pflanzen, welche man besonders ausgewählt hatte, weil man glaubte, daß sie sich an das Klima der Antillen gewöhnen würden. Bevor ich darüber das Nähere angebe, bemerke ich, daß das Consulats-Gebäude, welches ich bewohne, einige 100 mètres (300 Fuß) vom Ufer des Meeres entfernt liegt und daß das nur kleine Stück Land, welches ich in einen Garten verwandelt habe, aus einer Art Muschelkalk besteht, der ungefähr 1 Fuß hoch mit guter Erde bedeckt ist; aber da diese Kalkbank nicht sehr hart und ganz geborsten ist, so können die Wurzeln der Pflanzen sie an vielen Stellen durchbrechen und darin tief genug eindringen. Die mittlere Jahrestemperatur der Luft ist ungefähr 78° Fahrenheit (25—26° Celsius. 20,5° Reaumur) und die des Bodens in 1 Fuß oder ein wenig mehr Tiefe 75° F. (23—24° C., 19° R.); annäherungsweise genügende Angaben, um die Temperaturverhältnisse zu verstehen, unter denen meine Versuche ausgeführt wurden!

„Meine Pflanzen waren in einem Ward'schen Kasten verpackt. Unter ihnen befanden sich einige Fuchsien, die bei ihrer Ankunft, mit Ausnahme einer einzigen, sich in recht gutem Zustande befanden. Sie wurden mit aller nur wünschenswerthen Sorgfalt gepflanzt. Dessen ungeachtet gingen sie alle noch vor der Blüthe zu Grunde. Die Pelargonien hatten dasselbe Schicksal; nur eine einzige Tom Pouce schlug aus der Wurzel aus, blühte mehrere Male; zuletzt aber wurde sie gelb und verkam wie die andern. Die weißen und rothen chinesischen Rosen, Bouquet, Devoniensis, mousseuse de Provins, Paul Joseph kamen in vollkommen gesundem Zustande an; die mousseuse de Provins machte einige Triebe, dann wurde sie krank und ging aus. Es sei hier bei-

*) Dies kommt auch im südlichen Frankreich vor, wo man nicht selten Exemplare der Lagerstroemia von 5—6 mètres (15—18 Fuß) Höhe antrifft, deren Stamm die Dicke eines Beines übertrifft. Nichts kann nur annähernd den Effekt wiedergeben, den sie zur Zeit ihrer Blüthe machen.

läufig noch bemerkt, daß ich auf den Antillen nie eine Moosrose angetroffen habe, und daß keine von den Personen, die ich über diesen Gegenstand befragte, früher deren gesehen haben. Alles, was man bisher von diesen Rosen hat erreichen können, war, daß sie 2 oder höchstens 3 Jahre kümmerlich vegetirten, wonach sie ohne zu blühen abstarben.

„Die rothen und weißen chinesischen Rosen machen sich ganz anders; sie treiben mit erstaunenswerther Stärke und sind das ganze Jahr hindurch in Blüthe. Zu Anfang zeigte sich die weiße Varietät ein wenig schwach, aber nachdem sie an einen der Sonne mehr ausgesetzten Ort gepflanzt wurde, nahm sie an Kräftigkeit zu und nun vergeht kein Tag, an dem sich nicht mehrere Blumen erschließen. So lange sie nicht der Sonne ausgesetzt war, hauchte diese Blume einen eigenthümlichen Wohlgeruch aus. Die Rosen Paul Joseph und Bouguer sind ohne zu blühen ausgegangen und die La Birch treibt so kräftig ins Holz, daß ihr die Kraft fehlt, ihre Knospen zu Blüthen umzubilden. Alle Mittel, die man gewöhnlich anwendet, um Rosen zum Blühen zu bringen, wie das Kämmen der Aeste, das Beschneiden, die Wegnahme der Blätter u. s. w., sind mißlungen. Daher, wie ich schon weiter oben bemerkt habe, sagt das Klima hier ganz besonders nur den Theerosen zu, die so zu sagen das ganze Jahr hindurch blühen.

„Unter den anderen gesund und glücklich hier angekommenen Pflanzen erwähne ich besonders der **Ixora Bandhucca**, die während eines ganzen Jahres oder noch länger mit ihren prachtvollen Dolden rother Blumen bedeckt ist. Ich habe bis jetzt vergeblich versucht, sie durch Stecklinge zu vermehren. **Ixora alba** hat sich 2 Jahre lang hingeschleppt, zuletzt sich aber doch wieder erholt und sie bildet jetzt einen sehr starken Strauch, nur hat sie noch nicht geblüht. **Gardenia Fortunei** ist, nachdem sie 2 Jahre vegetirt hat, auf dem Wege auszugehen. **Dillenia speciosa**, welche 1849 nur eine kleine 6 Zoll hohe Pflanze war, ist nun ein Strauch von 10 Fuß Höhe, der aber auch noch keine Blumen gezeigt hat. **Ardisia Wallichii** ist noch lebend; sie hat regelmäßig ihre Blätter zweimal im Jahre verloren, aber nach jedem Abwerfen ist sie merklich schwächer geworden und ihre Triebe haben immer mehr an Kraft verloren. Ich habe wenig Hoffnung sie zu erhalten. **Coelebogyne ilicifolia** war während der ersten 8 Monate gut gewachsen, nach dieser Zeit wurde sie gelb, verlor ihre Blätter und ist endlich abgestorben. **Combretum comosum** scheint, nachdem es 3 Jahre langsam hinvegetirt hat, an Kraft zu gewinnen; es hat noch nicht geblüht. Dagegen ist **Eranthemum coccineum** eine sehr starke Pflanze geworden und vermehrt sich leicht durch Stecklinge; die scharlachrothen Blumen sind schön, aber sie verlieren einen Theil ihres Effektes, weil sie in ihren langen Aehren zu weit von einander entfernt stehen. **Noronha chartacea** hat nur einige Monate nach der Ankunft hier gelebt. **Diaperopus nerilfolius** hat einmal geblüht; nachher hat die Pflanze schnell abgenommen und gegenwärtig hat sie nur einen einzigen lebenden Trieb. **Kigelia pinnata** hat sich sehr stark vergrößert; sie hat jetzt an 2 mètres (6 Fuß) Höhe, blüht aber nicht. Den schönsten Erfolg habe ich mit **Hibiscus rosa-sinensis fl. pl.** gehabt; es ist jetzt ein schöner Strauch von 4 mètres (12 Fuß) Höhe, welcher das ganze Jahr hindurch mit seinen großen rothen Blumen im Ueberfluß bedeckt ist, deren einige

6—7 Zoll (16—20 centimètres) im Durchmesser haben; auch zieht er die Bewunderung aller Damen von San Domingo auf sich, die ihm den Namen Flor de la Reina Victoria gegeben haben. Die Pflanze vermehrt sich leicht durch Stecklinge und da ich diese freigebig vertheilt habe, so befindet sie sich in allen nur wein wenig gepflegten Gärten der Dominikanischen Republik. Seine Blumen dienen dazu, sowohl die Altäre bei allen kirchlichen Festlichkeiten zu schmücken, wie auch die üppigen schwarzen Haarflechten der schönen Señoritas auf Bällen, die bei der ganzen spanischen Bevölkerung so stark in der Mode sind. Eine andere von diesen Damen sehr geschätzte Pflanze ist Galphimia, eine hübsche Pflanze mit goldgelben Blüthensträußen, die ich von Jamaica auf San Domingo eingeführt habe, welche man hier, um das Andenken daran zu erhalten, Consulita nennt, was so viel als: die Blume des Herrn Consuls bedeutet.

„Man erzählt, daß der Baron von Wimpfen zuerst 1789 auf der Insel Narzissen, Hyacinthen, Tulpen und Veilchen eingeführt hat. Mit Ausnahme der Veilchen, die recht gut blühen, sind alle diese Pflanzen verschwunden, ohne eine Spur zurückzulassen; übrigens ist es bekannt, daß Zwiebelgewächse hier nicht fortkommen. Es ist mir ganz kürzlich gelungen, einige Resedapflanzen zu ziehen und zum Blühen zu bringen, doch hat keine einzige Samen getragen. Es ist dies wahrscheinlich das erste Mal, daß man diese Pflanze hier hat blühen sehen, denn eine leidenschaftliche Blumenliebhaberin sagte mir, daß sie noch nie, weder auf Portorico noch St. Thomas, noch auf einer der übrigen Antillen ein ähnliches Resultat davon gesehen habe. Meine Reseda hatte auch mindestens dasselbe Parfüm als die, welche man in England findet. Die in Europa so geschätzte Levkoje (Matthiola annua) treibt hier, aber nur Blätter, sie blüht nicht, und nimmt das Ansehen der Winterlevkoje (Matthiola incana) an. Ich habe jetzt davon Pflanzen, die 15 Monate alt sind, die demnach schon zwei Vegetationsperioden der Tropen durchgemacht haben, ohne dadurch weiter vorwärts gekommen zu sein. Die aus Europa mitgebrachten Georginen machen sich im ersten Jahre recht gut, nach dieser Zeit nehmen die Blumen allmählig an Umfang ab, aus gefüllten werden einfache, zuletzt vergeht die Knolle und die Pflanze stirbt ab.

„Man findet zuweilen, aber selten, die Passe roses und die Gartensonnenblumen; letztere vorzüglich in der Umgegend von Cibao in einer Höhe von 5—600 Fuß (150—200 mètres) über dem Meeresspiegel. In dem Thal von Constanza, welches schon so hoch liegt, daß es dort friert, und daß der Frost oft die jungen Triebe der Bäume tödtet und nur die lederartige Belaubung der Coniferen verschont, findet man Nelken und Sonnenblumen, eben so voll blühend wie in England. Ich habe in demselben Thale starke Pflanzen der weißen und rothen Nelken gesehen, die, aus einem Garten fortgeworfen, sich ohne menschliche Hülfe so vermehrt haben, daß sie beinahe große Striche Landes einnehmen, deren Millionen von Blumen die Luft mit ihrem Wohlgeruche erfüllen. Diese Nelken sind hier gewiß acclimatisirt, aber das diesem Landstrich ganz eigenthümliche Klima ist nicht viel von dem des Landes unterschieden, aus welchem diese Art eingeführt wurde!“

Diese Beobachtungen sind fast gleichlautend mit denen anderer Rei-

sender. Die Erfahrungen Poiteau's haben uns schon kennen gelehrt, daß die Fruchtbäume Europas in einem Klima unfruchtbar bleiben, wo eine fortwährende Hitze herrscht, die unzweifelhaft dazu beiträgt, daß ihr Wachsthum ohne Aufhören angeregt wird, was ihre Natur nicht zuläßt. Aber es giebt mehr dergleichen Beispiele: sehr häufig findet man Pflanzen, die weit von ihrem Geburtslande oder selbst von dem, wo sie durch jahrelange Cultur eingebürgert sind, fortgepflanzt wurden, entweder gar nicht oder doch nur schlecht wachsen unter gleichen Breitengraden als die waren, welche sie verlassen haben; solche sind der Weinstock und der Olivenbaum, die in die südlichen Provinzen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika verpflanzt wurden, wo die mittlere Temperatur fast der des südlichen Europa's und des nördlichen Afrika's gleich ist. Dies Alles weist darauf hin, daß die Natur ihre Gaben auf dem ganzen Erdball verstreut, daß sie einem jeden Lande seine eigenthümlichen Produkte zugetheilt hat, und dies letztere, um die Völker dadurch anzureizen, sich gleichbedeutende Produkte gegenseitig zu entlehnen, statt sich streng von einander abzuschließen. Diese Verschiedenheit der Produkte war von je her und wird immer die große Triebfeder aller Reisen und das festeste Band der wechselseitigen Beziehungen der Völker sein, das sie früher oder später, ungeachtet einiger Verschiedenheiten der Sitten, der Abkunft und der Sprache, zu einer einzigen Familie vereinigen wird.

Gartenbau-Vereine.

Bemerkungen über die Frühjahrs-Ausstellung in Erfurt.

Wer sich in den Tagen vom 8.—11. Mai plötzlich in das Ausstellungs-Local des Erfurter Gartenbau-Vereins versetzt gesehen hätte, wäre sicher nicht auf den Gedanken gekommen, daß er sich an einem der Hauptplätze des deutschen Samen- und Pflanzenhandels befinde, hätten es ihm nicht einige Namen von gutem Klange gesagt, mit welchen die einzelnen Tische bezeichnet waren. Aber es fehlten gar viele andere Gärtner-Namen, welche sonst in den Blumenausstellungen Erfurts glänzend vertreten waren, und so schien es, als hätte man lieber den Beweis vom Gegentheile dessen liefern wollen, was man gewöhnlich durch eine Ausstellung zu documentiren bemüht ist. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß man in dem, was ausgestellt worden, nicht das durch seine Blumen- und Gemüsezucht altberühmte Erfurt wiedergefunden hätte, wenn auch das Ensemble an einer Einförmigkeit und Leere leiden mochte, welche vielleicht in der frühen Jahreszeit und anderen Umständen ihre Erklärung findet. Wir übergehen deshalb die Darstellung des Totaleindruckes, den die Ausstellungsräume auf uns, wie auf viele andere Besucher gemacht, und treten zu den einzelnen Tischen heran.

Unsere Aufmerksamkeit wird zunächst durch einige Sammlungen von getriebenem Gemüse angezogen, welches trotz des für die Treibgärtner

so fühlbar gewesenen Mangels an Sonnenschein gut zu nennen war. Die von Herrn B. Döppleb eingelieferten Gemüse, welchem auch die dafür bestimmte Prämie ertheilt wurde, umfaßten Kopfsalat, Kohlrabi, Blumenkohl mit ziemlich großen, festen und schneeweißen Köpfen, Spargel und Carotten. Daneben fehlte auch der Schmuck der Blumen nicht, Primula chin. striata und cupreata, und Bellis perennis maxima, nuptialis und Oculus veris. Man erkennt das alte Tausendschönchen nicht wieder, so groß sind seine Blumen unter der Hand des Herrn Döppleb geworden, indem viele von ihnen ein Zweithalerstück an Größe übertreffen.

Von Herrn Lorbacher fanden sich ebenfalls getriebene Gemüse ausgestellt, worunter auch Bohnen, Erbsen, Kartoffeln und besonders schöne Gurken.

Waren nun auch Jahreszeit und ungünstige Witterung einer Blumenausstellung im Allgemeinen nicht günstig, so brachte diese doch einige Modeblumen vorzugsweise zur Anschauung, vor Allem Cinerarien und Calceolarien. Von ersteren war die Sammlung des Herrn E. Benary, mit der Signatur Cineraria hyb. compacta nana versehen, von großer Schönheit und befriedigte durch ihren niedrigen, vollbuschigen Habitus, durch reichen, flachen, dicht gedrängten Strauß, wie durch reine, lebhafte, oft strahlende Farben auch den schwierigsten Beurtheiler. Ein Gleiches ist von den Calceolarien desselben Ausstellers zu sagen, zumal von den zwergwüchsigen, von welchen getiegerte und getuschte getrennt aufgestellt waren.

Mit Cinerarien war die Ausstellung auch von den Herren Gebr. Born und von den Herren Platz & Sohn bedacht worden, mit Blumen, welche auch neben denen des Herrn Benary noch Anerkennung verdienten.

Von eigentlichen und überall populär gewordenen Modeblumen waren neben den schönen Aurikeln und Primeln der Herren Moschkowitz & Siegling nur Levkoyen und Lack zur Ausstellung gekommen. Die Sammlungen F. A. Haage, Moschkowitz & Siegling, E. Benary, Platz & Sohn lieferten den vollen Beweis, daß Erfurt seit Jahren dieses Fundament seines ausgebreiteten Samenhandels befestigt und beträchtlich erweitert habe. Vor allen andern ausgezeichnet waren die Stangen-Herbstlevkoyen des Herrn Franz Anton Haage, denen ein Preis zuerkannt wurde und die wir hiermit allen Levkoyenfreunden angelegentlich empfehlen wollen.

Unter den gemischten Pflanzengruppen zog uns, wie wir es von dieser vielumfassenden Handelsgärtnerei seit langen Jahren gewohnt sind, die des Herrn F. A. Haage vor allen anderen an. Ueberragt von einem prachtvollen Exemplar von Dracaena Boerhavii, mischten sich Laub und Blumen von Azaleen, Rhododendron, Erikeu, Deutzia gracilis, Acacien u. s. w. zu einem reizenden, harmonischen Ganzen. Besonders hübsch erschienen uns die Rhododendron eigener Zucht, welche recht weit verbreitet zu werden verdienen.

Auch die gemischte Gruppe des Herrn Wendel verdiente vollkommen den Beifall, welchen ihr Preisrichter und Publikum gespendet. Besonders waren es die anmuthigen Tropäolen, welche hier in kräftigen, schönen Exemplaren zur Anschauung gelangten, T. Jarratti, tricolorum, azu-

reum, azureum crispum und grandiflorum. Auch die gemischte Gruppe der Herren Moschkowitz & Siegling brachte einige in guter Cultur stehende Tropäolen, war aber noch besonders interessant durch einen von diesen Herren gezüchteten und in den Handel gebrachten Rhododendron-Sämling, Rh. arboreum hyb. Radetzky, welcher sich allen Freunden dieses schönen Pflanzengeschlechtes durch Blüthenreichthum und feuriges Colorit empfiehlt.

Von Blattpflanzen war nichts eingeliefert, was wir noch nicht gesehen hätten, aber doch fanden sich einige anziehende Gruppirungen vor, entweder, wie die des Herrn F. A. Haage jun., mit anderen Pflanzen gemischt oder für sich, wie die Collection der Herren Moschkowitz & Siegling. Zwei prächtige Exemplare von Latania borbonica beschatteten die Levkoyen-Collectionen der Herren Platz & Sohn und des Herrn Benary, und der Vordergrund, gleich unter dem anmuthig decorirten Proscenium, war durch zwei schön gewachsene, starke Exemplare von Araucaria imbricata, Herrn Topf gehörig, ausgeschmückt.

Wir haben den Leser gern zu dem Einzelnen hingeführt, was uns Freude gemacht, aber ihm auch das nicht verhehlt, was uns geschmerzt. Wo die Umstände so viele und mannichfaltige Hülfsmittel zur Verfügung stellen, sollte man da nicht erwarten können, daß das Interesse an den Ausstellungen des Gartenbau-Vereins inniger, werkthätiger, aufopfernder sich erweise?

Hochheim bei Erfurt, Mai 1859. H. Döring & Sohn.

London, Horticultural-Society. Die Mitglieder dieser Gesellschaft statten den Gärtnern und Cultivateuren öffentlich ihren Dank ab für die mit so herrlich kultivirten schönen und seltenen Gewächsen so reichhaltig beschickte Ausstellung, die am 12. und 13. Mai in St. James Hall stattgefunden hat.

Nach den Berichten in Gardener's Chronicle muß diese Ausstellung eine vorzügliche gewesen sein, an der sich neben sehr vielen Privatgärten die bedeutendsten Handelsgärtner mit ihren schönsten Pflanzenschätzen betheiligt haben, als die Herren Veitch, Standish, Lane, Fraser ꝛc.

Von großen Seltenheiten, die wir nicht bereits auch schon auf der Blumenausstellung in Hamburg gesehen hätten, finden wir wenig in den Berichten aufgeführt. Die Herren Veitch exellirten mit ihren Theophrasta macrophylla und imperialis (die wir bekanntlich hier so vorzüglich schön von Herren James Booth & Söhne sahen), dann Aralia Sieboldii, Rhopala-Arten und viele andere Blattpflanzen.

Als Neuheiten wären vielleicht zu bezeichnen: eine schöne Exochorda (Spiraea) grandiflora und das großblumige Vergißmeinnicht von Neuseeland, Myosotis nobilis, von Herrn Standish eingesandt. Von Herren Veitch: Olea ilicifolia, schön, und die neuen Linden'schen Begonien. Es scheint demnach auch in England gegenwärtig nichts Neues von ungewöhnlicher Schönheit vorhanden zu sein, natürlich mit Ausnahme von Floristen-Blumen, in welcher Brauche fast täglich Neuheiten auftauchen und es auch daran auf dieser Ausstellung nicht fehlte, namentlich Rosen, indische Azaleen, Rhododendron ꝛc.

Pflanzen-Ausstellung im Crystall-Palast zu Sydenham.

Die erste große diesjährige Pflanzen-Ausstellung in dem prächtigen Crystall-Palaste zu Sydenham fand am 18. Mai statt und ist in jeder Beziehung zur großen Befriedigung ausgefallen. Eine prachtvolle Sammlung Pflanzen des Kalt- und Warmhauses war aus dem Garten des Sir John Cathcart (Gärtner Herr Dods) aufgestellt. Dieselbe bestand aus blühenden Leschenaultia, Helichrysen, Eriostemon, Azaleen, unter diesen die herrliche Glory of Sunning Hill, eine völlig gefüllt blühende rosa Varietät; dann Adenandra fragrans, Boronia pinnata, Pimelea spectabilis, Acrophyllum venosum, eine sehr hübsche Pflanze in einem so prächtig kultivirten Exemplare, wie man es so bald nicht wieder finden dürfte. Diese hübsche Neuheit hatte auch bereits mehrere Male im bot. Garten zu Hamburg geblüht und verfehlten wir nicht die Pflanzenfreunde auf sie aufmerksam zu machen.

Eine Menge ähnliche Sammlungen, kleinere wie größere, sind aus anderen Gärten eingegangen und aufgestellt gewesen und fast sämmtliche zeichneten sich durch die vorzüglich gut kultivirten Exemplare aus.

Sammlungen von Blattpflanzen waren nur zwei vorhanden und enthielt die aus dem Garten des Herrn Cutbush (Gärtner Herr Dods) eine Prachtpflanze der Maranta capitata mit großen ovalen, lebhaft grünen, stark gerippten Blättern; es ist dies eine sehr effectvolle Art.

Orchideen waren in großen Massen aufgestellt und war unstreitig die Sammlung des Herrn Bullen, Gärtner des J. Butler Esq. zu Woolwich, die beste. Diese Sammlung enthielt unter anderen Epidendrum bicornutum, Saccolabium retusum, guttatum und andere Arten mit fünf Blüthenrispen, Vanda suavis, teres, tricolor und insignis; Aerides odoratum, Cattleya Skinneri, Calanthe veratrifolia, Coelogyne Lowi mit fünf Blüthenrispen, Chysis bractescens und das seltene Cypripedium hirsutissimum. — Ein Arpophyllum giganteum einer anderen Sammlung hatte vier Blüthenrispen. —

Von Azaleen war, wie sich erwarten läßt, eine herrliche Schau vorhanden, ebenso von Eriken. Die Rosen in Töpfen waren wahrhaft prachtvoll, die Herren Lane, Francis und Paul, Namen, die als Rosenzüchter auch auf dem Continent einen sehr guten Klang haben, hatten Ausgezeichnetes geliefert, neben diesen aber auch noch viele Andere.

Neue Pflanzen waren sparsam, Herr Dods hatte eine orangescharlach blühende Genethyllis macrostegia, Herr Veitch schöne Aroideen, Begonia ꝛc. geliefert; Daviesia umbellata, eine gelbblühende Papilionacee kam von Herrn Green. — Olea ilicifolia aus Japan von den Herren Veitch gefiel sehr, ebenso deren Acer japonicum polymorphum.

Herr Paul hatte noch ausgestellt ein Rhododendron Dalhousianum mit 14 Blüthen in größter Vollkommenheit. Von Spergula pilifera, als ein neues Substitut für Grasplätze, hatte Herr Summers eine große Schale voll ausgestellt, die allgemeines Interesse fand.

Pelargonien, Fuchsien, Cinerarien, Aurikeln, Calceolarien und dergl. Floristenblumen fehlten natürlich nicht.

Früchte waren nur spärlich vorhanden, dennoch sah man Ananas, Weintrauben, Pfirsich, Melonen, Orion (gelbfleischige) und Polignac

(scharlachfleischige) von Herrn Peed; ferner Feigen, Kirschen und Erdbeeren. Weintrauben und Orangen in Töpfen waren zahlreich eingesandt worden.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Begonia xanthina *Hook. var.* Lazuli.

Als Begonia Lazuli wurde diese Art oder Varietät von Herrn Director Linden verbreitet, die, wie bekannt ist, aus Asien stammt. Sir W. Hooker giebt im B. M. Taf. 5107 eine Abbildung dieser Pflanze und sagt, daß diese Begonie zu derselben Gruppe gehöre wie B. Rex, amabilis, argentea, Victoria ꝛc. des Herrn Linden. Alle diese gehören zu einer und derselben Gruppe, von der die B. xanthina von Bhotan als der Typus betrachtet werden muß, wenn diese Art nicht sogar, wie Hooker sicher glaubt, die Mutterpflanze aller dieser hier genannten Begonien ist. B. Victoria ist sicherlich nur eine Varietät mit gefleckten Blättern der B. xanthina. Aber mögen sie nun Varietäten oder Arten sein, jedenfalls sind sie große Zierpflanzen für unsere Warmhäuser.

Vriesia psittacina *Hook. var.* rubro-bracteata.

Eine reizende Bromeliacee, die wir zu öfterem in der reichhaltigen Pflanzensammlung des Herrn Consul Schiller in Blüthe sahen. Die Blätter sind 8—10 Zoll lang, öfters auch noch länger, lang zungenförmig, welllig, zugespitzt, ganzrandig, dunkelgrün, nach dem Rande zu mehr erweitert, lederartig. Der Blüthenschaft ist 1—1½ Fuß lang, aufrecht stehend, 10—20 zweizeilig stehende Blumen tragend. Bracteen groß, schuppenartig, brillant scharlach. Blumenblätter lichtgelb.

Schon vor 30 Jahren brachte das Bot. Mag. eine Abbildung dieser Pflanze, die jedoch viel zu wünschen übrig läßt. Später gab das Bot. Reg. Vol. 29, tab. 10 eine gelungenere Abbildung dieser Art, von der die jetzt im Bot. Mag. tab. 5108 gegebene eine Varietät ist, mit ganz scharlachroth gefärbten Bracteen.

Nepenthes ampullaria *W. Jack.*

Verglichen mit Nepenthes Rafflesiana, villosa und anderen, ist dies nur eine unscheinbare Art. Dieselbe kommt von Singapore, auch von Rhio auf der Insel Bintang im Malayischen Archipel. Wenn auch eben keine Art, die sich durch große Schläuche an den Blattenden empfiehlt, ist sie demnach jedenfalls eine interessante Pflanze und der Kultur werth. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5109.

Howardia Caracasensis *Weddell.*

(Calycophyllum tubulosum Seem., Pinckneya lonantha Hort. Makoy.)

Rubiaceae.

In der That eine sehr hübsche Pflanze mit gefällig herabhängenden Blüthenrispen. Die Schönheit der Blüthen wird noch bedeutend gehoben durch die eigenthümliche Vergrößerung des einen kleinen Kelchzahnes in einen großen herzförmigen, gestielten, dunkelrosaroth gefärbten, blattähnlichen Lappen, ähnlich wie es bei den bekannten Arten der Gattung Mussaenda der Fall ist. Auch noch in anderer Beziehung ist die Gattung Howardia von Interesse, indem die Grundspecies H. febrifuga Wedd. von Bolivia eine der im Handel vorkommenden Fieberrinden liefert.

Howardia Caracasensis ist ein Bewohner der Provinz Caracas in Venezuela, wo sie von Herrn Funke zuerst entdeckt wurde. Ebendaselbst fanden sie die Herren Fendler und Birscheil; Dr. Seemann dagegen fand sie an den Ufern des Flusses Chagres in Panama. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5110.

Stephanophysum Baikiei *Hook.*

Acanthaceae.

Eine der vielen interessanten Pflanzen der Nigerexpedition unter dem Befehle des Dr. Baikie, gesammelt von dem unermüdlichen Naturforscher Herrn Carter. Die, aus dem an den Garten zu Kew eingesandten Samen, erzogenen Pflanzen blühten im Winter 1858/59 in großer Schönheit. Die Pflanze wird ungefähr 2—3 Fuß hoch, ist mehr krautig als holzig, aufrecht, verästelt; die Aeste sind gegenüberstehend, vierkantig, abstehend. Die Blätter sind paarweise gegenüberstehend, oft ¾ Fuß lang, eiförmig-lanzettlich, dünnhäutig, ganzrandig, vielnervig, zugespitzt, verschmälert an der Basis. Die Blüthenrispe ist endständig, mit großen Bracteen, vielblumig. Die Blüthen sind gegenüberstehend, sitzend. Die Blumenkrone über 2 Zoll lang, ist scharlachroth, röhrenförmig, in der Mitte etwas aufgeblasen. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5111.

Linum pubescens *Russ.* β Sibthorpianum.

(Linum piliferum Prsl., L. Sibthorpianum Reut, L. decoloratum Griseb., L. hirsutum Sibth.)

In De Candolle's Prodromus sind 46 Arten der Gattung Linum beschrieben, darunter jedoch mehrere, die als keine guts und bestimmte Arten gelten können. Die Gattung verdiente eine genaue Revision und hat Dr. Planchon schon einen großen Dienst geleistet durch seine „Revisio Ordinis Linearum" in Hook. Lond. Jour. of Bot. p. 519.

Die hier in Rede stehende Art, zu der Planchon die oben angeführten Synonyme bringt, scheint eine sehr weite Verbreitung zu haben, sie findet sich nämlich in Aleppo, auf dem Berge Libanon, in Sicilien, durch ganz Griechenland und auf den griechischen Inseln, in Macedonien und Bithynien in einer Höhe von 5—700 Fuß über der Meeresfläche.

Es ist eine hübsche einjährige Art mit rothen Blumen, die jedoch denen des Linum grandiflorum Desf. bedeutend nachstehen. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5112.

Vanilla lutescens *Moq. Tand.*

Die bis jetzt in den Sammlungen befindlichen Vanilla-Arten haben größtentheils nur wenig auffällige Blumen von grünlich-weißer Farbe. Die hier genannte Art macht jedoch eine Ausnahme, denn ihre Blüthen sind goldgelb und messen 6 Zoll im Durchmesser und stehen, wenn die Pflanze in Ueppigkeit, zu 10—12 beisammen. Im Journ. de la Soc. Imp. Hort. 5, 97, t. XI, 1859 befindet sich eine vortreffliche Abbildung dieser Art. Ob die Früchte auch den lieblichen Geruch haben, wie die der V. planifolia ist noch ungewiß, da dieselben noch nicht völlig reif waren. Die von Duchartre beschriebene Pflanze befindet sich im Garten der medizinischen Facultät zu Paris, und wurde durch Herrn Coudert von La Guayra eingeführt. Gard. Chron.

Callicarpa purpurea *h. Angl.*

Verbenaceae.

Im 4. Hefte S. 170 der Hamb. Gartztg. haben wir eine ausführliche Mittheilung dieses hübschen Ziersträuches gemacht, der wir hier noch hinzufügen wollen, daß sich eine Abbildung dieser Pflanze in der 4. Liv. der Illustr. hortic. tab. 202 befindet. Lemaire bezweifelt auch, daß es die Callicarpa purpurea Juss., oder die unter diesem Namen in DC. Prodr. XI, p. 645 aufgeführte Pflanze, vielmehr hält er sie für eine Form der C. purpurea (Porphyra dichotoma Lour.), es könnte aber auch die Call. lasiantha sein, welches eine spätere, genauere Untersuchung ergeben wird.

Rhododendron *var.* Clowesianum *Rollis.*

Dieses herrliche Rhododendron blühte zuerst bei den Herren Rollisson zu Tooting. Die Blumen, in großen Köpfen beisammen stehend, sind weiß mit blau-violetter Zeichnung. Herr Van Houtte, in dessen Flore des serres sich auf Taf. 1315—1316 eine Abbildung befindet, kultivirt diese Varietät bereits seit zwei Jahren und hat sie sich als ganz hart erwiesen.

In demselben Hefte der Flore des serres, 3. Liv., tom. XIII, (März 1858, und erschienen am 15. April 1859) sind noch abgebildet:

Taf. 1308—1309 Calanthe vestita Lindl. (Preptanthe vestita Rchb. fil.) var. macula lutea und var. macula rubra.

Taf. 1310 Crocus vernus var. majestuosus, eine hübsche Varietät mit violett gestreiften Blumen.

Taf. 1311 Embothrium coccineum Forst. (Ixora coccinea Comm., Cates parviflora Juss.)

Taf. 1312 Aesculus californica Nutt. (Calothyrsus californica Spach.)

Taf. 1313 Chrysanthemum carinatum varietates.
Taf. 1314 Plocostemma Lasianthum Bl. (Hoya lasiantha Herb. Korth.),

bis auf die Crocus, sämmtlich Pflanzen, die bereits nach den Abbildungen theils im Bot. Magazine, theils in der Illustr. Hortic. in der Hamburg. Gartenztg. besprochen, resp. empfohlen worden sind.

Das April-Heft der Illustration Horticole (VI, 4. Liv.) bringt Abbildungen von Pflanzen, die ebenfalls in der Hambg. Gartenztg. bereits empfohlen worden sind, so auf

Taf. 202 Callicarpa purpurea Hort. Angl.
" 203 Rhododendron jasminiflorum W. Hook.
" 204 Amygdalus (persica?) rosaeflora.

* Jambosa lanceolata *Korth.*

(Jambosa Korthalsii Bl.)

Diese schöne Art, die auch im bot. Garten zu Hamburg kultivirt wird, erhielt der bot. Garten zu Leiden im Jahre 1853 von Herrn Teysmann und nachdem sie im genannten Garten geblüht hat, geben die „Ann. d'Hortic. et de Botanique" III, 3. Liv. eine Abbildung davon. Der Redacteur dieses schätzbaren Journals, Herr Garteninspector H. Witte, bemerkt, daß die Pflanze seit drei Jahren alljährlich bei ihm geblüht habe und eine der vorzüglichsten Arten dieser Gattung sei. Die Pflanze hat bei ihm eine Höhe von 1½ Metre erreicht. Die großen Blumen, mit ihren sehr langen, weißen und zahlreichen Staubfäden contrastiren vortrefflich mit den sehr großen, dunkel glänzend grünen Blättern. Die Pflanze wurde zuerst von dem bot. Garten zu Leiden unter der Benennung J. Korthalsi abgegeben, unter welchem Namen auch wir sie kultiviren, es hat sich jedoch nun herausgestellt, daß es die J. lanceolata Korth. ist.

Angraecum sesquipedale *Aub.*

Orchideae.

Eine noch sehr seltene, ausgezeichnet schöne Art von Madagascar, die bisher den Botanikern nur aus Beschreibungen (Aub. du Pet. Thouars, Hist. des Pl. Orchid. Afr. 8., tab. 66 und ejusd., groß Folio, colorirte Abbildg. tab. 1, 2) bekannt war, bis es dem Rev. W. Ellis gelungen ist eine lebende Pflanze einzuführen, die bereits zweimal bei ihm geblüht hat, nämlich im Jahre 1857 und im Februar 1859, nach welchem Exemplare eine Zeichnung angefertigt und im Bot. Mag. tab. 5113 veröffentlicht worden ist. Die Blume mißt reichlich 7 Zoll im Durchmesser und der Sporn ist über 1 Fuß lang. Die Färbung der Blume ist eine einförmige, elfenbeinfarbige oder gelblich weiße und hat die Blume den Geruch des Lilium candidum. Diese Pflanze zog fortwährend die Aufmerksamkeit des Herrn Ellis während seiner Reise durch die Urwälder Madagascars auf sich und hat sie als die Königin der Orchideen bereits vielfach Gelegenheit zu Beschreibungen und zur Bewunderung gegeben.

Bilbergia macrocalyx *Hook.*

Eine der Bilbergia Wetherelli (Bot. Mag. t. 4835) und der B. thyrsoidea (Bot. Mag. t. 4756) nahe verwandte Art aus Brasilien. Herr J. Wetherell fand sie in Menge bei Bahia, woselbst sie vielfältig auf Baumstämmen wächst. Die mäßig großen Blumen sind grün mit blauen Spitzen, die die Blüthenrispe umgebenden Bracteen brillant scharlachroth. Bot. Mag. t. 5114.

Gesneria purpurea *Paxt.*

(Gesneria Douglasii [var. verticillata] Hook., Bot. Mag. t. 3612, non G. Douglasii Lindl. Bot. Reg. t. 1110, non Lodd. Bot. Cab. t. 1939, non Van Houtte Flore des serres X, t. 1009; Dircaeo-Gesneria purpurea Planch. Fl. des serres t. 1046.)

Obgleich schon zwei Abbildungen dieser Art von Gesneria im Botanical Magazine existiren, so bringt das neueste Heft dieses Werkes auf Taf. 5115 doch noch eine Abbildung derselben, theils, weil sie eine sehr schätzenswerthe Pflanze ist und theils, weil Sir W. Hooker bei dieser Gelegenheit einige Fehler verbessern wollte, die von ihm selbst wie von Anderen in Bezug auf diese Pflanze gemacht worden sind. Zuerst erschien eine Abbildung dieser Pflanze im Bot. Mag. tab. 2776 unter dem Namen Gesneria verticillata, angefertigt nach einem sehr schwachen Exemplare mit nur zwei Blumen. Im Jahre 1826, ein Jahr zuvor, hatte Dr. Lindley eine Pflanze G. Douglasii benannt, die er nachher für identisch mit der G. verticillata im Bot. Mag. hielt und deshalb in Douglasii umtaufte, weil die Bezeichnung verticillata bereits von Cavanilles einer anderen Art beigelegt worden war. Die Lindley'sche Pflanze ist sehr getreu im Bot. Reg. t. 1110 abgebildet. — Ein sehr schönes Exemplar der G. verticillata Hook., das Hooker von Herrn Allcard im Jahre 1836 aus Rio erhalten hatte und sich von der G. Douglasii Lindl. durch den eigenthümlichen quirlartigen, einfachen Blüthenstand unterscheidet, nannte Hooker G. Douglasii var. verticillata und bemerkte hierbei, daß bei Lindley's Pflanze die Inflorescenz eine richtige Rispe bilde, während bei seiner Pflanze die Blüthen in dichten Knäuel quirlartig beisammen stehen, nur einzelne wenige Stengel sind dicht an der Basis verästelt. Auch sind die Blumen größer und mehr purpurroth gefärbt.

In diesem Winter blühte im Kew-Garten eine Gesneria, welche die Aufmerksamkeit Hooker's besonders deshalb in Anspruch nahm, als sie ihm eine Varietät der G. verticillata zu sein schien. Die Knollen dieser Pflanze hatte der Kew-Garten im vorigen Jahre aus Rio Janeiro erhalten und Hooker war nicht wenig erstaunt, diese Pflanze als eine neue Art, sowohl von Lindley in „Paxton's Flow. Gard." als Gesn. purpurea und von Planchon in der „Flore des serres" als Dircaeo-Gesneria purpurea aufgestellt zu finden. Lindley, dem das Vaterland der Pflanze unbekannt war, hielt sie für eine Hybride, vielleicht zwischen G. Douglasii und G. discolor. Planchon leitet ihre Herkunft, jedoch ohne jede Beweisanführung, von G. Douglasii und G. (Dircaea) labiata ab. — Hooker pflichtet nun Lindley vollkommen bei, daß es

eine gute und die von ihm genannte G. purpurea sei, die, beiläufig noch bemerkt, eine sehr empfehlenswerthe Pflanze ist.

Rhododendron Wilsoni *(hybridum)*.

Ein sehr hübscher Bastard zwischen Rhododendron ciliatum und glaucum mit weißrosa Blumen, den Herr Th. Nuttall aus Samen gewonnen hat. Bot. Mag. tab. 5116.

Aesculus indica *Colebr.*

Es ist auffällig genug, daß eine so schöne Pflanze wie diese, die bereits 1828 von Wallich (in seinem bekannten Werke als Pavia Indica Colebr. von Kamaon und Sirmore [Webb] aufgeführt) vertheilt worden ist, bis zum Jahre 1844 weder irgendwo citirt, noch von einem Autor beschrieben worden ist, denn im Jahre 1844 findet man sie von J. Cambassedes in den „Plantae Rariores" gesammelt von Victor Jacquemont in Ostindien zuerst aufgeführt.

Das nördliche Indien ist als das Vaterland unserer gewöhnlichen Roßkastanie (Aesculus Hippocastanum) angegeben, aber Dr. Royle versichert, daß die eigentliche Region derselben noch völlig unbekannt ist. Dieser Baum ist nicht in Dr. Wallich's Katalog aufgeführt, noch ist er von ihm verbreitet worden. Wallich hat ihn niemals angetroffen, obgleich er die nördlichen Gebirge von Indien oft besucht hat, wo er wachsen könnte und wo die Aesculus Indica wächst, mit der er nahe verwandt ist. — Die Aesculus Indica, Indische Roßkastanie, wird von den Gebirgsbewohnern Gunour oder Pangla genannt und wächst 8—10,000 Fuß hoch über dem Meere in Kamaon, Garhwal und Sirmore, also nahe den Quellen des Ganges und in Kumiwur. Es ist ein hoher und schöner Baum. Die Frucht, obgleich etwas bitter, wird von den Himalagensen gegessen. Bot. Mag. tab. 5117.

Begonia *(hybrida)* Leopoldii *Hort.*

Abermals eine beachtenswerthe Hybride, die im Etablissement des Herrn Ambr. Verschaffelt gezüchtet worden ist und zwar durch Befruchtung der B. Griffithii (picta Hort., Bot. Mag. tab. 4984) und der B. splendida, mit der sie große Aehnlichkeit hat, aber noch um vieles schöner ist. Es ist diese Form unter den jetzt vorhandenen unzähligen Hybriden jedenfalls eine der hervorragendsten und sehr zu empfehlen. Eine vortreffliche Abbildung befindet sich in der Illust. hortic. tab. 205.

Livistona humilis *R. Br.*

Palmae.

Die Tafel 206 der Illustration Horticole bringt eine Abbildung dieser sehr zierlichen Palmenart aus dem nordöstlichen Neuholland. Sie hat viel Aehnlichkeit mit dem Chamaerops humilis in ihrer äußeren Erscheinung, ist aber um vieles eleganter und eine ganz vorzügliche Acquisition unserer Sammlungen, um so mehr, da diese Palme keine

bedeutende Höhe erreicht und ſich mit Leichtigkeit in jedem Warmhauſe kultiviren läßt.

Berberis Hookerii *Hort.*

Eine ſehr hübſche Art, dem Berb. Wallichiana DC. ſehr nahe ſtehend. Leider iſt über deren Abſtammung und Einführung nichts bekannt. Eine Abbildung dieſer empfehlenswerthen Art befindet ſich in der Illust. hortic. tab. 207.

Officinelle und andere Gewächſe des botaniſchen Gartens in Breslau.

Seit dem Erſcheinen der Schrift über den botaniſchen Garten zu Breslau von Herrn Geh. Mediz.-Rath Profeſſor Dr. Göppert (Die officinellen und techniſch wichtigen Pflanzen unſerer Gärten u. ſ. w. und die Beſchreibung deſſelben. 1857.), hat der Herr Verfaſſer wieder mancherlei Acquiſitionen gemacht, von denen derſelbe als Supplement zu jenen Arbeiten, einige im Arch. d. Pharm. Bd. 48, 2. Heft erwähnt, weil er wünſcht, daß man auch anderwärts mehr als bisher dieſe Richtung verfolgen möge, daß ſich dieſe Zwecke ganz gut mit den Beſtrebungen, die Wiſſenſchaft an und für ſich ohne Rückſicht auf praktiſche Zweige zu fördern, vereinigen laſſen. Auch fangen die Handelsgärtner an, Pflanzen dieſer Art mehr Berückſichtigung zu widmen, cultiviren eine größere Zahl derſelben und führen ſie in eigenen Rubriken vereinigt auf. In Deutſchland ſind in dieſer Hinſicht den Beiſpielen von Linden in Brüſſel, Mackoy in Lüttich, namentlich Geitner in Planitz bei Zwickau, Blaß in Elberfeld und jüngſt Laurentius in Leipzig gefolgt.

Farrn wurden insbeſondere vermehrt durch die ſeltenen Marattiaceen: Marattia salicina, M. Laucheana, Angiopteris pteroides de Vriese, ſo wie durch Platycerium Stemmaria und Pl. grande (Pl. alcicorne war ſchon früher vorhanden), durch das immer noch ſehr koſtbare Acrostichum crinitum u. m. a., die im Freien nun ſchon durch zwei Winter cultivirte baumartige Gramineé Bambusa aurea aus Japan; ferner Smilax China aus Japan, Lilium giganteum, welches im vorigen Sommer blühte; Haemanthus toxicarius, deſſen Zwiebel den Buſchmännern nach Livingſton zur Bereitung des Pfeilgiftes dient zugleich mit dem Safte der gleichfalls hier vorhandenen cactusähnlichen Euphorbia arborescens, Vanilla planifolia Andr. und V. gujanensis Splitg., die außer V. aromatica ebenfalls Handelsſorten der Vanille liefern; Copernicia cerifera Ht. Amstel., von welcher das unter dem Namen Carnauba bekannte Mehl des Handels ſtammt; Borassus flabelliformis, die Hanfnußpalme Oſtindiens; Pleetocomia elongata Mart. aus Java, die amerikaniſchen Sagopalmen Caryota mitis Karst. und C. excelsa Hort. Aug.; Calamus verus Lour. jetzt eben blühend, eine der Mutterpflanzen des Drachenblutes; die in England im Freien ausdauernde Cha-

maerops excelsa Thunb. aus Japan; die Kohlpalmen Braſiliens Cocos oleracea Mart. und Euterpe oleracea Mart.; die ſelten ächt vorkommende Sabal Palmetto Lodd.; der noch wenig verbreitete Pandanus reflexus (Doornia reflexa de Vriese) (Pandanus furcatus iſt nun zu einem Exemplare mit 15 Fuß langen Blättern herangewachſen). Araucaria Bidwillii in einem 4 Fuß hohen Exemplare; Dammara alba, orientalis und australis, Mutterpflanzen der verſchiedenen Sorten des Dammaraharzes; Liquidambar imberbe Ait. aus Kleinaſien, die eigentliche Mutterpflanze des Styrax liquida, hat jetzt ſchon zwei Winter im Freien überdauert; Artemisia Moxa DC., eine japaniſche Arzneipflanze; Cinchona Condaminea Lam.; außerdem noch vorhanden C. ovata, pubescens und Calisaja Wedd.; die ſchöne Araliacee Oldfieldia africana Berthel. & Hook. Das afrikaniſche Teakholz; die braſilianiſchen Fieberrindenbäume Crataeva Tapia L. und C. tapioides DC.; der Baumwollenbaum der amerikaniſchen Tropenländer Bombax Ceiba; Hebradendron cambogioides Graham; die Mutterpflanze des Ceyloniſchen Gummiguttis, die des braſilianiſchen Takamahakas, Calophyllum Madrunno, der weiße Zimmtrindenbaum Canella alba Murr., der Gummiguttibaum von Myſore Xanthochymus pictorius Roxb. nebſt den früher ſchon vorhandenen, in Europa weniger verbreiteten indiſchen Fruchtbäumen der Cluſiaceen, wie Garcinia Mangostana der wohlſchmeckendſten Frucht Aſiens, Rheedia lateriflora L. und der Mammei-Frucht Mammea americana aus Weſtindien; die Mutterpflanze des wurmwidrigen Carapa-Oels, Carapa guianensis Aubb. aus Guiana; der Caracas-Fieberbaum Cedrela montana Karst., der Cascarillenſtrauch Croton Eluteria Sw.; der Caranaharzbaum Bursera gummifera Jacq.; Guajacum arboreum DC. Akajouholzbaum; Myrobalanen: Terminalia bellerica Roxb. aus Oſtindien; Eucalyptus globulus, blue gum tree von Vandiemensland, Veilchenbaum, der dort die enorme Höhe von 250—300 Fuß erreicht (Rival der Sequoia Wellingtonia B. Seem.), der Cajeputölbaum Melaleuca Leucadendron, Blätter vom feinſten Oelgeruch dieſes Namens; Lecythis Ollaria, Topffruchtbaum aus Braſilien; Bertholletia excelsa, der Paranußbaum; die mexikaniſchen und braſilianiſchen Copalbäume Hymenaea Courbaril und H. stilbocarpa Hayne; der Copaivabalſam Copaifera officinalis; die officinellen Röhren und braſilianiſchen Caſſien Cassia fistula und brasiliensis; Myrtus Pimenta, welches alljährlich bei uns blüht, entwickelte im vorigen Jahre auch reife Früchte; die merkwürdigen Kannenträgerpflanzen aus verſchiedenen Familien, wie Nepenthes- und Sarracenia-Arten, die Noronta guianensis, deren Bracteen ſchlauchförmig ſind und die ſeltene, ſchwer zu cultivirende neuholländiſche Cephalotus follicularis, die Schlauch und auch gewöhnliche Blätter trägt. Der ſo überaus intereſſante Cycadee mit Farrnblättern Stangeria paradoxa darf ich entgegenſehen. Unſer großes Exemplar von Cycas revoluta von 5 Fuß Stammhöhe mit 60—80 Wedeln, welches im Jahre 1854 blühte, entwickelt ſeit jener Zeit zwei Blattkronen und ſchickt ſich an dichotom zu werden u. m. a.

Breslau, den 3. April 1859.

Garten-Notizen.

Etabliſſement des Herrn Ambr. Verſchaffelt.

Das Etabliſſement des Herrn Ambroiſe Verſchaffelt in Gent hat in den letzten Jahren einen erſtaunlichen Aufſchwung genommen und nimmt jetzt unter den erſten Handelsetabliſſements des europäiſchen Continents eine würdige Stelle ein. Sind die dortigen Kulturen auch noch nicht die allerumfaſſendſten, ſo findet man dennoch eine Auswahl der ſchönſten und gangbarſten Gewächſe und, was ſehr viel werth iſt, die Pflanzen befinden ſich faſt durchgehends in einem äußerſt geſunden Zuſtande. Jeder, der das Etabliſſement des Herrn Ambr. Verſchaffelt beſucht hat, kann nicht Rühmendes genug von demſelben mittheilen.

Die Sammlung beſteht hauptſächlich aus Gewächſen des Warm- und Kalthauſes, unter dieſen natürlich nur das beſte und ſchönſte, ſowohl unter den reinen Species wie unter den Hybriden. Von Rhopala werden im neueſten Verzeichniſſe (65) 11 Arten aufgeführt, 4 Theophrasta, unter dieſen die neue Th. imperialis zu 150—400 Fr., Urania speciosa und amazonica zu nur 10 und 25 Fr. notirt. — Die Farrn- wie Orchideenſammlungen ſind weniger bedeutend, dennoch findet der Pflanzenfreund unter beiden Familien eine hinreichende Auswahl ganz herrlicher Arten. An Palmen iſt das Etabliſſement ziemlich reich und ſind viele Arten zu nur ſehr mäßigen Preiſen notirt. Es befinden ſich in dieſer Sammlung ſehr ſeltene Arten, die natürlich auch nur zu hohen Preiſen abgebbar ſind. Wie die Gewächſe für's Warmhaus zeichnen ſich auch die des Kalthauſes aus, ſo beſonders die Aralia-Arten, Clematis, Chorozema, Epacris, Eriostemon, Lomatia, Pimelea u. v. a. Indiſche Azaleen, Camellien und Rhododendron ſind bei Herrn Verſchaffelt ganz beſonders zahlreich und ſchön zu finden. Die Camellienſorten ſind nach den Jahrgängen zuſammengeſtellt, wie ſolche in der unübertrefflich ſchönen „Nouvelle Iconographie des Camellias“ von Ambr. Verſchaffelt abgebildet worden ſind, welches Prachtwerk bereits 9 vollendete Jahrgänge zählt und noch ununterbrochen fortgeführt wird.

Ein Nachtrag zu dem oben erwähnten Verzeichniſſe iſt unlängſt erſchienen, durch welches den Blumen- und Pflanzenfreunden eine Menge neuer, ſchöner und ſeltener Pflanzen angeboten werden, unter dieſen die hübſche Calliearpa purpurea, Alstroemeria argenteo-vittata, 4 neue prächtige indiſche Azaleen, nämlich A. Leopold I., Duc de Brabant, Etoile de Gand und Reine des panachées. Der reizende Amygdalus camelliaeflora iſt in 4—5 Fuß hohen Exemplaren in Töpfen zu 25 Fr. zu beziehen, ferner eine neue Dicltytra, D. cucullaria, Gentiana Fortunei und vieles andere mehr.

Bei den Pflanzen, die in der „Illustration horticole“ abgebildet ſind, iſt jedesmal die Tafel dieſes Werkes citirt, ein Werk, das den Pflanzenfreunden nicht genug empfohlen werden kann, theils wegen der vorzüglich gut angefertigten Abbildungen, die ohne jede Uebertreibung dargeſtellt ſind, theils wegen der ausführlichen Beſchreibungen und Synonymie der Pflanzen und dann wegen ſeines ſonſtigen gediegenen In-

haltes, außerdem kostet das Werk, das regelmäßig jeden Monat erscheint, nur 18 Fr.

Kew-Garten.

Der Director des botanischen Gartens zu Kew, Sir W. J. Hooker, hat so eben den Jahresbericht für das verflossene Jahr über dieses großartige Institut veröffentlicht, sich dabei aber hauptsächlich nur auf die Verbesserungen ꝛc. beschränkt.

Der Besuch des Gartens von Seiten des Publikums war wieder ein ganz erstaunlicher, während derselbe im Jahre 1857 von 361,978 Personen besucht worden war, besuchten ihn im Jahre 1858 405,376 Personen. Im Monat Juni allein wurde er von 82,455, im Juli von 88,965 und im August von 95,802 Personen besucht. Am stärksten war der Besuch des Sonntags, so am 8. August von 12,763, am 1. August von 13,761 Personen u. s. w.

Eine größere Sorgfalt wurde auf die Ausschmückung des Gartens selbst während des letzten Jahres verwendet. Die Zahl der Blumenbeete wurde vermehrt und abwechselnd untermischt mit zahlreichen Blüthensträuchern des freien Landes, und schöne immergrüne Gehölze wurden auf die Rasenplätze gepflanzt. — Den ersten Gartengehülfen ist ein höheres Gehalt bewilligt. — Die vielen Gewächshäuser sind in einem vorzüglichen Zustande und enthalten große Pflanzenschätze. Viele Gewächshäuser sind bereits wieder überfüllt und da es unmöglich ist, jede eingeführte Pflanze zu kultiviren, so beschränkt man sich jetzt auf die Erhaltung und Vermehrung derjenigen Pflanzenarten, die sich durch Schönheit auszeichnen oder von medizinischer oder technischer Wichtigkeit sind. Das Palmenhaus mit seinen Seltenheiten erregt noch immer die Bewunderung eines jeden Besuchers.

So herrlich und bewunderungswürdig nun auch die Gewächshäuser für die tropischen Gewächse dastehen, so mangelhaft sind die für die Kalthauspflanzen, namentlich für die Pflanzen aus Südafrika, Australien, Mexico ꝛc., für Coniferen, die seit 18 Jahren den Stolz des Gartens ausmachen. Viele der herrlichen Araucarien und andere reichten bereits im Jahre 1841 bis unter die Fenster der höchsten Gewächshäuser des Gartens und mußten verstümmelt werden, um sie nicht ganz eingehen zu lassen. Es ist aber keineswegs Sorglosigkeit derjenigen Männer, welche an der Spitze dieses Instituts stehen, daß nicht schon längst diesem Bedürfnisse abgeholfen worden ist. Das kostspielige Palmenhaus und verschiedene andere beträchtliche Ausgaben für die Erweiterung und vortreffliche Unterhaltung der Sammlung und des Gartens erfordern eine Pause, ehe an die Erbauung eines anderen, gleich großen Hauses für die Gewächse des temperirten Klimas gedacht werden kann, leider zum Nachtheile vieler seltener und herrlicher Pflanzen in den prächtigsten Exemplaren, für deren fernere Erhaltung nun nicht mehr eingestanden werden kann, wenn im Laufe dieses Jahres keine Erweiterung der Häuser stattfinden sollte.

Das Herbarium und die Bibliothek (oder wissenschaftliches Departement) und das Museum für ökonomische Botanik haben sich seit der Gründung beträchtlich erweitert.

Das Herbarium, das dem Publikum zugänglich ist und aus der Sammlung des Directors (Sir W. Hooker) und der Sammlung des Herrn Bentham besteht, der sein Herbarium bekanntlich dem Staate übermacht hat, nimmt noch immer den ersten Rang in Europa hinsichtlich seiner Größe und Nützlichkeit ein. Ob das Herbarium des brittischen Museums noch nach Kew übersiedelt werden wird, darüber ist leider bisher noch kein fester Beschluß gefaßt worden.

Die Bibliothek steht in einem gleich großen Rufe, nicht gerade wegen ihrer Reichhaltigkeit als wegen ihres Nutzens.

Das Museum muß in Augenschein genommen werden, um dasselbe völlig zu verstehen. Der Zuwachs der Sammlung durch die Liberalität der Kaufleute und Reisenden ist sehr beträchtlich gewesen.

Der Königl. Pleasure Ground hat wenig Veränderung erlitten seit der Vergrößerung des Arboretums. Der anstoßende Theil von 30 Morgen Landes mit Inbegriff der Queen's Cottage ist durch neue Wege und Anpflanzungen vielfältig verschönert worden. Die Baumschule (im Pleasure Ground gelegen) hat gegen 18,000 Bäume und Sträucher zur Ausschmückung des Parkes hergegeben, zugleich wurden auch noch 2814 Stück Gehölze (Bäume und Sträucher) an den Victoria- und Battersea Park abgegeben, also im Ganzen 20,559 Stück.

Nach G. Ch.

Der Samengarten der Herren P. Smith & Co. in Bergedorf.

Zur Zeit als noch die Gärtnerei des Herrn Böckmann hierselbst bestand, war diese es namentlich, zu der alljährlich die Pflanzenfreunde wanderten, um sich über eine prachtvolle Collection Pelargonien zu erfreuen. Seit dem Aufhören dieser Gärtnerei haben wir jetzt in unmittelbarer Nähe Hamburgs keine hervorragende, großartige Sammlung dieser lieblichen Pflanzengattung und die Blumenfreunde müssen nun schon eine weitere Tour machen, wenn sie sich durch eigene Anschauung von den alljährlich neu hinzukommenden prächtigen Varietäten Kenntniß verschaffen oder sich an den Anblick, den eine Collection von mehreren hundert Sorten in vollster Blüthenpracht gewährt, ergötzen wollen. — Die hervorragendsten Pelargoniensammlungen finden wir jetzt bei den Herren James Booth & Söhne in Flottbeck, bei den Herren J. H. Ohlendorff & Söhne und bei den Herren P. Smith & Co. in Bergedorf und war es die letztere, welche wir Anfangs Juni zu sehen Gelegenheit hatten. Die Sammlung besteht aus über 200 Sorten, von denen die „Fancy“ oder Fantasie-Pelargonien in vollster Blüthenpracht standen, während die großblumigen Sorten noch nicht sämmtlich völlig ihre Blüthen entfaltet hatten. Um die Blumenfreunde auf die Pelargonien-Sammlung der Herren P. Smith & Co. aufmerksam zu machen, brauchten wir eigentlich nur auf deren Preis-Verzeichniß über Floristen-Blumen pro 1859 hinzuweisen, worin die schönsten Sorten verzeichnet und ausführlich beschrieben stehen. Heut zu Tage jedoch ist es schwer eine Auswahl nach den Verzeichnissen zu treffen, man muß die Blumen erst selbst sehen, ehe man kauft und so wollen wir denn hier nachstehend einige Sorten aufführen, die wir unter den vielen schönen als die

schönsten notirten und die gewiß auch den Beifall eines noch so strengen Kritikers erhalten dürften.

1. Großblumige Pelargonien.

Neueste Sorten.

Aquilla, untere Blumenblätter scharlach, obere schwarz, scharlach gerandet.

Empress Eugenie (Story), rein weiß mit tirschrothen Flecken in den oberen Blumenblättern, extra schön.

Richard Benyon (Hoyle), tief orange-carmoisin, obere Blumenblätter fast schwarz, ausgezeichnet.

Rosé Celestial (Turn.), sehr große Blume mit rein weißem Centrum, untere Blumenblätter rosa und schwarzbraunen Flecken in den oberen Blumenblättern, sehr reich blühend.

Neuere Sorten.

Marie (Story), eine extra Blume, rein weiß mit schwarzrothen Flecken.

Rose Raglan (Hoyle), rosa, obere Blumenblätter gefleckt, große Blumen und Dolden, herrlich.

Aeltere Sorten.

Princess Royal (Henders.), hellpurpur und sammtschwarz, tiefroth gerandet.

Vulcano, reich scharlach mit dunkelbraunen Flecken, sehr schön.

2. Großblumige Sorten mit auffallend gezeichneten Blumen.

Neueste Sorten.

Emperor, eine extra Blume, untere Blumenblätter rein weiß mit purpur Flecken, obere sammtpurpur, weiß gerandet, große Blumen.

Queen of Beauties (Turn.), weiß mit carmin Flecken in den unteren Blumenblättern und einem großen carmin Flecken in den oberen Blumenblättern, große Dolden, sehr frei blühend.

Neuere Sorten.

Alexander (Dobson), obere Blumenblätter glänzend schwarz-braun, carmin gerandet, untere lachsscharlach, dunkelbraun gefleckt und geadert, carmin gerandet, ganz vorzüglich.

Conqueste (Demay), carmoisin mit schwarzen Flecken auf allen Blumenblättern, extra.

Eole, weiß mit pflaumenfarbigen Flecken, sehr schön.

Glow'worm, glänzend hellrosa, auf allen Blumenblättern einen dunkelbraunen Flecken, auffallend und extra schön.

Guillaume Sovereyns, eine glänzend violett-rosa Varietät, in allen Blumenblättern einen schwarz-braunen Flecken, sehr auffallend und extra schön.

Lord Raglan, scharlach-carmoisin mit großen dunkelbraunen Flecken auf den oberen Blumenblättern, auffallend, extra schön.

Mr. Beck (Turn.), die unteren Blumenblätter sind hellrosa, braun gefleckt, die oberen sind schwarz-braun, hellrosa gerandet, das Centrum weiß.

Mr. Hoyle (Turn.), eine hellrosa Blume mit weißem Centrum, auf allen fünf Blumenblättern einen schwarz-braunen Flecken, umgeben von einem scharlach Ringe, extra schön.

Madame Pescatore, carmoisin scharlach, weiß gerandet, weißes Centrum, dunkelbraunen Flecken auf jedem Blumenblatt, sehr schön.

Napoleon III., eine vorzüglich schöne Blume, die unteren Blumenblätter sind hellrosa mit schwarz-braunen Flecken, braun getuscht und geadert, die oberen sind glänzend schwarz-braun, scharlach gerandet.

Rollissonii, hellrosa, carmoisin geadert, mit dunkelbraunen Flecken, sehr hübsch.

Spotted Gem (Turn.), eine rosa-lilla Blume, jedes Blumenblatt auffallend gefleckt, schön.

Verschaffeltii (Miellez), eine lachsfarbene Blume, deren Blumenblätter geadert und gesprenkelt sind, sehr schön.

Vespa, weiß mit einem pflaumenfarbenen Flecken auf jedem Blumenblatt.

Wie unter diesen großblumigen Sorten giebt es auch unter den sogenannten Fancy-Sorten ganz vorzügliche Varietäten und es wird einem in der That schwer zu sagen, welche Sorten den Vorzug vor den anderen haben, sie sind fast sämmtlich schön und es ist zu verwundern, daß diese Pelargonien nicht noch allgemeiner kultivirt werden.

Als ganz vorzüglich schön notirten wir:

Bridesmaid (Turn.), ganz neu, **Amphitrite** (Henders.), **Bird of Paradise**, **Cloth of Silver**, **Duke of Cambridge** (Henders.), **Evening Star** (Henders.), **Giovanna**, **Jeunette** (Henders.), **Lady Hume Campbell** (Miller), **Nerée**, **Queen of the Fancies** (Henders.), **Belle Marie** (Ambr.), **Bride** (Henders.), **delicata** (Ambr.) und **Prima Donna** (Henders.).

Unter den scharlach-, rosa- und weißblühenden Pelargonien, die sich besonders zu Gruppen auf Rasenplätzen eignen, sahen wir neben den bekannten zwei ganz vorzüglich schöne neue Sorten, nämlich:

Scarlet Globe (Morgan) mit großen lebhaft scharlach Blumen mit weißem Auge, die Blumendolden sehr groß, reich blühend und die Pflanze von zwergigem Habitus, und

Scarletina (Waite), reich scharlach mit weißem Auge, große Blumendolden, beide ganz vorzüglich schön.

Zu den buntblättrigen Pelargonien, von denen man im Garten der Herren Smith & Co. allerliebste Gruppen sieht, jede Gruppe jedesmal nur aus einer Sorte bestehend, zählt man jetzt auch schon bereits an 20 verschiedene empfehlenswerthe Sorten, von diesen machten einen ganz besonders guten Effekt:

Brillant, tiefe scharlach Blumen mit weiß gerandeten Blättern, reich blühend, schöner Habitus.

Emperor, ganz neu, brillant scharlach, schöne Form, Blätter silberweiß gerandet.

Lady Plymouth, mit rein weiß gerandeten Blättern.

Ivy Leaf, epheublättrig, grün mit weißem Rande.

Bijou und **Perfection**, ganz neu mit silberweiß gerandeten Blättern und brillant scharlachfarbenen Blumen, ganz ausgezeichnet.

Die Petunien, Verbenen und Fuchsien, von denen Herr Smith ganz vorzügliche Sortimente hält, waren zur Zeit unsers Besuches nur erst wenige in ihrer Blüthenpracht. Als ausgezeichnet schön möchten wir empfehlen die

Petunia Antigone, rein weiße, große, stark gefüllte und ungemein lieblich duftende Blumen.

P. Comte de Limminghe, große rosa Blumen, stark gefüllt.

P. General Havelock, große lebhaft carmoisinrothe Blumen, sehr stark gefüllt.

P. Tom Thumb, violett-rosa, purpur gestreift mit dunklem Schlunde. Die Pflanze wird nur 6 Zoll hoch und eignet sich ganz vorzüglich zu Gruppen.

Von neuen Verbenen, die erst im Mai zum ersten Male abgegeben worden sind und zum ersten Male in Blüthe standen, verdienen ganz besonders hervorgehoben zu werden:

Cyclops (Edmond), braune Blumen mit großem weißem Auge, eine ganz neue Färbung.

Eclipse (Edmond), tief glänzend scharlach mit weißem Auge, sehr lebhaft und unstreitig die beste scharlachrothe Verbene, ganz vorzüglich zu Gruppen.

Lady Seymour (Edmond), rosa-lilla, großes citronengelbes Auge, die Blumendolde sehr groß, vorzüglich schön.

Vergleicht man diese vier Verbenen wie viele andere Varietäten neuester Zeit mit der Urform, aus der sie nach und nach hervorgegangen sind, mit der in den meisten Gärten ganz verschollenen V. chamaedrifolia Juss. (Melindre Hort.), so sollte man es kaum glauben, daß sie von dieser Art abstammen, so sehr hat sich die Form der Blume durch die Kultur verändert.

Das Calceolarien-Sortiment, namentlich der sogenannten strauchigen Varietäten, ist bei Herrn Smith ein ganz vorzügliches; wir sahen Blumen von so enormer Größe und von so herrlicher Färbung und Zeichnung, daß man diese mit zu den besten Blumen der krautigen Calceolarien zählen würde. Viel zu wenig werden diese Calceolarien in Gärten verwendet, was um so mehr zu bewundern ist, da sie fast den ganzen Sommer hindurch sowohl in Töpfen als ganz besonders aber im freien Lande in Blüthenpracht haben kann.

Mögen für diesmal diese wenigen Notizen über die vorzüglichen Floristenblumen genügen, mögen sie aber auch ihren Zweck nicht verfehlen und die Aufmerksamkeit der Blumen- und Pflanzenfreunde auf diese Gewächse durch sie gelenkt werden, zugleich auch noch die Hamburg besuchenden Garten- und Pflanzenfreunde animiren einen Abstecher nach dem freundlich gelegenen Städtchen Bergedorf zu machen und dem Garten der Herren P. Smith & Co. einen Besuch abzustatten, wo sie so viel Schönes und Neues, besonders unter den Floristen-Blumen, annuellen Gewächsen und im Freien ausdauernden immergrünen Gehölzen, namentlich Coniferen, finden werden. Ein freundliches, liebevolles Entgegenkommen von Seiten der Herren Besitzer dieser, in größter Sauberkeit gehaltenen Gärtnerei, kann sich jeder Besucher gewärtigt sein.

E. D—o.

Hannoversche Sitten und Gebräuche
in ihrer Beziehung zur Pflanzenwelt.

Ein Beitrag zur Culturgeschichte Deutschlands.

Von Dr. Berthold Seemann.

Im vorigen Jahrgange der Hamburger Gartenzeitung (S. 346) theilten wir den geehrten Lesern eine Abhandlung, betitelt: „Hannoversche Sitten und Gebräuche in ihrer Beziehung zur heimathlichen Flora von Herrn Dr. B. Seemann“, mit, die sich eines so allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte, daß wir nicht anstehen dieser eine zweite ähnliche, gleich vortrefflich geschriebene Abhandlung unter obigem Titel von demselben Verfasser folgen zu lassen. Diese Abhandlung ist ein Auszug aus einem populären Vortrage, den Herr Dr. B. Seemann in der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover am 20. April d. J. gehalten hat und von ihm zuerst in No. 8 der „Bonplandia“ weiter veröffentlicht worden ist. —

„Es giebt nur wenige allgemein verbreitete Sitten und Gebräuche der Stadt Hannover und deren Umgegend, bei denen nicht die eine oder andere Pflanze, sei es in materieller, sei es in ideeller Hinsicht, betheiligt ist. Wollte man schulmeisterisch verfahren, so könnte man dieselben erstens in ihrem Zusammenhange mit der einheimischen Flora, zweitens mit der eingebürgerten oder eingeführten, und endlich drittens mit der fremdländischen behandeln. Drei Thatsachen würden in Folge dieser Behandlung besonders hervortreten. Bei der Betrachtung der streng heimathlichen Pflanzen würde uns der innige Zusammenhang derselben mit den Ursitten und dem Naturdienste unserer alten Vorfahren einleuchten; bei den aus fremden Ländern zugeführten und bei uns eingebürgerten Pflanzen würden wir auf die scharf ausgeprägten Gesellschaftszustände der entlegensten Völkerstämme stoßen. Die Anwendung der Myrthe und des Lorbeers würde uns das klassische Griechenland mit seinem vollendeten Schönheitssinne vor die Seele rufen, der Gebrauch des Tabacks uns an die an dramatischem Interesse reiche Entdeckung der neuen Welt erinnern, wo spanische Hidalgos mit einem gemischten Gefühle von Abscheu und Mitleiden nackte Wilde zusammengerollte Blätter eines Giftkrautes rauchen, kauen und schnupfen sahen oder englische Abenteurer mit hochgesinnten Indianern Nordamerikas die Friedenspfeife rauchten. Eine Betrachtung der Sitten und Gebräuche in ihrem Zusammenhange mit der streng fremdländischen Flora endlich, — der Geschichte der verschiedenen von uns alltäglich gebrauchten ausländischen Pflanzenerzeugnisse würde uns einen klaren Blick in die innigen und wichtigen Beziehungen thun lassen, welche zwischen den entlegensten Gegenden der Erde, den entferntesten Völkerschaften und uns selbst bestehen, und wohl geeignet sein, uns das schöne Band erkennen zu lassen, das die Gottheit um alle Menschen wohlweislich geschlungen hat. Die dampfende Theekanne würde uns an das durch Despotenmacht geistig erstarrte China, der geschlürfte Kaffee an das glückliche Arabien erinnern;

bei der Betrachtung von Baumwollenſtoffen würden wir einen Seufzer nicht unterdrücken können, daß es gerade, um Material zu dieſen Geweben zu ſchaffen, nothwendig befunden wird, Negerſclaven zu halten, daß gerade die unbedeutende Baumwollenpflanze der Zankapfel hat werden müſſen, welcher die größte Staatengeſellſchaft des herrlichen Amerikas in ihren Grundfeſten erſchüttert. Doch da ich kein Schulmeiſter bin, ſo muß man es mir zu Gute halten, wenn ich nicht als ſolcher kehre und mich mit Erſtens, Zweitens und Drittens für heute ängſtlich quäle, beſonders da ich durch einen weniger methodiſchen Gang meinen Zweck vollkommen zu erreichen hoffe.

Die Schaubühne nimmt die Aufmerkſamkeit der Hannoveraner zu ſehr in Anſpruch, als daß ſie hier gänzlich unberührt bleiben dürfte, wäre es auch nur, um der zierlich gebundenen Blumenſträußchen und der ſogenannten Lorbeerkränze zu gedenken, welche den Darſtellenden als Beifallsbezeugung huldigend zugeworfen werden. Ich ſage abſichtlich „ſogenannte“ Lorbeerkränze, denn Jemand, der hinter die Couliſſen geſchaut, weiß, daß aus der nahen Eilenriede geholtes Fuhnſch- und Stechpalmenlaub, dem die Stacheln abgeſchnitten oder auch die Blätter des Laurustinus (Viburnum Tinus) in vielen Fällen die Stelle des claſſiſchen Lorbeer vertreten müſſen. Auch kreuzen ſich die Intereſſen der Wiſſenſchaft mit denen der Bühne in mehr als einer Beziehung, und zwar ſeit dem Tage, wo Caroline Neuberin hiſtoriſch richtige Anzüge einführte, und wo der früher nur mit Worten angedeutete Hintergrund der Bühne ein möglichſt treues Bild des Ortes der Handlung wiedergab. Der Naturforſcher kann indeß in ſeiner Stellung zur Kunſt nur Puriſt ſein. Der Anblick eines blühenden Kirſchbaumes neben einem reifen Getreidefelde in ein und derſelben Decoration berührt ihn ebenſo unangenehm wie das muſikaliſche Ohr eine falſche Note. Unſere Hofbühne hat in der Herſtellung richtiger Decorationen in neueſter Zeit manchen Fortſchritt gemacht, und ſind namentlich tropiſche Pflanzenformen mit einer Treue wiedergegeben, daß ſie ſofort wiſſenſchaftlich beſtimmt werden könnten. Die Prachtwerke unſerer großen Reiſenden, ſowie die Pflanzenſchätze der königlichen Gärten haben dazu das Material liefern müſſen, und vom botaniſchen Standpunkte aus würde man das Geſchaffene unbedingt loben können, wären nicht Gewächſe der öſtlichen und weſtlichen Halbkugel bunt durch einander gemiſcht. Doch die Decorations- wie die Landſchaftsmalerei iſt noch zu ſehr in ihrer erſten Kindheit als daß ſie allen wiſſenſchaftlichen Anſprüchen genügen könnte, und mit der Blumenmalerei ſteht es ſo ſchlecht, daß wir in ganz Deutſchland nur zwei Männer haben, die in dieſer Kunſt Meiſter ſind. Fehler und Verſtöße, die der Fachgelehrte auf den erſten Blick gewahrt, fallen manchen Malern kaum auf, weil ihnen die tiefere Einſicht, welche das wiſſenſchaftliche Studium verleiht, abgeht; z. B. bei Betrachtung des bekannten Stahlſtiches „Joſeph von ſeinen Brüdern verkauft“ ſpringt es dem Botaniker ſogleich in die Augen, daß unter der Wüſtenvegetation ſich die freilich jetzt im Morgenlande viel und weit verbreitete Cactuspflanze (Opuntia vulgaris) findet, die doch zu den Zeiten der Pharao's die Grenzen der neuen Welt nicht überſchritten hatte. Aehnliche Anachronismen gewahren wir zuweilen auf der Bühne, und zwar durch einen Schickſalsſtreich meiſtens da, wo man ſich bemüht hat, recht naturgetreu

zu sein. So gab man neulich in einer größeren Stadt das Schauspiel: „die Sabinerinnen“. Da sah man freilich die melancholische italienische Pinie, die schlanke Cypresse und die hundertjährige Agave, wie sie heutzutage um Rom vorkommen. Nichtsdestoweniger mußte das stachelige Laub der Letzteren jedem Eingeweihten ein anachronistischer Dorn im Auge sein, da bekanntlich die Agave americana erst nach der Entdeckung des Columbus das Bürgerrecht in Europa erlangte.

In allen Ländern des nördlichen Europa, so auch bei uns, ist die Fenstergärtnerei beachtenswerth. Oft geben in den ärmlichsten Hütten, wo der praktische Ernst des Lebens grinsend vor der Thür steht, einzelne wohlgepflegte Blumenstöckchen davon Zeugniß, daß bei dem Bewohner Sinn für Poesie nicht gänzlich erstarrt ist. Doch das Verzeichniß der auf diese Weise gezogenen Gewächse ist selbst bei bemittelteren Leuten im allgemeinen gering, und trotz der zahlreichen Neuigkeiten, die kühne Reisende uns alljährlich, bald aus düsteren Urwäldern der Tropen, bald aus lichten Ebenen und feuchten Bergschluchten der gemäßigten Zone zuführen, gewinnt es wenig an Ausdehnung. Da erblicken wir dasselbe rothe Schustergeranium, das dankbarere Sorten schon längst aus allen Gärten verdrängt haben, dasselbe Epheu-, Citronen- und Muscatgeranium, das bereits unsere Großeltern zogen, die Brand-Aloë, von der gelegentlich die Nachbarskinder ein Blatt zur Heilung von Brandschäden erhalten, den Rosmarin, das Eiskraut, die Perlaloë und die am Vorgebirge der guten Hoffnung von Schweinen so gern gefressene Calla; ein Monatsröschen, ein Heliotrop, eine Fuchsia und im Sommer Balsaminen, Basilicum und Reseda schließen sich der schönen Reihe an. Selten fehlt jedoch die feinblätterige Myrthe. Diese, früher der Venus heilig, steht jetzt unter dem besonderen Schutz unserer deutschen Mädchen, und eine jede hält es für Pflicht, wenigstens ein Myrthenstöckchen in ihre unmittelbare Pflege zu nehmen, um stets Material zur Hand zu haben, den „schönen grünen Jungfernkranz“ zu winden, wenn die Busenfreundin ihren Ehrentag feiert. Es hat daher die Myrthe eine viel höhere symbolische Bedeutung im deutschen Leben als der Brautkranz von Orangenblüthen im englischen und französischen, und keine Hochzeit würde ohne sie vollkommen sein. Die tiefe, darin liegende Poesie wird freilich von Denjenigen gänzlich übersehen, welche uns so viel von Civilehe vorreden. Keine Wünschelruthe, so mächtig sie auch nur das Märchen ersinnen kann, dürfte eine solch' magische Wirkung hervorbringen, als es der Myrthenkranz in dem Augenblick thut, wo er auf die Locken der Braut gedrückt wird. Eine liebliche Verklärung überströmt ihr ganzes Gesicht, verwandelt die leblosesten Züge und rechtfertigt gewissermaßen die häufig gehörte Bemerkung, daß es keine häßliche Braut gebe. Bald nach der Trauung wird der bedeutungsvolle Kranz abgenommen, und jede Brautjungfer sucht dann wenigstens ein Sproß desselben zu bekommen, um ihn als Steckling zu benutzen. Mit Myrthenstecklingen sind jedoch unsere Fenstergärtner selten erfolgreich, obgleich dieselben unter geschickter Hand wie Unkraut wachsen. Es kommen recht viele mißglückte Versuche vor; auch sagt man, es sei nothwendig, am untern Ende des Steckлings ein Kreuz zu schneiden, um in dasselbe ein Gerstenkorn zu stecken. Durch einen Proceß, der nicht weiter erklärt wird, soll der Steckling zu derselben Zeit Wur-

zeln ſchlagen, wo das Gerſtenkorn zu keimen beginnt. Ehe ich wußte, daß es nöthig ſei unmittelbar unter den Blattanſätzen den Steckling abzuſchneiden, damit er leicht Callus bilden könne, machte ich bisweilen Verſuche in dieſer Richtung, hatte jedoch damit ebenſo wenig Glück als mit den Sperlingen, die ich durch Aufſtreuen von Salz auf den Schwanz einzufangen hoffte.

Die Kopfbedeckungen, welche unter dem Namen der Panama-Hüte ſeit einigen Jahren bei uns Eingang gefunden haben, werden nicht alle auf der Landenge von Panama verfertigt, ſondern bei weitem die Mehrzahl derſelben und noch dazu die beſten Sorten in Manta, Monte Chriſti und anderen Orten Neu-Granada's, ſüdlich von Panama. Dieſe Hüte werden faſt auf dem ganzen Feſtlande von Amerika und in Weſtindien getragen, die beſten koſten von 150—200 Dollar und kommen ſelten nach Europa, nur die ſchlechteren, gröberen Sorten, die in den tag- und nachtgleichen Gegenden der Neuen Welt von den Negern und unteren Volksclaſſen gebraucht, werden maſſenweiſe eingeführt. Panamahüte zeichnen ſich vor anderen Strohhüten dadurch aus, daß ſie nur aus einem Stücke beſtehen, dabei leicht und biegſam ſind. Man kann einen ſolchen Hut aufrollen und in die Taſche ſtecken, ohne daß es ihm großen Nachtheil bringt. In der Regenzeit wird er leicht ſchmutzig; dann wäſcht man ihn mit Seife und Waſſer, hierauf mit Zitronenſaft oder irgend einer andern Säure und ſetzt ihn der Sonne aus; ſo wird ſeine Weiße leicht hergeſtellt. Ich war der Erſte, welcher über dieſe Hüte einen Aufſatz veröffentlichte, und darf daher wohl ein Wort über ihre Verfertigung einſchalten. Die Pflanze, deren Blätter dazu genommen werden, heißt im gemeinen Leben „Jipijape“ oder „Portorico“ und in der botaniſchen Sprache Carludovica palmata. Sie hat das Anſehen einer Palme und findet ſich längs der Weſtküſte Neu-Granadas und Ecuadors. Die Blätter werden eingeſammelt, ehe ſie ſich entfalten, aller Rippen und gröberen Faſern beraubt, und nachdem ſie einen Tag der Sonne ausgeſetzt geweſen, in kochendes Waſſer getaucht, bis ſie weiß werden. Dann hängt man ſie an einem ſchattigen Ort auf und läßt ſie bleichen. Das nunmehr fertige Stroh wird in dieſem Zuſtande von Ecuador und Neu-Granada nach verſchiedenen Plätzen verſendet, beſonders nach Peru, wo die Indianer es viel zu Cigarrentaſchen verwenden, von denen das Stück oft an 40 Thaler koſtet. Das Flechten der Hüte iſt ſehr mühſam. Gröbere werden in ein bis zwei Tagen vollendet, während die feineren oft mehrere Monate in Anſpruch nehmen, daher ſich der große Unterſchied im Preiſe erklärt. Die beſte Zeit zum Flechten iſt bei feuchter Witterung, in der Regenzeit und in den Frühſtunden; bei trockenem Wetter und in den mittleren Tageszeiten bricht das Stroh leicht ab, was ſich bei den fertigen Hüten durch Knötchen verräth, die den Werth des Gegenſtandes vermindern.

Es gibt nur wenige Deutſche, welche ſich nicht ſchämen würden, der Negerſclaverei irgend welchen Vorſchub zu leiſten, und doch wenn die Sache bei Licht beſehen wird, ſo tragen alle mehr oder minder dazu bei, die Lage der Schwarzen zu perpetuiren. Wir alle verbrauchen eine bedeutende Maſſe von Colonial-Waaren, und es iſt ja bekannt, daß der größte Theil derſelben, beſonders Zucker, Kaffee und Baumwolle, mit Sclavenblut getränkt iſt. Manche philanthropiſche Dame, die über die

Schicksale Onkel Tom's bittere Thränen vergießt, hat wohl niemals daran gedacht, daß dasselbe Papier, auf welchem Frau Beecher Stowe's pathetische Erzählung gedruckt ward, aus Baumwollenfasern besteht, die unter eines Legree's Aufsicht eingeerntet wurden. Der Gedanke liegt hier nahe, daß Menschenfreunde nichts gebrauchen sollten, was durch Sclavenarbeit gewonnen wird. Mrs. Fry aß aus diesem Grunde niemals Zucker und hatte auch ihrem Hausgesinde streng verboten, sich jener Süßigkeit zu bedienen. Es trug sich jedoch zu, daß eine Negerin ihres Haushaltes sich eines Tages als Diebin kleiner Geldsummen herausstellte, und als die Herrin fragte, zu welchem Zwecke sie das Entwendete benutzt, erhielt sie zur Antwort: es sei unmöglich, Thee und Kaffee ohne Zucker zu trinken, und habe sie Letzteren dafür gekauft. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Diebin den innigen Zusammenhang kannte, der zwischen Zuckerproduction und Unterdrückung ihrer Stammgenossen besteht; die Gesellschaft aber, die ihn vollkommen begreift, möchte trotzdem geneigt sein, dieselbe Antwort zu geben: sie kann nicht ohne Zucker leben, seien die Folgen auch welche sie wollen. Ein Luxusartikel, an den wir uns einmal gewöhnt haben, bleibt für immer Bedürfniß. So lange also Zuckerbedarf herrscht, und dieser Bedarf beträgt jährlich in Europa allein 1,260,000 englische Tonnen, wovon in England durchschnittlich 36½ Pfund, in Frankreich 12 Pfund, im Zollverein 7 Pfund, in Oesterreich 3½ Pfund, und in Rußland gar nur 2 Pfund auf jeden Kopf kommen; so lange also Zuckerbedarf herrscht, bliebe den Schwarzen wenig Hoffnung auf Freiheit, hätte nicht die Vorsehung uns eine andere Pflanze kennen gelehrt, die ihm Hülfe bringen wird; denn wie das Schwert nur durch das Schwert, das Wort nur durch das Wort bekämpft werden kann, so kann auch nur die Pflanze, welche Knechtschaft bringt, durch die, welche Freiheit verkündet, besiegt werden. Gelingt es also, diese zuckerliefernde Pflanze mit freier Arbeit in solcher Masse zu ziehen, daß sie den ganzen Zuckerbedarf der Erde, der sich in 1858 auf 1,700,000 englische Tonnen belief, befriedigt, so ist ein bedeutungsvoller Schritt zur Befreiung der Schwarzen geschehen. Mancher Runkelrübenzuckerfabrikant unseres Landes mag sich bei diesem Gedanken stolz in die Brust werfen, und dabei wähnen, er übe einen Act der Humanität, wenn er seinen Kunden theuren Zucker verkaufe. Doch ich mag kaum glauben, die dicke, fleischige Runkelrübe sei dazu berufen, des Negers trauriges Loos zu verbessern, obgleich ich mir wohl bewußt bin, daß gegenwärtig eine viel größere Masse Rübenzucker gezogen wird, als vor hundert Jahren alle Colonien zusammen hervorbrachten. Die Zukunft der Runkelrübe ist mehr als zweifelhaft. Das Gewächs gedeiht freilich bei uns gut, und hat auch manche Feldfrüchte verdrängt, aber in Deutschland nicht durch freie Concurrenz, sondern dadurch, daß sie sich unter Schutzzölle gestellt hat; und ich habe zu wenig Vertrauen in alle „schützenden Privilegien", um anzunehmen, daß eine Cultur, die nicht auf eigenen Füßen stehen kann, dermaleinst das Freiheitspanier einer unterdrückten Race werden könne. Dagegen besitzt die wilde Dattelpalme Ostindiens (Phoenix sylvestris) alle Vorzüge, und kommt unter allen Verhältnissen vor, um sie als dasjenige Gewächs erscheinen zu lassen, das fähig ist, den ganzen Zuckerbedarf der Erde zu liefern. Diese Palme soll nach genauen Berechnungen völlig 5 Tonnen Zucker per

engl. Morgen geben, also 2 Tonnen mehr als die Runkelrübe, und 2 mehr als das Zuckerrohr; dabei wächst sie in Länderstrichen, wo freie Arbeit billig ist, und dürfte daher durch ihre Ergiebigkeit sowohl die Runkelrübe wie das Zuckerrohr aus der Cultur verdrängen, und nebenbei im wahren Sinne des Wortes „ein Oelzweig des Friedens“ werden. Sie würde dann nicht die einzige Palme sein, welche den Unterdrückten Heil brachte; auch eine afrikanische Art, die Elaëis guineënsis Gaertn., trug bereits mächtig dazu bei, die Gräuel des Sclavenhandels zu vermindern, indem afrikanische Häuptlinge es vortheilhafter fanden, das zu Stearin-Kerzen gegenwärtig so viel gebrauchte Palmenöl einsammeln zu lassen, als ihre Unterthanen stückweise nach Amerika zu verkaufen.

Ein ähnliches Bewandniß hat es mit dem Kaffee und der Baumwolle, deren Hauptmasse, vorzüglich der Letzteren, durch Sclavenarbeit in Amerika producirt wird. Doch der Kaffee, den uns Amerika erzeugt, ist nur von untergeordnetem Werthe, und wird niemals eine starke Concurrenz mit dem der Levante aushalten können. Er leidet nämlich meistens unter dem Mißstande, daß er in der nassen Jahreszeit reift, daher leicht von Fäulniß und Schimmelpilzen angegriffen wird, vermittelst künstlicher Hitze getrocknet werden muß und oft einen erdigen, unangenehmen Geruch besitzt, der in dem sogenannten Rio-Kaffee fast immer im höchsten Grade gegenwärtig ist. Wir Nord-Deutschen müssen jedoch mit diesen Sorten der neuen Welt meistens vorlieb nehmen, und uns obendrein noch einen tüchtigen Zusatz von im Lande erzeugten Zichorien gefallen lassen, während die Süd-Deutschen meistens schönen Levante-Kaffee schlürfen, was bei unseren Kaffeetrinkern recht oft den bescheidenen Wunsch rege macht: Oesterreich möge sich bald dem Zollverein anschließen.

An Baumwolle liefern die Vereinigten Staaten gegenwärtig nicht allein die beste Sorte, sondern auch die größte Masse, ein Umstand, der, selbst wenn es gelänge Zucker und Kaffee massenweise aus Asien zu erhalten, die endliche Lösung der Sclavenfrage vereiteln würde. Gegenwärtig sind die Ansichten darüber sehr getheilt, ob es jemals möglich sein werde, Baumwolle, die mit der sogenannten „Sea-Island“ Sorte, welche auf dem angeschwemmten Boden der Mississippi-Mündung gezogen wird und im Handel den ersten Platz behauptet, gleich kommt, in Ostindien zu ziehen. Es hat sich jedoch jüngst in Liverpool eine Gesellschaft gebildet, die, mit bedeutenden Geldmitteln ausgerüstet, sich die Aufgabe gestellt hat, den Anbau der Baumwolle in Ostindien auf großem Fuße zu betreiben, und so durch praktische Schritte die Abschaffung der Sclaverei in Amerika anzubahnen.

Ueber hannoversche Gebräuche zu reden, ohne dem des Tabacks zu gedenken, würde ein ebenso großer Verstoß sein als über Ostindien und Südamerika zu schreiben, ohne das Kauen der Betelnuß und der Coca-Blätter zu erwähnen. Das Rauchen scheint den meisten Völkern seit uralten Zeiten eigen gewesen zu sein, wenn auch nicht das des Tabacks; auch unsere Vorfahren dürften davon keine Ausnahme gemacht haben. Doch war es bis zu den Tagen eine wenig verbreitete Gewohnheit, wo der beruhigend wirkende Taback aus Amerika dem aufregenden Thee Asiens und Kaffee Afrikas in Europa begegnete. Die Umständlichkeit, mit der sich die alten spanischen Geschichtsschreiber der Entdeckung der

neuen Welt über den Gebrauch dieſes Krautes erlaſſen, beweiſt, wie unbekannt den Spaniern das Rauchen überhaupt war. Daß ſich die Indianer fein geriebene Blätter in die Naſe ſtopften, und ſich, was wir heut zu Tage eine „Priſe“ nennen, anboten, war ihnen ebenfalls in hohem Grade auffallend; auch das Kauen des Tabacks und die ſchmutzige Nachwirkung deſſelben erfüllte ſie mit Ekel und Erſtaunen, während die Pfeife, welche ſich Kaiſer Montezuma, wie mancher ehrſame deutſche Bürger, nach dem Eſſen anzünden ließ, Cortez und ſeinen Gefährten ungemein luſtig erſchien. Und in der That liegt auch etwas höchſt Komiſches in dem Gedanken: ein vernünftiger Menſch könne ſich ſtundenlang ernſtlich damit beſchäftigen, durch Zuführung von atmoſphäriſcher Luft ein widriges Giftkraut langſam verkohlen zu machen, und dabei ſeine Sprach- und Riechorgane zu Rauchkammern und Schornſteinen umzuwandeln. Allein trotz dieſer lächerlichen Seite, tr. ꝛc. des unbehaglichen Zuſtandes, den der Neuling für ſeine erſte Bekanntſchaft mit dem Tabak durchzumachen, trotzdem die ganze Sitte, wenn man ihrer Meiſter geworden, auch nicht ein Argument für ſich hat, das nicht heftig bekämpft werden könnte, wird doch die Jugend mit einer Macht zu ihr hingezogen, mit welcher die der Lorelei keinen Vergleich aushält und nur die Lockung der Sirenen im claſſiſchen Alterthume einigermaßen eine Parallele bietet. Schon lange, ehe wirklicher Tabak in die Hände der Knaben gelangt, wird mit ſpaniſchen Röhren aus den Stengeln oſtindiſcher Palmen das Cigarrenrauchen, mit Roſenblättern das Pfeifenrauchen praktiſch erlernt. Iſt die, oft ſchwere, Lehrzeit vorüber, ſo kommt Nicotiana Tabaccum und ihre Verwandten an die Reihe, und der Neuling trägt dann unermüdet ſein Scherflein zu der großen Wolke bei, die Tag ein Tag aus über ganz Deutſchland wie der Steinkohlenrauch oder der Nebel über Englands Hauptſtadt ſchwebt. Nur weniger Tabak wird in unſerer Gegend angebaut, und ſchreibt ſich die Einführung dieſes Culturzweiges wohl aus den Zeiten der Continental-Sperre durch Napoleon I. her. Doch iſt dieſe als „Kneller“ bekannte Sorte ſo ſchlecht, daß die feine Naſe vollendeter Raucher ſie ſchon auf geraume Strecken wittert. Früher gebrauchte man bei uns mehr Pfeifen, jetzt mehr Cigarren, welche letztere uns größtentheils entweder direct von Hamburg und Bremen, oder, nachdem ſie eine Seereiſe nach Havana gemacht haben, zukommen. Sonſt ließen ſich echte Havana-Cigarren mit daran erkennen, daß ſie vermittelſt eines eigenthümlichen gelben Baſtes zuſammengebunden waren, deſſen botaniſcher Urſprung bis vor einigen Jahren dunkel war, wo man ihn endlich auf Hibiscus elatus, eine Malvacee, zurückführte; doch iſt das heutzutage kein Beweis der Aechtheit mehr, da Cuba-Baſt uns jetzt von Weſtindien zukommt, wie der in Matten geflochtene Lindenbaſt von Rußland. Wie lange die edle Sitte des Rauchens ſich in Deutſchland halten wird, läßt ſich auch nicht einmal annähernd errathen; daß ſie bleibend eingeführt ſei, iſt zu bezweifeln. Noch hat ſie ihren Höhepunkt nicht erreicht, denn obgleich ſchon ganz kleine Knaben ſich in derſelben üben, ſo iſt doch noch ein Fortſchritt in jener Richtung möglich. Nämlich ſchreienden Säuglingen beider Geſchlechter, wie ich es oft in Südamerika bei den Negern und Zambos geſehen, eine Cigarre calmirend in den Mund zu ſtecken.

Die Zahl der aus Pflanzenſtoffen bereiteten Speiſen und Getränke

ist so groß, daß, da ich kein Kochbuch zu liefern beabsichtige, nur die als Hauptnahrung dienenden, oder die eigenthümlichen kurz erwähnen kann. Die Hauptsorte Brot wird aus Roggenmehl gebacken, und das Hauptgemüse ist die Kartoffel, die bekanntlich vor zwei Jahren in Weimar das hundertjährige Jubiläum ihrer Einführung in Deutschland feierte. Wir hängen an der Kartoffel mit derselben Treue wie der Irländer, und sie erscheint auf die mannigfaltigste Weise zubereitet bei fast jeder Mahlzeit. Eine beliebte Weise, sie aufzutischen, die auch in Braunschweig verbreitet, ist, sie in rohem Zustande zu reiben, und wie Eierkuchen in der Pfanne zu braten, wo sie dann etwa das Aussehen mexikanischer Tortillas de Maiz haben, und unter dem klangvollen Namen „Puffer" zahlreiche Consumenten finden. Die Hannoveraner halten so viel von der Kartoffel, daß sie billigerweise dem braven Manne ein Denkmal errichten sollten, der sie ihnen zuführte. Doch der Name desselben ist schwer zu ermitteln. Ursprünglich aus Chile stammend, hat sich die Kartoffel von dem Süden nach dem Norden Amerikas verbreitet, und soll sie unser Landsmann, der berüchtigte Seeräuber und zugleich berühmte englische Admiral Franz Drake von der Neuen Welt mitgebracht haben. Dr. Klotzsch, der seinen Landsleuten den Ruhm dieser Einführung gewiß gern gelassen, hat jedoch nachgewiesen, daß Drake eben so wenig wie Raleigh das Verdienst zugeschrieben werden kann, dies wichtige Culturgewächs nach Europa gebracht zu haben. Die Kartoffeln oder Kartuffeln hießen lange Zeit, und in den Acten der Preußischen Domainenkammer noch bis 1775 hinab „Tartuffeln", und dieser Name ist wahrscheinlich von Tartufli (Trüffeln), mit denen die Kartoffeln ihrer Gestalt nach Aehnlichkeit haben, entlehnt, deren Diminutiv im Italienischen „Tartuffoli" lautet. Die Vermuthung, ja mehr als Vermuthung, liegt daher nahe, daß die Kartoffel über Italien uns zugekommen. Der englische Name „Potato" ist eine Verdrehung des spanischen Wortes „Batata", mit welchem man die eßbaren Knollen von Batatas edulis bezeichnet, während der französische und holländische Name „Erdäpfel" keine größere Tragweite hat.

Unter dem Grünstoff ragen die verschiedenen Kohlsorten besonders hervor. Der Weißkohl wird im Spätherbst fuderweise in die Stadt gefahren, um größtentheils in Sauerkraut, mit dem man uns im Auslande so arg neckt, verwandelt zu werden. Man mag immerhin über den starken Geruch der Schüssel die Nase rümpfen, allein es würde bei unseren langen Wintern schlecht um uns stehen, wenn wir sie nicht hätten. Als antiscorbutisches Mittel ist sie selbst, wie ich höre, in die amerikanische Marine eingeführt, und gewiß besser als der Citronensaft, den man auf langen Seereisen täglich schlürfen muß.

Suppen giebt es fast so viele wie Tage im Jahre, und eine lange Reihe von aromatischen und pikant schmeckenden Pflanzen muß es sich gefallen lassen, als Suppenkraut zu dienen; besonders aber sind Knollenfellerie, Tripmadam, Petersilienwurzel und Porro die vier vegetabilischen Großmächte des Suppentopfes. Porro kann ich nie ansehen, ohne dabei der komischen Auftritte zu gedenken, die Shakespeare in seinem Heinrich V. anbringt, wo besonderer Nachdruck auf den Umstand gelegt wird, daß echte Waliser ihn am St. Davidstage (1. März) als Nationalpflanze ihres Landes tragen, und Pistol zur Strafe für seine Verhöh-

nung der alten Sitte durch Fluellen genöthigt wird, Porro zu essen. Obgleich seit Shakespeare's Zeiten wieder einige Jahrhunderte verflossen sind, so wird die Sitte doch noch aufrecht erhalten. Ende Februar werden u. A. auf dem großen Gemüse- und Blumenmarkte von Covent-Garden in London kräftige Porropflanzen, deren Blätter mit Haarnadeln wie Locken zusammengerollt und mit Goldschaum bedeckt sind, feilgeboten, und meist von denselben Händlern, die einige Tage später die Irländer mit dem von ihnen verehrten Shamrock am St. Patrickstage versehen.

Ich wende mich zunächst zum Biere. Schon die alten Deutschen hatten, wie Tacitus berichtet, eine große Fertigkeit in der Kunst des Bierbrauens erlangt, und bereiteten ihr Lieblingsgetränk, dem sie, wie heutzutage die Studenten, im Uebermaße huldigten, höchst wahrscheinlich nur aus Gerstenmalz und ohne den Zusatz des würzigen Hopfens. Auch ist der Zeitpunkt, wo der Hopfen zuerst in die Bierbrauerei eingeführt wurde, nicht wissenschaftlich ermittelt. Herr von Perger in Wien, der auf mein Ersuchen sich dieses Gegenstandes annahm, fand, daß erst im 14. Jahrhundert des neuen Krautes Humulus oder Hop durch Johann von Lüttich Erwähnung geschah, daß „Humulus" das latinisirte germanische Wort „Humal" ist, das sich auch schon im Persischen als „Hamal" findet, und daß über die Bedeutung des Ausdruckes „Hop" oder „Hopfen" ein Dunkel herrscht. In England wurde der Hopfen unter der Regierung Heinrich's VIII. zuerst angewendet, und ein Schluß des Parlaments untersagte auf lange Zeit den Zusatz des Krautes, der betäubenden Eigenschaft halber, die es mit seinen Verwandten, dem Hampfe theilt. Ob die Pflanze von dem Festlande kam, oder schon früher in England wild wuchs, ist, wie das eigentliche Vaterland derselben, noch eine schwebende Frage. Gegenwärtig werden sehr gesuchte Hopfensorten in England gezogen, und das englische Bier stark mit denselben versetzt. Sowie jedoch nicht alles Gold ist, was glänzt, so ist auch nicht alles Hopfen, was bitter schmeckt. Man sagt es den englischen Brauern nach, daß sie viel Cocculus gebrauchen, ebenso wie es den Berlinern nachgewiesen worden ist, Ledum palustre mit ihrem Bitterbier, namentlich dem Bockbiere zu vermischen, um es stark und berauschend zu machen. Der Ruf, welchen die hannoverschen Brauer genießen, ist unverdientermaßen auf die Stadt beschränkt. Sie bereiten aus einer Mischung von 1/3 Weizen- und 2/3 Gerstenmalz, mit einem schwachen Zusatz von Hopfen schmackhafte Weißbiere, und unter diesen ist besonders die von Broyhan erfundene, und des Erfinders Namen tragende Sorte beliebt; doch möchten Fremde fast glauben, es sei an ihr Hopfen und Malz verloren, da sie sich nicht lange hält und an Ort und Stelle getrunken werden muß, selbstverständlich also jene großen überseeischen Reisen nicht erträgt, die das englische Ale, Stout und Porter, das bairische Bier, und selbst die braunschweiger Mumme zurücklegen. Unser Bitterbier wird nur aus Gerstenmalz bereitet und stark mit Hopfen versetzt. Der starken Nachfrage nach zu urtheilen, muß es wohl gut sein, was allerdings die oft in England gehörte Bemerkung entkräftet: wir Deutschen haben freilich das Bier erfunden, allein das richtige Recept desselben verloren, und können daher jene kräftigen Sorten nicht brauen, die bei unseren Inselnachbaren ganz und

gebe sind. Ja, das deutsche, sogenannte Lagerbier scheint sogar bestimmt zu sein, eine große culturhistorische Rolle in der Welt zu spielen. Die Franzosen haben sich bereits unsere Bierausdrücke mundrecht gemacht, und unter den vielen neuen Elementen, welche die deutsche Einwanderung in die Vereinigten Staaten einführte, muß außer dem Turnen und dem hochgepriesenen deutschen Liede auch das Lagerbier genannt werden. In New-York und in fast allen großen Städten der Union giebt es deutsche Bierhallen, die nicht allein von unseren Landsleuten, sondern auch von den Amerikanern besucht werden. Nicht mit Unrecht erblicken scharfsinnige Yankees in dieser jüngsten Angewohnheit ihrer Mitbürger eine segensreiche Neuerung, bestimmt, über den so arg eingerissenen Gebrauch gebrannter Getränke den Sieg davon zu tragen. Der gemeine Amerikaner lernt erst beim Glase deutschen Lagerbiers das vernünftige Trinken, denn von Haus aus schluckt er sowohl Spirituosen wie sein Essen in größter Eile hinunter, und weder die Mäßigkeits-Vereine, welche die Leute von dem Branntwein, noch das Maine-liquer-Gesetz, welches den Branntwein von den Leuten abhält, versprechen in gedachter Richtung so viel Gutes zu schaffen als das deutsche Lagerbier. Diejenigen, welche glauben, durch diesen Wechsel der Getränke sei nicht viel für die Menschheit gewonnen und gänzliche Enthaltung aller berauschenden Getränke streng anempfehlen, vergessen, daß es noch nie eine Nation von Wassertrinkern auf der Erde gegeben und daß fast jedes Volk es verstanden hat, dergleichen Getränke zu bereiten: die Kamtschadalen aus Spiraea Kamtschatica, die Südseeinsulaner aus einer Pfefferart (Piper methysticum Forst.) und der Dracaena terminalis Linn., die Mexikaner aus der hundertjährigen Agave (A. Americana L.), die Peruaner aus dem Mais, die Asiaten aus Palmensaft u. s. w. Wir dürfen daher wohl annehmen, daß ein so allgemein gefühltes Bedürfniß seine physiologische Berechtigung habe. — Außer den verschiedenen Getreidearten, dem Hopfen, Ledum palustre, Anamirta, Cocculus und anderen bei der Zubereitung des Bieres angewandten Stoffen, sind noch mehrere andere Pflanzen im Spiele, ohne die kein Brau zu Stande kommt. Ich meine die Hefe (Hormiscium cerevisiae), die bei dem Gährungsprocesse sich geltend macht und eine Pflanzenbildung ist, die, nach Berkeley, verschiedenen Pilzarten angehört, bis jetzt aber noch nicht auf künstlichem Wege in irgend eine höhere Pilzform hat zurückgeführt werden können. Neue Untersuchungen, namentlich die Bail's haben jedoch festgestellt, daß die Zersetzung der gährungsfähigen Flüssigkeit erst durch das Wachsen der Hefenzellen bewirkt werde, und daß die Schnelligkeit des Gährungsprocesses von der Schnelligkeit der Hefenvermehrung abhängig sei. Man könnte also sagen, jeder Brauer, sowie jeder Bäcker treibe im Verborgenen ein Bischen kryptogamischer Pflanzenzucht, und Gärtner hätten allerdings Ursache zu klagen, daß man ihnen ins Handwerk pfusche.

Hannover ist schon zu sehr Großstadt, um die Idylle des Erntefestes in Scene setzen zu können. Selbst in den Vorstädten und naheliegenden Dörfern hat das Fest einen mehr prosaischen als poetischen Anstrich. Doch wird am Martinstage durch die Jugend daran erinnert, daß die Obstlese beendigt sei. Abends ziehen Schwärme von Knaben und Mädchen, häufig Kürbislaternen mit phantastischen Figuren tragend,

von Haus zu Haus, namentlich in den Vorstädten, und machen sich durch Anstimmung des niedersächsischen Liedes:

„Martin! Martin! Heeren!
De Appel un de Beeren,
De Nötte mag eck geeren"

bemerkbar. Werden ihnen jedoch nach mehrmaliger Wiederholung dieser schwungreichen Strophen keine Früchte geschenkt, so suchen sie ihrer Täuschung in Reimen schmeichellosen Inhalts Luft zu machen, und wenden sich bittend der nächsten Thüre zu.

Hannover liegt ferner zu weit nördlich, um sich eines Winzerfestes freuen zu können. Als Land der Suppe und des Schwarzbrotes bedarf es leichter, warmer Weine, die etwas Gerbstoff enthalten, und diese werden ihm von dem Süden zugeführt. Nur unsere israelitischen Mitbürger feiern, eingedenk ihrer großen Vergangenheit, an ihrem Laubhüttenfeste zugleich ein Dankfest der Weinlese und ein allgemeines Erntefest. Die Bemittelten unter ihnen errichten bei dieser Gelegenheit in ihren Gärten und Hofräumen eine Hütte, deren Dach mit dem aufgeschossenen Kraute des im Frühling als Gemüse beliebten Spargels gedeckt, und deren Inneres geschmackvoll mit Blumen und Früchten geziert wird. Wenn Abends die Kerzen angezündet und das helle Licht durch die grüne Blättermasse blinkt, macht das Ganze, besonders auf Denjenigen einen tieferen Eindruck, der mit der hohen Bedeutung des Festes vertraut, im Geiste den langen Zug der Israeliten sich mühsam durch die Wüste winden sieht, bald nach nahrhaften Ausscheidungen der Mannaesche, bald zwischen dürren Felsen nach Wasser suchend und dabei im Herzen sich den unerschütterten Glauben an die Einheit der Welt, an einen einzigen Gott bewahrend, wie ihn die Priester Egyptens auf ihren großen Denkmälern in Zeichen verkündeten, die nur durch den glücklichen Fund eines Rosettasteines der erstaunten Nachwelt verständlich zu werden bestimmt waren. Am ersten Tage des Laubhüttenfestes ist es den Israeliten zur Pflicht gemacht, beim Gottesdienste die Frucht des Baumes Cedris, ein Palmenblatt, ein Myrthenreis und einen Zweig der Bachweide, letztere drei in einem Bunde vereinigt, mit den Worten: „Ihr sollt euch damit vor dem Herrn eurem Gotte freuen" zur Hand zu nehmen. Die Frucht des Cedris-Baumes ist eine Citronenart, das Palmenblatt gehört dem Dattelbaume an, der bekanntlich im Morgenlande wächst, und in Oberitalien, namentlich in der Umgegend Gennas seiner Blätter wegen, die in ganzen Schiffsladungen abgehen, angebaut wird. Die Myrthe ist die gewöhnliche großblättrige Form, doch müssen es kräftige, lange Schüsse sein, besonders solche, die anstatt der gewöhnlichen zwei entgegengesetzten Blätter drei quirlständige entwickelt haben. Als Bachweide dient jede beliebige Salix-Art. Die Bibel geht auf die Symbolick dieser Pflanzen nicht weiter ein, und Commentarschreiber haben daher den ihnen hier gebotenen freien Spielraum wacker benutzt.

Einige Worte über den Klee. So lange der Klee, seinem normalen Wuchse treu bleibend, nur drei Blättchen entwickelt, hat er in Hannover außer einer heraldischen nur seine landwirthschaftliche Bedeutung als Viehfutter, doch sobald er durch einen Lusus naturae vier Blättchen treibt, wird ihm allseitig die seltene Zauberkraft zuerkannt, dem Besitzer

Glück und Heil zu bringen. Bisweilen gewahrt man ganze Schwärme junger Männer und Mädchen emsig die roth- und weißblühenden Kleetriften nach diesem Talisman durchsuchend. Einige von ihnen sind gleich anfangs begünstigt, Andere mühen sich stundenlang ab, ohne das Gesuchte zu finden, und schließen höchstens ihre Arbeit mit der schmerzlichen Erfahrung, daß das Glück selbst in der Vertheilung seiner Symbole launig ist. Das gefundene Zauberkraut wird sorgfältig nach Hause getragen und sicheren Ortes aufbewahrt, erhält aber noch (so wird versichert) eine ganz besondere Wirksamkeit, wenn es Freunden unvermerkt zugesteckt und so unbewußt getragen wird. Vierblättriger Klee steht nicht allein in Hannover und in Deutschland überhaupt, sondern auch in fast allen europäischen Ländern, ja selbst in Nordamerika, in magischem Ansehen. In Griechenland glaubt das Volk, wie Landerer versichert, durch diese Pflanze, die es „τετράφαρλον τριφυλλον“ nennt (vergl. E. Otto's Hamb. Gart. u. Bl.-Ztg. Jahrg. XIII, p. 141), Schätze heben und allen Heilmitteln widerstehende Krankheiten heilen zu können; in England und Schottland schreibt man ihr ebenfalls übernatürliche Kräfte zu. Einen siebenblättrigen Klee, den man in Großbritannien als den allerwirksamsten preist, habe ich selbst nie gefunden; er scheint, wie das wahre Glück, nur eine ideale Schöpfung zu sein.

Ferner darf nicht vergessen werden die über die ganze Erde verbreitete Hühnerwyrthe (Stellaria media Smith) und der Wägerich oder Wegerich (Plantago major Linn.), womit man Kanarien- und anderen gefangen gehaltenen Vögeln ihr trauriges Kerkerleben zu versüßen sucht. Mit welcher Wehmuth mag ein solches Thier, wenn es einst wieder frei geworden, auf diese Pflanzen blicken! Sie waren mit der Aufhebung seiner Naturrechte eng verknüpft und ihr Anblick weckt nur trübe Erinnerungen. Wohl kein Menschenstamm kann diese Stimmung so ganz begreifen als der Indianer des freien Westens. Auch ihm gilt ihr Dasein und zwar mit Recht, als gleichbedeutend mit verlorener Freiheit, denn überall, wohin die Civilisation ihr Glück, ihr Elend trägt, folgen sie ihm auf Schritt und Tritt. Er gewahrt daher mit ängstlicher Ueberraschung die Spuren des ersten Wagens in seiner heimathlichen Prairie, dicht bewachsen mit Wägerich, den er in seiner poetischen Natursprache bedeutungsvoll »die Fußtapfen des Weißen« nennt. Ein ahnungsvolles Grausen sagt ihm deutlich, daß es fortan vergeblich sei, den Grundbesitz seines Stammes unbestritten zu behaupten. Dem blassen Manne vom fernen Osten kann kein Bogen, kein Pfeil widerstehen. Schweigsam lenkt nun das Urkind Nordamerikas seine Schritte westwärts, und schlägt noch einmal seine Zelte in tiefer Stille mächtiger Urwälder auf. Noch einmal glaubt es die Freiheit ungeschmälert genießen zu können. Doch horch! Welch knarrendes Geräusch begleitet jenen Zug, der sich langsam, doch festen Schrittes durch das hohe Gras und die Compositen-Stauden der Prairie windet? Das sind die Wagen der ersten Vordringler europäischer Civilisation. Waltete noch ein Zweifel darüber ob, so würde das fremde Kraut, welches mit hündischer Treue den Fersen des Weißen nachschleicht, ihn rasch heben, und den Indianer stillschweigend, doch nachdrucksvoll mahnen, eine Gegend zu fliehen, wo jedem Verweilen gewisser Untergang folgt.

Hiermit schließe ich für heute den Kreis des hannoverschen Volks-

lebens, soweit er von dem eingenommenen Standpunkte aus sichtbar ist. Ich habe nachgewiesen, wie innig der Zusammenhang unserer Sitten und Gebräuche mit der einheimischen wie der ausländischen Pflanzenwelt ist, und wie eng die Beziehungen sind, welche zwischen dem stillen Gewächsreiche und dem bewegten Menschenleben bestehen. Doch erst in einem dritten Vortrage werde ich den Gegenstand zum Abschluß bringen können und somit alle unsere Lebensverhältnisse von einem ganz neuen Gesichtspunkte aus beleuchtet haben.

Heliotrop.

Die Heliotrop empfehlen sich besonders durch den starken und angenehmen Geruch, der an sich nicht sehr bedeutenden Blumen. In neuerer Zeit sind auch von ihnen eine ziemlich große Anzahl von Varietäten aufgetaucht, welche Unterschiede im Wuchse, in der Belaubung, in Größe, Farbe und Duft der Blumen zeigen, häufig aber so unbedeutende, daß sie nur schwer aufzufinden sind. Der Liebhaber kann sich also auf eine kleine Zahl von Sorten sehr wohl beschränken. Zur Kultur im freien Grunde taugen in unserem Klima nicht alle Spielarten, da viele zu zärtlich und schwachwüchsig sind. Diese sind dann dagegen meist für die Topfkultur vorzugsweise geeignet, bei welcher die starkwüchsigen nur in jungen Pflanzen recht schön sind, später aber bald Mangel an hinreichender Nahrung leiden und weniger reich und kräftig blühen. Es soll daher eine kleine Reihe von wirklich verschiedenen Varietäten aufgeführt werden, die nach jenen Rücksichten eingetheilt ist.

I. Zum Auspflanzen im Freien.

Triomphe de Liège, sehr starkwüchsig, tief gefurchte und stark behaarte Blätter, sehr große Blumen von gewöhnlicher Farbe.

Napoleon III., eine sehr ähnliche, nur etwas schwächer wachsende Varietät, die aber bei weitem dankbarer blüht und deshalb den Vorzug verdient.

Peruvianum, die alte Stammart, welche durch feinen Geruch, reiches Blühen und Härte noch immer vorzugsweise für den freien Grund zu empfehlen ist.

Anna Thurell, eine ausgezeichnete Varietät, reichblühend, von lebhaftem Wuchse. Die Blätter sind sehr dunkel und wie mit glänzendem Lack überzogen, die großen Blumen tief violett. Beste der dunkeln.

Aucubaefolium, eine Abart von Triomphe de Liège, mit weiß gefleckten Blättern. Einzelne Zweige werden aber oft ganz grün oder ganz weiß und müssen entfernt werden.

II. Für Topfkultur.

Corymbosum novum, gedrungener Wuchs, die Blüthen sehr reichlich erscheinend, von gewöhnlicher Farbe.

Premices, Gegenstück dazu mit dunkeln Blumen.

Voltaireanum nanum, ebenso, aber ganz zwergig.

Immortalité de Marie Louise, Blumen von gewöhnlicher Farbe, aber ausgezeichnet durch den Duft, welcher an Heliotrop, Reseda und Lacke zugleich erinnert.

Beim Auspflanzen auf Beete werden die Heliotrop mit ihren Zweigen oft niedergehackt, wo dieselben alsbald Wurzeln schlagen, eine niedrige, dicht geschlossene Gruppe bilden und reich blühen. Zu dieser empfehlenswerthen Methode eignen sich von den obigen aber nur peruvianum und Anna Thurell; die anderen müssen aufrecht wachsen, sind daher allein für sich, oder in der Mitte der Beete anzubringen.

Als Einfassung um Heliotrop-Gruppen kann man Pflanzen mit rosarothen Blumen, z. B. Sileno pendula verwenden. Um die dunkeln Varietäten macht sich aber auch Sanvitalia procumbens sehr gut, deren gelbe, den ganzen Sommer über sehr reich erscheinenden Blüthen mit dem Dunkelviolett des Heliotrops angenehm contrastiren.

Sollen Heliotrop im Freien gut gedeihen und reichlich blühen, so müssen sie einen sehr geschützten und warmen Standort haben und nahrhafte, aber lockere Erde. Hebt man die Erde des Beetes 2 Fuß tief aus, bringt dann auf den Grund desselben eine fußhohe Schicht von Laub und Pferdedünger, die sich noch etwas erwärmen kann, und darüber wieder die Erde, bereitet also das Beet so zu, wie für Blattpflanzen zu geschehen pflegt, so bekommt eine solche Pflege der Heliotrop-Pflanzung außerordentlich gut.

Aeltere Pflanzen sind zum Auspflanzen in den freien Grund am geeignetsten, weil sie reicher blühen. Junge Vermehrung treibt anfangs zu sehr in die Blätter und blüht spärlicher. Bei sorgfältigem Einpflanzen im Herbste vor Eintritt des Frostes und guter Pflege im Winter kann man dieselben Pflanzen mehrere Jahre hinter einander verwenden. Solche bedürfen aber im Winter etwas mehr Wärme, als die in Töpfen gebliebenen.

Es bleibt noch übrig eine allgemeine Bemerkung in Betreff aller der Topfgewächse zu machen, welche man im Frühjahre einzeln oder zur Bildung von Gruppen in das Freie auspflanzt. Diese Pflanzen haben in der Regel in ihren Winterquartieren schon junge Blätter gebildet, welche gegen jeden stärkeren Temperaturwechsel, sowie gegen Sonne und Wind sehr empfindlich sind. Man muß dieselben daher nach und nach an die freie Luft gewöhnen, ehe man sie auspflanzt, ihnen also zuerst längere Zeit einen nicht unmittelbar der Sonne ausgesetzten, aber warmen und geschützten Stand geben und wenn irgend möglich, zum Auspflanzen einen trüben warmen Tag wählen. Versäumt man diese Vorsicht, so werden die Blätter verbrannt oder sonst beschädigt, und die Pflanze gebraucht lange Zeit, ehe sie zu neuem Wachsthum kommt. Die meisten Pflanzen dieser Art beginnen überhaupt nicht eher lebhafter zu wachsen und zu blühen, als bis der Erdboden eine höhere Temperatur angenommen hat. Damit dieses möglichst bald geschehe, sorge man vor Allem für gehörige Wasserabzüge des Bodens, nöthigenfalls durch Drainage. Ueberhaupt ist es in unserm Klima nicht räthlich, solche Pflanzen eher, als gegen Ende Mai oder selbst Mitte Juni auszupflanzen. Sehr zweckmäßig ist es aber dann, dieselben vorher, etwa schon im März oder

April durch Beschneiden in die gewünschte Form zu bringen und erst noch einmal in größere Töpfe mit nahrhafter Erde umzupflanzen, damit der Trieb angeregt und neue Wurzeln gebildet werden, die dann natürlich beim Auspflanzen gegen jede Beschädigung sorgfältig geschont werden müssen, damit sie am neuen Standorte sogleich weiter wachsen können.

Verbenen können diese Sorgfalt eher entbehren, da sie gegen Sonne und niedrige Temperatur weniger empfindlich sind und nach dem Auspflanzen in den freien Grund alsbald weiter wachsen, auch wenn dieses schon zu Anfang Mai geschieht.

Der eben berührten Umstände halber sind Beete, mit solchen Pflanzen besetzt, selten hier vor Ende Juni oder Anfang Juli in reichblühendem Zustande. Wer also seinen Garten gern die ganze schöne Jahreszeit über in vollem Schmucke sieht, der muß darauf Bedacht nehmen im Frühling die Beete mit anderen Pflanzen besetzt zu haben, die nach dem Abblühen dann jenen weichen.

Literatur.

Wredow's Gartenfreund oder vollständiger, auf Theorie und Erfahrungen gegründeter Unterricht über Behandlung des Bodens und Erziehung der Gewächse im Gemüse-, Obst- und Blumengarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten. **Neunte Auflage.** Nach den neuesten Erfahrungen gänzlich umgearbeitet und vermehrt von **H. Gaerdt**, Obergärtner des Herrn Borsig zu Moabit, und **E. Reide**, Königl. Obergärtner in Berlin. Berlin 1859. Verlag von Rudolph Gärtner. 8. 874 S. Preis 2 ℛ.

Das 8. Heft, dieses von uns mehrfach empfohlenen Gartenbuches, ist uns vor Kurzem zugegangen und ist somit das Buch nun vollständig erschienen. Daß die Herausgeber dieses Buches etwas Praktisches und allgemein Nützliches liefern würden, war zu erwarten, denn beide Herren haben durch ihren langjährigen Wirkungskreis in den verschiedensten Zweigen der Horticultur einen großen Namen erlangt; deshalb können wir unser früher ausgesprochenes Urtheil über dieses Werk hier nur nochmals wiederholen und das Buch als eins der besten und brauchbarsten dieser Art mit Recht empfehlen.

Daß das Buch noch bedeutend hätte erweitert werden können, ist gewiß, allein Mangel an Raum, wie andere äußere Bedingungen waren den Herausgebern hinderlich, indem Umfang und Eintheilung möglichst mit den früheren Auflagen übereinstimmen sollten. Eine größere Erweiterung würde aber auch andererseits das Buch wieder vertheuert haben und somit den Unbemittelteren schwerer zugänglich gewesen sein, und es war Hauptzweck der Verfasser, ein gutes Gartenbuch zu liefern, das ein Jeder sich mit Leichtigkeit anschaffen kann, um sich daraus Rath zum guten Gedeihen seiner Pfleglinge zu holen. Außer den allgemeinen

nothwendigsten Regeln über die Behandlung des Bodens und Erziehung der Gewächse im Gemüse-, Obst- und Blumengarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten sind ca. 1250 verschiedene Pflanzenarten aufgeführt und über deren Kultur und Nutzen gesprochen worden. Ein beigegebenes Register erleichtert das Auffinden jeder Pflanzenart, die in dem Buche besprochen ist.

Am Schlusse des Textes ist noch eine Abhandlung über Systemkunde gegeben und zugleich das Linné'sche, auch künstliche oder Sexualsystem, wie das Jussieu'sche natürliche System hinzugefügt.

E. D—o.

Feuilleton.

Ueber die Benutzung der Aprikosen im Orient, theilt Herr Dr. L. Landerer in Athen in No. 13 der „Flora", Folgendes mit: „Eine der schmackvollsten Früchte, die sich auch in großer Menge überall im Oriente findet und deshalb auch sehr wohlfeil ist, so daß sich jede Familie und auch der ärmste Mann damit sättigen kann, ist die Aprikose, Kaissa auf Türkisch genannt. In allen Theilen des Orients bereiten sich die Leute aus denen, die man nicht im frischen Zustande verspeisen kann, Confitüren für den Winter, und ganz besonders wird auf der Insel Cypern, wo diese Früchte außerordentlich groß, gleich Aepfeln werden, und äußerst süß und schmackhaft sind, eine eigenthümliche Confitur, die man Kaissapytta nennt, daraus verfertigt. Diese Kaissapytta würde man beim ersten Anblick für ein Stück grober, braun-schwarzer Leinwand halten können, indem sie wie ein Tuch oder ein Stück braunem Flanells, mit der sie die größte Aehnlichkeit hat, aufgerollt ist. Sie wird auf Cypern in folgender Weise bereitet: Die noch etwas unreifen Aprikosen werden durch ein Sieb getrieben und mittelst Zusatz von Honig aus Johannisbrod, der ebenfalls nur auf Cypern bereitet wird und eines der Hauptversüßungsmittel, besonders für die Armen ist, zu einer festen Masse eingedampft, daß sich dieselbe auf einem Tische auswalzen läßt und eine Art von Teig bildet, der an der Sonne völlig ausgetrocknet wird, worauf man ihn in der angegebenen Weise zusammenwickelt. Solche aufgewickelte Kaissapytta wird von jeder Familie bereitet und für das ganze Jahr aufbewahrt. Will man sich daraus irgend etwas bereiten, so schneidet man sich ein Stück davon ab und kocht dasselbe mit Reis zu einem Reis-Pilaw oder auch mit Fleisch ꝛc., auch giebt man den Kindern oder Dienstboten als Zuspeise ein Stück Kaissapytta, das man gleich einem Tuche vom Stücke herabschneidet und mit Brod ißt. Sehr selten findet man jedoch außerhalb Cypern diese Kaissapytta käuflich.

Eine Methode, Bäume und Sträucher, namentlich immergrüne, mit sicherm Erfolg des Anwachsens zu verpflanzen, wird von Herrn Luizet in den Verhandlungen der Gartenbau-Gesellschaft der Rhone empfohlen. Nach Herrn Luizet

erholen ſich ſelbſt Bäume und Sträucher wieder, die längere Zeit gelegen haben und deren Wurzeln ſtark betrocknet ſind, auch empfiehlt er ſeine Methode namentlich bei ſpätem Verpflanzen im Frühjahre.

Die Methode beſteht in Folgendem:

In ein Gefäß oder auch in ein Loch in der Erde, das circa 20 Gallonen Waſſer faſſen kann, gieße man ſo viel Waſſer hinein, daß es bis zu ¾ gefüllt wird. Zu dieſem Waſſer ſchütte man dann 20 Pfund Kuhdünger mit einer gleich großen Quantität guter, nahrhafter Erde untermiſcht, und rühre das Ganze ſo lange um, bis es eine gleichmäßige flüſſige Subſtanz bildet. In dieſe Miſchung tauche man nun die Wurzeln der zu pflanzenden Gewächſe, eben bevor ſie eingepflanzt werden. Die hierauf auf die Wurzeln geworfene Erde bleibt feſt an den Wurzeln haften, die dann ſogleich zu ſchwellen anfangen, und bei Beginn der Circulation des Saftes bilden ſich ſofort Saugwurzeln, die durch den nahrhaften Ueberzug gleich Nahrung finden und nicht nur anwachſen, ſondern auch die Bildung neuer Wurzeln ſichern, ſo daß nicht mehr zu fürchten iſt, daß der Baum eingehe. Gardeners' Chronicle, der wir dieſe wohl zu beachtende Notiz entnehmen, ſagt, es erinnert dies Verfahren an ein ähnliches, nämlich Samen mit einer kräftigen Dungflüſſigkeit zu überziehen, wodurch die Samenpflanzen leichter und ſchneller aufkommen ſollen. Das Praktiſche von Herrn Luizet's Methode, die in Folge ihrer Einfachheit und Billigkeit leicht ausführbar iſt, würde ſich am beſten erproben laſſen an Pflanzen, namentlich Sträucher und Bäume, die längere Zeit verpackt geweſen und deren Wurzeln ſtark angetrocknet ſind.

Ueber die **Gewinnung und Benutzung des Salep.** Mit dem Eintritte der kalten Jahreszeit im Monat September und October kommen aus dem benachbarten Epirus, beſonders aus Macedonien, die ſogenannten Saleptſiden oder die ſich mit dem Salephandel beſchäftigenden Albaneſen. Dieſe Leute geben ſich größtentheils ſelbſt mit dem Einſammeln dieſer Wurzeln ab, welches gewöhnlich zur Zeit der Blüthe der Orchideen geſchieht. Da dieſe Pflanzen geſellſchaftlich wachſen, ſo wird die Erde in der Nähe derſelben umgegraben, die darin befindlichen Wurzelknollen werden ausgeleſen, von Erde gereinigt, gut abgewaſchen und zum Bleichen und Austrocknen an die Sonne gelegt, was in einer Zeit von 12 Tagen erfolgt iſt. Fünf Okken friſcher Salepwurzeln geben 1—1½ Okken getrocknete, welche nun in hanfene Säcke gefüllt, entweder im Ganzen oder als ein Pulver, das jedoch häufig verfälſcht iſt, in den Handel gebracht werden. Aus Theſſalonich wird der Salep nach Kleinaſien, nach Smyrna und Conſtantinopel gebracht; von dem Feſtlande und aus Volo kommt er nach Griechenland. Die Griechen ſind große Freunde deſſelben, ſie benutzen ihn als ein allgemeines Heilmittel gegen Huſten und alle katarrhaliſche Krankheiten, laſſen ſich aber denſelben aus den angrenzenden Ländern kommen, obwohl die ihn liefernden Pflanzen auch häufig in Griechenland zu treffen ſind. Im vergangenen Jahre blieben die Saleptſiden aus, angeblich weil die Pflanzen nicht zur Blüthe kamen und man daher nicht wußte, wo die Knollen ſich finden. Aus dieſem Grunde wurde der Preis derſelben ſehr hoch und während in früheren Jahren die Okke rohe Salepwurzeln nur 3—5 Drachmen koſtete, wurden dießmal 18—20 Drachmen dafür gefordert.

— Geſtoßenen Salep von dieſen Saleptſiden zu kaufen iſt nicht ſehr rathſam, indem ſie denſelben mit Reſeſte, d. i. Amylum aus Reis, vermengen. Zu dem Gebrauch, den dieſe Saleptſiden davon machen, hat dieſe Beimiſchung keine Bedeutung, indem ſie daraus das Salep-Gelée, das bei der Nacht, oder von Morgens Anbruch bis gegen 8 Uhr des Morgens in den Straßen herumgetragen wird, mittelſt Honig bereiten. Mit dem Anbruche des Tages hört man in allen Straßen den Ausruf: salepi seston, warmen Salep! Beſonders iſt es die arbeitende Claſſe, die ſo warmen Salep, der ganz dick und gelèeartig iſt, trinkt oder mit einem Stück Brod ißt. Gegen Morgen werden dieſe Salepbereiter, die einer eigenen Zunft angehören, unſichtbar und beginnen das Geſchäft der Bereitung des Chalba aus Seſamſamen und Honig. Was nun die Orchis- und Ophrys-Arten betrifft, die ſich in Epirus und in Macedonien, ſo wie auch in Griechenland finden, ſo ſind folgende zu nennen: Orchis pyramidalis, masculo, longicornis, undulatifolia, papilionacea, latifolia, sambucina, maculata, conopsea, nigra; — ferner Ophrys muscifera, apifera, aranifera, fusca; — Aceras anthropophora. Der aus Macedonien gebrachte Salep iſt ein Gemenge der Knollen von Orchis- und Ophrys-Arten.

(Dr. Lauberer in No. 13 der „Flora“.)

Ueber die **Mandarinen-Früchte.** Unter den Hesperiden-Früchten, die ſich in den Gärten der Griechen und beſonders auf den Inſeln des griechiſchen Archipels, auf Naxos, Tenos finden, iſt auch Citrus Bigardia oder Citr. bigardica sinensis, Cit. bigardica myrtifolia zu erwähnen. Die Früchte dieſes Baumes nennt man Mandarinen, ſie ſind kleinen Pomeranzen ähnlich, deren Schale einen ſehr angenehmen Geruch entwickelt und deren Mark, das in mehreren Fächern eingeſchloſſen iſt, einen ſehr delicaten, ſüßlichen Geſchmack beſitzt, weshalb auch blos der Saft aus den Früchten ausgeſogen und die Schale weggeworfen wird. Unter dieſen Früchten giebt es ſolche, die beinahe nur aus der Schale beſtehen und die nach Auslöſung der bitter ſchmeckenden Kerne zum Einmachen mittelſt Zucker oder Betmeſe, d. i. eingekochtem Traubenmoſt, geeignet ſind. Der Saft dieſer Früchte iſt bitteraromatiſch und der daraus bereitete Syrup beſitzt gleichfalls einen angenehm aromatiſch-bittern Geſchmack und eignet ſich vorzüglich zur Bereitung von wohlſchmeckendem Roſoglio, ſowie, mit rothem Weine vermiſcht, zur Darſtellung eines gewürzhaften Glühweins. Die kleinen, im Sommer abgefallenen, grünen Früchte geben mit Zucker eingekocht ein ſehr ſchmackhaftes, bitteres, magenſtärkendes Glüko, das zu den auserleſenſten Confitüren Griechenlands gehört. Durch Deſtillation der zerſtampften Früchte mit Waſſer erhält man ein dem Pomeranzenblüthen-Waſſer ähnliches Deſtillat, das kaum von dem Aqua Naphae zu unterſcheiden iſt, ſo daß ich der Meinung bin, daß ein ſolches aus den Mandarinen-Früchten erhaltenes Waſſer in Betreff der Wirkung dem aus den Orangenblüthen dargeſtellten vollkommen gleichkomme, und vieles aus Spanien, Portugal, Sicilien, Calabrien nach andern Ländern Europas geſandtes Eau des fleurs d'Orange nichts anderes als ein aus den Früchten von C. bigardica erhaltenes Deſtillat ſei. Das zu gleicher Zeit erhaltene ätheriſche Oel beſitzt eine ſchwach goldgelbe

Farbe, ist klar und leichtflüssig, unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Weingeist, und diese alkoholische Lösung besitzt einen sehr angenehmen Geruch theils nach Citronen-, theils nach Pomeranzenöl. Nach meinen Beobachtungen hat dieses Oel auch die merkwürdige Eigenschaft, die Fluorescenz der epipolischen Diffusion zu zeigen, denn wenn man dasselbe unter gewissen Einfallswinkeln des Lichtes betrachtet, so zeigt es gleich einer Lösung des schwefelsauren Chinins, oder einem Quassia-Infusum, oder einem Decoct der Roßkastanienrinde, eine charakteristische blaue Färbung.

(Dr. Landerer in No. 13 der „Flora“.)

Cornus mascula. Dieser schöne Strauch, so genannt von cornu, Horn, wegen der Härte und Zähigkeit seines Holzes, findet sich nicht im heutigen Griechenland, jedoch und zwar schon häufig in Kleinasien, in der Umgegend von Smyrna und noch mehr von Constantinopel, so daß seine Früchte auf den Bazars vorkommen. Die Orientalen sind Freunde dieser angenehm säuerlichen Früchte, sie werden in frischem Zustande gegessen, und jede Hausfrau in der Türkei bereitet sich aus den Kranien Syrupe und Gelée's, um diese zu den verschiedensten Speisen, ja sogar zur Pilaw als Zuspeise beizusetzen. Die unreifen Früchte werden auch, gleich den unreifen Oliven, mit Salz eingemacht, und sodann gleich andern eingemachten Früchten von den Orientalen gegessen. In medicinischer Hinsicht ist zu bemerken, daß man im Oriente diesen Früchten styptische Eigenschaften zuschreibt und daher ihren Genuß bei allen Krankheiten, namentlich bei Diarrhöen, Fiebern u. dgl. erlaubt. Zur Zeit, als ich in Smyrna und Constantinopel war, herrschte daselbst sehr stark die Cholera; während deshalb der Genuß aller Früchte mittelst eines eigenen Fermans strengstens untersagt war, durften die Kranien-Händler unangefochten ihre Früchte ausrufen und in kleinen Gläsern, die als Maß dienen, verkaufen. Auch die Kerne dieser Früchte werden benutzt; sie werden durchbohrt und zu Kombologen, d. i. Rosenkränzen für die ärmeren Leute angefaßt; indem es Sitte im Oriente ist, daß jeder Türke oder auch Grieche, um spielend und tändelnd die Zeit hinzubringen, einen solchen Kombologen in der Hand hat. Die Kombologen der Reichen bestehen aus Bernstein und Glas, oft mit Smalte und Gold geziert, so daß ein solcher Rosenkranz einen Werth von 500 bis 2000 Piastern haben kann, während ein solcher aus den Kernen der Krani oder auch aus Olivenkernen nur 1—2 Piaster kostet und denselben Nutzen gewährt.

(Dr. Landerer in No. 13 der „Flora“.)

Anchusa tinctoria. Eine der wichtigsten Pflanzen im Alterthum war Anchusa tinctoria, die wegen der rothen Farbe ihrer Wurzel den Damen als Schminke diente, was man ἀγχουσίξειν nannte und den Alten keinen erfreulichen Anblick gewährte. Besonders bedienten sich Hetären solcher Mittel theils zum Rothfärben der Gesichtswangen, theils zum Färben der Augenbrauen und der Fingernägel. Aus den Schriften der Alten erhellt gleichfalls, daß man dem Purpur, der aus dem Safte der Purpurschnecke bereitet wurde, verschiedene glänzende Pflanzenfarben zusetzte und als solche waren im Gebrauch der Saft der Rad. Anchusae tinctoriae, der Rad. Rubiae tinctorum, so wie der Kermesbeere, Coccus Ilicis. Die An-

chusa kommt unter dem Namen Alchanna oder Alkanna aus Aegypten in gröblich gepulvertem Zustande; ihre Hauptverwendung besteht im Gebrauche zum Färben der Kopfhaare, so wie auch der Nägel und Augenbrauen. Um sich die Haare braunroth zu färben — eine Farbe, die die orientalischen Damen sehr lieben — wird dieses Alchanne in die Haare eingestäubt, dieselben werden dann mit einem Kopftuche umwickelt und zusammengebunden; so begiebt sich nun die Orientalin in das Chamam-Lalsa, d. i. das türkische Schwitzbad. Es bildet sich durch den Schweiß eine extract-ähnliche Flüssigkeit, die die Haare durchdringt und sehr schön braunroth färbt. Nach dem Bade werden die Haare mit Wasser und Seife ausgewaschen, ausgekämmt und zeigen sich nun nach dem Trocknen schön braunroth gefärbt. Diese Auffärbungsmethode wird von Zeit zu Zeit wiederholt, wenn die Dame bemerkt, daß die Haare auszubleichen beginnen sollten. Um die Fingernägel roth zu färben, werden kleine Säckchen mit Alkanna gefüllt und diese, während die Dame im Chamam sitzt, auf die Nägel aufgebunden. Diese Sitte ist im Oriente unter dem gemeinen Volke sehr im Gebrauch, macht aber auf den Fremden, der nicht gewohnt ist, solche gefleckte und buntgefärbte Nägel zu sehen, einen übeln Eindruck.

(Dr. Landerer in No. 13 der „Flora“.)

Spergula pillifera DC. wird jetzt in England vielfältig als ein Substitut für Grasplätze benutzt und den Gartenfreunden von den bedeutendsten Handelsgärtnern zu diesem Zwecke empfohlen. Die Herren E. G. Henderson & Sohn preisen diese Pflanze als vollkommen ausdauernd an; sie bilde, heißt es, eine dichte grüne Fläche und ist im Winter, wie im Sommer gleich grün, braucht nicht geschnitten oder gemäht zu werden. Im Juli zeigt sich eine unzählige Menge schneeweißer sternartiger Blumen, wodurch die grüne Fläche ein ungemein liebliches Ansehn erhält. Der Preis guter starker Pflanzen ist 4 Shilling Sterl. pr. Dutzend.

Spergula pillifera DC. oder Sagina pillifera Fzl. stammt aus Corsica und bezweifeln wir nicht, daß sie sich als Substitut für kleine Rasenplätze wohl eignen würde; es wäre wünschenswerth, daß auch bei uns Versuche damit angestellt würden.

---

* **Corylus Colurna** L. Unter den verschiedenen Haselnußbäumen ist dieser einer der imposantesten. Bei einer Höhe von 50 bis 60 Fuß, die er erreicht, bildet er einen herrlichen Baum. Seine Heimath ist die Türkei und Kleinasien. Er hält die kältesten Winter bei uns aus, ohne im geringsten zu leiden und befindet sich bereits seit 1665 in den englischen und deutschen Gärten. Wie uns einer unserer geehrten Correspondenten mittheilte, hat diese Art im vorigen Jahre im Garten zu Sagan reife Früchte gebracht, was nach Aussagen des Herrn Jäger seines Wissens noch niemals in Deutschland vorgekommen sein soll. — Im botanischen Garten zu Hamburg befindet sich ein sehr stattliches Exemplar dieser Haselart, das wohl über 30 Jahre alt sein mag und bereits eine Höhe von gegen 40 Fuß erreicht hat. Alljährlich setzte er Früchte an, doch nie waren diese völlig reif oder keimfähig ausgebildet, jedoch im vorigen Jahre wurde auch hier eine Menge völlig reifer Früchte geerntet, von denen bereits mehrere gekeimt haben. Die Früchte sitzen zu 5—7 beisammen und ist eine jede von einer doppelten, vielfach getheilten Hülle umge-

ben, was ihnen ein hübsches Aussehen giebt. E. D—o.

---

* **Syringa chinensis** Willd. Eine eigenthümliche Erscheinung zeigte sich in diesem Jahre an einem sehr großen, alten Exemplare der sogenannten chinesischen Syringe, Syringa chinensis. Ein starker Zweig brachte nämlich an seiner Endspitze zweierlei Blüthenrispen, nämlich mehrere Rispen der S. chinensis, wie sie am großen Strauche überhaupt alle waren und unmittelbar daneben noch mehrere Rispen mit viel helleren und kleineren Blumen, die sich von denen der S. persica L. kaum unterschieden, sowohl in der Farbe, wie in Größe und Geruch. Obgleich der Strauch schon über 30 Jahre an derselben Stelle steht, so ist diese Erscheinung hier noch niemals, weder an diesem noch an anderen Exemplaren, beobachtet worden. — Was mag die Ursache dieses Naturspiels sein? E. D—o.

Vertilgung der Erdflöhe. Das Landwirthsch. Wochenblatt für Neuvorpommern enthält folgende Notiz: „Ein Rapsbauer fand nach gutem Auflaufen des Rapses nach zwei Tagen die Erdflöhe in solcher Masse an den aus zwei Blättern bestehenden Pflänzchen, daß nicht eins davon kommen zu können schien. Er präparirte hierauf ein Streumittel von 1 Theil Guano, 1 Theil Gyps und 4 Theilen Holzasche, vorher mit einem Absud von klein zerhacktem Wermuth übergossen und dann wieder getrocknet, und bestreute damit die schon gelichteten Rapsreihen. Nach einigen Stunden sei der Rapsacker frei von Erdflöhen gewesen, und nur eine kleine Parzelle, wohin das Streumittel nicht reichte, habe ausgepflanzt werden müssen.“

In diesem Frühjahre sind hier die jungen Kohlpflanzen in den Mistbeetkästen sehr stark von den Erdflöhen befallen worden. Ein wenig auf die Pflanzen, gestreutes Insectenpulver vertrieb sämmtliche Erdflöhe in Zeit von einigen Stunden. E. D—o.

Personal-Notizen.

Herr **R. Fortune** hat von der Gesellschaft für Acclimatisation in Paris eine Medaille 1. Cl. erhalten, als Anerkennung für die vielen nützlichen und schönen Pflanzen, die durch ihn in England eingeführt worden sind.

Herr **Eyles**, einer der tüchtigsten und erfahrensten Gärtner Englands, ist zum Superintendent über das Gartendepartement im Crystal-Palast zu Sydenham ernannt worden.

Herr Hofgärtner **Erblich** ist zum Hofgartenmeister und zum ersten Vorstande des königl. großen Gartens zu Herrenhausen, Herr lit. Hofgärtner **Hermann Wendland** zum wirklichen Hofgärtner und zweiten Vorstande des königl. Berggartens zu Herrenhausen ernannt worden.

Ueber holländer Blumenzwiebeln

erscheint — früher stets mit Beifall aufgenommen — auch in diesem Jahre ein Catalog, damit verbunden ist ein Nachtrag zu dem sonst noch gültigen Hauptcatalog, enthaltend eine Menge bedeutende Preisermäßigungen, vorzüglich aber das ganze Sortiment der neuesten mexikanischen Pinus (an 62 Spec.) und einen bedeutenden Nachtrag von Stauden, deren beste Versandtzeit der Herbst ist.

Um geneigte Berücksichtigung bittet **G. Geitner.**

Neue Pflanzen-Hybriden und Floristen-Vereine.

Zu den vielen schönen blumistischen Neuheiten, die in neuester Zeit von den verschiedenen deutschen Gärtnern erzielt worden sind, darf gewiß auch mit vollem Rechte die Lychnis Haageana des Herrn E. Benary in Erfurt gerechnet werden. Von jeher ist die alte Lychnis fulgens eine Lieblingspflanze der Gärtner gewesen, sowohl für die Topf- als freie Landkultur, jedoch dürfte diese Pflanze nun sehr bald durch die viel schönere Lychnis Haageana verdrängt werden. Letztere ist eine Hybride der so schönen L. Sieboldii v. Houtt. oder L. grandiflora alba Sieb. (siehe Hamburg. Gartztg. XIV, S. 178) und der L. fulgens. Sie hat ganz den Habitus und die Größe der Blumen der L. Sieboldii, nur daß bei letzterer die Blumen rein weiß und bei L. Haageana prächtig brillant purpur-zinnober sind. Trotz des sehr niedrigen Preises, zu dem diese Neuheit von Herrn Benary angeboten wurde, war der Absatz derselben in Deutschland bisher ein nur geringer gewesen, während dagegen eine sehr beträchtliche Anzahl von Exemplaren nach England und Belgien gewandert ist, und es ist gewiß, daß, wenn diese Pflanze erst von englischen oder belgischen Gärtnern empfohlen werden wird, sie auch dann in Deutschland mehr Anerkennung finden dürfte.

Unwillkürlich müssen wir uns hier wieder fragen, warum haben wir in Deutschland noch keine Floristen-Gesellschaften, an welche die in Deutschland erzeugten blumistischen Neuheiten zur Begutachtung einzusenden wären, es würde dann keinem Zweifel unterliegen, daß die von einer solchen Gesellschaft streng geprüften und als schön erklärten Pflanzen bald eine sehr weite Verbreitung in Deutschland finden würden und man hätte dann nicht nöthig sich nach England zu wenden, um selbst in Deutschland erzeugten Hybriden-Pflanzen von dort, oft unter anderen Namen für schweres Geld, kommen zu lassen. Neuheiten, welche nicht von der Prüfungscommission eines Floristen-Vereins geprüft worden sind, würden dann weniger Beachtung finden und mancher Schwindel mit Hunderten von Bastarden, die alljährlich in die Welt gesetzt werden, aufhören. Schon früher ist in diesen Blättern auf die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit solcher Floristen-Vereine hingedeutet worden und hoffentlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo sie ins Leben gerufen werden, um so mehr, da sich viele alte Gartenbau-Vereine mit ihren alljährlichen Ausstellungen mehr oder weniger überlebt haben und die Ausstellungen meist nur noch floriren, wo sie was Neues sind.

Vor einiger Zeit sahen wir ganz vorzügliche gefüllte Petunien englischen Ursprungs bei den Herren P. Smith & Co. in deren Garten zu Bergedorf, so schön diese nun auch sind, so müssen wir es hier zum Ruhm des Herrn Ch. Deegen in Köstritz sagen, daß dessen neueste Petunien, sowohl gefüllt als einfach blühende, den englischen Erzeugnissen durchaus nicht nachstehen, sogar mehrere Sorten diese noch über-

treffen. Wir sind selbst im Besitze herrlicher Sorten und nach diesen zu urtheilen, zweifeln wir nicht, daß die in dem März-Hefte der Gartenflora abgebildeten Sorten ganz naturgetreu gegeben worden sind. —

Wie schön sind ferner nicht die neuesten von Herrn P. Smith und anderen Gärtnern erzogenen strauchigen Calceolarien, wie prächtig nicht die von Herrn Mardner in Mainz in den Handel gebrachten fünf neuesten indischen Azaleen, abgebildet im deutschen Magazin 3. Lieferung pro 1859.

So könnten wir noch eine große Menge herrlicher Pflanzen-Hybriden jeglicher Art anführen, deren Entstehen wir dem Fleiße und der Mühe deutscher Gärtner verdanken, von denen aber ein großer Theil leider zu wenig bekannt geworden ist, weil sie eben nur durch die Preisverzeichnisse der betreffenden Gärtner und Züchter den Pflanzenfreunden angeboten wurden und letztere sich zu oft in ihren Erwartungen bei Anschaffung neuer Pflanzen getäuscht sahen, als daß sie sich durch bloße Anpreisungen zum Kauf verlocken ließen. Man muß jetzt erst sehen, ehe man Pflanzen, namentlich Hybriden, wählt, es sei denn, daß deren Schönheit und sonstiger Werth von irgend einer Autorität bestätigt worden ist und eine solche Autorität würde unsers Erachtens nach eine Floristen-Gesellschaft sein. —

Sollten jedoch unsere geehrten Correspondenten in den Besitz von neuen Erzeugnissen gelangen, mögen diese nun von ihnen selbst oder von Anderen erzogen worden sein, so sind auch wir gern erbötig, solche Erzeugnisse, wenn sie wirklich schön und von den vorhandenen Formen verschieden sind, in diesen Blättern bekannt zu machen, resp. zu empfehlen, wir müssen aber in diesem Falle um Zusendung einiger Blumen zur Ansicht und um etwaige Notizen über die Entstehung und dergleichen bitten.

Bemerkungen
über schön oder selten blühende Pflanzen
im botanischen Garten zu Hamburg.

Spiraea Reevesiana Lindl. var. fl. plen. Es ist diese Art unstreitig eine sehr schätzbare Acquisition für unsere Gärten. Die Stammart wurde im Jahre 1824 durch Herrn Reeves aus China eingeführt. Im Jahre 1844 beschrieb sie Lindley als eine eigene Art unter obigem Namen, den sie auch bis heute in den Gärten behalten hat, obgleich sie anfänglich zu Spiraea lanceolata Poir. gezogen wurde. Die Doldentrauben bei der Sp. Reevesiana sind achselständig und endständig, lang gestielt, während diese bei Sp. lanceolata achselständig und nur kurz gestielt sind. Vor einigen Jahren wurde die Varietät mit gefüllten Blumen durch die Herren Standish & Noble verbreitet, welche sie von Herrn Fortune aus China erhalten hatten. Es ist, wie

bemerkt, ein reizender Strauch und macht namentlich auf Rasenplätzen neben Weigelia rosea und dergleichen Ziersträuchern einen sehr guten Effekt. Bei uns blühte die Pflanze bisher nur in Töpfen, sie ist jedoch nach den Aussagen Sachkundiger vollkommen hart. Die Blüthezeit fällt gegen Ende Mai, dauert mehrere Wochen und läßt sich diese Art ohne Zweifel, wie die Spiraea prunifolia fl. pl., sehr gut treiben. Die 2—3 Zoll großen Blüthendolden eignen sich ganz vorzüglich zu Bouquets und haben die einzelnen Blüthen viel Aehnlichkeit mit den Myrthenblüthen. Die „Gartenflora" brachte im April-Heft d. J. Tab. 252 eine gelungene Abbildung der Sp. Reevesiana fl. pl. und kann der Mitherausgeber dieses schätzenswerthen Journals, Herr E. Ortgies, ebenfalls nicht Rühmendes genug von dieser Pflanze sagen.

Diplacus glutinosus Nutt. var. grandiflorus. Schon bei einer früheren Gelegenheit empfahlen wir diese sehr ausgezeichnete Pflanze unter dem Namen Diplacus californicus, unter welcher Benennung sie hierselbst durch die Herren P. Smith & Co. zuerst verbreitet worden ist. Abgebildet findet sich diese Pflanze in der Flore des serres IX, tab. 883 und heißt es daselbst, daß der Dipl. glutinosus bereits schon im Jahre 1796 in den deutschen Gärten kultivirt wurde und davon in England eine Abart mit orangegelben Blumen. Gegenwärtig unterscheidet Lindley vier Hauptformen dieser Art, nämlich:

1. aurantiacus, Bot. Mag. tab. 334 (Nov. 1796). Blumen orangeroth, der Rand der Blüthen ausgerandet.

2. puniceus, Bot. Mag. tab. 3655 (Mai 1858), aus Californien von Nuttall eingeführt. Blumen röthlich-zinnober, die Lappen der Blüthenhülle ausgerandet.

3. latifolius, mit großen gelben Blumen, mit fast ganzrandiger Blumenkrone, mit großen Blättern und von etwas niedrigem Habitus.

4. grandiflorus, unsere in Rede stehende Art, ausgezeichnet durch den sehr erweiterten Saum der Blumenkrone, deren großer Lappen tief eingeschnitten ist. Diese Form selbst wird mit verschieden gefärbten Blumen angetroffen, bald chamois-nankinfarben, bald mehr weiß mit gelblichem Anflug und bald in einer Farbenschattirung zwischen beiden. Unsere Pflanze hat eine reine Nankinfarbe. Sie stammt ebenfalls aus Californien, weshalb man ihr auch fälschlich den Namen californicus beigelegt hat.

Diese sehr empfehlenswerthe Pflanze verlangt dieselbe Behandlung wie die jetzt so beliebten Petunien, gedeiht jedoch am besten in Töpfen in einem luftigen Kalthause und hat man nur darauf zu achten, daß die Pflanzen nicht zu viel Nässe auf einmal erhalten, da sie dann leicht absterben, wie es auch häufig die Petunien zu thun pflegen.

Escallonia pterocladon Hook. Es soll dieser niedlich blühende Strauch in England hart sein, was auch wahrscheinlich ist, da er aus dem westlichen Patagonien stammt, bei uns verlangt derselbe jedoch das Kalthaus während des Winters oder einen frostfreien, trocknen Kasten. Es ist ein Strauch von 4—6 Fuß Höhe mit vielen kleinen

immergrünen lanzettlichen Blättern bekleidet, denen einer feinblättrigen Myrthe nicht unähnlich. Jeder kleine Zweig trägt bis zur Spitze eine große Anzahl kleiner, Epacris ähnlicher, weißer Blumen von lieblichem Dufte. Die Blüthezeit ist der Monat Mai und Juni. Eingeführt wurde diese Pflanze durch die Herren Veitch & Sohn im Jahre 1854. Sie bietet hinsichtlich ihrer Kultur durchaus keine Schwierigkeiten, sie gedeiht sehr üppig in einer Mischung von Laub-, Rasen- und Dungerde.

Rosa Fortuneana Lindl. Als Rose nur von geringer Schönheit. Aehnlich den Banksrosen, zu welcher Abtheilung sie unfehlbar gehört, zeichnet sie sich durch einen kräftigen und schnellen Wuchs aus und eignet sich wie jene sehr gut zur Bekleidung von Spalieren und Lauben. In Töpfen kultivirt, scheint sie nur sehr schwer und spärlich zu blühen. Bereits seit vielen Jahren im Besitze dieser Art, blühte in diesem Jahre ein veredeltes Exemplar zum ersten Male mit einigen wenigen mittelgroßen, gelblich weißen, halbgefüllten Blumen. In England, wo sie im Freien aushalten möchte, dürfte sie mehr zu verwenden sein als bei uns.

Argyrophanes Behrii Schldl. (Chrysocephalum Behrianum Sond., Helipterum Behrii F. Müll.). Unsere Sammlungen sind eben nicht reich an sogenannten schönen Immortellen-Blumen, deshalb ist es uns lieb, auf eine hübsche, neue Art aufmerksam machen zu können, deren Einführung wir Herrn Dr. F. Müller verdanken. Die Pflanze wird 2—3 Fuß hoch, verästelt sich von unten stark und trägt an den Endspitzen der Zweige über 1 Zoll große, rein weiße Strohblumen. Dr. Behr, nach dem diese Art benannt ist, entdeckte sie in Südaustralien im Fichtenwalde zwischen Gawler und Lightriver.

Die Kultur ist ganz dieselbe wie bei den übrigen Helipterum- und Helichrysum- (Aphelexis-) Arten.

E. O—o.

Die Familie der Dalbergien.

In der Versammlung am 24. Mai d. J. der Linnean-Society in London hielt Herr Bentham unter andern auch einen kürzeren Vortrag über die Dalbergien, eine Unterabtheilung der Leguminosen, aus dem wir unseren Lesern diejenigen Beobachtungen über die einzelnen Arten dieser Familie mittheilen wollen, die uns von allgemeinem Interesse zu sein scheinen.

Die meisten Arten der Dalbergien sind hartholzige Bäume, oft von beträchtlicher Größe und Schönheit, viele Arten sind auch mehr oder weniger klimmend, einige sogar steigen bis in die Spitzen der höchsten Bäume und halten sich vermittelst ihrer gedrehten Blattstiele oder ge-

krümmten stacheligen Nebenblättchen. Das Holz der baumartigen Species ist, wie bei den meisten Leguminosen, sehr hart und dauerhaft, häufig von großer Schönheit und ist es als Nutzholz von hohem Werthe, daher es vielfältig nach Europa zu Mobilien exportirt wird, es ist hübsch geadert und nimmt eine vortreffliche Politur an. Die hauptsächlichsten Varietäten des Palisanderholzes, welches in England eingeführt wird, kommen aus dem Innern von Brasilien über Rio Janeiro und werden von der Dalbergia nigra gewonnen. Andere Qualitäten kommen von Arten der Gattung Machaerium.

Die Honduras- und Martaban-Palisanderhölzer scheinen auch von irgend einer Art dieser Familie herzurühren. Das Palisander- oder Camholz des tropischen Afrikas ist das Produkt des Pterocarpus erinaceus oder P. echinatus.

Das rothe Sandelholz oder Rubinholz aus Indien kommt ebenfalls von einer Art Pterocarpus und das Sissoholz von Dalbergia Sisso.

Mehrere Arten erzeugen Gummi oder Harz, wie z. B. das Kino-Gummi von Pterocarpus erinaceus in Afrika und von P. marsupium und P. santalinus in Indien. Der Gummi Tragant soll von Pterocarpus indicus in Asien und von P. draco im tropischen Amerika kommen. Sehr ähnliche Harze werden dem Ecastophyllum monetarium, Drepanocarpus lunatus und einigen anderen Arten zugeschrieben.

Die Wurzeln, Rinden und Früchte verschiedener Arten sind als höchst adstringirend, narkotisch und giftig bekannt. Alle Arten von Andira, gewöhnlich in Südamerika unter dem Namen Angelina bekannt, sollen daselbst ein kräftiges Mittel gegen Würmer sein.

Mehrere Arten der Gattung Lonchocarpus, denen der Gattung Tephrosia nahe stehend, liefern Gifte, mit denen Fische vergiftet werden, ebenso die verwandte Piscidia Erythrina.

Andererseits werden die Früchte mehrerer Arten in einigen Ländern sehr gern gegessen, obgleich man den meisten auch giftige Eigenschaften zuschreibt. Die Arten, welche besonders eßbare Früchte liefern, sind Pterocarpus esculentus und die ähnlichen korkfrüchtigen Arten oder Varietäten von Ecastophyllum im tropischen Afrika, von der Geoffroya superba im nördlichen Brasilien und Venezuela, der G. spinosa unfern Carthagena, auch die Früchte einer Art von Dipteryx, in Antioquia als Almeadron bekannt, sollen daselbst gegessen werden. Die Früchte oder Samen vieler Dipteryx-Arten sind jedoch bekannter unter dem Namen Tonca-Bohnen oder Camaroo zur Parfümirung des Schnupftabacks, wie auch zur Oelgewinnung, eine Art liefert das Eboe-Oel im Mosquito-Lande.

Die Früchte von Pterodus in Süd-Brasilien sind noch reicher an Oel, das zugleich kräftige medizinische Eigenschaften besitzen soll.

Das Poonga- oder Kurunj-Oel in Indien kommt von der Pongamia glabra.

Beim Verbrauch der Früchte, ob als Nahrung oder als Arznei, hat man stets die größte Vorsicht zu gebrauchen, da sie, wie schon bemerkt, fast sämmtlich sehr narkotische Eigenschaften besitzen, Eigenschaften, die alle verwandten Pflanzen dieser Familie haben, wie z. B. mehrere baumartige Galegeae, Phaseoleae ꝛc., unter deren Samen wir viele finden, die zur Nahrung dienen, so wie viele stark giftige.

Dieſer allgemeinen Einleitung zu dieſer Abhandlung folgte dann die Beſchreibung von 286 Arten in 23 Gattungen der Dalbergine-Familie, die wir hier übergehen.

Einige Tage in Buitenzorg.

(Frei nach den Annales d'Horticulture et de Botanique, Volume III, Livraison 1 und 2, mitgetheilt von F. W. Klatt.)

Die Redaktion der oben angeführten Zeitſchrift ſchreibt: „Wir erhielten dieſen Artikel aus Java und theilen denſelben, obwohl er nur wenig Wichtigkeit für die Gärtnerei hat, doch den Leſern mit, da er durch die Darſtellung der Eindrücke, welche die Natur und der javaniſche Pflanzenwuchs hervorrufen, unterhalten wird.“

Sonnabend, den 26. December 1857, gegen 6 Uhr Morgens verließ der Verfaſſer der nachfolgenden Mittheilungen Batavia in Geſellſchaft des Kapitains von Huffler, um ſich nach Buitenzorg zu begeben.

Die Entfernung, welche die Königin des öſtlichen Handels von dieſer Provinzſtadt mit ländlichen Straßen und maleriſchen Häuſern, wo Flora ihren Herrſcherſitz aufgeſchlagen hat, trennt, beträgt nur 6 Poſtſtationen oder 36 Pfähle. Jede Poſtſtation mißt gewöhnlich 6 Pfähle und jeder Pfahl zeigt 20 Minuten Weg an, ſo daß alſo die ganze Entfernung 12—13 Stunden Marſch beträgt. Dieſe Entfernung legen die Poſtwagen in der Regel in 4 Stunden zurück, wobei ſie 6 oder 4 Pferde gebrauchen, je nachdem der Weg mehr oder weniger Schwierigkeiten darbietet. Bei jeder Poſtſtation wechſelt man die Pferde.

Während der vier erſten Stationen bietet der Weg gar nichts Bemerkenswerthes dar, wenn man dazu nicht einige Landhäuſer oder einige Kampongs (inländiſche Dörfer) rechnen will; die beiden letzten Stationen aber zeigen ſo reizende Gemälde, daß man fortwährend in Entzücken verſetzt bleibt.

Ganz rechts vor ſich ſieht man den Salak (Goenoeng Salak), ungefähr 10,000 Fuß hoch, links erhebt ſich der Sariboe (Goenoeng Sariboe), an deſſen Fuß Reis wächſt.

Die Sawaks (Reisfelder) ſieht man überhaupt, wenn ich mich ſo ausdrücken darf, in unendlicher Zahl in der Geſtalt der Amphitheater an den Füßen der Berge hängen, unaufhörlich durch das Gewäſſer bewäſſert, welches von den Gipfeln herabfließt. Dieſe Gipfel ſelbſt ſind mit Biebiet bedeckt, das heißt mit Gräſern, die ſich gerade im Wachsthum befinden, von glänzend grüner Farbe und ſo mit den dunkelgrünen Kokosgehölzen einen herrlichen Contraſt bildend.

Der Weg fängt ſchon an, ſich allmählig zu erheben und an beiden Seiten wird der Pflanzenwuchs je mehr und mehr üppig. Hier iſt die Atmoſphäre viel weniger drückend, als in Batavia und man athmet in langen Zügen die Luft einer erfriſchenden Natur. Indem man ſo den herrlichſten Anblick genießt, welchen die menſchlichen Sinne nur faſſen

können, und man sich mehr und mehr dem Ziele seiner Reise nähert, wird das Auge durch die reizende Wohnung der Frau van Son gefesselt, welche in einiger Entfernung auf einer Erhöhung liegt.

Kaum rauht eine Krümmung des Weges diese Aussicht, so findet man in der Mitte des Pfades eine weiße Pyramide mit dem niederländischen Löwen, welcher, als Sinnbild der 7 vereinigten Provinzen, in seiner einen Klaue 7 Pfeile hält. Keine Heldenthat, noch irgend eine traurige Begebenheit knüpft sich an dieses Monument. Vielleicht soll es nur dazu dienen, dem Besucher so lange als möglich den Anblick des prächtigen Palastes des General-Gouverneurs zu entziehen; vielleicht ist es aber auch dahingestellt, damit der General-Gouverneur das Symbol der Kraft des Königreichs im Auge habe, wovon er der höchste Repräsentant in diesen entlegenen Ländern ist, damit seine Hand das Steuer des Staatsschiffes in dem von Indiern bevölkerten Meere fest führe.

Das Monument findet sich eine Viertelstunde vom Palast. Eine Allee, auf beiden Seiten mit großen Bäumen bepflanzt, führt in gerader Linie dahin; indessen krümmt sich der Weg plötzlich und man findet sich in Buitenzorg.

Ich begab mich gerade ins Hôtel Bellevue, wo ich gegen 10 Uhr Morgens ankam. Nach eingenommenen Erfrischungen ließ ich mich nach der Wohnung des Herrn Teysmann, Inspector des botanischen Gartens, fahren.

Unglücklicherweise erfuhr ich daselbst, daß dieser Herr schon seit 5 Wochen nach den Lampongs gereist war, doch hatte Frau Teysmann die Güte, mit mir einen Spaziergang zu machen, wobei sie mir zeigte, wie man Vanille trocknet und mich zugleich auf manche Merkwürdigkeiten des Insekten- so wie des Pflanzenreichs aufmerksam machte.

Bei meiner Rückkunft war zu dem zweiten Gärtner, Herrn Binnendijk geschickt worden, der auch bald anlangte.

Er rief mir ein Willkommen in Buitenzorg zu und da wir beide aus Leyden waren, welches er vor 7 Jahren verlassen hatte, so richtete er viele Fragen über den jetzigen Zustand des botanischen Gartens daselbst an mich. Dieselben konnte ich glücklicherweise sehr gut beantworten, indem ich die beiden letzten Jahre daselbst zugebracht hatte.

Die Zeit war schnell mit den Rückerinnerungen an die Vergangenheit dahin geflossen und ich nahm Herrn Binnendijk's Einladung, ihm nach seiner Wohnung zu folgen, von ganzem Herzen an. Er stellte mir seine Frau vor und ich brachte einige angenehme Augenblicke in der Mitte einer Familie zu, mit der ich über Leyden reden konnte. Am Abend wurde ich von Herrn Binnendijk in die Societät eingeführt, womit der Tag für mich angenehm schloß.

Am folgenden Morgen ging ich in ein kleines Lusthaus des Hôtels, von wo aus man, wie ich gehört hatte, einen reizenden Aussichtspunkt auf den Salak hätte.

Daselbst angelangt übertraf die Wirklichkeit alle meine Erwartungen. Vor mir breitete sich der Salak in seiner ganzen Pracht mit seinen vier spitzigen Gipfeln aus, von unten bis oben mit prächtigen Palmen bedeckt. Das Wasser, welches von dem Berge strömte, stürzte sich mit erschreckendem Geräusch über die Felsen und verlor sich in die Tiefen der Abgründe. Zahlreiche Kampoengs (Dörfer) sind von Kokos,

Paradiesfeigen, Leuchterbäumen umgeben, durch deren Laub man die Dächer der Hütten der Eingeborenen schimmern sieht. Ein Gemälde, das sich schwer beschreiben läßt.

Am Nachmittag besuchte ich in Begleitung des Herrn Binnendijk den berühmten botanischen Garten, wo ich mich wieder sehr an den verschiedensten Fernsichten ergötzen konnte. Leben und Blühen, das scheint hier der Ruf der Natur zu sein!

Nach langen Betrachtungen, die ich den prächtigen Blüthen der Orchideen gewidmet hatte, womit dieses Land so reich gesegnet und versehen ist, fühlte ich mehr wie je die Wahrheit der Worte des großen Alexander von Humboldt, daß das Leben eines Malers nicht lang genug sei, und daß nicht Farben genug da wären, die unendlichen Abstufungen dieser eigenthümlichen Blüthen auszudrücken.

Endlich näherten wir uns dem Palast. Er ist ganz nach orientalischem Styl erbaut, in der Mitte mit einem Thürmchen, und bringt, obwohl von großer Ausdehnung, doch das Gefühl des Beengtseins hervor.

Der Garten enthält zahlreiche kleine Kanäle, die ihn durchschneiden und, mit dem Wasser genährt, welches vom Salak kommt, sich später mit dem großen Flusse vereinigen. Auch sind daselbst zwei große Teiche, von denen der eine einen Springbrunnen hat, welcher sein Wasser zu einer ziemlichen Höhe treibt.

Mit Anbruch der Dunkelheit bereitete ich mich zu einem Ausfluge nach dem Berge Megamendoeng vor.

Dieser Berg, 4700 Fuß hoch, liegt 7 Stunden von Buitenzorg. Er ist der Mittelpunkt oder vielmehr ein Paß zwischen dem Gedeh und dem Pangerangoeng. Man kommt auf der Hauptstraße von Java, die der General-Gouverneur und Marschall Daendels angelegt hat, zu ihm. Da man mir angerathen hatte bei Nacht dahin zu reisen, um beim Morgenroth auf dem Gipfel zu sein, so reiste ich gegen 9 Uhr Abends ab. Der Mond war dabei im schönsten Glanze mein Gefährte.

Der Besitzer des Hôtels hatte mir ein gutes Pferd verschafft. Durch die Güte des Herrn Schreuder sah ich mich auch bald mit einem malayischen Führer versehen und da es immer etwas gefährlich ist, während der Nacht zu reisen, besorgte ich mir einen guten Dolch.

Für den, der nie ein gebirgiges Land bewohnte und sich plötzlich nun dahin versetzt sieht, ist der Eindruck, den die Umgebung auf ihn macht, so groß, daß er sich in der Mitte einer Feenwelt zu befinden glaubt. Nun gar noch einen Berg im Glanz des Mondes erklettern, wo Alles so groß sich gegen die glänzende Kuppel des hellblauen Himmels abspiegelt; dazu das sanfte Gemurmel des Wassers, das Säuseln des Windes, das Zirpen der Heuschrecken oder dann und wann das entfernte Gebrüll eines Tigers hören, und dabei sich ganz allein zu fühlen mit seinen Einbildungen, welche durch so viele verschiedene Gegenstände Nahrung erhalten, das ist — sage ich — ein unbeschreiblich erhabener Genuß.

Ich war in die Betrachtung dieser Naturschönheiten so vertieft, daß ich nicht einmal die Kälte bemerkte, die sich allmählig eingestellt hatte und immer mehr zunahm, je mehr ich mich dem Gipfel des Berges näherte.

Aber plötzlich wurde ich dadurch dieser Träumerei entrissen, daß

mein Pferd auf einem großen Steine ausglitt. Die letzte Station wird nämlich durch große Steine, die hier und da auf einem thonigen und schlüpfrigen Boden liegen, mühevoller und selbst gefährlich. Ich entschloß mich also abzusteigen und den Rest des Weges zu Fuß zu machen. Nach einer halben Stunde war ich auf dem Gipfel. Es war 2 Stunden nach Mitternacht als ich an die Thür der Hütte eines Eingeborenen klopfte, der als Mandoer (Wache) von der Regierung angestellt ist. Ich war kaum eingetreten, als er mir zwei viereckige Stücke Kapas (Baumwolle) auf eine bali-bali (eine Art Ruhebank aus Bambus) ausbreitete und bald ein hell flammendes Feuer anfachte.

Ich warf mich auf diese Art von Ruhebank, auf der zu schlafen es mir unmöglich war, besonders, da mein ganzer Geist von all den Naturschönheiten noch eingenommen ist. Die verschiedenen Auftritte, welche so tiefe Eindrücke auf meine begeisterten Sinne gemacht hatten, gingen fortwährend noch einmal meinem Geiste vorbei; ich sah noch einmal diese prächtigen Bäume, ich hörte wieder diese befremdenden Töne, die das Ohr in diesen Ländern während der Nacht berühren.

Endlich kündete mir ein schwacher Schimmer den heiß erflehten Tag an, ich erhob mich und weckte meinen Führer, Sapada, der ruhig auf der Erde schlief.

Als ich die Hütte verließ, fing der Himmel an, sich im Osten mit einem hellen Roth zu färben, doch konnte man noch nicht die nahen Gegenstände unterscheiden.

Endlich erhob sich die Sonne mehr und mehr und nun entrollte sich meinen Augen ein so prächtiges Schauspiel, wie ich es noch nie erblickt hatte.

Links erhob sich der Sariboe, mit blau-rother Farbe magisch gegen des Himmels Azur abstechend. Rechts war der Gedeh, dessen Krater man weithin erblickt, indem ihm immer eine dicke Rauchwolke entschlüpft. Viele Gewässer kommen von der Höhe dieser Berge herab, vergrößern und verlieren sich mit tausend Krümmungen in eine immergrüne Ebene, wie Silberfäden, die durch eine ungleich grüne Oberfläche gezogen sind.

Ungefähr 5000 Fuß unter mir breitete sich die Preanger Provinz, eine Landschaft, die für die allerschönste der ganzen Insel Java gilt, aus.

Bei der Stadt Tjanjor finden sich die Sawas, bedeckt mit Biebiet von zarter Farbe, reizend mit dem Dunkel der Cocospalmen wechselnd, die hier und da stehen, als wollten sie gleichsam den ermüdeten Reisenden einladen, ihnen eine erfrischende Frucht aus ihrer Krone zu nehmen.

Von der Höhe des Megamendoeng sieht man eine unendliche Zahl Pedaties (eine Art Karren mit zwei Rädern), die von Karbouw's (Kühen) gezogen werden, und da zum Transport der Producte dienen, wo keine schiffbaren Flüsse sind, so besonders auf dem großen Wege von Batavia nach Tjanjor, der den Poentjakfluß durchschneidet.

Senkrecht unter meinen Füßen breitete sich eine Wolke aus, die durch einen sanften Wind fortgetragen, sich in eine tiefe Schlucht verlor. Diese Schlucht soll durch den Einsturz des Berges entstanden sein, was mich zu der Vermuthung brachte, daß der Megamendoeng oder der Poentjac, wie man ihn auch oft nennt, ehemals ein Vulkan

gewesen ist. Später erfuhr ich, daß der Einsturz des Megamendoeng am 10. October 1834 gegen 6 Uhr Morgens stattgefunden hat und zwar als Folge eines schrecklichen Erdbebens, wobei unter andern der Palast von Buitenzorg, 1744 durch den General-Gouverneur Baron von Imhoff gegründet, 1809 durch den Gouverneur Daendels, so wie 1818 durch den Generalgouverneur van der Capellen ausgebessert und vergrößert, zerstört wurde. Dieses Erdbeben, von dem der Megamendoeng den Mittelpunkt bildete, verbreitete sich über das ganze östliche Java.

Nachdem ich beinahe eine Stunde mit der Betrachtung dieses entzückenden Schauspiels zugebracht hatte, wurde ich von meinem Führer eingeladen, längs der Schlucht hinabzusteigen, um den Telaga Warna zu besuchen. Ich stieg dann einen Abhang von 3—400 Fuß hinab, aber auf einem so engen und schlüpfrigen Pfade, daß ich Mühe hatte, mich auf den Beinen zu halten.

Rechts erhob sich eine Erdmauer, auf der sich die Pflanzen förmlich anhäuften und drängten. Man sah da viele Bäume, von Lianen und Schmarotzerpflanzen, deren Blüthen mit ihren glänzenden Farben weit leuchteten und mit ihrem balsamischen Geruch berauschten, umschlungen, die durch ihre Größe in Erstaunen setzten. Unter dieser Menge Schmarotzerpflanzen bewunderte ich mit Recht wieder die Orchideen und die Farrnkräuter. Jene, sich bald neigend, bald aufsteigend, boten in ihren Blüthen einen entzückenden Anblick, diese setzten durch ihre Formen und ihre großen Wedel in Erstaunen. Links breitet sich die Schlucht aus, von der ich oben redete. Der felsige Boden läßt zweifeln, daß je eine Pflanze in ihm wachsen könne, aber dennoch befindet sich auf ihm so viel nahrhafte Erde, daß Pflanzen aufkommen können und man sieht gegenwärtig sich Bäume von 80—100 Fuß erheben, die mit ihren Gipfeln hier und da den Weg berühren, den man herabsteigt.

Plötzlich befand ich mich vor einem ziemlich großen See, welcher von allen Seiten von Berghöhen umgeben ist, die 3—400 Fuß messen und ganz mit Bäumen so dicht bedeckt sind, daß deren Gipfel eine undurchdringliche Fläche darstellen.

Den Eindruck zeichnen, den ich empfand, als ich mich plötzlich vom Gipfel in die Mitte des Berges vor diesen herrlichen See versetzt sah; die Bewegung, die religiöse Ehrfurcht darstellen, von der ich mich ergriffen fühlte beim Anblick der Riesen, die mich von allen Seiten umgaben; die Gedanken der Unendlichkeit meines in Erstaunen versetzten Geistes wiedergeben — das Alles ist eine Aufgabe, die über meine Kräfte geht. Ich werde mich also begnügen, das wiederzuerzählen, was ich über diesen See erfahren habe.

Wann der See entstanden ist, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. So viel ist gewiß, er existirt schon viele Jahre; sein Wasser ist süß und höchst wahrscheinlich wird er durch die Gewässer gebildet, die von der Spitze des Berges kommen. Er hat eine Tiefe von 200 Fuß. Man hatte mir erzählt, daß er viele Fische enthalte. Um mich davon zu überzeugen, forderte ich von dem Mandoer ein Netz. Er holte alsbald ein kleines Schiffchen, in welchem sich Alles befand, was man zum Fischen brauchte. Obwohl es nun nicht ohne Gefahr war, sich einem Fahrzeug anzuvertrauen, welches nur für eine

Person bestimmt war, und das bei der geringsten verkehrten Bewegung umschlagen konnte, zögerte ich doch nicht, es zu wagen, und ich hatte das Glück, eine halbe Stunde später, als ich den Fuß ans Land setzte, eine gute Anzahl Fische im Netze zu zählen.

Ich verließ diesen Ort nicht ohne Bedauern, indem ich mich mehr als einmal umwandte, um einen Abschiedsblick auf das magische Ganze zu werfen.

Nachdem ich mit vieler Mühe den schwierigen Weg wieder erklettert hatte, der auf den Gipfel des Berges führte, ließ ich mir ein Frühstück bereiten. Dann bestieg ich mein Pferd, um wieder nach Buitenzorg zurückzukehren, wo ich um 5 Uhr Nachmittags nach einer Abwesenheit von 20 Stunden wieder ankam.

Ich hatte mir vorgenommen am nächsten Morgen Batoe-toelis zu besuchen, als noch am Abend Herr Binnendijk mir eine Einladung von Herrn Michiels, einem großen Gutsbesitzer zu Buitenzorg, brachte, ihn folgenden Tages zu besuchen. Zuerst entschuldigte ich mich, da aber Herr Binnendijk in mich drang und mir mittheilte, daß ich etwas Merkwürdiges sehen würde, nahm ich die Einladung an und verschob meinen Ausflug nach Batoe-toelis auf einen andern Tag.

Herr Binnendijk hatte mir nur die Versicherung gegeben, daß ich etwas recht Merkwürdiges zu sehen bekommen würde und diese halb europäische, halb indische Wirthschaft, wie ich sie fand, war wirklich interessant.

Am Abend befand sich eine indische Musikergesellschaft in der Gallerie und führte verschiedene Stücke auf. Was die Musik (Gambelang) betrifft, so ist sie einförmig und dumpf. Das ist das Ergebniß verschiedener Arten Instrumente, unter welchen die Gongs, kupferne Hohlbecken mit Knöpfen von demselben Metall, die auf einem Fußgestell befestigt sind und auf welche die Künstler mit dünnen kupferbelegten Stöcken schlagen, und der Rahab, eine Art Geige mit 2 Saiten, den ersten Platz behaupten.

Ich wohnte auch einem indischen Tanze, Rongang genannt, bei, wo man die Federkraft und Biegsamkeit der Glieder der Tänzer und Tänzerinnen bewundern mußte. Genau genommen besteht der Tanz nur in einer Art mechanischer Bewegung des ganzen Körpers, besonders aber der Füße und Hände, welchen diese excentrischen Künstler unnachahmbare Stellungen verleihen können. Dabei schreiten sie langsam vor oder zurück und sagen in einem einförmigen und dumpfen Ton irgend eine Geschichte her.

Aber diese Musik, diese Tänzer, mit ihren kupferfarbigen Gesichtern und den glänzenden Kleidern, beim Lampenlicht gehört und gesehen zu haben war mir das eigenthümlichste, was mir zu Theil geworden ist.

Am folgenden Tage, dem letzten meiner Anwesenheit in Buitenzorg, reiste ich nach Batoe-toelis (Stein mit einer Inschrift), wo ich gegen 7 Uhr des Morgens ankam. Das ist der Ort, wo Praboe Seda, der letzte Fürst des früheren großen Königreichs Bramaya-Malsa-Tandraman, seinen Kraton (Palast) gehabt hatte. Man findet da den Stein mit der Inschrift, von dem der Name seinen Ursprung hat, es ist eine Inschrift in der Sanscritsprache. Es giebt auch noch einen andern Stein, der den Eindruck zweier menschlicher Füße trägt, auf dem die Unglän-

bigen Opfer darbringen, wie sie es auch noch neben einem Waringi (Ficus benjamina), einem Baum von hohem Alter, thun, um den herum sich viele heilige Gräber befinden. Diese Gräber, welche aus dem vierzehnten Jahrhundert stammen, (es ist aus der Zeit des Verfalls des Königreichs Bramaya-Malsa-Tandraman), sind unter demselben Baum angelegt, also wenigstens 5 bis 6 Jahrhunderte alt. Ich hätte mich wohl länger an diesem Orte aufhalten mögen, aber ich war genöthigt, am folgenden Tage nach Batavia zurückzukehren, meine Geschäfte riefen mich dahin, auch mußte ich noch mehrere Besuche machen. Ich riß mich also von diesem Orte los, an den ich mich so gefesselt fand.

Ich reiste am folgenden Morgen um 5 Uhr ab und gegen 9 Uhr befand ich mich auf dem Rückwege nach Batavia, nach einer Abwesenheit von 10 Tagen, die ich nie beklagen werde, da ich sagen kann, daß ich eine der schönsten Gegenden Javas gesehen habe, unter so vielen schönen, die diese Insel dem Besucher darbietet.

Garten-Notizen.

Orchideensammlung des Herrn G. Reed.

Eine der vorzüglichsten Orchideensammlungen in England soll auch die des Herrn G. Reed zu Burnham, Somerset sein, wo in der Mitte Juni über 150 Arten in Blüthe standen.

Sogleich beim Betreten des Cattleya-Hauses, bemerkt Gard. Chron., wurde man durch ein Prachtexemplar der Laelia purpurata mit 26 geöffneten Blumen, jede 6 Zoll im Durchmesser haltend, überrascht. Auf dem Beete stand ein Cypripedium barbatum mit 40 Blumen, dann eine dunklere Varietät der Laelia purpurata mit 17 Blumen, ferner Cattleya Mossiae, Phalaenopsis amabilis, Oncidium Papilio und Chysis Limminghii mit vielen Blumen. In einer anderen Abtheilung desselben Hauses befinden sich Aerides, Vanda und Saccolabium-Arten.

In dem sogenannten mexikanischen Hause sah man prächtige Exemplare der Sobralia macrantha mit 12 Blumen, Calanthe Masuca mit 12 Blüthenstengeln; ein großes Odontoglossum citrosmum mit 10 kräftigen Blüthenstengeln, zwei ausgezeichnete Exemplare der Calanthe veratrifolia mit 36 Blüthenstengeln, eine gute Pflanze des seltenen und schönen Oncidium sessile mit 6 Rispen gelber Blumen, Dendrobium Devonianum, große Exemplare von Brassia maculata, Maxillaria tenuifolia, letztere mit 2—300 Blumen, sehr große Exemplare von Brassia verrucosa und v. major, mehrere Dendrobien, die seltene und herrliche Barkeria spectabilis mit 27 kräftigen Blüthenrispen u. dgl. m.

Das Etabliſſement der Herren J. Booth & Söhne in Flottbeck.

Die geehrten Leſer glauben vielleicht, wenn ſie die Ueberſchrift leſen, wir wollen hier eine detaillirte Beſchreibung des Booth'ſchen Etabliſſements geben, was jedoch durchaus nicht unſere Abſicht iſt, denn daſſelbe iſt ja allen Leſern, theils durch eigene Anſchauung, theils durch früher gegebene Mittheilungen rühmlichſt bekannt genug, wir können es aber nicht unterlaſſen die Blumenfreunde von Zeit zu Zeit auf einzelne ſich daſelbſt in Blüthe befindenden Pflanzen oder auf dort vorhandene neue und empfehlenswerthe Gewächſe aufmerkſam zu machen. Bei unſerem heutigen Beſuche dieſes Gartens war es ein ausnehmend reichhaltiges Roſen-Sortiment, das im Freien einen impoſanten Anblick darbot. Seit mehreren Jahren haben wir hier keinen ſolch üppigen und herrlich ſchöne Roſenflor gehabt als in dieſem Jahre; frei von allem Ungeziefer blühen ſelbſt die älteſten und vernachläſſigten Roſenſorten in einer Fülle und Schönheit in allen Gärten durchgängig ſo herrlich ſchön, wie wir es ſelten hier erlebten. Wird nun ſchon der Blumen- und Pflanzenfreund durch dieſe köſtlichen Roſen und andere Zierſträucher und Stauden, wie durch das in unmittelbarer Nähe der Gewächshäuſer mit voller Sachkunde aufgeſtellte Pinetum angezogen, ſo bieten mehrere der großen Gewächshäuſer eine nicht minder überraſchende Blumenſchau dar. Die meiſten der mächtig großen herrlichen Schaupflanzen, als Eriostemon, Epacris, Boronia, Polygala ꝛc. ꝛc. waren freilich meiſt verblüht, dagegen waren es in den Kalthäuſern die Fuchſien und Pelargonien und in dem einen Warmhauſe die Gloxinia und Achimenes, die in ihrer Blüthenpracht und Zuſammenſtellung einen unübertrefflichen Anblick darboten. Im vorigen Hefte hatten wir die Pelargonien-Sammlung der Herren P. Smith & Co. beſprochen. Bei Herren Booth ſahen wir im Allgemeinen, neben vielen anderen neuen, dieſelben ausgezeichneten Sorten, auf die wir bereits aufmerkſam gemacht haben, weshalb wir es für überflüſſig halten, hier nochmals ſpeciell auf die verſchiedenen Sorten dieſer Gattung einzugehen.

Wohl aber dürfte es den Blumenfreunden angenehm ſein, die Namen einiger der neueſten und vorzüglichſten Fuchſienſorten zu erfahren, die wir in vorzüglich ſchön gezogenen reichblühenden Exemplaren zu ſehen Gelegenheit hatten. Es ſind:

1. **Fuchsia British Sailor** (Banks), Kelchblätter reich ſcharlach, Blumenkrone dunkelviolett.

2. **Guiding Star** (Banks), eine vorzügliche Sorte, Kelch und Röhre weiß, röthlich getuſcht, die Kelchblätter ſehr breit, weiß und ſehr zurückgebogen. Blumenkrone ſehr groß, reich violett-purpur; der Habitus iſt vorzüglich.

3. **Loch Katrine** (Banks) mit carmoiſin-ſcharlachfarbenen, ſehr breiten und zurückgebogenen Kelchblättern, die Blumenkrone iſt tief violett, faſt ſchwarz.

4. **Masaniello** (Banks). Die Kelchblätter ſehr groß, breit, lebhaft carmoiſin, halb zurückgebogen; Blumenkrone ſehr erweitert und violett. Es iſt dies eine der vorzüglichſten Sorten von Subſtanz, Form und Farbe verbunden mit ſchönem Habitus.

5. **Prince Frederick William of Prussia** (Banks). Die

Rähne lebhaft carminroth, Kelchblätter ſehr breit, ebenfalls carminroth und ſtark zurückgebogen, glockenförmig, eine ſehr ſchöne Blume, die ſich wie mehrere Sorten in der Färbung verändert.

6. **Prima Donna** (Smith) und

7. **Souvenir de Chiswick** (Banks), letztere keine der allerneueſten, aber eine der wirklich empfehlenswertheſten. Der Kelch iſt roſa-carmoiſin, die Kelchblätter ſind groß und ſchön zurückgebogen, die Blumenkrone iſt ſchön violett. Prächtiger Habitus.

Tritt man aus dieſem mit den Fuchſien und verſchiedenen andern Schaupflanzen aufgezierten Hauſe in das daran ſtoßende Warmhaus von über hundert Fuß Länge, ſo machen die Gloxinien, welche in mehr als hundert Schauexemplaren vorhanden ſind und die eine ganze Längsſeite des Hauſes einnehmen, einen wahrhaft imponirenden Eindruck. Mehrere Exemplare haben über hundert Blumen und dieſe ſtehen, umgeben von einem Blätterkranz, an der Pflanze dicht beiſammen. Welchen Sorten der Vorzug zu geben iſt, iſt ſehr ſchwer zu ſagen, ſie ſind ohne Ausnahme ſchön, ſowohl die mit aufrechtſtehender als die mit mehr geneigten Blumen, in weiß, roth und blau in den verſchiedenſten Nüancirungen und Zeichnungen ſich präſentirend.

Einen reizenden Anblick gewährte eine auf den Boden geſtellte Gruppe Gloxinien der ausgeſuchteſten Sorten mit aufrechtſtehenden Blumen, in deren Mitte das majeſtätiſche Exemplar des Cyanophyllum magnificum ſteht, das auf unſerer letzten Ausſtellung ſo viel Furore machte.

Hinter den Gloxinien an der Längsſeite des Hauſes, etwas mehr erhaben, befanden ſich die ausgeſuchteſten Sorten von Achimenes in ſo üppigen und reichblühenden Exemplaren, wie wir ſie ſelten geſehen haben, unter denen auch die Tapina splendens mit ihren feurig-ſcharlachfarbenen Blumen hervorleuchtete. Auch Achimenes Meteor iſt eine ſehr gute Acquiſition.

Wie auf der einen Seite dieſes Hauſes die Gloxinien einen ſo überraſchend ſchönen Anblick gewähren, ſo ſind es auf der anderen Seite die verſchiedenſten buntblättrigen Begonien und einige andere Pflanzen mit bunten Blättern. Einige von dem Obergärtner Herrn Boyſen aus Samen gezogene Begonien kommen der B amabilis und Victoria des Herrn Linden ſo nahe, daß ſie kaum von dieſen zu unterſcheiden ſind und uns in unſerer Anſicht beſtärken, daß die Linden'ſchen Begonien auch eher wohl Hybriden als Arten ſein mögen. Eine ganz vorzüglich ſchöne, von den andern Hybriden abweichende Begonie iſt die B. Reine Victoria des Herrn Makoy, die wir hier zum erſten Male ſehen.

Die ſchönen neuen Caladien-Arten ſahen wir in üppigſter Schönheit und ſind außer den ſchon früher etwähnten Chantin'ſchen noch die C. Brongartii, Neumanni, surinamense zu empfehlen.

Außer dieſen genannten Pflanzen ſind in dieſem Hauſe noch gar manche Schätze vorhanden, über die zu referiren wir bis zu einer andern Gelegenheit warten, nur die Stephanotis floribunda, die das Glasdach des Hauſes bis zur Hälfte bezogen hat und mit vielen Hunderten von Blumen bedeckt iſt, können wir nicht unerwähnt laſſen.

Da die Herren Beſitzer dieſer großartigen Gärtnerei fortwährend

bemüht sind alljährlich Verbesserungen und Verschönerungen im Garten wie an den Gewächshäusern vorzunehmen, so haben sie auch in diesem Jahre eine solche mit dem großen Camellienhause vorgenommen und hat dasselbe eine höchst zweckmäßige Umwandlung erlitten. Die das Haus in zwei Abtheilungen bisher trennende Mittelwand ist nämlich fortgenommen und das Nordhaus auf diese Weise mit dem Südhause vereinigt worden, wodurch eine großartige Glashalle von 40 Fuß Tiefe bei etwa doppelter Länge und 18 Fuß Höhe gewonnen worden ist. Beim Eintritt durch die Flügelthüren an der breiten, ganz aus Glasfenstern bestehenden Giebelwand gewahrt man jetzt eine im Grunde stehende Gruppe großer Araucarien und andere dergl. Gewächse, die einen imposanten Anblick gewähren.

Ende Juni 1859. E. O—o.

Ueber Webestoffe aus Pflanzentheilen.

In der am 13. März abgehaltenen allgemeinen Versammlung des Gewerbe-Vereins in Breslau, die sich einer überaus lebhaften Betheiligung erfreute, hielt Herr Geheimer Medicinal-Rath Prof. Dr. Goeppert einen Vortrag über einen Theil der Webestoffe. Eine großartige Zahl ausgezeichneter Rohproducte, Präparate, Pflanzen und Pflanzentheile, welche zur näheren Erklärung des technischen Theils des Vortrages dienten, so wie sehr anschauliche Abbildungen mikroskopischer Untersuchungen ꝛc., welche die wissenschaftliche Grundlage desselben bildeten, waren von dem Herrn Vortragenden in gewohnter Bereitwilligkeit, seine schätzenswerthen Vorträge nach allen Seiten hin verständlich zu machen, der Versammlung vorgelegt. Das, was über diesen höchst belehrenden Vortrag in der Bresl. Ztg. veröffentlicht worden ist, hatte Herr Goeppert die Güte uns für die Leser der Gartenzeitung einzusenden und beeilen wir uns die zu einem Bilde aneinander gereihten Skizzen hier wiederzugeben.

„Es ist eine interessante Erscheinung, daß das Pflanzenreich, welches in seiner äußeren Erscheinung uns in so großer Mannigfaltigkeit entgegentritt, von dem mikroskopischen Wesen bis zu dem mächtigen, 300 Fuß hohen Baume in allen seinen Gebilden sich auf Ein Grundorgan, die Zelle, zurückführen läßt, alles organische Entstehen von ihrem Wesen abhängt und auch im Thierreich bei den ersten Entwicklungsphasen ausschließlich vorhanden ist. Erst seit der Vervollkommnung der Mikroskope ist diese Zusammensetzung näher erkannt worden. Die Zelle ist im Allgemeinen ein mit Flüssigkeit erfülltes geschlossenes Bläschen. In der weiteren Entwickelung erleidet die Zelle ihrer Form und Beschaffenheit nach mannigfache Veränderungen, woher viele physikalischen Unterschiede der Pflanzen. Als die Grundform der Zelle kann man die der Kugel bezeichnen, von welcher die längliche, cylindrische, polyedrische sich ableiten. Festigkeit erlangt die Zelle durch Ablagerung von Schichten im

Innern derſelben. Langgeſtreckte prismatiſche Zellen bilden feſtere und zugleich dehnbarere Gewebe, als polyedriſche oder parenchymatöſe. In die erſtere Reihe gehört die Baſtzelle, die nicht blos in der Rinde der Laub- und Nadelholzbäume, ſondern auch im Stengel krautartiger Pflanzen, wie im Lein, Hanf, Neſſelarten, den Corchorus-Arten und in den langgezogenen Blättern vieler, insbeſondere tropiſcher ſogenannter Monocotyledonen wie der Agave, Ananas, Drachenbäume oder Dracänen, neuſeeländiſchen Flachs, Pandaneen, Palmen u. ſ. w. in großer Menge angetroffen wird. Zu verſchiedenen techniſchen Zwecken, Flechtwerken, Geweben dienen nun viele Pflanzen ohne alle Zubereitung, oft Stengel und Blätter oder nur einzelne Theile derſelben mit und ohne Zubereitung. Ganz beſonders liefern zu den erſteren Beiträge die Familien der wahren Gräſer, die Scheingräſer oder Cyperaceen und Binſen oder Juncineen und zwar in allen Theilen der Erde. Im ſüdlichen Deutſchland, im Littorale, Ober-Italien, wie überhaupt im ganzen Süden Europas, dienen faſt alle größeren Pflanzen dieſer Gruppen zur Bereitung ebenſo nützlicher als wohlfeiler häuslicher und öconomiſcher Geräthſchaften. Unſere einheimiſchen ſtehen ihnen an Brauchbarkeit nicht nach, doch liegt dieſer Zweig der Induſtrie bei uns ganz im Argen, man kauft im Auslande Matten u. dgl., die bei uns auch darzuſtellen wären.

Den, den Oeconomen auf Wieſen ſo verhaßten Riedgräſern, Binſen u. ſ. w. ließe ſich auf dieſe Weiſe eine ähnliche, nützliche Verwendung abgewinnen. Es giebt noch viele Wege, ſich zu erhalten und unterhalten, wenn man ſich nur erſt entſchließt, dem Alt hergebrachten Valet zu ſagen. Sommerweizenſtroh dient allerdings vorzugsweiſe zur Bereitung der berühmten Florentinerhüte, aber auch unſer überall gemeines Wieſenrispengras, Poa pratensis, mit 1½—3 Fuß hohen Halmen dient im fernen Auslande zu gleichen Zwecken, anderer einheimiſcher Gräſer von gleicher Qualität nicht zu gedenken. Das im ganzen Süden, beſonders in Spanien ſo vielfach benutzte Sparto-Gras (Stipa tenacissima) und das baumartige Arundo Donax wurde vorgelegt, das Papiergras der Alten, Cyperus Papyrus, desgleichen das Bambusrohr in einem ½ Fuß dicken, 8 Fuß hohen Exemplar. Die Bambusarten ſind ungeheure Baumgräſer von 60—80 Fuß Höhe, 1—2 Fuß Dicke der Stämme, welche die mannigfachſte Anwendung finden. Nicht nur, daß man Queckſilber in den hohlen und durch Glieder abgeſperrten Theilen aus Japan nach Europa verſendet, ſondern es werden auch Gefäße, Wände, Bänke, Zäune, Paliſaden, Segelſtangen ꝛc. daraus gefertigt, Decken geflochten und dergleichen. Wegen der in ſeiner Oberhaut namentlich ſich findenden Kieſelſäure iſt es wenig feuergefährlich. In China iſt die Induſtrie des Bambus am weiteſten entwickelt, und ſeitdem dieſes Land für Europa erſchloſſen, haben vielfache Producte ihren Weg von dort hierher gefunden. —

Zu den Palmen gehörig und nur fälſchlicher Weiſe auch Bambusrohr genannt iſt das Stuhlrohr — ſpaniſches Rohr — in ſeiner techniſchen Anwendung allgemein bekannt. Weniger bekannt dürfte es ſein, daß dieſes Rohr kletternden Palmen Oſtindiens, Calamus-Arten, angehört, die 600—800 Fuß hoch klimmen, im friſchen Zuſtande mit

Stacheln besetzt sind und den Wäldern ihres Heimathlandes Undurchdringlichkeit verleihen. Von den Gräsern unterscheiden sich diese Calamusarten sofort dadurch, daß sie an den Gelenken nicht hohl sind. Eine im hiesigen botanischen Garten gezogene Calamus Rotang ist bereits 8 Fuß hoch, und ein kleineres, vorgezeigtes Exemplar, Calamus micranthus, zeigte namentlich die starke Bewehrung recht augenscheinlich. —

Von den Palmen selbst werden einzelne Pflanzentheile ohne jede weitere Veränderung benutzt und zwar die Blätter der Fächerpalmen von der Chamaerops humilis, die einzige europäische, bis nach den Ländern des Mittelmeeres sich ausdehnende Art. Die sehr festen Fasern werden zu Matten ꝛc. benutzt; die Blätter selbst zum Dachdecken ꝛc. verwendet. Die Fasern im Innern der Stämme werden zu Stricken, Besen ꝛc. verbraucht. So haben sich die Fasern der Attalea funifera wegen ihrer Festigkeit zur Herstellung von Besen ganz vortrefflich bewährt und werden dieselben, trotz ihres höheren Preises, in London allgemein benutzt. Die Stiele werden zu Behältern für den Transport werthvoller Gegenstände verwendet. So fand der Vortragende in Triest ein derartiges aus Dattelpalmen, einem Vogelbauer nicht unähnlich sehendes Kästchen, welches für den Transport des Rosenöles aus dem Orient nach Triest benutzt wurde und der Versammlung vorgezeigt wurde. Von den Fasern der Früchte werden die der Cocospalme zu Stricken und Tauen benutzt. England besitzt in dem an 20 Meilen langen Cocospalmen-Walde auf Ceylon einen reichen Schatz. Ueberhaupt giebt es wohl kaum eine Pflanzenfamilie, die so vielseitige Benutzung darböte, als die der Palmen. Fast jede tropische Landschaft hat gewisse Arten, die Sago, Oel, Früchte, Zucker, Milch, Gewebe, Bauholz und Dachbedeckung liefern.

Zu den ohne weitere Zubereitung verwendbaren Pflanzenproducten zählt auch die Baumwolle. Sie kommt von einem Halbstrauche (Gossypium herbaceum und Gossypium religiosum) Arabiens und Persiens, der auch in andere Gegenden übertragen und dort cultivirt wird. Die wallnußgroßen Kapseln zerspringen bei der Reife und enthalten die erbsengroßen mit Baumwolle umwickelten Samen. Die Anwendung der Baumwollengespinste ist bekanntlich eine sehr mannigfache. Von dem baumartigen Gossypium kommt keine Baumwolle in den Handel. G. herbaceum liefert die weiße, G. religiosum die gelbe Baumwolle. Als Surrogat für die Baumwolle, die ihrer Natur nach ein Pflanzenhaar ist, hat man auch andere Pflanzenhaare angewendet. So namentlich Asclepias syriaca, um deren Einführung sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Medicinalrath Friese sehr thätig bewies. Weitere Verbreitung hat die Pflanze aber nicht gefunden, da ihr Ertrag nicht lohnend genug. In Pisa werden aus den Fasern noch Hüte gemacht. Andere Surrogate der Baumwolle sind die Haare der Weide, Pappel, der Wiesenwolle (an Mooren und als sicheres Anzeichen für deren Vorhandensein); doch sind diese Surrogate nicht ausreichend, um die Baumwolle selbst zu ersetzen.

In zubereitetem Zustande werden verwendet die oben genannten Bastgewebe von Flachs, Hanf, Nessel.

Die Bastfaser befindet sich bei ihnen unter der Oberhaut. In technischer Beziehung ist der Unterschied dieser Faser von der Baum-

wollenfaser und der Thierwolle beachtenswerth. Mancherlei chemische Vorschriften für die Untersuchung und Unterscheidung der Gewebe sind gegeben worden; aber man hat diese Prüfung mit Recht verlassen, denn sie erwies sich als unzureichend und hat manche ungerechte Verurtheilung wegen Fälschung der Stoffe herbeigeführt. Nur die mikroskopische Untersuchung kann hier entscheidend sein; und sie ist ohne große Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. Reider veranschaulichte in sehr fasslicher Weise die Verschiedenheit der Gewebestoffe durch im Großen ausgeführte mikroskopische Zeichnungen, die die Structur der genannten Fasern, wie auch der Seide und thierischen Wolle darstellten.

In neuerer Zeit hat man mehrere tropische Pflanzen wegen ihrer Bastfasern zu technischen Zwecken verwendet und ihre Producte auch bei uns einzuführen begonnen, die, sämmtlich in größeren Quantitäten vorgelegt, zum Theil von unserm auf Java als Arzt und Naturforscher verweilenden Landsmann Herrn Dr. Bernstein eingeschickt wurden, wie der sogenannte Manillahanf von Musa textilis, das sogenannte Chinagras von Corchorus olitorius, von javanischen Gespinnstpflanzen Urtica candicanid, tenacissima, von Agave americana, Bromelia Ananas, der Zuckerpalmen Arenga saccharifera und Corypha umbraculifera, der neuseeländische Flachs, Hibiscus-Arten, von deren Bast, namentlich von H. tiliaceus, die Hüllen der westindischen Cigarren stammen. Das feinste Gewebe liefern die Spiralgefäße der Bananen oder Pisangstämme, welches jedoch nur selten nach Europa kommt. Ein Paar Handschuhe wiegen etwa den sechsten Theil eines Quentchens. An einem lebenden Exemplare wurde von dem Vortragenden die Art der Gewinnung demonstrirt. Bewunderung verdient der einem feinen Spitzenschleier vollkommen ähnliche und ohne alle weitere Zubereitung auch gleich verwendbare Bast des Manchettenbaumes Lagetta lintearia auf Jamaika. Die Pflanze befindet sich im hiesigen botanischen Garten. Eine lebende Pflanze des neuseeländischen Flachses wurde vorgezeigt, wie auch der schöne Cyclanthus palmatus, von dessen Blättern die kostbaren Panamahüte bereitet werden u. s. w.

Der Vorsitzende sprach dem Vortragenden den Dank des Vereines für seinen eben so belehrenden, als unterhaltenden Vortrag aus, welchem Danke sich die Versammlung durch Erheben von den Plätzen anschloß.

Gartenbau - Vereine.

Frankfurt a. M. Die Verwaltung der Gartenbau-Gesellschaft „Flora“ in Frankfurt a. M. hat nachfolgendes Programm zu ihrer dritten, auf den 5. bis 10. April 1860 festgesetzten Blumen- und Pflanzen-Ausstellung veröffentlicht, zu deren Betheiligung sie ergebenst einladet.

§ 1. Die Eröffnung der Ausstellung findet Donnerstag den 5. April, Nachmittags um 2 Uhr statt. Der Schluß ist auf Dienstag den 10. April, Abends 7 Uhr festgesetzt.

§ 2. Jedermann kann Pflanzen, Blumen, Gartenin*strumente* und andere, in das Gartenfach einſchlagende Gegenſtände zur Ausſtellung einſenden.

§ 3. Für diejenigen Pflanzen, welche von auswärts eingeſchickt werden, übernimmt die Geſellſchaft die Pflege während der Ausſtellung.

§ 4. Die Einſender ſind erſucht, die zur Ausſtellung beſtimmten Gegenſtände längſtens bis Mittwoch den 4. April einzuliefern; Bouquets, Obſt und Gemüſe können auch noch Donnerſtag den 5. April bis Morgens um 8 Uhr aufgeſtellt werden.

§ 5. Mittwoch den 11. April beliebe man die eingeſandten Gegenſtände wieder abholen zu laſſen.

§ 6. Die Einſender werden erſucht, ihre Pflanzen *deutlich* zu bezeichnen und *doppelte* Verzeichniſſe beizulegen.

§ 7. *Einmal gekrönte* Pflanzen ſind von der *Concurrenz* um die folgenden Preiſe ausgeſchloſſen.

§ 8. Die ausgeſetzten Preiſe werden von eigens hierzu ernannten Preisrichtern zuerkannt.

§ 9. *Kulturvollkommenheit*, *Blüthenreichthum* und *Neuheit* mit *blumiſtiſchem Werthe* ſollen bei Zuerkennung der Preiſe beſonders maßgebend ſein.

§ 10. Mit dieſer Ausſtellung wird eine Pflanzenverloſung verbunden werden, worüber zu ſeiner Zeit das Nähere bekannt gemacht werden wird.

Folgende Preiſe ſind für die Ausſtellung beſtimmt:

A. Erſter Preis: *Zehn Dukaten*. Derjenigen Pflanzengruppe, die ſich durch *Blüthenreichthum*, *Kulturvollkommenheit* und *größte Mannigfaltigkeit ausgezeichnet* und mindeſtens 30 Species enthält. Zweiter Preis: *Fünf Dukaten*.

B. Erſter Preis: *Acht Dukaten*. Der *ſchönſten* und *reichhaltigſten* Sammlung Roſen in mindeſtens 36 Sorten Roses remontantes, 24 Sorten R. bourbon, 12 Sorten R. thée, 6 Sorten R. mousseuses, 3 Sorten R. noisette. Zweiter Preis: *Vier Dukaten*.

C. Erſter Preis: *Fünf Dukaten*. Der *reichhaltigſten*, *beſtcultivirten* und *reichblühenden* Sammlung von Rhododendron arboreum und deren Hybriden. Zweiter Preis: *Drei Dukaten*.

D. Erſter Preis: *Vier Dukaten*. Der *reichhaltigſten*, *beſtcultivirten* und *reichblühenden* Sammlung von Azalea indica. Zweiter Preis: *Drei Dukaten*.

E. Erſter Preis: *Vier Dukaten*. Der *ſchönſten* und *beſtcultivirten* Sammlung von Camellien. Zweiter Preis: *Drei Dukaten*.

F. Erſter Preis: *Vier Dukaten*. Denjenigen ſechs Kulturpflanzen, die ſich durch *Blüthenreichthum* und *entſchiedene Vollkommenheit* auszeichnen. Zweiter Preis: *Zwei Dukaten*.

G. Erſter Preis: *Vier Dukaten*. Der *reichhaltigſten* Sammlung decorativer Blattpflanzen in mindeſtens 30 Species. Zweiter Preis: *Drei Dukaten*. Dritter Preis: *Zwei Dukaten*, für mindeſtens ſechs *neu* eingeführte Blattpflanzen, die ſich durch ſchöne Blattformen beſonders auszeichnen.

H. Einen Preis: *Zwei Dukaten*. Der ſchönſten Gruppe Neuholländer Pflanzen in *vorzüglicher* Kultur und in mindeſtens 20 Species.

I. Einen Preis: Vier Dukaten. Der schönsten Sammlung Coniferen in mindestens 40 Species.

K. Einen Preis: Zwei Dukaten. Der schönsten Gruppe von getriebenen Gehölzen neuerer Einführungen, worin auch Azalea pontica gut vertreten ist.

L. Einen Preis: Zwei Dukaten. Der schönsten Gruppe von Zwiebelgewächsen, als: Amaryllis, Hyacinthen, Tulpen ꝛc.

M. Einen Preis: Einen Dukaten. Der reichhaltigsten und schönsten Sammlung von Viola altaica.

N. Einen Preis: Einen Dukaten. Der schönsten Sammlung Cinerarien.

O. Drei Preise: Jeder zwei Dukaten. Für die drei schönsten und reichhaltigsten gemischten Gruppen.

P. Zwei Preise. Erster Preis: Vier Dukaten. Für die reichhaltigste Sammlung von getriebenem Obste. Zweiter Preis: Zwei Dukaten. (NB. Das Obst muß noch an der Pflanze hängen.)

Q. Drei Preise. Erster Preis: Zwei Dukaten. Der reichhaltigsten Sammlung von getriebenem Gemüse. Zweiter und dritter Preis: Jeder einen Dukaten.

R. Zwei Preise: Jeder einen Dukaten. Zur freien Verfügung der Herren Preisrichter.

S. Ehren-Urkunden.

1) Für das schönste in natürlicher Form gebundene Bouquet.
2) Für das schönste in künstlicher Form gebundene Bouquet.
3) Für den geschmackvollst gearbeiteten Kopfputz in lebenden Blumen.
4) Für den geschmackvollst arrangirten Blumentisch.
5) Für den best-gezeichneten Gartenplan.
6) Für die best-conservirten Gemüse.
7) Für das best-conservirte Obst.

Frankfurt a. M., im April 1859.

Berlin. Am 19. Juni beging der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in Berlin sein 37. Jahresfest, das wie bisher mit einer großen Pflanzen-Ausstellung verbunden war. Die Ausstellung fand wieder im Königl. Reithause statt, deren Anordnung über das Ganze die Herren Barrenstein, Kunst und Handelsgärtner, und W. Lauche, Obergärtner im Pflug'schen Garten zu Moabit, übernommen hatten. Dieses Mal hatte man es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, das Aesthetische hervortreten zu lassen, zu welchem Zwecke der K. Obergärtner Herr Neide (Mitherausgeber des von uns mehrfach empfohlenen Buches „Wredow's Gartenfreund") bereitwillige Hülfe leistete und es war nur eine Stimme, daß das Arrangement meisterhaft gelungen war; der Eindruck, den man beim Betreten des Ausstellungslokals empfand, war imposant, denn die Grundidee, den Rand eines amerikanischen Urwaldes darzustellen, war glücklich durchgeführt. Eingetreten, glaubte man sich in eine fremde Gegend versetzt, das Auge schweifte schnell hinweg über die Gewächse fremder Zonen jeglicher Art. Buntblättrige Pflanzen, Palmen, Cycadeen, Pandaceen mit andern Laubbäumen der heißen Länder bildeten einen Hain, der ein treues Bild eines

tropiſchen Waldes gab. — Der botaniſche Garten hatte hierzu die Pflanzen geliefert. Die Gruppe ſelbſt befand ſich auf hoher Terraſſe und nahm die Giebelſeite des Lokals ein, jedoch ſo, daß man am Fuße derſelben herum gehen und rückwärts einen Blick nach dem Raſengrunde und den ſonſt im mittleren Raum befindlichen Tiſchen ſenden konnte. Ziemlich breite Wege führten auf beiden Seiten hinauf, während die Mitte wiederum eine Felſenpartie mit Waſſerfall darſtellte, äußerſt naturgetreu dargeſtellt, ſo daß dieſe Partie ſich des allgemeinſten Beifalls zu erfreuen hatte.

Die Längswände des Lokals waren mit geſchmackvoll arrangirten Pflanzengruppen gedeckt, auch hier hatte der botaniſche Garten das meiſte geliefert, ferner aber auch noch ganz beſonders der K. Univerſitätsgarten (Herr Univerſitäts-Gärtner Sauer), Herr Kunſt- und Handelsgärtner L. Mathieu, Oberhofgärtner Fintelmann in Charlottenburg, Hofgärtner Krawack in Bellevue, Kunſt- und Handelsgärtner Barrenſtein, Herr Egebrecht, Obergärtner im Conſul Wagner'ſchen Garten, ꝛc. Ferner ſah man Gruppen von prächtigen Kalosanthes coccinea des Herrn Kunſt- und Handelsgärtner Hoffmann, desgleichen Hortenſien von Herrn Kunſt- und Handelsgärtner Oſtwaldt, Verbenen von Herrn Kunſt- und Handelsgärtner Schäffer, Delphinien und neuholländiſche Veronica-Varietäten von Herrn Priem u. dergl. gewöhnliche ſogenannte Marktpflanzen mehr von verſchiedenen Einſendern.

Herr Laurentius in Leipzig hatte die neue Blattpflanze Laportea crenulata eingeſandt, Herr Obergärtner Gireoud im Rauen'ſchen Garten Cypripedium spectabile und Rhynchostylis guttata.

Eine recht hübſche Orchideengruppe des Herrn Kunſt- und Handelsgärtner Allardt verdient, wie die Petunien- und Pelargonien-Sortimente des Herrn Barrenſtein nicht minder erwähnt zu werden.

An den beiden Seiten der mittleren Raſenfläche befanden ſich zwei Tiſche, auf dem einen befand ſich ein Sortiment der neueſten Begonien aus dem botaniſchen Garten, auf dem andern ebenfalls Begonien, welche Herr Stange, Obergärtner des Herrn Conſul Schiller zu Hamburg, aus Samen gezogen und zur Ausſtellung geſandt hatte. Einen ganz prächtigen Anblick boten gegen 30 verſchiedene Begonien aus dem Dannel'ſchen Garten (Obergärtner Herr Paſewaldt), überragt von einem herrlichen Baumfarrn, Balantium antarcticum aus dem Decker'ſchen Garten.

Unter den vielen ſonſtigen Pflanzen, die rühmend erwähnt werden müſſen, gehören die wenigen, aber prächtigen Orchideen des Herrn M. Reichenheim, als: Disa grandiflora (blühend), Anguloa Clowesii, Phalaenopsis amabilis ꝛc. — Theils neue und ſich als vorzügliche Blattpflanzen empfehlende Aroïdeen hatte Herr Hofgärtner Sello auf Sansſouci eingeſandt, nämlich: Spathiphyllum heliconiifolium, Philodendron speciosum und Anthurium Selloi und dann eine blühende Agave recurva. — Pelargonien-Sortimente ſah man aus dem Krichelborf'ſchen (Obergärtner Kreutz), Dannenberger'ſchen (Obergärtner Kohlmann) und Wagner'ſchen Garten (Obergärtner Egebrecht). — Herr Kunſt- und Handelsgärtner W. Lauche in Potsdam hatte einige ſehr ſeltene Pflanzen eingeliefert, ſo z. B. das ſchöne monſtröſe Farrn Gymnogramma Stelzneriana, Gnetum Gnemon, Bignonia marmorata, ferner

Cacao-, Piment-, Gummigutti-, Cascarilla-Pflanzen u. dergl. seltene officinelle Gewächse mehr. — Spathiphyllum lanceolatum (eine Aroidee) blühend, Himantophyllum miniatum, eine prächtige Amaryllidee, hatte Herr L. Mathieu aufgestellt.

Da es unmöglich ist, sämmtliche Gewächse, die außer den genannten noch in sehr großer Menge vorhanden waren, hier namhaft zu machen, so beeilen wir uns noch die schönen Früchte zu nennen, welche diese Ausstellung zierten.

Pflaumen erster Qualität hatte Herr Garten-Conducteur Meyer in Sanssouci geliefert; Aprikosen, Pfirsich und Feigen Herr Hofgärtner Nietner in Sanssouci, Erdbeeren Oberhofgärtner Fintelmann in Charlottenburg. Ein Sortiment ganz vorzüglicher getriebener Kartoffeln und schöner Gurken Herr Hofgärtner Nietner in Sanssouci. Von Herrn Kunst- und Handelsgärtner Lauche sah man schöne blaue Kohlrabi, chinesische Rettige und die Perpignan-Salat-Köpfe; von Herrn L. Mathieu chinesische Kartoffeln oder Yamsbataten u. a. m.

An Preisen wurden vertheilt:

1) Der künstlichen Felsengruppe von Herrn Obergärtner Neide entworfen und ausgeführt 20 ℛ.
2) und 3) Der Gruppe des botanischen Gartens und der des Herrn Universitätsgärtner Sauer, jeder ein Preis von 15 ℛ.
4) 5) und 6) Der Gruppe No. 4 des botanischen Gartens, der des Herrn L. Mathieu und Allardt, jeder 10 ℛ.
7) Der Gruppe No. 9 des botanischen Gartens 5 ℛ.
8) Der Begonien-Sammlung des Herrn Danneel (Obergärtner Pasewald) 15 ℛ.
9) und 10) Den Pelargonien des Herrn Kricheldorf zu Magdeburg (Obergärtner Kreutz) und den 12 bunten Blattpflanzen des Herrn Danneel jeder ein Preis von 5 ℛ.
11) Den Begonien-Sämlingen des Herrn Consul Schiller in Hamburg (Obergärtner Stange) 10 ℛ.
12) Dem Begonien-Sämling B. Knerkii ein Ehrendiplom.
13) und 14) Den Erdbeeren des Herrn Mohs, Handelsgärtner in Potsdam, und den Pflaumen des Herrn Garten-Conducteur Meyer in Sanssouci jedem einen Preis von 5 ℛ.
15) und 16) Den Erdbeeren des Herrn Oberhofgärtner Fintelmann und den Aprikosen des Herrn Hofgärtner Nietner in Sanssouci ein Ehrendiplom.
17) Den chinesischen Bataten des Herrn Mathieu 5 ℛ.
18) und 19) Den Bouquets der Herren Jannoch und Krause jeden einen Preis von 5 ℛ.
20) und 21) Dem Rosen-Sortiment des Herrn Lorberg und den Pyrethrum roseum-Sämlingen des Herrn Bedinghaus zu Rimy bei Mons ein Ehrendiplom.

Als Extra-Preise wurden zuerkannt: 8 Preise zu 5 ℛ und zwar der Disa grandiflora und der Anguloa Cloweaii des Herrn M. Reichenheim (Obergärtner Kraus), der Begonia Rex des Herrn Kricheldorf (Obergärtner Kreutz), dem Cypripedium spectabile und Rhynchostylis gutlata des Herrn Rauen (Obergärtner Gireoud), der

Sollya Drummondii des botanischen Gartens (Inspector Bouché) und der Agave recurva des Herrn Hofgärtner Sello.

Ehrendiplome erhielten endlich: Laportea crenulata des Herrn Laurentius in Leipzig, Cedrela febrifuga des Herrn Pflug in Moabit (Obergärtner Lauche), Erica ventricosa carnea des Herrn Eichhorn in Breslau (Obergärtner Rohmann) und Yucca filifera des Herrn Handelsgärtner Allardt.

Kiel. Die diesjährige Blumen- und Gemüse-Ausstellung hielt der Gartenbau-Verein für Schleswig, Holstein und Lauenburg am 4., 5. und 6 Juli in Kiel ab und zwar wieder im Dänischen Schulgebäude. In zwei geräumigen Sälen waren die eingesandten Gewächse, Früchte und Gemüse auf Tischen längs der Seitenwände gefällig aufgestellt, und es hatten zu dieser Ausstellung nahe an zwanzig verschiedene Handels- und Privatgärten contribuirt. Unter den verschiedenen Einsendungen standen die der Herren James Booth & Söhne in Flottbeck, die des Herrn Kunst- und Handelsgärtner Eckardt in Düsternbrook, Dahle in Kiel, Kühne in Altona wegen ihrer Reichhaltigkeit oben an und bildeten das Haupt der Ausstellung, obgleich sich unter den übrigen kleineren Einsendungen manche hübsche Gegenstände bemerkbar machten.

Vergleichen wir diese Ausstellung mit den früheren seit dem fünfjährigen Bestehen des Vereins, so läßt sich nicht leugnen, daß sich ein bedeutender Fortschritt in der Pflanzenkultur in Kiel bemerkbar macht, denn fast alle von den in und bei Kiel ansässigen Kunstgärtnern eingesandten Pflanzen zeugten von einer guten Kultur und scheint jeder von ihnen eifrig bemüht zu sein nach besten Kräften zur Förderung der Gartenkultur beizutragen und den Vorstand des Vereins zur Verfolgung seiner Zwecke thätig zu unterstützen.

Betrachten wir nun die einzelnen Einsendungen genauer und beginnen damit im ersten Saale linker Hand, so überrascht uns hierselbst eine imposante Pflanzen-Gruppe aus den Gewächshäusern der Herren James Booth & Söhne in Flottbeck. Die ganze prächtige Sammlung bestand hauptsächlich nur aus verschiedenen Arten und Varietäten dreier Gattungen, nämlich aus Fuchsien, Caladien und Begonien, sämmtlich aber in üppigster Kulturvollkommenheit, und was die Fuchsien anbelangt außerdem noch in reichster Blüthenfülle. Es waren sämmtlich ausgezeichnete Sorten, sowohl neueste wie neuere, so unter ersteren die Fuchsia British Sailor, Rose of Castille, Loch Katrine, Guiding Star, Prince Frederic William of Prussia, von neueren die sehr schöne Souvenir de Chiswick, galanthiflora pl., Princess of Prussia, Venus de Medici, Fairest of the fair, Primadonna und Duchess of Lancaster.

Die Caladium- wie die Begonien-Arten, die Herr Obergärtner Boysen zu stolzen, herrlichen Exemplaren herangezogen und mit vielem Geschmack im Ausstellungslocale aufgestellt hatte, boten einen prächtigen Anblick dar und obgleich keine dieser Pflanzen in Blüthe war, so gewährten sie doch ein äußerst mannigfaltiges Farbenspiel. Von den schönen Caladien waren ausgestellt: C. picturatum, bicolor splendens, Brongnartii, Verschaffeltii, Neumanni, marmoratum, haematostigmum

und Chantini, letztere unstreitig eins der vorzüglichsten. Von Begonien: B. Royei, picta, annulata (Griffithii), Rex, Reichenheimii, splendida argentea, xanthina marmorea, latimaculata, Miranda, Mad. Wagner, Lazuli, deren Blätter in der schönsten Lasur-Farbe schillerten, Victoria, amabilis, argentea und Reine Victoria. Außer diesen genannten Pflanzen noch ein schönes Senecio Farfugium Koch und Hydrangea japonica fol. aur. var.

Die zweite Gruppe in diesem Saale war die des Kunst- und Handelsgärtner Herrn Ch. Eckardt in Düsternbrook, welche die ganze Rückwand einnahm und theils aus Blattpflanzen, theils aus Floristenblumen bestand. Wir zählten hier 15 Sorten Fuchsien, darunter Queen of the Sea, Rose of Castille und Peer of England, dann 40 Sorten sehr schöner meist neuester Verbenen, 8 Petunien, Phlox, Maranta, Phrynium, Aletris, Dracaena, diverse Begonia, Achimenes, Farrn und Selaginellen, Tydaea Eckhantii, Cissus discolor u. m. a. Sämmtliche Pflanzen hatten ein sehr kräftiges und gesundes Aussehen.

Herrn Eckardt's Gärtnerei zu Düsternbrook ist eine der ältesten und zugleich die erste und bedeutendste Handelsgärtnerei Kiels. Man findet hier eine große Auswahl von Floristen-Blumen, als: Pelargonien, Fuchsien, Calceolarien, Petunien, Verbenen, diverse Blattpflanzen, eine große Auswahl von Gewächshauspflanzen, dann Baumschulen und gute Gemüsesorten und bemerkten wir durchweg eine gute Kultur und musterhafte Ordnung. Abgesehen von dem Interesse, welches diese Gärtnerei für jeden Pflanzenfreund haben muß, ist sie noch ganz besonders ihrer reizenden Lage wegen an einem schönen Buchenwalde mit einer weiten Aussicht auf die Ostsee Jedermann zum Besuch zu empfehlen.

Die dritte Wand war mit einer Anzahl Pflanzen aus dem Garten des Herrn Ober-Appellationsgerichts-Secretairs Ackermann in Kiel besetzt. Die Sammlung bestand größtentheils aus Blattpflanzen aller Art in nur kleinen aber kräftigen Exemplaren, bemerkenswerth sind: Aphelandra Leopoldii (blühend), Sciadophyllum palmatum und pulchrum, Urtica macrophylla, Lychnis coronata (blühend), Adamia versicolor (blühend).

Vor dem einen Fenster dieses Saales hatte Herr Pyrotechniker H. Pierau in Kiel eine kleine, aber sehr interessante gemischte Sammlung aufgestellt, dieselbe bestand aus: 1 hochstämmig gezogenen (veredelten) Pelargonium tricolor, 1 Weinstock, Precose malinger, gegen 3½ Fuß hoch mit 9 Trauben, 1 Muscat Reinette-Apfel und Maria Louise-Birne in Töpfen, beide mit hübschen Früchten, 7 diverse Sorten Stachelbeeren, einige hübsche Rhodanthe Manglesii u. dergl. m. Wie immer zeichnete sich auch diesmal Herrn Pierau's Einsendung vortheilhaft aus.

Vor dem andern zweiten Fenster hatte Herr Handelsgärtner C. Kühne in Altona eine sehr hübsche Aufstellung von Gemüsen, unter denen sich hervorthaten: 3 Köpfe großer weißer hamburger Blumen- und ganz früher krauser grüner Savoyerkohl, 3 Sorten große Bohnen (engl. Windsor, langschotige Schwert und breite Wilhelmsburger), Rhabarber (Queen Victoria), von dem ein Stengel ein Pfund wog, große grüne französische Artischocken, Erfurter neue Preis-Gurken, diverse Wurzeln, 16 Sorten Erbsen, 10 Sorten Kopfsalat u. dergl.

Außer diesen Gemüsen hatte Herr Kühne noch aufgestellt 8 Sorten diverse Tropaeolum, 1 Sortiment von 40 Sorten und Arten ver-

ſchiedener Freilandpflanzen und Annuellen. Leider waren dieſe abgeſchnittenen Blumen in wenigen Gefäßen zu dicht beiſammen geſteckt, ſo daß die eine Sorte von der andern verdeckt und die Schönheit mancher Art dadurch beeinträchtigt wurde. Hätte jede Sorte für ſich in einem Glaſe geſtanden, ſo würde die ganze Sammlung einen hübſchen Anblick gewährt und dieſelbe auch unfehlbar den erſten Preis erhalten haben.

In der Mitte des Saales ſtand ein runder Tiſch, aufgeziert mit verſchiedenen theils abgeſchnittenen Blumen und Früchten. In der Mitte desſelben ragte eine Agave geminiflora mit einem 6 Fuß hohen Blüthenſchaft hervor, die vom K. bot. Garten eingeſandt war. Mit Bedauern vermißten wir aber weitere Beiträge zu dieſer Ausſtellung aus dem bot. Garten. Auf dem Tiſche befand ſich ferner ein Sortiment Petunien, Stockroſen und andere Freilandpflanzen in abgeſchnittenen Exemplaren von Herrn P. E. Meyer in Kiel. Von Herrn D. Wieſe, Gärtner zu Lehmkuhlen, ein Körbchen mit Roman Emperor und New Elton Erdbeeren; von Herrn Schloßgärtner A. Cramer in Kiel 9 Sorten Erdbeeren (Victoria, Cremont, Excellent, Surprise, Nimrod, Roſenerdbeere und Goliath), ſämmtlich ſehr gut, und 4 Sorten Kirſchen; von Herrn Eckardt ein Korb mit Goliath-Erdbeeren. Eine Schale mit Viola tricolor von Herrn Profeſſor Dr. Seelig zu Kiel, unter denen ſich eine ganz ſchwarze namentlich auszeichnete; Kittley's Goliath-Erdbeeren von Herrn Daunenberg, Gärtner auf Gültzow in Lauenburg.

Herr Profeſſor Dr. Seelig hatte an einer anderen Stelle dieſes Saales aus ſeinem hübſchen Garten noch ein exquiſites Sortiment von 70 Sorten Roſen aufgeſtellt, dann mehrere ſtrauchartige Calceolarien aus Samen, Pelargonien, eine Maikirſche im Topf, das liebliche Leptodactylon californicum, reich blühend, und die neue Linaria cymbalaria fol. var., eine ſehr empfehlenswerthe Pflanze.

Im zweiten Saale zeichnete ſich die Pflanzen- und Gemüſeſammlung des Herrn C. E. Dahle, Handelsgärtner in Kiel, aus. Erſtere beſtand aus blühenden und Blatt-Pflanzen, ſämmtlich in nur kleinen, aber kräftigen und geſunden Exemplaren. Wir notirten hier 13 Sorten Scharlach-Pelargonien, 27 Sorten neueſte und neuere Fuchſien, 21 desgleichen Verbenen, 30 Sorten Pelargonien, Tetratheca verticillata und die neue, prächtige Dianthus Heddewigii giganteus, richtiger D. chinensis L. var. giganteus. Es iſt dies bekanntlich eine Nelkenvarietät, die der Handelsgärtner Herr Heddewig in Petersburg erzogen hat. Die Blumen ſind ungemein groß, einfach und die Blumenblätter ſtark gefranzt. Ein Bouquet diverſer Varietäten dieſer Nelke befindet ſich in Regel's „Gartenflora“ Februar-Heft 1859 abgebildet. —

Der Vorſtand des Vereins, der alljährlich eine Anzahl der neueſten blumiſtiſchen Neuheiten anſchafft und dieſe von Herrn Dahle anbauen läßt, um deren Werth zu prüfen, hat auch Herrn Dahle veranlaßt dieſe Nelke anzuziehen, die ohne Zweifel zu den beſten blumiſtiſchen Neuheiten zu zählen ſein dürfte. Die Pflanze ſoll nur einjährig ſein, doch glauben wir ſicher, daß ſie ſich durch Stecklinge vermehren und überwintern laſſen wird.

Von Gemüſen hatte Herr Dahle unter anderen eingeliefert mehrere ſehr gute Gurken, als: Neue Arnſtädter Rieſen-, Non plus ultra-, Roman Emperor-, Preis von Erfurt- und Neue chineſiſche blaßgrüne

Gurke; an Erbſen: Dickson's Favorite und Neueſte engl. Prisetaker; an Salat: Neuer großer weſtindiſcher, Perpignaner Dauerkopf und Vollblut-Forellen, mehrere Carotten-Sorten, violetten Herbſt-Rettig aus China, gewöhnliche und ſibiriſche Korbelrüben.

Die Einſendungen des Herrn Hofjägermeiſter von Ahlefeld (Gärtner Seemann) zu Groß-Königsförde entſprachen diesmal nicht unſeren Erwartungen, wir waren gewohnt von ihm nur ſchöne und gut kultivirte Pflanzen zu ſehen, diesmal jedoch gerade das Gegentheil, denn die 20 Sorten Pelargonien waren total verblüht und theilweiſe auch ſehr unanſehnliche Exemplare, nicht viel beſſer waren die Fuchſien. — Außer dieſen Pflanzen waren noch von dem Gärtner ausgelegt 16 Sorten Gemüſe, unter denen der Blumenkohl lobende Erwähnung verdient.

Ein Preis von 4 ℳ und einer von 2 ℳ waren ausgeſetzt für die beſten Erdbeeren in wenigſtens 12 Sorten. Es war nur eine Sammlung eingegangen und zwar 15 Töpfe von Herrn von Ahlefeld (Gärtner Seemann). Die Pflanzen ſtanden in Töpfen und waren ungemein volltragend." Da es aber keine 12 verſchiedene Sorten und dieſe nicht einmal benannt waren, überdies den Pflanzen eine Menge abgeſchnittene Stengel mit Früchten beigeſteckt worden waren, ſo wurde den Pflanzen nur der 2. Preis zuerkannt. Jedenfalls wäre es beſſer geweſen, die Früchte abgepflückt, jede Sorte einzeln auf Tellern ausgeſtellt zu haben, anſtatt durch das Beiſtecken der Früchte bei den einzelnen Pflanzen glauben zu machen, die Exemplare wären von Natur ſo volltragend. —

Unter den kleineren Einſendungen bemerkten wir noch:

Ein Topf mit Zephyranthus roseus, ſehr vollblühend, von Fräulein Kraus in Kiel.

Von Herrn G. Barckhauſen, Gärtner zu Bothkamp, Zwerg-Blumenkohl, Zuckermelone und andere Gemüſe, ſo wie einige gut conſervirte Aepfel.

Von Herrn Kloſtervoigt Reher in Preetz ein Korb mit vorjährigen Aepfeln: Calville blanc d'hiver, desgleichen 11 Aepfel Calville blanc von der Frau von Thaden auf Tesdorf, dieſe Früchte waren ausgezeichnet erhalten.

Hiermit glauben wir ziemlich genau mitgetheilt zu haben, was auf dieſer Ausſtellung ausgeſtellt geweſen war, mögen die ferneren Ausſtellungen immer mehr und mehr Theilnahme und Intereſſe erwecken, ſowohl unter den contribuirenden Gärtnern und Pflanzenfreunden, wie auch unter dem Publikum im Allgemeinen.

Preisvertheilung.

I. Zierpflanzen.

1. Für die beſte Sammlung Roſen in wenigſtens 24 Sorten ohne Concurrenz.
2. Für die beſte Sammlung Pelargonien in wenigſtens 24 Sorten: Herrn Handelsgärtner Dahle ein 2. Preis 4 ℳ.
3. Für die beſte Sammlung Fuchſien in 12 Sorten: Herren J. Booth & Söhne ein 1. Preis 6 ℳ.
   Für die beſte Sammlung Fuchſien: Herrn Chr. Eckardt ein 2. Preis 3 ℳ.

4. Für die beste Sammlung Warmhauspflanzen in 12 Sorten: Herren J. Booth & Söhne ein 1. Preis 8 ℳ.
   Für die beste Sammlung Warmhauspflanzen: Herrn A. Ackermann ein 2. Preis 4 ℳ.
5. Für die beste Sammlung neuer Verbenen in 12 Sorten: Herrn Chr. Eckardt ein 1. Preis 5 ℳ.
6. Für die beste Sammlung von Freilandpflanzen, sowohl annuelle als Stauden: Herrn Kühne ein 2. Preis 2 ℳ.
7. Für Neuheiten, den Caladien der Herren J. Booth & Söhne ein 1. Preis 8 ℳ.
   Den Dianthus Hoddewigii grandiflora des Herrn Dahle ein 2. Preis 2 ℳ.
   Dem Pelargonium tricolor des Herrn Pieran ein 2. Preis 2 ℳ.

II. Gemüse.

1. Für die beste Aufstellung von Gemüsen: Herrn Kühne ein 1. Preis 6 ℳ.
   Für die beste Aufstellung von Gemüsen: Herrn Dahle ein 2. Preis 4 ℳ.
2. Für den besten Blumenkohl: Herrn von Ahlefeld (Gärtner Seemann) ein 2. Preis 2 ℳ.
3. Den Schlangengurken des Herrn Thiessen ein 1. Preis 2 ℳ.

III. Früchte.

1. Für die besten Erdbeeren in 12 Sorten: Herrn von Ahlefeld (Gärtner Seemann) ein 2. Preis 2 ℳ.
2. Den Früchten ꝛc. des Herrn 1. Preis 4 ℳ.

E. D—o.

Prag. Die böhmische Gartenbau-Gesellschaft in Prag hat unlängst ihren funfzehnten Jahresbericht veröffentlicht. Nach demselben ist die Gesellschaft auf einem sehr erfreulichen Standpunkte angelangt, sie zählt gegenwärtig 599 Mitglieder, die nicht nur in den meisten Provinzen des Reiches vertheilt, sondern bis an die entferntesten türkischen und russischen Grenzen wesentlich mit zur Förderung und Unterstützung des Gartenbaues in seinem ganzen Umfange und in allen seinen Zweigen beitragen helfen.

Da der Verein die statutenmäßige jährliche Vertheilung von Vermehrungen der in dem Gesellschaftsgarten kultivirten Pflanzen als eines der wesentlichsten Mittel zur Förderung des Gartenbaues, und sodann die möglichste Befriedigung der Wünsche der Mitglieder als eine besondere Aufgabe seiner Verwaltung ansieht, so wurden in dieser Beziehung, um denselben bei der Wahl die Gelegenheit zu bieten, ihre Sammlungen mit neuen interessanten Zierpflanzen, Weinsorten und sonstigen neuesten Erzeugnissen der Gartenkunst bereichern zu können, solche Objecte aus den besten Quellen des Auslandes bezogen.

Die Vertheilung der dann vermehrten Pflanzen fand zur bestimmten Zeit statt und wurden im Frühjahre und Herbste 1858:

An Georginen 1972 Stück, Blumensamen 1055 Prisen, Küchengewächssamen 1385 Portionen, Pfropfreiser 945 Stück, Obstbäumchen und Sträucher 1169 Stück, verschiedene andere lebende Pflanzen 16,631 Stück — insgesammt also im verflossenen Jahre 23,127 Pflanzenobjecte

an die Mitglieder vertheilt, fürwahr eine Pflanzenmenge, welche theils zur Nutzbringung, theils zur Verschönerung einer großen Anzahl von Gärten mächtig beizutragen im Stande ist.

Die im April v. J. abgehaltene Blumen- und Pflanzenausstellung gab abermals einen rühmlichen Beweis von der hohen Stufe, auf welcher Böhmens Gartenkultur steht.

Vom Secretair des Vereins, Herrn Dr. Aug'ustin Krell, wird an Sonn- und Feiertagen in dem Gesellschaftsgarten ein Unterricht in der populären Botanik an Gartengehülfen und Lehrlingen ertheilt. Es nahmen im vorigen Jahre 21 Personen daran Theil, von denen sich 10 freiwillig der am 10. October in Gegenwart des Ausschusses abgehaltenen Prüfung unterzogen und ihnen darauf dem Erfolge entsprechende Zeugnisse ausgestellt wurden.

Erbsenlinse.

Sowohl in deutschen wie englischen Gartenschriften wurde zu Anfang dieses Jahres eine Erbsenlinse erwähnt, die Herr Dr. Rauch in Bamberg in seinem Buche „Anbau-Versuche mit neuen oder wenig bekannten Nutzgewächsen ꝛc.“ S. 40 als ein Bastard zwischen Erbse und Linse anführt. Wir bemerkten im 5. Hefte S. 237 unserer Zeitung, daß diese Pflanze weiter nichts sei als Vicia sativa leucosperma. Bisher weiß man noch von keinem Falle, daß eine Kreuzung zwischen den Papilionaceen stattgefunden habe, um so mehr, bemerkt Gardeners' Chronicle, muß eine Kreuzung zwischen der winzigblüthigen Linse und der großblumigen Erbse auffällig erscheinen.

In demselben so eben erwähnten Journale sagt Dr. Lindley, dürfte man jedoch eine Möglichkeit einer solchen Kreuzung nicht für unwahrscheinlich halten, zudem schien uns der Name Rauch doch auch eine Garantie für die Wahrheit zu sein *). Herr Dr. Lindley hat nun von mehreren Personen Samen, die denselben direct von Herrn Rauch bezogen hatten, erhalten, so z. B. von Herrn Van Houtte, dem zugleich versichert worden ist, daß die Hybridisation dadurch bewirkt worden sei, daß man die gewöhnliche Linse (Ervum Lens) mit dem Pollen einer Art Zuckererbse befruchtet habe. Es blieb nun Herrn Lindley nichts anderes übrig, als den Samen zu säen und das Resultat abzuwarten.

Die Samenpflanzen, schreibt Lindley, stehen jetzt (18. Juni) in Blüthe und hält er es für nothwendig zu bestätigen:

---

*) In dem Rauch'schen Buche heißt es wörtlich pag. 40, Februar-Lieferung: „Eine zwischen Erbse und Linse stehende Frucht, der letzteren aber näher verwandt, von eigenthümlichem, aber sehr angenehmem Geschmack, der auch Solchen zusagt, welchen die Linsen nicht behagen. Sie hat lange Schoten wie die Erbse und ist deshalb viel reichtragender als die gewöhnliche Linse.“

Die Redact.

1) daß es durchaus nicht den Anſchein hat, daß irgend eine Gartenerbſe bei der Befruchtung im Spiele iſt;

2) daß die Samenpflanzen völlig frei ſind von dem Blute einer Linſe, und

3) daß ſie mehr irgend eine Art Wicke zu ſein ſcheinen oder eine Form der Vicia globosa der Gärten, doch iſt letzteres auch noch ſehr zweifelhaft, ebenſo wenig ſcheint es die Vicia sativa leucosperma (Hambg. Gartztg.) zu ſein.

Es wäre nun Herrn Dr. Rauch's Pflicht, genau anzugeben, wie dieſe Pflanze entſtanden iſt.

Schließlich bemerkt Herr Lindley noch, daß von Herrn F. A. Haage jun. in Erfurt eine Linſe unter dem Namen E. monanthos oder Linſe der Provence vertheilt worden ſei, die mit der Rauch'ſchen Erbſenlinſe durchaus nicht zu verwechſeln iſt.

In No. 627 des G. Chr. berichtet Herr F. A. Haage in Erfurt Nachfolgendes über dieſe Pflanze als Entgegnung auf die frühere (obige) Mittheilung in G. Chr. Herr Rauch iſt gleichfalls der Meinung, daß es keine Hybride ſei, vermuthlich aber eine Varietät der Vicia sativa. Herr Haage hält die Pflanze für identiſch mit Ervum monanthos (Provence-Linſe), die er unter dieſem Namen bereits ſeit 30 Jahren verkaufe. Ob aber der Name monanthos recht iſt, will Herr Haage nicht mit Beſtimmtheit behaupten, jedoch iſt es keinenfalls eine Varietät der Vicia sativa, für welche mehrere Autoritäten die Pflanze ausgeben.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften.

* Columnea scandens *L.*

(Columnea rotundifolia Salisb., C. speciosa Prsl.

Gesneriaceae.

Dieſe Pflanze, von der die Tafel 5118 des Bot. Mag. eine Abbildung bringt, iſt in den Pflanzenſammlungen Deutſchlands allgemein bekannt und findet man ſie ihrer ſchönen, großen carminrothen Blumen wegen vielfach kultivirt. C. rotundifolia Salisb. und C. speciosa Prsl. ſind zu wenig verſchieden, um ſie als Arten von der C. scandens trennen zu können.

Am beſten gedeiht die Pflanze in einem feuchten Warmhauſe und eignet ſie ſich auch ganz beſonders zu Ampelpflanzen.

Goldfussia Thomsoni *Hook.*

Acanthaceae.

Eine ſehr hübſche Art, die durch Herrn Dr. Thomſon vom Sikkim Himalaya in England eingeführt worden iſt. Sie gehört wie die G.

discolor, Dalhousiana und penstemonoides zu einer und derselben Gruppe der Acanthaceen, und unterscheidet sich von diesen durch den mehr oder weniger schlanken Habitus, durch die wenigen meist endständigen Blumen, durch die schlankere Blumenröhre und dunkel violett-rothe Farbe derselben. Alle die hier genannten Arten verdienen kultivirt zu werden, denn ihre Blumen sind schön und dauert deren Blüthezeit mehrere Monate hindurch. G. Thomsoni wurde von den Herren Thomson und Hooker im westlichen Nepal bei Garwhal (Sikkim) in einer Höhe von 6—9000 Fuß entdeckt. Bot. Mag. t. 5119.

Rhododendron Smithii *Nutt.*

Eine niedrig bleibende, sich stark verästelnde Art mit brillant carminfarbenen Blumen, die in Köpfen an den Endspitzen der Zweige beisammenstehen. Diese Art hat im Allgemeinen viel Aehnlichkeit mit dem alten Rhododendron arboreum und barbatum.

Diese ausgezeichnete Art blühte im März 1859 zum ersten Male in England und war von Herrn Booth von Bhotan eingeführt worden, wo sie im Paß von Lablung in Gesellschaft mit Rhododendron Hookeri Nutt. wächst. Sie wurde auf Wunsch des Herrn Nuttall zu Ehren des verstorbenen Sir James Edward Smith benannt, durch den die Aufmerksamkeit der Pflanzenfreunde zuerst auch auf das Rhod. arboreum gelenkt wurde. Bot. Mag. t 5120.

Stangeria paradoxa *T. Moore*

(Lomaria coriacea Kze., L. eriopus Kze.)

Cycadeae.

Diese sehr merkwürdige Pflanze wurde im Jahre 1835 zuerst von Kunze nach einem unvollständigen Exemplare von Südafrika als ein Farrn (Lomaria) in der Linnaea (vol. 10, p. 506) erwähnt. Später (1851) sandte Dr. Stanger eine Pflanze von Natal an Herrn R. B. Ward, der sie wieder an den botanischen Garten zu Chelsea übergab und wurde sie dann zuerst von Herrn Moore nach einem ebenfalls unvollständigen Exemplare als ein „Zamia-ähnliches Farrn“ oder „Farrnähnliche Zamia“ beschrieben; zugleich aber auch die Meinung ausgesprochen, daß diese Pflanze eher eine Cycadeae als Farrn sein möchte, was sich denn auch später herausstellte. Im Jahre 1854 wurden Exemplare dieser Pflanze mit Fruchtzapfen in der Linnaean Society vorgezeigt und seitdem sind im Garten zu Kew sowohl männliche als weibliche Exemplare, jedoch leider zu verschiedenen Zeiten, zur Blüthenentwickelung gekommen.

Die Gattung Stangeria ist nahe verwandt mit Encephalartus, auch besteht zwischen der Fructification beider Gattungen kein wesentlicher Unterschied, dagegen ist ein Unterschied im Habitus und in den Blättern und ganz besonders in dem kurzen rübenartigen Stamm der Stangeria, an dem keine bleibenden Reste der abgestorbenen Stengel der Wedel oder Blätter bleiben, ferner ist ein Unterschied in den wenigen endständigen Blättern und in der farrnähnlichen Nervatur der einzelnen Blättchen.

Der Stamm der Pflanze ist etwa 1 Fuß hoch, nach der Basis zu etwas dünner werdend und mit wenigen Wurzeln versehen. Das obere Ende ist etwas verjüngt und trägt 3—6 Blätter oder Wedel. Bracteen sind wenige, diese liegen dachziegelförmig, sind breit eirund, wollig. Die Blätter sind 2 Fuß lang und 1 Fuß breit, glatt, nur nicht an der wolligen Basis des Blattstengels. Blättchen etwa 12 gegenüberstehende Paare, die unteren gestielt, die oberen sitzend mit einer breiten herablaufenden Basis, scheinend, lichtgrün. Der Rand ist gesägt gegen die Mitte zu, wenig verdickt, gefiedert geadert. Die Adern erreichen den Rand der Blättchen, alle sind frei. Der männliche Blüthenzapfen ist gestielt, 6 Zoll lang und 1¼ Zoll breit, die Spitzen der Schuppen sind wollig, trapezförmig. Antheren sehr zahlreich, gelb. Die weiblichen Blüthenzapfen diesem ähnlich, jedoch kürzer, ungefähr 2—3 Zoll lang. Bot. Mag. t. 5121.

Agave maculosa *Hook.*

Eine neue Art aus Texas, die der Agave saponaria Lindl. von Guatemala am nächsten steht. Der Habitus ist niedrig, stammlos, die Blätter sind 4—6 Zoll lang, dick, fleischig, lanzettförmig, an der Basis stengelamfassend, der Rand nach oben gebogen, mit kurzen Zähnen besetzt. Blüthenschaft mittelständig, 1—1½ Fuß lang, nach der Basis zu beblättert, die dann mehr nach oben zu allmählig in Bracteen übergehen. Blüthenrispe 6—8 Zoll lang, Blüthen 10—12. Die Blüthenhüllblätter grün mit rothem Anflug. Bot. Mag. t. 5122.

Gynura bicolor *DC.*

(Cacalia bicolor Roxb.)

Compositae.

Eine sehr alte bekannte, in den Gärten jedoch gänzlich verloren gegangene Pflanze, die sich durch ihre schön gefärbten Blätter sehr empfiehlt. Die Blätter sind nämlich auf der unteren Seite, oft auch auf beiden brillant purpurroth gefärbt und contrastiren sehr hübsch mit den goldgelben Blüthen. Die Pflanze stammt von den Molukken, von wo sie im Jahre 1790 in den botanischen Garten zu Calcutta und im Jahre 1799 durch Sir J. Banks in England eingeführt wurde. In jetziger Zeit, wo man so sehr für die buntblättrigen Pflanzen eingenommen ist, dürfte diese Pflanze von besonderem Interesse sein. Bot. Mag. tab. 5123.

Rhododendron Nuttallii *Booth.*

Herr Otto Forster in Augsburg hatte das Glück diese prächtige Art zuerst in Blüthe gebracht zu haben (vergl. Hamburg. Gartenztg. XIV, p. 286). und erschien dessen Exemplar abgebildet in dem vortrefflichen Illustr. Bouq. fasc. V, Pl. XXI und jetzt bringt die Illustr. hortic. tab. 208 eine zweite Abbildung nach der so eben erwähnten. Daß diese Art zu den prächtigsten Arten gehört, bemerkten wir schon früher, dieselbe empfiehlt sich durch ihre ganz enorm großen, mehr als 6 Zoll im Durchmesser haltenden weißen Blumen.

Azalea magnifica (*Hybrida*).

Unter den vielen pontischen Azaleen-Varietäten ist dieses eine der schönsten Formen, mit großen weißen prächtig orangegelb gezeichneten Blumen, die in jeder Sammlung einen Platz verdient. Eine Abbildung finden wir in der Illustr. hortic. Taf. 209.

Grevillea alpestris β helianthemifolia *Meisn.*

(Grevillea alpina β Lindl., G. Dallachiana F. Müll.)

Proteaceae.

Ein niedlicher kleiner Busch von graciösem Wuchs, mit zahlreichen kleinen grau-grünen ovalen Blättern und sehr vielen gelblich-rothen Blumen. Derselbe stammt aus Neuholland in der Umgegend von Port Philipp.

Fast sämmtliche Grevillea-Arten sind Zierpflanzen, theils empfehlen sie sich durch ihre hübschen, oft sehr großen und eigenthümlich geformten Blätter, aber fast sämmtlich durch ihre mehr oder weniger hübschen Blumen, dessenungeachtet werden sie jetzt wenig mehr kultivirt und findet man sie höchstens nur noch in botanischen Sammlungen. Die Illustr. hortic. bringt auf Taf. 210 eine Abbildung der hier in Rede stehenden, noch seltenen Art.

Fuchsia simplicicaulis *R. & P.*

Zu den unzähligen neuen Hybriden, welche alljährlich in den Gärten auftreten, auch einmal wieder eine neue Art, die wohl der Beachtung werth zu sein scheint. Es ist eine sich nur wenig verästelnde Pflanze, wie schon ihr Name andeutet. Die Blumen stehen in hängenden Rispen zu 3 bis 5 beisammen, sie haben eine sehr verlängerte dünne Röhre (gut 3 Zoll lang) und eine nur kleine Blumenkrone von blutrother Färbung. Ruiz und Pavon haben diese Art in ihrer Flora von Chili beschrieben. Neuester Zeit wurde sie durch Herrn W. Lobb von Chili und Peru an die Herren Veitch & Sohn zu Exeter eingesandt. Am nächsten steht F. simplicicaulis der F. venusta Hook.

Die Belgique Hortic., die auf Taf. 225 eine Abbildung dieser hübschen Species bringt, giebt mit ihr zugleich noch zwei sehr schöne Hybriden von Fuchsien, nämlich F. Eclat und F. Sir Colin Campbell, erstere von Herrn Smith und letztere von Herrn Wheeler gezogen, zwei Blumen allerersten Ranges. Die F. Eclat hat eine weiße Blumenkrone, während die F. Sir Colin Campbell eine fast rein dunkelblaue Blumenkrone hat.

Begonia Queen Victoria *hort. Makoy.*

In dem Etablissement der Herren James Booth & Söhne sahen wir bereits lebende Pflanzen dieser Begonia, die wir nach der B. Rex für eine der vorzüglichsten Hybriden halten. Herr Jacob Makoy in Lüttich hatte das Glück dieselbe aus Samen gezogen zu haben, es ist jedoch nicht gesagt aus welcher Befruchtung dieselbe her-

vorgegangen ist. Eine sehr getreue Abbildung befindet sich in der 8. Livr. dieses Jahrganges der Belgiq. hortic. pag. 226.

* Calathea fasciata *Rgl. & Kcke.*

Marantaceae.

Herr Dr. Regel gab im vorigen Jahrgange seiner vortrefflichen „Gartenflora“ S. 348 die Diagnose einer neuen Calathea, die von dem Reisenden Marius Porte in den Catinga's des südlichen Theils der Provinz Bahia in Brasilien entdeckt und im Jahre 1858 von Herrn Linden zuerst unter dem Namen Maranta fasciata in den Handel gebracht worden ist. Die Pflanze blühte zum ersten Male bei Herrn Siesmayer auf Kamenostrow in Petersburg *). Eine sehr gute Abbildung und Beschreibung dieser schönen Calathea befindet sich in dem 2. Hefte der Mittheilungen des Petersburger Gartenbau-Vereins, die von jetzt ab in deutscher und russischer Sprache erscheinen, ebenso giebt die Gartenflora Tab. 255 eine sehr gelungene Abbildung derselben.

Die Calathea (Maranta) fasciata hat einen niedrigen, kaum ½ Fuß hohen Wuchs mit verhältnißmäßig großen Blättern. Die Blätter stehen ziemlich wagerecht, sind schief kreisförmig, am Grunde und an der Spitze abgerundet-stumpf und an der letzteren mit einem aufgesetzten Spitzchen versehen, auf beiden Seiten kahl; auf der Oberseite glänzend und auf das prächtigste abwechselnd mit 6—8 dunkelgrünen und weißen schiefen Querbändern versehen. Die Blüthenähre ist nur kurz, unter den Blättern verborgen, die Blüthen wie deren Bracteolen sind mäßig groß, weiß und von geringer Schönheit, dagegen empfiehlt sich die Pflanze ungemein durch ihre herrlichen Blätter und sollte sie in keiner Sammlung fehlen. — Ob Calathea (Maranta) borussica, die dieser Art sehr nahe steht, nur eine Abart von dieser oder wirklich eine eigene Art ist?

* Urostigma magnificum *Rgl.*

Artocarpeae.

Eine sehr empfehlenswerthe Blattpflanze fürs Warmhaus, von der die „Gartenflora“ Taf. 256 eine Abbildung giebt, nachdem zuvor Dr. Regel im vorigen Jahrgange seiner Zeitschrift eine genaue Beschreibung gegeben hat. Bekannter ist diese Pflanze in den deutschen Gärten als Ficus subpanduraeformis de Vris. (Leonensis Hort.) oder Urostigma subpanduraeformis Miq. Der ächte Ficus subpanduraeformis gehört jedoch zu den schärflich behaarten Arten, Ficus oder Urostigma magnificum Rgl. ist dagegen durchaus kahl, ja die obere Blattseite ist glänzend.

* Thunbergia coccinea *Wall.*

(Thunbergia pendula Hassk., Hexacentris coccinea Nees.)

Diese alte bekannte und zugleich schöne Schlingpflanze befindet sich schon an 40 Jahre in den Sammlungen, da sie aber eine bedeutende

*) Auch im bot. Garten zu Hamburg blühte diese Art im vorigen Jahre. Die Redact.

Größe erreichen muß, ehe sie blüht, so findet man sie jetzt nur selten in den Gärten. Vortrefflich eignet sich diese Art zur Bekleidung von Säulen in großen (Palmen-) Häusern oder zur Bildung natürlicher Festons. Einmal sahen wir die Th. coccinea im bot. Garten zu Berlin in Blüthe und zwar im Palmenhause, wo sie sich sehr ausgebreitet hatte.

Das Vaterland dieser Pflanze sind die hügeligten Regionen Indiens, von Kamaon, Nepal, Sikkim, Khasia, der Halbinsel Malaga bis nach Java. Eine ihr sehr nahe stehende Art, die Th. Mysorensis, ist gleichfalls sehr gewöhnlich auf Ceylon. — Neuester Zeit blühte die Th. coccinea in der Gärtnerei des Herrn Veitch, und giebt das Bot. Mag. auf Taf. 5124 eine Abbildung.

Rhododendron Shepherdii *Nutt.*

Abermals ein schönes Rhododendron, das von Herrn Nuttall von den Gebirgen von Bhotan und Assam eingeführt wurde und bereits bei ihm in seinem Garten zu Nutgrove in Chesshire geblüht hat. Diese Art unterscheidet sich von dem Rh Kendrickii, von der nächstens eine Abbildung im Bot. Mag. erscheinen soll, durch das glatte Ovarium und durch den großen Kelch; von dem Rh. arboreum unterscheidet es sich durch die Farbe auf der Unterseite der Blätter, durch die zarteren Nerven und durch den größeren Kelch. Herr Nuttall bemerkt, daß diese Pflanze auf den Dola-Gebirgen von Bhotan mit Rh. eximium wächst und daß er es zu Ehren des Herrn Henry Shepherd, Curator des bot. Gartens in Liverpool, genannt habe. — Die Blumen stehen in dichten endständigen Köpfen beisammen und sind brillant dunkel scharlachroth. Bot. Mag. Taf. 5125.

Cymbidium eburneum *Lindl.*

Orchideae.

Diese liebliche und seltene Orchidee ist bis jetzt nur von einem Botaniker gefunden worden, nämlich von dem verstorbenen Herrn Griffith, der sie bei Myrung auf den Khasia-Gebirgen im östlichen Bengalen entdeckte, wo sie etwa 5—6000 Fuß über der Meeresfläche wächst. — Die Blumen sind groß, etwa 4—5 Zoll im Durchmesser, von elfenbeinweißer Farbe. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5126.

Ceanothus Veitchianus *Hook.*

Herrn Veitch verdanken wir die Einführung dieses herrlichen harten Strauches, der ihn durch seinen Sammler Herrn W. Lobb aus Californien erhielt. Obgleich diese Art in vieler Beziehung dem C. floribundus, C. Lobbianus und C. papillosus nahe steht, so unterscheidet sie sich doch hinlänglich von diesen durch die Blätter. So schön nun auch die bekannten Arten an sich schon sind, so werden dieselben dennoch durch die brillant ultramarinblauen Blüthen, welche diese Art in großer Menge hervorbringt, wie durch die dunkeln glänzend immergrünen Blätter übertroffen. Das Exemplar, welches bei Herrn Veitch blühte, war etwa 3 Fuß hoch und so stark mit Blüthen bedeckt, daß kaum ein Blättchen zu sehen war.

Die Pflanze verästelt sich stark und die Blumen erscheinen in 1 bis 3 Zoll langen Köpfen an den Endspitzen der Zweige. Eine sehr zu empfehlende Art, die bei uns jedoch das Kalthaus zur Ueberwinterung bedarf. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5127.

Datura chlorantha *flor. plen.*

Eine hübsche Datura mit gefüllten gelben Blumen, welche die Herren Henderson zu Pine-apple Place bei London von Herrn Francis im bot. Garten zu Adelaide in Süd-Australien erhalten haben. Es ist eine Art mit gefüllten gelben Blumen, die während des ganzen Sommers blühen und einen angenehmen Geruch verbreiten. Ob die Pflanze in Australien heimisch ist, steht noch sehr in Frage, es ist eher wahrscheinlich, daß Samen davon von Europa nach Adelaide gebracht worden sind und ist es daher noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob unsere wirklich die obengenannte Art oder ob es vielleicht ein Bastard ist. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5128.

Ueber einige merkwürdige Epheu

und über eine neue Art und Weise, diesen Baum als Gartenschmuck anzuwenden.

Nach der Revue horticole mitgetheilt von F. W. Klatt.

Der Verfasser des folgenden Aufsatzes, Charles Martins, schreibt: De Candolle hat einen Epheu, der zu Gigean, nahe Montpellier wuchs, beschrieben. Im Jahre 1814 hatte seine Basis 6 Fuß im Umkreis. Von dieser Basis aus breiteten sich zwei große Stämme über eine Mauer aus und bedeckten eine Oberfläche von 72 Quadratmetres; seine ganze Höhe betrug 6 Metres. Ein Sturm warf 1829 diesen Epheu um.

Das Klima, so wie der Boden von Montpellier scheinen dem Wachsthum dieses schönen Baumes günstig zu sein. Ich habe einen in dem Gehölze von Oscar gemessen, welcher 0,39 Metres im Umkreis hatte; sein Alter war jedoch unbekannt. Er steht nicht einzeln da, sondern ich habe noch mehrere seiner Art zu beschreiben.

Bei der Zerstörung einiger Häuser, um das Chor der Cathedrale zu bauen, wurde eine alte Mauer blosgelegt, welche einen Theil des alten Benediktinerklosters, von Urban V. gegründet und nun von der Medicinschule benutzt, gebildet hatte. Ein Epheu, in den alten Kirchhof des Convents gepflanzt, bedeckt die nördliche Seite der Mauer an der Rückseite des großen Amphitheaters der Facultät. Von 0,30 Metres über dem Boden ist der Umkreis des Stammes 0,77 Metres. Bei der Höhe von 2 Metres theilt er sich in drei Zweige, von welchen der östlichste, 0,45 Metres im Umkreise, der größte ist. Der Epheu breitet

ſich in der Geſtalt eines umgekehrten vollkommen regelmäßigen Dreiecks über die Mauer aus. Die Höhe deſſelben iſt 10,88 Metres und ſeine Baſis, welche mit dem Obertheil der Mauer zuſammentrifft, iſt 23,25 Metres in der Länge, ſo daß es eine Oberfläche von 126 Quadratmetres darſtellt. Der Raum, den dieſer Epheu alſo deckt, iſt größer als der des Epheu von Gigean.

Wenn die Mauer höher wäre, würde die durch den Epheu bedeckte Oberfläche noch beträchtlicher ſein, denn die Zweige gehen nicht nur über die Mauer hinüber, ſondern ſie breiten ſich auch über das Dach des daran ſtoßenden Amphitheaters aus und ſie werden von Zeit zu Zeit abgeſchnitten, um es vor der Bedeckung zu bewahren. Man hat den Vorſchlag gemacht, die neue Cathedrale mit einem viereckigen Platz zu umgeben. Wenn die Stadtbehörde von Montpellier dieſen Vorſchlag ausführte, ſo würde dieſer ſchöne Epheu eins der merkwürdigſten Verzierungen dieſes neuen Spazierganges ſein.

Ich hatte dieſen Epheu ſtets für außerordentlich ehrwürdig gehalten, als mich ein glücklicher Zufall zu einem alten Gärtner (Aymard genannt und 71 Jahre alt) führte, der mir folgende Mittheilung machte: In dem Alter von 8 oder 10 Jahren unterſtützte er ſeinen Vater bei der Anlage einer Nußhecke, um die erwähnte Mauer zu verbergen, als er eine junge Ephenpflanze bemerkte, die an der Mauer emporkletterte. Er ſchonte ſie und ſie nahm allmählig an Stärke zu. Der Knabe, zum Mann aufgewachſen, machte ſich ein Vergnügen, wenn er in den benachbarten Gärten arbeitete, ſeinen Epheu allmählig die Mauer erſteigen, den oberen Theil derſelben 1833 erreichen und endlich überſchweifen zu ſehen. Die wunderbare Größe dieſes Epheu, der ſo erwieſen aufs Höchſte 65 Jahre alt iſt, iſt ein bemerkenswerther Beweis für den Einfluß der zerſetzten thieriſchen Materie auf die Pflanzenwelt. Ich habe ſchon geſagt, daß der Garten, in dem er wächſt, als Begräbnißplatz den Mönchen der Priorei von St. Germain diente, die im Jahre 1366 von dem Papſt Urban V. gegründet wurde; aber Aymard bezeugte, daß ſie während der Revolution da viele Knochen und Särge eingegraben hatten, die aus einigen Todtengewölben der Nachbarſchaft, die öffentlichen Gräber genannt, genommen worden ſeien. Bis zu einer bedeutenden Tiefe war der Boden mit menſchlichen Knochen und verrottetem Holz gefüllt, das in großen Mengen gefunden wurde, als man den Grund zum Chor der Cathedrale ausgrub. Dieſer Epheu iſt alſo in Erde gewachſen, die ausnahmsweiſe gedüngt und unvergleichlich reicher an phosphorhaltigem Kalk war, als der reichſte gewöhnliche Boden.

Um eine Idee von dem Einfluſſe dieſer ungewöhnlichen Nahrungsanhäufung zu erhalten, machte ich mir das Vergnügen zu berechnen, wie die Dimenſionen des Epheu geweſen wären, wenn er im ungedüngten Boden gewachſen wäre. De Candolle liefert einen Grund zu der Berechnung. Er maß in Montpellier einen Epheu, der in gewöhnlichem Boden wuchs, 45 Jahre alt war und im Umkreiſe 0,65 Metres hielt. Wenn wir ein geometriſches Verhältniß zwiſchen Umkreis und Alter dieſes Epheu und dem Umkreis (0,245 Metres) des Epheu der Cathedrale fänden, wonach wir das wahrſcheinliche Alter des letztern berechnen wollten, würden wir in einen großen Irrthum verfallen. Förſter, Gärtner, ja ſelbſt Holzfäller und Holzſäger wiſſen ſehr wohl, daß bei allen

Bäumen die Holzschichten hinsichtlich der Dicke vom Mittelpunkte nach dem Umkreis zu abnehmen. Unglücklicherweise sind die Gesetze dieser Abnahme selbst hinsichtlich der gemeinsten Art noch nicht fest bestimmt. Mit Hülfe meines Freundes August Bravais habe ich sie für Pinus sylvestris bestimmt. Das Wachsthum dieses Baumes haben wir vom 70.° Nördlicher Breite bis zu 51½° oder von Lappland bis Nordfrankreich untersucht. In der Mitte Schwedens, in der Breite von 60°, zeigt dieser Baum die schönsten Verhältnisse und den regelmäßigsten Wuchs, da sind wir auch fähig gewesen die ältesten Bäume zu messen. Wir haben festgestellt, daß die geringe Abnahme der Holzschichten dargestellt wird durch eine hyperbolische Krümme mit einer senkrechten Linie, die nie mit ihr zusammenstößt. Andere Betrachtungen zeigen die große Wahrscheinlichkeit, daß die Hyperbel das allgemeine Gesetz des Wachsthums hinsichtlich der Dicke aller Arten Bäume in unserm Klima abgiebt.

Wegen Mangel anderer Elemente werde ich daher voraussetzen, daß der Epheu der Medicinschule diesem Gesetz gefolgt sein müßte, wenn er in einem gewöhnlichen Boden gewachsen wäre, darnach würde ich dann sein Alter auf 360 Jahre festsetzen. So hat ein Epheu, in einen stark gedüngten Boden gepflanzt, in 65 Jahren den Durchmesser erhalten, den er in einer ungedüngten Erde erst am Ende von 360 Jahren erhalten hätte, folglich hat eine überflüssige Düngung mit phosphorhaltigem Kalk die vegetative Kraft dieses Strauches verfünffacht.

Diese Thatsachen geben der annähernden Berechnung des Alters der Bäume nach ihrem Wuchs ein neues und wichtiges Element, denn der Epheu von De Candolle 1814 zu Gigean beobachtet mit dem Durchmesser von 0,620 Metres würde das außerordentliche Alter von 800 Jahren erreicht haben, wenn er in einem ungedüngten Boden gewachsen wäre, sein Alter würde jedoch in einem gedüngten Garten viel geringer gewesen sein und, wenn er in dem alten Kirchhofe der Abtei von St. Germain gewachsen wäre, würde es nur 160 Jahre betragen haben.

Der Montpellier Garten besitzt einen in anderer Hinsicht merkwürdigen Epheu, der das Interesse der Gärtner und besonders der Landschaftsgärtner mehr erregen wird, als es das große Alter derjenigen thun kann, die wir eben besprochen haben. 1811 oder 1812 pflanzte De Candolle in dem neu hinzugefügten nördlichen Theil der Baumschule, wo die Bäume nach natürlichen Familien geordnet sind, einen gemeinen Epheu, wie gewöhnlich mit einer Stütze. Die Stengel umschlangen diese und durch das Flechten um dieselbe bildeten sie einen Stamm, ähnlich wie bei den amerikanischen Lianen, der damit endete, daß er den Baum tödtete und ihn ersetzte, den er umschlang. Die Stütze war nicht hoch, daher ist der Stamm nur 1,30 Metres; er ist 2,30 Metres im Umkreis bei 0,30 Metres über dem Boden; die Spitze des Baumes, vollkommen rund, ist nicht mehr als 4,35 Metres hoch, aber 19,30 Metres im Umkreis. Die Enden der niedrigsten Zweige berühren die Erde und der ganze Baum bietet die Erscheinung einer grünen Pyramide, die auf dem Boden ruht. Dieser Epheu ist nun 46 Jahre alt, sein Stamm, wie ich schon gesagt habe, ist nicht einfach, sondern aus einer Anhäufung von verwickelten Stämmen und Zweigen zusammengesetzt, die sich fortdauernd in der Zahl vermehrt haben. Wenn wir wünschen uns eine Vorstellung über das Alter dieses Epheus zu

bilden, so ist es sehr wichtig, diese verbundenen Stämme von einem einzigen, gleich jenem der Medicinschale, zu unterscheiden.

Diese Neigung des Epheu, einen Stamm durch Umschlingung und Vereinigung seiner Zweige zu bilden, kann vortheilhaft bei der Ausschmückung von Parks und Gärten benutzt werden. Ich habe solches durch die Erfahrung bewiesen gefunden. 1852 versetzte ich einen Pinus Larix von 5 Metres Höhe und stellte ihn dem Hause, worin ich in den botanischen Garten wohnte, gegenüber. Nach einigen Monaten starb der Baum, von dem ich die Zweige entfernte und an dessen Fuß dagegen zwei Epheu und zwei Banksia-Rosen pflanzte. Zwei Jahre lang blühten die beiden kriechenden Pflanzen und die gelbe Rose schien im Vortheil mit dem dunkelgrünen Laub des Epheu verglichen, aber stufenweise gewann der letztere die Uebermacht, erdrückte seine schwächeren Gefährten und gewann die Spitze der Stütze. Dann befestigte ich auf dieser Spitze des Baumes einen eisernen Reifen, 1 Metre im Umkreise; die Zweige des Epheu erreichten bald seine Ecke und fielen nun rund umher alle wieder nieder, so einen immergrünen Leuchter darstellend. Der falsche Stamm des Epheu ist nun stark genug sich selbst zu tragen, wenn der Epheubaum vergehen sollte, doch die harzige Natur der Stütze sichert seine Dauer. Nun will ich einen Reifen des doppelten Durchmessers anbringen, um so zwischen dem Stamm und den hängenden Zweigen ein grünes, immer kühles und schattiges Sommerhaus herzustellen.

In Mitteleuropa wächst der Epheu üppig, aber er überschreitet nicht den 58.° Nördlicher Breite; wohl findet er sich auf der Insel Gotland, aber nicht in Schweden. In Großbrittanien hört er bei den Shetlandsinseln auf, und wächst weder auf den Hebriden noch auf den Faroerinseln. In England und Deutschland ziert er alle Ruinen, indem er sie mit einem dauernden Grün bekleidet. Kein Reisender wird den Epheu vergessen, der die Ruinen des Heidelberger Schlosses ziert, wie den, der die mittelalterliche Feste von Bressuire in der Vendée und den, der das Schloß von Courtalein (Eure-et-Loire), das Erbe der Familie Montmorency schmückt. Dieses Schloß hat seit 1440 gestanden; es ist an der Seite von einem Thurm gedeckt, der 23 Metres Höhe hat; der Epheu ist mit viel Sorgfalt an einem Gitter gezogen und die Fenster scheinen aus dem Blattwerk herausgeschnitten. Es ist unmöglich sich eine Vorstellung von dem entzückenden Eindruck dieses grünen Schlosses zu bilden. In England habe ich den Epheu bewundert, der die Ruinen von Kenilworth bekleidet. Loudon beschreibt jenen von Brockley Hall in Sommersetshire, welcher über die Bäume klettert. Einer davon ist 0,266 Metres im Umkreis, ein anderer 0,285 Metres, beide müssen sehr alt sein, denn das Wachsthum des Epheu ist in England langsamer als im Süden Frankreichs. Ein anderer Epheu bedeckt eine Hütte in der Stadt Morpeth in Northumberland; er wächst aus einer Mauer heraus und mißt 0,490 Metres im Umkreis, da wo er zweigt, in einer Höhe von 3 Metres über dem Boden.

Epheu bedeckt so oft die Ruinen alter Gebäude, daß es unterhaltend sein würde, ihr Wachsthum im Umkreis zu erforschen. Dieses kann geschehen, indem man die Holzschichten bei alten Epheu, die man am Grunde abgeschnitten hat, zählt, oder indem man den Umkreis derjenigen mißt, deren Alter man weiß. Eine gewisse Zahl Beispiele mit

einander verglichen wird ein Mittel liefern, durch das man das Alter aller großen Epheu berechnen kann, deren Durchmesser man gemessen hat, denn wenn diese Sträucher in der Nähe einer Ruine wachsen, in einem Boden, der weder angebaut noch gedüngt ist, so kann vorausgesetzt werden, daß sie eine geringere Größe haben werden.

Die Berechnung des Alters eines Epheu an einer Ruine wird in sich selbst unterhaltend sein, denn ich bin gewiß, daß man Beispiele langer Lebensdauer finden würde; überdies würden wir klärlich eine Grenze in der Dauer der Ruine selbst haben, da sie nothwendigerweise älter sein muß, als der Epheu, welcher sie bekleidet. Pflanzen-Physiologie und die Geschichte der Ruinen, welche Europa bedecken, würden so ein gleiches Interesse erregen in dem Verfolg dieser Nachforschungen.

Abgebildete Camellien

in Amb. Verschaffelt's Nouvelle Iconographie des Camellias.

(Liv. II. Februar 1859.)

Taf. 1. **Cam. Bella Toscana.** Eine Blume mittler Größe, von schöner lebhaft rother Farbe; die Blumenblätter sind zahlreich, abgerundet, am obern Rande kaum gekerbt, regelmäßig dachziegelförmig liegend. Die im Centrum stehenden Blumenblätter sind nur etwas kleiner, oval, ganzrandig, zusammengedrängt stehend und ein Herz bildend.

Herr Verschaffelt erhielt diese hübsche Varietät aus Italien und hat sie bei ihm zu mehreren Malen vorzüglich schön geblüht.

Taf. 2. **Cam. Duc de Caraman.** Herr Verschaffelt verdankt diese Camellie Herrn Miellez, der sie vermuthlich aus Italien erhalten hat. Es ist eine sehr regelmäßig gebaute Blume von 4—5 Zoll im Durchmesser. Die Blumenblätter sind groß, eiförmig, ausgebreitet, im Centrum der Blume etwas unregelmäßig stehend, sämmtlich von lebhaft rosa Färbung und jedes mit einer weißen Längsbinde gezeichnet. Diese Varietät zeichnet sich außerdem noch aus durch schönen Habitus, schönes Laub und reiches Blühen.

Taf. 3. **Cam. myrtiflora elegans.** Ebenfalls eine sehr regelmäßig gebaute Blume, die Herr Verschaffelt im Jahre 1857 von Herrn Cesar Franchetti aus Florenz erhielt und hat sie im Frühjahre 1858 und 1859 sehr reich bei dem Herausgeber der vortrefflichen Iconographie geblüht.

Es ist eine Blume gewöhnlicher Größe, schön rosaroth. Die zahlreichen Blumenblätter sind groß, abgerundet-eiförmig, dachziegelförmig gestellt und zwar ungemein regelmäßig. — Schöner Habitus, leichtes und reichliches Blühen sind noch besondere gute Eigenschaften dieser Camellie.

Taf. 4. Cam. Luisa Bussola. Unübertreffliche Grazie, zartes Colorit und größte Regelmäßigkeit! dieses sind die Eigenschaften, welche diese Camellie in hohem Grade vor so vielen anderen auszeichnen. Sie stammt ebenfalls aus Italien, von wo sie in neuester Zeit eingeführt worden ist.

Die Blumen sind mittler Größe, die großen Blumenblätter sind eiförmig, abgerundet, äußerst zart rosa, ein breiter weißer Streifen ziert jedes Blumenblatt, wie einige außerdem noch mit feinen purpur Strichen gezeichnet sind. — Diese Varietät blüht gern, die Knospen öffnen sich leicht, so daß sie jede zu wünschende Eigenschaft einer guten Camellie besitzt.

(Liv. III. März 1859.)

Taf. 1. Cam. Gaspara Stampa. Herr Verschaffelt erhielt diese Camellie im Jahre 1857 aus Florenz von Herrn Luzatti und hat sie seitdem bereits zweimal bei ihm geblüht. Die Blumen sind 4 Zoll im Durchmesser, vollkommen regelmäßig gebaut, und von zarter rosa Färbung. Die Blumenblätter sind groß, abgerundet, am obern Rande leicht gekerbt und ist jedes mit einer weißen Längsbinde gezeichnet. Die Pflanze hat einen schönen Habitus und schönes Laubwerk.

Taf. 2. Cam. Rosmunda. Diese äußerst liebliche Varietät stammt aus derselben Quelle wie die vorhergehende, sie ist unstreitig eine der vorzüglichsten unter den weißblumigen und eine der am regelmäßigsten gebauten unter den regelmäßigen. Die Blumen sind mittelgroß, rein weiß und bestehen aus einer Menge kleiner, abgerundeter, dachziegelförmig gestellter Blumenblättern. Die Blumen bilden eine ganz vorzügliche Kokarde. — Alle sonstigen guten Eigenschaften sind bei dieser Camellie vereinigt, so daß sie eine Blume ersten Ranges ist.

Taf. 3. Cam. Giovanni Rostan. Herr Miellez zu Esquermes-lez-Lille erhielt diese Camellie vor einigen Jahren aus Italien, von wo sie der Herausgeber der Iconographie empfangen hat, und da sie bereits mehrere Male geblüht hat, so kann er sie als eine vorzügliche Blume empfehlen, wie dies auch aus der Abbildung ersichtlich ist.

Die Blumen sind mittelgroß, regelmäßig dachziegelförmig geformt, zart rosa. Die im Centrum stehenden Blumenblätter sind klein, mehr aufrecht stehend und eine Art Herz bildend, die der äußeren Peripherie groß, oval, zart weiß und dunkelroth gestreift.

Taf. 4. Cam. Géri. Eine Camellie italienischen Ursprungs. Herr Franchetti in Florenz hat sie aus Samen erzogen und gehört sie mit zu den regelmäßig gebildeten Blumen. Letztere sind groß, zart rosa, in der Mitte weiß gestreift. Die einzelnen Blumenblätter sind oval, leicht gekerbt. Habitus der Pflanze gut.

Literatur.

Leopoldina. Unter diesem Titel soll das im vorigen Hefte bereits gedachte amtliche Organ der Kaiserl. Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher erscheinen *). Das Blatt erscheint in zwanglosen und mit besonderen Nummern versehenen Lieferungen, deren 15 einen Band bilden, im Verlage von Herrn Friedrich Frommann in Jena. Der Preis einer Nummer beträgt nur 2 Sgr., also 1 ℳ pr. Crt. für einen Band.

Die Bestellung auf dieses in Quart erscheinende Blatt kann auf Buchhändlerwege bei dem Verleger in portofreien Briefen geschehen.

Das erste Heft der „**Reisen und Forschungen im Amur-Lande** in den Jahren 1854—1856 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. Leopold Schrenck" ist erschienen und enthält eine Einleitung und die Mammiferen des Amur-Landes.

Ferner ist erschienen:

Primitiae Florae Amurensis. Versuch einer Flora des Amurlandes von **Carl Joh. Maximowicz**, Reisenden des Kais. botanischen Gartens zu St. Petersburg. Mit 10 Tafeln und einer Karte. (Aus den Mémoires présentés à l'Académie Imp. des sciences de St. Petersbourg par divèrs savants, T. IX besonders abgedruckt.) St. Petersburg, 1859. 4. Pag. 1—504. 5 ℳ 17 Ngr.

Ueber die **Droguen-Aufstellung** im botanischen Garten der Universität Breslau. Von Prof. Dr. **Göppert**, Director des bot. Gartens. Hannover 1859, Hahn'sche Buchhandlung. (Extra-Abdruck aus dem Archiv der Pharmacie Bd. 148, Heft 1.)

Zur würdigen Feier der Versammlung des norddeutschen Apotheker-Vereins, welcher im August 1857 in Breslau tagte, hatte der Verfasser obiger kleiner Schrift, Herr Prof. Dr. Göppert, sich mit den Herren Marnschke und Schube zu einer Ausstellung in einem der Gewächshäuser des botanischen Gartens verbunden, zu welcher sie ausgezeichnete Droguen in ihrer natürlichen Verpackung in wahrhaft großartigen Quantitäten und der Verfasser die Mutterpflanzen derselben lieferten, welche neben denselben angebracht wurden. Diese noch niemals versuchte Verbindung des Botanischen mit dem Pharmakognostischen erregte das Interesse des Vereins in hohem Grade und veranlaßte den Wunsch, eine solche Aufstellung wo möglich permanent zu sehen. Als hierauf Herr Apotheker Dr. Herzog aus Braunschweig diesem Gedanken Worte verlieh und zur Realisirung desselben aufforderte, erklärten sich die obengenannten Herren bereit, Herr Kaufmann und Droguist Gaßmann aus

*) Die erste Lieferung ist bereits erschienen. D. Redact.

Dresden zeichnete eine namhafte Summe, die übrigen Mitglieder des Vereins schlossen sich an, wodurch Herr Dr. Göppert in den Stand gesetzt wurde, ans Werk schreiten zu können. Herr Prof. Dr. Martius in Erlangen schenkte eine namhafte Zahl höchst interessanter Pflanzengewebe; Fehlendes ergänzte Herr Dr. Göppert aus seinen reichhaltigen pharmakologischen und botanischen Sammlungen, so daß das Ganze nun als vollendet anzusehen ist.

An 550 Droguen und dazu gehörende Blüthen, Früchte und Samen, von denen die kleine Brochüre ein genaues Verzeichniß bringt, sind nun in zierlichen, mit eingeriebenen Stöpseln und eingebrannter Aufschrift versehenen Gläsern von 4—10 Par. Zoll Höhe, je nach der Beschaffenheit des Produkts, wo es nur irgend die Localität und die Eigenthümlichkeit der Mutter- oder der ihr nächst verwandten Pflanze gestattete, bei ihr selbst im Freien auf 4 Fuß hohen Pfählen und in den Gewächshäusern auf Postamenten aufgestellt, wodurch den Studirenden der Medicin und Pharmacie, so wie auch den Technikern aller Art ein gewiß sehr erwünschtes Hülfsmittel zur Erleichterung ihrer Studien gewährt wird, welches natürlich auch zur Erläuterung pharmakologischer Vorlesungen dient.

Die Mehrzahl der Gläser ist mit etwas eingezogenem Halse unter dem Stöpsel angefertigt worden, dessen weiterer Verschluß durch schnelltrocknenden Copalfirniß bewirkt ward. Da es jedoch, wie natürlich, gelegentlich nicht an Versuchen fehlt, das Glas zu öffnen, kann man im Freien dann das Eindringen von Feuchtigkeit nicht vermeiden, weswegen man im bevorstehenden Sommer Stanniolkapseln darüber legen und selbst auch wohl den Stöpsel entfernen wird. Ganz und gar cylinderförmige Gläser mit einem breitrandigen gläsernen Stöpsel, welche Form, da es hier eines anderweitigen Verschlusses, um das Eindringen von Regen zu verhindern, nicht bedarf, sind jedoch den anderen unbedingt vorzuziehen und dürften daher bei etwaigen neuen Anlagen dieser wenigstens für die im Freien aufzustellenden Droguen gewählt zu werden verdienen.

Die Bitte des gelehrten Herrn Verfassers an das gesammte Publikum, diese Einrichtung, die ihrer Natur nach bei den in allen Theilen des Gartens zerstreuten Objecten eigentlich nicht beaufsichtigt werden konnte, unter seinen Schutz zu nehmen, hat die größte Beachtung gefunden, denn während der ganzen Dauer der Ausstellung von April bis October hatte man über keine Beschädigung irgend einer Art zu klagen. „Meinen vieljährigen," schreibt der Verfasser, „und zwar in einer Stadt von 120,000 Einwohnern gesammelten Erfahrungen zufolge, würden sie vielleicht wohl stattgefunden haben, wenn man bemüht gewesen wäre, auf ängstliche Art den Zugang zu denselben zu erschweren oder ihn nur unter vielen Clauseln und sichtbaren Cautelen zu gestatten. Vertrauen erzeugt Vertrauen, sagt nur zu wahr ein altes, nie genug und überall in hohen wie in niederen Kreisen zu berücksichtigendes Sprichwort, und dies hat sich auch hier bewährt und dürfte vielleicht Veranlassung geben, dergleichen auch an anderen Orten zu versuchen.

Folia Orchidacea. An Enumeration of the known species of Orchids. By Professor **Lindley**. Part IX. May 1859.

Wir erhielten ſo eben die 9. Lieferung dieſes werthvollen Werkes. Dieſelbe enthält die Fortſetzung der Arten der Gattung Pleurothallis, 40 Seiten, und ſind nicht weniger als 280 Arten von Pleurothallis beſchrieben. Der Verfaſſer ſcheint bei der Bearbeitung der Arten dieſer Gattung ſehr genau zu Werke gegangen zu ſein und auch die deutſche Gartenliteratur beachtet zu haben, denn wir finden ſowohl die Berliner Allgem. Gartenzeitung als auch die Hamburger Gartenzeitung, in denen in letzter Zeit mehrere Arten Pleurothallis beſchrieben worden ſind, citirt.

Feuilleton.

Die Verwaltung des Kew-Gartens. Aus dem von dem Director des K. bot. Gartens zu Kew veröffentlichten officiellen Bericht über den Fortſchritt dieſes Gartens ſeit den letzten 6 Jahren wie über den jetzigen Zuſtand deſſelben, entnehmen wir folgende einzelne Data bezüglich der Verwaltung dieſes großartigen National-Inſtituts.

1. **Der Director.** Die allgemeine Oberaufſicht über das ganze Inſtitut führt der Director, er iſt für die gute Ordnung und Ausführung der Arbeiten in allen Theilen des Inſtituts verantwortlich. Er führt die ganze Correſpondenz, die eine ſehr beträchtlich ſtarke iſt. Der Director beſucht täglich den Garten und die Gewächshäuſer, leitet den Tauſch mit lebenden Pflanzen und Samen, entwirft die Berichte und Eingaben, revidirt die Anſchläge, leitet alle vorzunehmenden Verbeſſerungen und Veränderungen und unterzeichnet ſämmtliche Rechnungen des Gartens, Muſeums, der Bibliothek und Herbariums. Er erwählt die Gehülfen und Gartengehülfen für die Gärten in den engl. Colonien und für andere Etabliſſements, ſorgt, daß die Fabrikbeſitzer, Kaufleute, Droguiſten, Handelsgärtner, Pflanzenfreunde und Reiſenden in allen Theilen der Welt die richtigen Namen der Pflanzen und die deren Produkte, erhalten, wie er alle Anſuchen dieſer Art ohne Unterſchied des Bittſtellers zu willfahren hat. Um aber alle dieſe Geſchäfte genügend ausführen zu können, iſt dem Director ein Hülfsdirector beigegeben worden.

2. **Curator.** Der Curator oder Vorſteher führt die praktiſche Oberaufſicht bei den Culturen in allen Theilen des bot. Gartens, den Kalt- und Warmhäuſern, ſorgt, daß jede Pflanze mit einem Namen verſehen iſt und hat die Oberaufſicht über die angekommenen oder wegzuſendenden Pflanzen und Samen; wie er ferner die Obergehülfen, Gehülfen und Tagelöhner zu entlaſſen und zu engagiren hat. Es iſt dann noch das Amt des Curators, die Rechnungsbücher und ein genaues Verzeichniß aller Gartengeräthſchaften zu führen. Er prüft endlich die anzunehmenden Gartengehülfen und giebt denſelben beim Abgange ein Atteſt. Aſſiſtirt iſt der Curator durch einen Sub-Curator.

3. **Obergehülfen (Foremen).** Im Garten zu Kew ſind 7 Obergehül-

fen angeſtellt. Jeder derſelben hat eine Anzahl Gärtner und Arbeiter unter ſich, für deren Führung er während der Arbeitszeit dem Director und Curator verantwortlich iſt, wie er dies auch iſt für die in ſeinem Departement gebrauchten Utenſilien, für die Sicherheit, Ordnung und gute Kultur der Sammlungen. Der Obergehülfen Verantwortlichkeit iſt eine ſehr große, beſonders derjenigen, die für die Vermehrung der Pflanzen (Kultur zahlreicher Arten der Kalt- und Warmhäuſer, des freien Landes ꝛc.) zu ſorgen haben, oder denen die Decoration des Gartens anvertraut iſt und die das Publikum zu befriedigen haben. Es muß bemerkt werden, daß vom Kew-Garten Pflanzen aller Art, beſonders ſolche, die am allerſchwierigſten wachſen, beſtändig verlangt werden.

a. Ein Obergehülfe ſteht dem Vermehrungshauſe, dem Hauſe für Farrn, Begonien und Palmen vor, den Aroideen, Succulenten-Pflanzen. Er hat für die Vermehrung aller Warmhauspflanzen zu ſorgen wie diejenigen Samen zu ſäen, die ein Warmbeet erfordern, er leitet die Verpackung der in Ward's Käſten abzuſendenden Pflanzen und führt genaue Verzeichniſſe über das, was eingeht und das, was abgegeben wird.

b. Ein Obergehülfe ſorgt für die Orchideenhäuſer, die buntblättrigen Warmhauspflanzen, Waſſerpflanzen, Nepenthes, tropiſchen Fruchtbäume u. dergl. ſeltene Pflanzen mehr.

c. Ein dritter iſt für die Bäume und Geſträuche aus den engliſchen Colonien und anderen Ländern, die noch den Schutz eines Hauſes bedürfen Unter deſſen Aufſicht ſtehen auch die Azaleen, Fuchſien und Roſen.

d. Das Palmenhaus und das neue Victoria-Haus mit ihrem reichen Inhalte erfordert eines Obergehülfen ganze Zeit.

e. Ein fünfter Obergehülfe hat die Staudengewächſe unter ſich (6000 Arten), die ſyſtematiſch geordnet ſind. Er erzieht die Freiland-Pflanzen aus Samen und hat für gute Vermehrung der Stauden ꝛc. zu ſorgen.

f. Der ſechſte Obergehülfe hat für die Blumenbeete jeglicher Art und Größe im ganzen Garten zu ſorgen, von denen im Ganzen 400 vorhanden ſind. Dieſe Beete während des Sommers und Herbſtes mit Blumen zu verſehen, erfordern ca. 40,000 Pflanzen, die anzuziehen keine geringe Mühe macht.

g. Die Bäume, Grasplätze, Wege, Gruppen von Rhododendron ꝛc. und die blühenden Sträucher auf den Raſenplätzen beanſpruchen die ganze Energie eines Obergehülfen, wie viele Arbeitskräfte je nach der Jahreszeit.

Die Gehülfen, meiſtens ſich zu vervollkommnen, ſind junge Männer, die an andern Orten noch für Lehrlinge gelten würden, ſie werden bezüglich ihres guten Charakters, ihrer Fähigkeiten und ihrer guten Führung angenommen. Jeder muß ein oder zwei gute Atteſte beibringen können und eine Anzahl Fragen ſchriftlich in Bezug auf ſeine Fähigkeiten beantworten. Die gewöhnliche Dauer eines Engagements iſt zwei Jahre. Die Gehülfen erhalten wöchentlich 12 s (4 ℳ), können ſich aber innerhalb zweier Jahre bis zum Obergehülfen-Aſſiſtent mit 18 s hinaufarbeiten.

Arbeiter. Die Zahl derſelben wechſelt je nach der Jahreszeit und Arbeit.

Außerdem beſchäftigen die Königl. Gärten zu Kew einen Poliziſten, drei Conſtabler in Livree und zwei beſtändige Thürſteher; zwei weibliche Dienſten zu etwaigen Hülfsleiſtungen bei den den Garten beſuchenden Damen, eine Perſon zum Schrei-

den der Namenetiquetten und mehrere Heizer ꝛc.

Leopoldinia Pissaba Wallace. Herr Spruce machte in der Sitzung der Linnean Society am 16. Juni einige interessante Mittheilungen über diese wichtige Palme. Er sagt: „Die Palme, von der die Pissaba des Rio Negro (besser gekannt als die von Para, aus welchem Hafen große Quantitäten davon nach Europa und Nordamerika exportirt werden) kommt, wurde in Folge ungenügender Data für identisch mit der Attalea funifera Mart., welche die Pissaba von Bahia liefert, gehalten. Herr Wallace führt jedoch mit Recht die Rio Negro-Pissaba zur Gattung Leopoldinia zurück, von der Martius sagt, sie sei ohne Blüthenscheiden, was jedoch unrichtig ist, denn nach Herrn Spruce hat diese Palme wirklich zwei dünne spindelförmige Blüthenscheiden, die sehr zeitig abfallen, noch bevor die Blumen völlig entwickelt sind. Die geographische Verbreitung der Pissaba-Palme, die in niedrig gelegenen sandigen Flächen, auf denen bei starkem Regen mehr oder weniger Wasser steht, wächst, ist von Rio Negro südlich, bis zu den Wasserfällen des Orinoco, nördlich, und von nahe des Japura, westlich, bis an die Quellen des Pacimani, östlich. „Bei zwei indianischen Dörfern auf der Südseite des Cassiquiare," bemerkt Herr Spruce, „drang ich tief in den Wald hinein und gelangte an große Flächen bedeckt mit Pissaba-Palmen. Nie werde ich den Eindruck vergessen, den diese herrlichen, so stark bebärteten Palmen in den Wäldern am Amazonen-Strom auf mich machten." Von der Pissaba, die am Cassiquiare und Guiana gesammelt wird, geht die Hälfte nach Para und die andere Hälfte nach Angostura am Orinoco. In der trocknen Jahreszeit gewähren die indianischen Dörfer an diesen Flüssen ein sehr lebhaftes Bild, Jedermann ist beschäftigt mit dem Anfertigen theils von Böten, theils von Tauen. Außer der Verwendung des Bartes der Pissaba, soll nach Herrn Spruce die fleischige Masse der reifen Frucht ein ausgezeichnetes Getränk liefern, das große Aehnlichkeit mit Sahne hat, sowohl in Farbe als Geschmack. Die Frucht bedarf jedoch 9 Monate bis zur Reife. Die Stämme dieser Palme erreichen eine Höhe von 40 Fuß, die Wedel einschließlich des 4 Fuß 8 Zoll langen Stengels 15½—16½ Fuß, die Fiedern sind 63, der Bart 21 Zoll lang, Blattscheide 4 Fuß.

Eine andere bärtige Palme, die sich längs den östlichen Abhängen der Anden befindet, beschreibt Herr Spruce als eine wahre Attalea, verschieden von A. funifera. Der Bart dieser Palme ist abfallend, während er bei der Pissaba bleibend ist, und liefert ausgezeichnete Besen. G. Ch.

Die Kultur der Cocospalme auf Ceylon. Herr Rev. Foulkes hat brieflich an Sir W. J. Hooker sehr schätzenswerthe Beiträge über die großartige Kultur der Cocospalme auf Ceylon eingesandt, die wir der Gard. Chron., in der sie abgedruckt, hier entnehmen.

Von den Eingeborenen wird die Cocospalme längs den Küsten bis zu einer Höhe von 2000 Fuß über dem Meere kultivirt, jedoch durchaus nach keinem Systeme. Nach einer ziemlich genauen Berechnung schätzt man allein die von den Eingeborenen auf diese Weise ange-

pflanzten Cocospalmen auf 20 Millionen.

Seit dem Jahre 1842 betreiben nun die Europäer in Pflanzungen nach einem ordentlichen Systeme die Kultur der Cocospalmen. In der Hoffnung, die Anlagekosten sehr bald herauszubekommen, waren in kurzer Zeit auf der ganzen Insel Tausende von Morgen Landes urbar gemacht, wobei sich die Unkosten wohl gegen eine halbe Million Pfund Sterling beliefen. Die Central-Provinz übergehend, wo die Caffee-Cultur vorherrschend ist, beläuft sich der Flächenraum in den übrigen Provinzen, auf dem sich 99 Cocospalmenplantagen befinden, auf 22,400 Morgen. Durchschnittlich 80 Palmen auf einen Morgen gerechnet, würde 1,792,000 Cocospalmen geben, die während der letzten 20 Jahre auf Ceylon erzogen worden sind; diese zu den oben erwähnten gerechnet, würde 22 Millionen ergeben, die sich auf der Insel befinden, und angenommen, jeder Baum liefere durchschnittlich jährlich 50 Nüsse, so würde dies 1100 Millionen Früchte sein, welche alljährlich auf der Insel Ceylon erzeugt werden. Da aber nicht alle Bäume gleich tragbar sind, so dürfte diese Berechnung nicht ganz richtig sein, weil aber 50 Früchte auf je einen Baum nur sehr gering angeschlagen ist, indem ältere Bäume oft $^2/_3$ mehr erzeugen, so ist obige Berechnung fast noch zu gering.

Eine Plantage von 600 Morgen Landes in der westlichen Provinz, auf der nur $^1/_5$ der Palmen volltragend ist, erzeugt jährlich 600,000 Nüsse. Das Ergebniß dieses Jahres der Besitzung von Jaffera (9000 Morgen Landes) ist allein 5 Millionen Nüsse.

Die Quantität Cocosnußöl, die 1857 von Ceylon exportirt wurde, belief sich auf 1,767,413 Gallonen.

Cycas revoluta mas. blühend. Bekanntlich sind in Europa die männlichen Exemplare dieser beliebten Cycadeae eine Seltenheit, um so interessanter ist es, aus den „Ann. d'hortic. et de Bot. des Roy. des Pays-Bas“ zu erfahren, daß ein solches Exemplar unlängst in den Gewächshäusern des Herrn Baron de Knobelsdorff auf Gelder in Overyssel geblüht hat. Seit 7 Jahren im Besitze dieses Exemplars entwickelte es alljährlich eine starke Wedelkrone, durch die im letzten Februar ein Blüthenzapfen zum Vorschein kam, im Ansehen einer Ananas nicht unähnlich und aus einer sehr großen Anzahl Schuppen zusammengesetzt. Während der vierwöchentlichen Blüthezeit verbreitete der Zapfen, besonders des Morgens, einen herben Geruch. Nach dem Verblühen wurde am Stamme zwischen den Rudamenten der alten abgestorbenen Wedel eine Menge junger Triebe sichtbar.

Der von uns schon einmal erwähnte große Cycas in dem Gewächshause des Herrn Geitner zu Planitz hat nun 36 vier Fuß lange Wedel getrieben, die zusammen einen Umfang von 12 Ellen haben und der Pflanze ein majestätisches Ansehen geben.

Geruch der Pflanzen. In Gard. Chron. fragt A. Z. bei dem Redacteur (Herrn Dr. Lindley) an, „wodurch erhalten Pflanzen ihren Geruch? und warum riecht die eine Blume, während die andere geruchlos ist, da doch alle Stoffe der Pflanzen ursprünglich ohne Geruch sind?“ Dr. Lindley schreibt dagegen, er kann diese Fragen nur beantworten, indem er andere Fragen stellt, nämlich, warum hat eine Person blonde, die andere schwarze Haare? Warum ist eine Kuh frei von Geruch und ein Fuchs nicht

täglich stark riechend? da doch von Anfang an die thierischen Stoffe alle gleich sind.

Neue Pflanzen hatten die diesjährigen Ausstellungen in England nur sehr wenige gebracht, am reichsten versehen war aber noch die letzte diesjährige Ausstellung, welche die K. botanische Gesellschaft am 6. Juli im Regent's Park abgehalten hat. So hatten die Herren **Veitch** ausgestellt das prächtige Pentstemon Jeffreyi, mit schönen blauen, im Innern röthlichen Blumen, aus Californien; eine neue Bilbergia mit einer großen, sich stark verästelnden Blüthenrispe, unzählige blasse fleischfarbene Blüthen tragend; die eigenthümliche Ceratodactylis osmundoides, Pteris argyraea mit großen, weiß gestreiften Wedeln; Platycerium Wallichii von Moulmain; zwei Arten von Blandfordia, Clianthus Dampieri; Chamaebates foliolosa, Dichorisandra vittata discolor mit roth gestreiften Blättern; Spraguea umbellata, mit rosa und weißen, wolligen Blüthen, von Californien; Aeschynanthus tricolor, Boehmeria argentea von Südamerika und Cyanophyllum magnificum, beide durch ihre herrlichen Blätter sehr empfehlenswerth, und Philesia buxifolia.

Die Herren **Parker & Williams** hatten eine Statice brassicaefolia mit weißen und blauen Blumen ausgestellt, dann die gelb gefüllt blühende Datura, ein buntblätteriges Tussilago, Tydaea und Begonia.

Von Herrn **E. G. Henderson** sah man die weißblumige Portlandia platantha, Gazania splendens, eine Pflanze mit silberweißen Blättern und hübschen gelben Blumen.

Die Herren **Low** zeigten mehrere Pflanzen von Borneo, verschiedene noch ohne Namen, dann eine buntblättrige Francisoea confertiflora, Myrsine picta, Gonotanthus cupreus (?) mit metallähnlichen Blättern, Pothos argyraea, ebenfalls den Chamaebates foliolosa, ein hübscher Strauch fürs Kalthaus, von Californien; Plerostemma lasianthum, eine Asclepiadeae mit Dolden hübscher orangegelber Blumen, nicht unähnlich denen von Cyrtoceras reflexum; Spraguea umbellata und Goethea striatiflora, deren nackter Stamm dicht besetzt war mit Blumen, umgeben von carminrothen Bracteen, welche die Hauptzierde dieser Pflanze ausmachen.

Schlingpflanzen im bot. Garten zu Buitenzorg. „Das ansehnliche Anwachsen des Inhalts des botanischen Gartens zu Buitenzorg auf Java," heißt es nach einer Privatmittheilung in der Flora, „insbesondere veranlaßt durch die große Ausbeute, welche der Inspector **Teysmann** auf seinen verschiedenen Reisen in Java und Sumatra gemacht hat, machte es im Jahre 1856 nöthig, die Abtheilung der Schlingpflanzen, deren es in dortiger Gegend ungemein viele giebt, nach einer anderen Stelle überzupflanzen, da der Raum, welcher früher dafür bestimmt war, längst zu eng geworden war. Diese Abtheilung ist wie jede der andern Abtheilungen — 1) Einjährige, 2) Perennirende, 3) Sträucher und Bäume — nach Endlicher's Genera plantarum geordnet und nimmt nun die südwestliche Ecke des bot. Gartens ein, wo früher noch sich einige Wohnhäuser von Europäern und Inländern befanden; es ist eine herrliche große Gruppe geworden, wo jede Art in doppelten Exemplaren an einen lebenden Baum gepflanzt ist, den die meisten bald ganz überwuchern. Man muß diesen Schlingpflanzen **lebende** Stüt-

zen geben, weil todte, trockene Baumstämme bald sowohl der Feuchtigkeit als auch den weißen Ameisen unterliegen und mit den darauf gewucherten Schlingpflanzen umstürzen würden; die Erfahrung hat gelehrt, daß dazu am besten sich ein Baum eignet, der einige starke gabelförmige Aeste hat und nicht viel Schatten macht, und zwar Odina gummifera Bl., von den Inländern Sparrenbaum, Kuda-Kuda oder Kaju Djaran genannt. Derselbe hat noch die gute Eigenschaft, daß man ihn als Baum seiner Wurzeln ledig einpflanzen und seines Fortwachsens sicher sein kann. Seit den letzten drei Jahren nun haben sich diese Schlingpflanzen von den natürlich stets folgenden Einflüssen des Versetzens und Zurückschneidens vollkommen erholt und ist die früher von ihnen eingenommene Stelle zur Vergrößerung der Baum- und Strauchgruppe der Leguminosae hinzugezogen worden, die daneben stand und längst einer Ausbreitung bedurfte; sie liegt unmittelbar östlich vom südlichen Eingange in den botanischen Garten.

Personal-Notizen.

Montagne und **Alph. de Candolle** sind von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg zu ihren correspondirenden Mitgliedern ernannt.

* Herr **H. Jensen**, dessen Gärtnerei in diesen Blättern zu öfterem rühmlichst erwähnt worden ist, hat den Betrieb seiner Gärtnerei von Johannis d. J. an seinem bisherigen Obergärtner Herrn **W. Busch** für alleinige Rechnung in Pacht übergeben.

† Aus englischen Gartenzeitungen erfahren wir leider den Tod des Herrn **Lovell**, derselbe starb am 30. Mai d. J. zu Bagshot in seinem 37. Jahre. Herr Lovell war einer der tüchtigsten, sowohl praktisch wie wissenschaftlich gebildeten Gärtner, und hat derselbe sich namentlich in der Landschafts-Gärtnerei einen Namen erworben. Im Jahre 1849 erschien von ihm eine sehr gute Abhandlung über das Wachsen und Reifen des Holzes an Pflanzen (abgedruckt im IV. Bande des Journals der Hortic. Soc. of London). Während der letzten Jahre war Herr L. bei Herrn Standish zu Bagshot engagirt, wo er sich hauptsächlich mit der Landschaftsgärtnerei beschäftigte. Ein großer Theil der Anlagen des Queen's Pavillon zu Aldershott soll nach seinen Ideen ausgeführt worden sein. In Gard. Chronicle finden wir eine Menge Pläne für „Villa-Gärten" von ihm mitgetheilt.

Correspondenz-Notizen.

Herrn Sch. Coswig. Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, das Eingesandte an den Mann gebracht zu haben.

Beiträge für die „Hamburger Gartenzeitung" werden auf Verlangen honorirt und können entweder dem Verleger, Herrn R. Kittler, oder der Redaction eingesandt werden. Diejenigen der geehrten Mitarbeiter, welche Extraabdrücke ihrer Aufsätze zu haben wünschen, werden gebeten ihren Wunsch bei Einsendung des Manuscripts uns anzuzeigen, da er später nicht berücksichtigt werden kann. Anonyme Einsendungen finden keine Aufnahme.

Victoria Regia.

Eine ganz eigenthümliche Erscheinung zeigte sich in diesem Jahre an fast sämmtlichen jungen Victoria-Pflanzen im botanischen Garten zu Hamburg. Da im vorigen Jahre die Samen der Victoria hierselbst nicht völlig zur Reife gelangt waren, so hatte der Herr Inspector Bouché in Berlin die Güte, mir eine Anzahl Samen aus verschiedenen Jahrgängen zu geben, die Ende Januar in kleine Töpfe ausgesäet und in einen Behälter mit Wasser gestellt wurden, wie es alljährlich, so lange die Victoria hierselbst kultivirt wird, geschehen ist. Nach Verlauf von 3—4 Wochen keimten die ersten Samen und sobald die jungen Pflanzen das erste Blättchen ausgebildet hatten, wurden sie einzeln in Töpfe, in eine leichte nahrhafte Erde gepflanzt. Die Pflanzen wuchsen freudig fort, so daß die stärkste der jungen Pflanzen bald größer gepflanzt werden konnte und dieselbe zum Auspflanzen in das große Bassin des Victoria-Hauses bestimmt wurde. Beim zweiten Verpflanzen der jungen Victoria wurde, wie früher, etwas Schlammerde angewendet, die bereits ein Jahr auf Haufen gelegen hatte. Die Pflanze nahm schnell an Größe zu, als sie aber plötzlich ein krüppelhaft gebildetes Blatt erzeugte. Anfänglich glaubte ich, daß dieses vielleicht von einer Drückung des Blattes im jungen Zustande herrühren könnte, allein diesem Blatte folgten von nun an nur mißgebildete und zwar ungemein schnell aufeinander, die Blätter schienen wie zerrissen und bestanden eigentlich nur noch aus den Hauptrippen, denn die eigentliche Blattsubstanz fehlte so zu sagen ganz. Dieselbe Erscheinung hatten noch 6—8 jüngere, nicht verpflanzte Pflanzen, so daß es durchaus nicht in Folge des beim Verpflanzen angewandten Schlammes sein konnte. Da die große Pflanze, deren Blätter bereits über 1 Fuß im Durchmesser hielten, für total mißrathen zu betrachten war, so wurde sie fortgeworfen und statt ihrer eine andere, dem Anschein nach ganz gesunde Pflanze genommen und ins Bassin gepflanzt. Hier wuchs sie freudig fort und ihre Blätter mochten wohl 12—14 Zoll im Durchmesser halten, als auch diese Pflanze anfing, gleich krüppelhafte Blätter zu treiben, eigentlich nur Blattstiele mit Rudimenten von Rippen und wenig Blattsubstanz. Da nun auch bei dieser Pflanze keine Besserung zu erwarten war, so wurde sie Anfang Juni durch eine andere Pflanze ersetzt, die bis jetzt, Mitte August, noch ganz gesund fortwächst.

Die Ursache dieser krüppelhaften Blattbildung kann ich mir nicht erklären, um so weniger, da die Wurzeln vollkommen gesund waren; möglich, daß die Erde zu nahrhaft war, es ist dann aber eigenthümlich, daß sich diese Erscheinung nicht schon früher einmal gezeigt hat.

Es wäre wohl interessant zu erfahren, ob auch an anderen Orten dieselbe Erscheinung stattgefunden hat und möchte ich um gütige Mittheilung bitten. So viel ist gewiß, sollte in den verschiedenen wenigen Gärten, wo heute noch die Victoria kultivirt wird, eine Samengewin-

nung einmal fehlschlagen, so dürfte die Victoria sehr bald aus den Gärten verschwinden und so leicht gewiß nicht wieder eingeführt werden.

Ueber die Gattung Pentstemon *L'Her.*

Von F. W. Klatt.

Der Besitz des botanischen Gartens in Hamburg an Arten aus dieser Gattung, 16 im Ganzen, gab Veranlassung, daß mich diese Abtheilung der Scrophularineen eine Zeitlang beschäftigte. Auffällig war mir dabei die Bezeichnung Trautvetter's, der Pentas'emon schreibt. Außerdem legt Walpers in dem Repertorium Vol. III dieser Gattung das fächliche Geschlecht bei, während Bentham in DC. Prodr. X und Walpers im Repertorium VI sie männlich sein läßt. Wichtiger als diese verschiedene Schreibart ist die Unterscheidung der Fünffaden von den Schildblumen, da, was jetzt Pentstemon heißt, früher Chelone genannt wurde.

Der Kelch ist in beiden Gattungen tief 5theilig; die Krone aufgeblasen-röhrig glockig, der Saum 2lippig, die Oberlippe ausgerandet 2lappig, die Unterlippe 3lappig. Von den 5 Staubgefäßen sind 4 fruchtbar, zweimächtig, das fünfte ist antherenlos. Die Kapsel ist wandspaltig, 2klappig.

Bei den Fünffaden sind nur die Blüthenstiele mit 2 Deckblättern versehen, bei den Schildblumen aber die Kelche mit 3 Deckblättern umgeben. Bei den Fünffaden sind die Blüthen traubig oder in Rispen und Sträußen aus Trugdolden zusammengesetzt, bei den Schildblumen finden sie sich ährig-kopfig zusammengesetzt. Der Hauptunterschied beider Gattungen liegt jedoch in dem Samen. Dieser ist bei den Fünffaden kantig, bei den Schildblumen breit randhäutig.

Nach dieser Unterscheidung zählt Bentham in DC. Prodrom. X nur 3 Arten zu der Gattung Chelone, nämlich: Ch. glabra L., Ch. Lyoni Pursh und Ch. nemorosa Dougl.

Viel reicher an Arten ist die Gattung Pentstemon. Bentham zählt in dem erwähnten Prodromus pag. 320—331 in dem sechsten Tribus (Cheloneae) der Scrophularineae 54 Arten Fünffaden auf, zu denen er noch im Anhang desselben Bandes pag. 593 zwei Arten hinzufügte. Zu diesen 56 Arten kommen noch 4 hinzu, die in Walper's Repert. VI beschrieben sind und 2 im Bot. Mag. bekannt gemachte. Alle diese Arten, sowie die oben angeführten Schildblumen, sind Bewohner Amerikas, besonders schöne finden sich in Nordwest-Amerika. Sie werden von Bentham in 5 Sectionen eingetheilt. Dieselben sind: Sectio I, Erianthera. Die Kronen einschnitte sind alle rund und die Antheren mit langer Wolle dicht bedeckt. Der Blüthenstand ist einfach und die Blüthenstiele sind an der Spitze mit zwei Deckblättern versehen. Zu dieser Section gehören: P. Scouleri, Menziesii, Lewisii, Douglasii

und frutescens. Sectio II, Cepocosmus. Die Kronencinschnitte sind alle rundlich, fast gleich oder kaum zweilappig. Die Antheren sind kahl oder selten kurz behaart. Diese Section wird wieder in Unterabtheilungen gebracht, deren erste Racemosi benannt ist. Diese Racemosi haben ganze, oft linealische Blätter, einfache Trauben und einblüthige Blüthenstiele, die in der Mitte mit 2 Deckblättern versehen sind. Zu dieser Abtheilung gehören: P. Gardneri, ambiguus, laricifolius und tenuifolius. Die zweite Unterabtheilung heißt Dissecti. Die Blätter sind bei der einzigen Art dieser Abtheilung eingeschnitten und die Blüthenstiele mehrblüthig. Nur P. dissectus. Bei der dritten Unterabtheilung, Integerrima, sind die Pflanzen aufrecht, kahl, selten schwach pflaumig-weichhaarig. Die Blätter sind ganzrandig. Die Blüthenrispe ist schlaff, aufrecht. Folgende Arten gehören dazu: P. grandiflorus, Murrayanus, speciosus, acuminatus, nitidus, gentianoides, Hartwegi, centranthifolius, Torreyi, imberbis, lanceolatus, erianthera, alpinus, strictus, secundiflorus, coeruleus. Die vierte Unterabtheilung, Serratae, enthält Pflanzen, die oft klebrig weichhaarig sind; ihre Blätter sind alle mehr oder weniger gesägt. Zu dieser Unterabtheilung zählt Bentham P. pumilus, Jamesii, albidus, cristatus, Cobaea, perfoliatus, campanulatus und tubiflorus. Die Sectio III führt den Namen Eupenstemon. Die Krone der dahin gehörenden Fünffaden ist 2lippig, die Oberlippe 2theilig. Die Antheren sind wie bei der zweiten Section gebildet. Die Blätter sind oft mehr oder weniger gezähnt. Zu dieser Section gehören: P. Digitalis, pubescens, gracilis, deustus, pruinosus, attenuatus, confertus, procerus, ovatus und staticaefolius. Die Sectio IV führt den Namen Elmigera. Die Blüthenstiele sind vielblüthig und die Antheren wie bei der zweiten Section. Die Krone ist tief 2lippig, die Oberlippe aufrecht ausgerandet und die Unterlippe herabgebogen, tief 3theilig. Dahin gehören: P. barbatus, corymbosus, cordifolius, breviflorus und antirrhinoides. Bei der letzten, der Sectio V, Saccanthera, ist die Krone kaum 2lippig, mit fast gleichen Einschnitten versehen. Die Antheren sind kahl oder rauh, pfeilförmig. Der Blüthenstand ist eine Rispe oder selten eine Traube, aus einblüthigen mit Deckblättern versehenen Blüthenstielen bestehend. Die Blätter sind eingeschnitten oder gezähnt. Zu dieser Gruppe gehören: P. triphyllus, Richardsoni, heterophyllus, venustus, serrulatus, diffusus und glandulosus.

Nachdem ich den Lesern dieser Zeitschrift eine Uebersicht über die Eintheilung Bentham's gegeben habe, werde ich in dem Folgenden die Arten vorführen, die kultivirt worden sind.

Sectio I. Erianthera.

1) **Pentstemon Scouleri** Dougl. **Scouler's Fünffaden.** Der kaum fußhohe Halbstrauch ist am Grunde holzig, ästig, kahl oder nach der Spitze weichhaarig. Die unteren Blätter sind spatelförmig länglich, die oberen linealisch-lanzettlich, gesägt und ganzrandig. Die Blüthen, mit blaß purpurfarbigen Kronen und lanzettlichen, lang zugespitzten Kelchabschnitten, bilden einseitswendige Trauben. Das unfruchtbare fadenförmige Staubgefäß ist an der Spitze weichhaarig. Abbild.: Bot. Reg. t. 1277.

2. Pentstemon Douglasii Hook. Douglas's Fünffaden. Der kleine äſtige Strauch iſt kahl und hat verkehrt eiförmige oder länglich lanzettliche, zugeſpitzte, ganzrandige, ſteife Blätter. Die Blüthen, an Blüthenſtielen, kaum von der Länge des Kelches und mit Kelchen, deſſen Abſchnitten äußerſt zugeſpitzt ſind, bilden vielblüthige Trauben. Die Kronen ſind violett. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kurz, fadenförmig, an der Spitze behaart. Abbild.: Bot. Reg. 1838, t. 16, Van Houtte, Flora der Gewächshäuser I, 145.

Sectio II. Cepocosmus.

§ 3. Integerrimus.

3. Pentstemon Murrayanus Hook. Murray's Fünffaden. Der 3 Fuß hohe Stengel iſt wie die ganze Pflanze meergrün, die Wurzelblätter ſind einen halben Fuß lang, geſtielt, verkehrt eiförmig, die Stengelblätter ſind verbunden, ſtengelumfaſſend, nach unten eiförmig-länglich, nach oben kreisrund. Die fahlrothen Blüthen, an verlängerten ſchlanken Blüthenſtielen in Büſcheln oder zu 2—4, bilden verlängerte ruthenförmige Riſpen. Der unfruchtbare Staubfaden iſt nach der Spitze hin erweitert, nackt. Die Kelchabſchnitte ſind breit lanzettförmig, ſpitz. Abbild.: Bot. Mag t. 3472.

4. Pentstemon giganteus Morren. Rieſen-Fünffaden. Der runde kahle Stengel hat gegenſtändige, ganzrandige, am Grunde herzförmige, lang verſchmälerte, zugeſpitzte Blätter. Die zahlreichen ſchlaffblüthigen Riſpen beſtehen aus zarten ein- oder zweiblüthigen Blüthenſtielen mit zugeſpitzten, am Grunde herzförmigen Deckblättern, glokkenförmigen kahlen Kelchen und großen purpur-ſcharlachrothen Kronen, die an Größe den Blüthenſtielchen gleich ſind. Abbild.: Ann. de la soc. d'agricult et de bot. de Gand II, tab. 63.

5. Pentstemon speciosus Dougl. Prächtiger Fünffaden. Der 3—4 Fuß hohe Stengel hat unten geſtielte, länglich ſpatelförmige Wurzelblätter und ſitzende lanzettförmige Stengelblätter. Die Riſpe iſt verlängert ruthenförmig, einſeitswendig und beſteht aus aufrechten 5—11-blüthigen Blüthenſtielen. Die Kronen ſind blau, die Kelchabſchnitte eiförmig-länglich, zugeſpitzt, am Rande häutig. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kahl, fadenförmig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1270.

6. Pentstemon acuminatus Dougl. Spitzblättriger Fünffaden. Der Stengel iſt aufrecht. Die Wurzelblätter ſind geſtielt, elliptiſch, ſpitz, ſteif, die oberen ſind herzförmig, ſtengelumfaſſend, eiförmig, zugeſpitzt. Die ſteife Riſpe iſt faſt unterbrochen, die Afterſchirme, aus denen ſie beſteht, ſind faſt ſitzend, zuſammengezogen. Die Kelchabſchnitte ſind lanzettlich-zugeſpitzt. Die Krone iſt purpurroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt fadenförmig, kahl. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1295.

7. Pentstemon gentianoides G. Don. Enzianähnlicher Fünffaden. Der Stengel iſt 3—4 Fuß hoch, aufrecht. Von den lanzettlichen Blättern ſind die oberen aus breitem ſtengelumfaſſenden Grunde allmählig zugeſpitzt. Die faſt unterbrochene Riſpe iſt am Grunde beblättert, die einzelnen Blüthenſtiele ſind kurz, dreiblüthig. Die Kronen ſind violett und die Kelchabſchnitte breit eiförmig-zugeſpitzt, kaum

häutig. Der unfruchtbare Staubfaden ist kahl und an der Spitze eingedrückt. Abbild.: Bot. Reg. New Ser. XVIII, tab. 16.

8. **Pentstemon Hartwegi Benth.** Hartweg's Fünffaden. Die schöne Pflanze wird 2—3 Fuß hoch und ist aufrecht. Die 2—4 Zoll langen Blätter sind lanzettlich, die oberen breit stengelumfassend. Die schlaffe Rispe ist fast kahl, die verlängerten Blüthenstiele sind fast dreiblüthig. Die Krone ist scharlachroth oder dunkelpurpurroth. Die Kelchabschnitte sind ei-lanzettförmig, zugespitzt, kaum häutig. Der unfruchtbare Staubfaden ist kahl, an der Spitze eingedrückt. Abbild.: Bot. Reg. 1838, tab. 3; Bot. Mag. tab. 3661.

9. **Pentstemon centranthifolius Benth.** Valerianblättriger Fünffaden. Die aufrechte Pflanze hat untere längliche und obere stengelumfassende, längliche oder eiförmig lanzettliche Blätter. Die verlängerte ruthenförmige Rispe ist einseitswendig. Die Kelchabschnitte sind breit eiförmig zugespitzt, am Rande häutig. Die Krone ist scharlach brennend roth. Der unfruchtbare Staubfaden ist kahl, fadenförmig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1737.

10. **Pentstemon miniatus Lindl.** Zinnoberrother Fünffaden. Die Pflanze ist strauchartig, meergrün, kurz weichhaarig. Die Blätter sind eiförmig, sehr kurz gestielt, am Grunde abgerundet. Die Blüthentraube ist schlaff einseitswendig, armblüthig. Die Blüthenstiele sind 2blüthig. Die Krone ist zinnoberroth, drüsig, weichhaarig und hat fast dreieckige gewimperte Einschnitte. Der Kelch ist ebenfalls drüsig weichhaarig und hat zugespitzte, umgerandete Einschnitte. Die Antheren sind kahl. Abbild.: Bot. Reg. 1847, tab. 14.

11. **Pentstemon Torreyi Benth.** Torrey's Fünffaden. Die aufrechte Pflanze hat untere verkehrt eiförmig längliche und obere sitzende, lang linealische Blätter. Die verlängerte Rispe ist armblüthig. Die Kelchtheile sind ei-lanzettförmig, umgerandet. Die Krone ist blau. Der unfruchtbare Staubfaden ist kahl, an der Spitze fast verbreitert. Eine Abbildung dieser Art fehlt.

12. **Pentstemon Wrightii Hook.** Wright's Fünffaden. Der Stamm ist aufrecht, 1½—2 Fuß hoch, stielrund, vom Grunde an ästig. Er trägt gegenständige, meergrüne, spatelförmige oder längliche, ganzrandige, in den Blattstiel übergehende Blätter, nur die obersten, unter der Rispe, sind länglich eiförmig, am Grunde fast herzförmig, sitzend. Die Rispe ist verlängert, mit Deckblättern versehen. Der Kelch ist mit kleinen drüsigen Haaren besetzt, seine 5 Abschnitte sind zugespitzt. Die Krone ist tief rosaroth. Der unfruchtbare Staubfaden ist ganz kahl. Abbild.: Bot. Mag. tab. 4601.

13. **Pentstemon erianthera Fras.** Kahler Fünffaden. Der fußhohe Stengel ist vom Grunde an ästig aufsteigend. Die unteren Blätter sind verkehrt eiförmig-länglich oder spatelförmig gestielt, die oberen sind sitzend, fast stengelumfassend, lanzettlich. Die Rispe ist länglich einseitswendig. Die Blüthenstiele sind klein, armblüthig. Die Krone ist purpurroth. Die Kelcheinschnitte sind breit eiförmig, am Rande fast häutig. Die Antheren sind behaart. Der unfruchtbare Staubfaden ist kurz behaart und nach der Spitze hin verbreitert. Abbild.: Bot. Mag. tab. 1672.

§ 4. Serratae.

14. Pentstemon Cobaea Nutt. Cobäablüthiger Fünffaden. Die Pflanze ist aufrecht, schwach flaumhaarig. Die Blätter sind gesägt, die unteren gestielt länglich, die oberen stengelumfassend, eiförmig oder lanzettlich. Die Rispe ist armblütig, weichhaarig und hat kurze, aufrechte, 3—5-blüthige Blüthenstiele. Die Krone ist weiß. Die Kelchabschnitte sind länglich-lanzettlich, nicht so zugespitzt als in den ähnlichen Arten, wohl oft sogar stumpf. Der unfruchtbare Staubfaden ist nach der Spitze erweitert und bärtig. Abbild.: Bot. Mag. tab. 3465, Sweet brit. flow. garden. New Series Vol. 4, t. 584.

15. Pentstemon perfoliatus A. Brongn. Durchwachsener Fünffaden. Die Pflanze ist aufrecht und klebrig-zottig. Die Stengelblätter sind breit-eiförmig, verbunden-stengelumfassend, geschwänzt-zugespitzt und gezähnt. Die Rispe ist verlängert und unterbrochen blättrig. Die Krone ist bleich violett. Die Kelchabschnitte sind lanzettlich. Der unfruchtbare Staubfaden ist kahl oder kaum mit einzelnen kleinen Borstchen besetzt. Abbild.: Ad. Brongn. hortieult. univ. 1844, Janv.

16. Pentstemon campanulatus Wlld. Glockiger Fünffaden. Die Pflanze ist kahl oder etwas an der Spitze drüsig weichhaarig. Die Blätter sind ausgebuchtet, gesägt, linealisch-lanzettlich oder eiförmig-lanzettlich, lang zugespitzt, die oberen Blätter sind oft am Grunde breit. Die Rispe ist schlaff, verlängert, einseitswendig, aus mehrblüthigen Blüthenstielen bestehend. Die Blumenkrone ist dunkel purpurfarbig, violett oder rosaroth. Die Kelchabschnitte sind eiförmig, fast gesägt, lanzettlich oder linealisch. Der unfruchtbare Staubfaden ist gebartet. Abbild.: Bot. Mag. tab. 1878 und 3884; Bot. Reg. tab. 1122 und 1138; Lodd. Bot. Cab. tab. 1420, 1429 und 1438; Sw. Brit. flow. gard. 3, tab. 230.

Sectio III. Eupentstemon.

17. Pentstemon Digitalis Nutt. Fingerhutähnlicher Fünffaden. Die Pflanze ist kahl oder selten weichhaarig. Die Wurzelblätter sind gestielt, eiförmig-elliptisch oder länglich; die Stengelblätter sind lanzettlich, stengelumfassend, gesägt. Die schlaffe Rispe hat aufrecht abstehende Blüthenstiele. Die Krone ist entweder weiß oder etwas röthlich. Die Kelchabschnitte sind theils kurz eiförmig, kaum zugespitzt oder lanzettlich, lang gespitzt. Der unfruchtbare Staubfaden ist der Länge nach bärtig. Abbild.: Rchb. Flor exot. 5, tab. 292; Sw. Brit. flow. gard. 2, tab. 120; Bot. Mag. tab. 2587.

18. Pentstemon pubescens Soland. Weichhaariger Fünffaden. Die Pflanze, 1—3 Fuß hoch, ist rauh oder kahl. Die Wurzelblätter sind gestielt, eiförmig; die Stengelblätter lanzettlich, stengelumfassend, gesägt oder selten ganz. Die schlaffe Rispe hat aufrecht abstehende Blüthenstiele, die 3—7-blüthig sind. Die Blumenkrone ist blau, violett, rosaroth oder weiß. Die Kelche sind so variabel, wie bei der vorhergehenden Art. Der unfruchtbare Staubfaden ist der Länge nach bärtig. Abbild.: Bot. Mag. tab. 1424 und 1425; Bot. Reg. tab. 1286.

19. Pentstemon gracilis Nutt. Schlanker Fünffaden.

Der Stengel ist einfach kahl oder schwach weichhaarig. Die Wurzelblätter sind elliptisch-länglich, fast lanzettlich; die Stengelblätter sind linealisch-lanzettlich, stengelumfassend und entfernt gesägt. Die Rispe ist verschmälert, 3—6 Zoll hoch, weichhaarig. Die Krone ist inwendig bläulich, auswendig grünlich. Die Kelchabschnitte sind eiförmig-lanzettlich zugespitzt. Der unfruchtbare Staubfaden ist der Länge nach bärtig. Abbild.: Lodd. Bot. Cab. tab. 1541, Bot. Mag. tab. 2945.

20. Pentstemon deustus Dougl. Schwefelgelber Fünffaden. Die Pflanze ist kahl. Die Blätter sind gesägt, die unteren gestielt, verkehrt eiförmig; die oberen sitzend, länglich-lanzettlich, zugespitzt. Die Rispe ist aufrecht. Die Blüthen sind bleich schwefelgelb; die Kelchabschnitte zugespitzt, am Rande häutig. Der unfruchtbare Staubfaden ist an der Spitze verbreitert, nackt. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1318.

21. Pentstemon pruinosus Dougl. Bereifter Fünffaden. Der Stengel ist 1—1½ Fuß hoch, kurz weichhaarig. Die Blätter sind ausgebuchtet, gesägt, zugespitzt, die unteren gestielt, eiförmig, die oberen stengelumfassend, ei-lanzettlich. Die Rispe ist unterbrochen. Die Krone ist himmelblau. Die Kelcheinschnitte sind lanzettlich zugespitzt, drüsigrauh. Der unfruchtbare Staubfaden ist an der Spitze bärtig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1280.

22. Pentstemon attenuatus Lindl. Verdünnter Fünffaden. Der Stengel dieser Pflanze ist aufrecht, am Grunde kahl. Die Blätter sind ganzrandig oder schwach gezähnelt; die unteren sind verkehrt eiförmig oder elliptisch, gestielt, die oberen sind stengelumfassend, breit, eiförmig. Die Rispe ist unterbrochen, rauhhaarig. Die Blumenkrone ist schwefelgelb. Die Kelchspitzen sind breit, lanzettlich zugespitzt, der ganze Kelch ist weichhaarig. Der unfruchtbare Staubfaden ist an der Spitze bärtig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1295.

23. Pentstemon confertus Dougl. Gedrängter Fünffaden. Die Stengel sind 1—1½ Fuß hoch, kahl. Von den ganzrandigen Blättern sind die Wurzelblätter gestielt, spatelförmig-länglich, die oberen Blätter aber stengelumfassend, eiförmig oder länglich-lanzettlich. Die dicht gehäuften Blüthen bilden unterbrochene Rispen. Die Kelcheinschnitte sind lanzettlich, zugespitzt, am Rande häutig. Die Kronen sind nickend, schwefelgelb. Der unfruchtbare Staubfaden ist an der Spitze verbreitert, bärtig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1260.

24. Pentstemon procerus Dougl. Hoher Fünffaden. Die Pflanze ist kahl. Von den ganzrandigen Blättern sind die Wurzelblätter gestielt, länglich-lanzettlich, die Stengelblätter aber stengelumfassend, länglich oder ei-lanzettförmig. Die Rispe ist aufrecht, unterbrochen, die Blüthen dicht gedrängelt. Die Kelchabschnitte sind oft breit gerandet, fast gezähnt. Die Kronen variiren zwischen violett und blau. Der unfruchtbare Staubfaden ist oben spatelförmig und der Länge nach bebartet. Abbild.: Bot. Mag. tab. 2954.

25. Pentstemon ovatus Dougl. Eiförmiger Fünffaden. Die Pflanze ist 2 Fuß hoch, weichhaarig, beblättert. Die Wurzelblätter sind lang gestielt, ei-lanzettförmig, die Stengelblätter breit, herzförmig-stengelumfassend, eiförmig, zugespitzt, gezähnt. Die Rispe ist länglich, unterbrochen. Die Kelchabschnitte sind linealisch-lanzettlich, am

Grunde faſt geraudet. Die Krone iſt glänzend purpurroth-blau. Der unfruchtbare Staubfaden iſt an der Spitze bärtig. Abbild.: Bot. Mag. tab. 2903.

26. **Pentstemon staticaefolius** Lind. Grasnelkenblättriger Fünffaden. Der Stengel iſt aufſteigend, weichhaarig. Die Wurzelblätter ſind länglich, lang geſtielt; die oberen ſind herz-eiförmig, gezähnt, weichhaarig. Die Riſpe iſt unterbrochen. Der Kelch iſt rauhhaarig, ſeine Theile ſind oval-lanzettlich, zugeſpitzt. Die Krone iſt prächtig violett. Der unfruchtbare Staubfaden iſt oben gebartet. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1770.

Sectio IV. Elmigera.

27. **Pentstemon barbatus** Nutt. Bärtiger Fünffaden. Der Stengel iſt 2—3 Fuß hoch, kahl, meergrün. Die ganzrandigen Blätter ſind unten länglich, oben linealiſch-lanzettlich. Die Riſpe iſt ſchlaff, verlängert. Die Abſchnitte der kleinen Kelche ſind geraudet. Die Krone iſt ſcharlachroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt dicht bärtig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 116 und 1839 tab. 21.

28. **Pentstemon baccharifolius** Hook. Bacharisblättriger Fünffaden. Der Stengel iſt aufrecht oder am Grunde niederliegend, 1—1½ Fuß hoch, kaum äſtig, bis da, wo er in die Riſpe übergeht, ſtielrund, purpurbraun und, wie auch die Blüthenſtielchen, Deckblätter und Blüthen, ſelbſt die Krone, innen und außen mit kleinen Drüſenhaaren bedeckt. Die Blätter ſind gegenſtändig, dunkelgrün, kahl, häutig, grob ſtachlig-geſägt; die unteren ſind ſpatelförmig, weiter hinauf werden ſie länglich und die in der Nähe der Blüthen ſind rundlich, alle ſitzend. Die Riſpen ſind gipfelſtändig, verlängert. Die Deckblätter ſind klein, breit eiförmig, zurückgebogen. Die Kelchabſchnitte ſind dachziegelartig, eiförmig. Die Krone iſt ſcharlachroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kahl, fadenförmig. Abbild.: Bot. Mag. tab. 4627.

29. **Pentstemon breviflorus** Lindl. Kurzblüthiger Fünffaden. Die Stengel ſind aufrecht, kahl, abſtehend, äſtig, grün. Die Blätter ſind geſägt oder ganzrandig, lanzettlich, an beiden Seiten zugeſpitzt. Die Riſpe iſt beblättert, ſchlaff. Die Kelchabſchnitte ſind lanzettlich, zugeſpitzt, ſchärflich. Die Krone iſt weiß-röthlich. Der unfruchtbare Staubfaden iſt pfriemlich und kahl. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1946.

Sectio V. Saccanthera.

30. **Pentstemon triphyllus** Dougl. Dreitheiliger Fünffaden. Die Pflanze iſt äſtig, 2 Fuß hoch, kahl oder an der Spitze weichhaarig. Die Blätter ſind zu drei oder zu vier wirtelſtändig ſitzend, ſchmal lanzettlich, ſchwachzähnig oder fiederſpaltig. Die Riſpe iſt ſchlaff, beblättert. Die Kelchtheile ſind lanzettlich, ſpitz. Die Krone iſt bläulich-violett. Der unfruchtbare Staubfaden iſt oben dichtbärtig. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1245.

31. **Pentstemon Richardsonii** Dougl. Richardſon's Fünffaden. Die Pflanze iſt 1—3 Fuß hoch, ſteif, aufrecht, verſchieden äſtig, kahl oder weichhaarig. Die Blätter ſind unten geſtielt, oben ſitzend, ei-lanzettförmig, eingeſchnitten-fiederſpaltig, zugeſpitzt. Die Riſpe

iſt ſchlaff, beblättert. Der Kelch hat lanzettlich-zugeſpitzte Theile. Die Krone iſt violett. Der unfruchtbare Staubfaden iſt nach der Spitze hin ſpatelförmig, kaum bärtig. Abbild.: Lodd. Bot. Cab. tab. 1641, Bot. Mag. tab. 3391, Bot. Reg. tab. 1121.

32. Pentstemon heterophyllus Lindl. Verſchiedenblättriger Fünffaden. Die kahle Pflanze wird über Fuß hoch und hat am Grunde ſchon ſchlaffe Aeſte. Die Blätter ſind unten geſtielt, linealiſch-lanzettlich oder ſpatelförmig, die oberen ſind linealiſch, ganz oder kaum entfernt gezähnt. Die Blüthentrauben ſind ruthenförmig. Die Kelchabſchnitte ſind breit, plötzlich zugeſpitzt. Die Krone iſt purpurroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kahl. Abbild.: Bot. Mag. tab. 3853, Bot. Reg. tab. 1899.

33. Pentstemon venustus Dougl. Hübſcher Fünffaden. Die Stengel ſind 2 Fuß hoch, beblättert, kahl. Die Wurzelblätter ſind ſitzend, die oberen ſtengelumfaſſend, ei-lanzettlich, zugeſpitzt, ausgefreſſen-gezähnt. Die Blüthenriſpe iſt thyrſoidiſch ſchlaff. Die Kelcheinſchnitte ſind eiförmig zugeſpitzt. Die Krone iſt purpurroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt gewimpert. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1309.

34. Pentstemon diffusus Dougl. Weitſchweifiger Fünffaden. Die Stengel ſind 2 Fuß hoch, am Grunde oft weitſchweifig, weichhaarig, aufſteigend, äſtig. Die unteren Blätter ſind geſtielt, eiförmig oder länglich, die oberen ſind ei-herzförmig, ſtengelumfaſſend, geſägt. Die Riſpe iſt länglich, unterbrochen, beblättert. Die Kelcheinſchnitte ſind verkehrt eiförmig, zugeſpitzt. Die Krone iſt purpurroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt oben gebartet. Abbild.: Bot. Reg. tab. 1132.

35. Pentstemon glandulosus Lindl. Drüſiger Fünffaden. Die Pflanze iſt aufrecht, klebrig, weichhaarig. Die Wurzelblätter ſind eiförmig, grob gezähnt; die Stengelblätter ſind breit herzförmig, ſtengelumfaſſend, wenig zähnig. Die Riſpe iſt unterbrochen. Die Kelcheinſchnitte ſind lanzettlich. Die Krone iſt blaß roſaroth. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kahl. Abbild.: Bot. Mag. tab. 3688, Bot. Reg. tab. 1262.

Kultur-Bemerkungen zu den Pentstemon-Arten.

Faſt ſämmtliche in der vorhergehenden Abhandlung aufgeführten Pentstemon-Arten können mehr oder weniger als Zierpflanzen empfohlen werden. Mehrere derſelben, meiſt ſtaudige Arten, halten bei uns im freien Lande während des Winters aus und bedürfen zu ihrem Gedeihen nur einen guten nahrhaften Boden, wie z. B. die P. confertus, procerus, pubescens, Cobaea, Digitalis, coeruleus, nemerosus und ovatus. Die übrigen Arten bilden einen mehr holzigen Stamm oder ſind an ſich zärtlicher, ſo daß man ſie in einem froſtfreien Kaſten oder in einem Kalthauſe überwintern muß, wie P. campanulatus (atropurpureus) mit ſeinen vielen Varietäten, Hartwegii Bth. (nicht gentianoides, wie dieſe Art fälſchlich in den Gärten genannt wird), ebenfalls mit vielen Varietäten, Murrayanus, perfoliatus, Richardsoni, Torreyi, baccharifolius, cordifolius, Wrightii u. a. Dieſe letzteren Arten eignen ſich aber eben ſo gut wie die zuerſt genannten zum Auspflanzen in das

freie Land für die Sommermonate, ja sie gedeihen im freien Lande viel besser und blühen leichter als in Töpfen.

Pentst. Murrayanus, Torreyi, Wrightii und einige andere sterben, nachdem sie geblüht haben, größtentheils ab; man muß daher, um sie zu erhalten, im Spätsommer Stecklinge davon machen und diese an einem hellen Standorte überwintern. Ueberhaupt suche man die übrigen Arten, die man ins Freie ausgepflanzt hat, im Herbste durch Stecklinge zu vermehren, denn wenn sich auch die ausgepflanzten Exemplare wieder einpflanzen lassen, so haben sie gewöhnlich eine solche Größe erreicht, daß sie zur Ueberwinterung viel Raum einnehmen würden, überdies auch sehr leicht abstocken und unansehnlich werden, es gilt dies namentlich von den hartholzigen Arten, wie z. B. von P. perfoliatus, Torreyi, cordifolius, bacharifolius ꝛc. Diejenigen Arten, die mehr staudig sind, aber dennoch frostfrei überwintert werden müssen, wie P. gentianoides und campanulatus und deren Varietäten, kann man kurz über der Erde abschneiden, die Ballen verjüngen und dann einpflanzen, sie leiden dadurch nicht, nur müssen sie vor zu großer Feuchtigkeit geschützt werden.

Fast alle Arten setzen sehr reichlich Samen an, so daß sie sich auch auf diese Weise leicht vermehren lassen.

Zur Topfkultur wende man eine gute nahrhafte, jedoch nicht zu fette Erde an, am besten Laub-, Dung- und Rasenerde zu gleichen Theilen. In einer zu fetten Erde sterben die zarteren Arten, wie namentlich P. Murrayanus, Torreyi, cordifolius, sehr leicht ab. Dasselbe tritt ein, wenn man den Pflanzen zu viel Wasser giebt, es ist daher unbedingt nothwendig, daß die Töpfe eine gehörige Scherbenunterlage erhalten, damit das Wasser stets freien Abzug habe.

E. D—o.

Bereisung der Hochebene von Curitiba,

Provinz Parana im südlichen Brasilien.

Von G. Wallis in Santa Catharina.

Eine von mir jahrelang gehegte Absicht, die Hochebene von Curitiba zu bereisen, gelangte endlich im August 1857 zur Ausführung. Der Seedampfer „Paraense“ brachte mich von Santa Catharina nach einer zweitägigen Fahrt nach Paranaguá, einer kleinen, aber durch Handel und Schifffahrt ausgezeichneten Stadt, auf dem 26.° südl. Br. gelegen. Von dieser Stadt werden jährlich viele Schiffsladungen Maté nach den anderen Provinzen Brasiliens, sowie selbst überseeisch versandt. Der Maté, dort meistens Herva (Kraut) genannt, ist das getrocknete Laub des Ilex Paraguensis, welcher Baum auf der benachbarten Hochebene in bedeutender Menge wächst. Specieller werde ich noch später auf diesen Gegenstand zurückkommen. So ungesund wie Paranaguá durch seine niedrige sumpfige Lage ist, so wenig interessant, ja

faſt traurig erſcheint die umliegende Vegetation, nur erſt in einiger Stunden Entfernung trifft man eigentlichen Urwald in nennenswerther Kraft wieder an.

Die Verſchönerung der Stadt ſcheint die Behörde ſich angelegen ſein zu laſſen; ſo z. B. wurde zur Zeit eine Brunnenanlage errichtet und Baumpflanzungen ausgeführt. Die Art aber, wie man einige Reihen Palmen anpflanzte, bewies, wie man hier in Braſilien mit dem Pflanzen von Bäumen nur wenige Umſtände macht. Man wählt nicht etwa kleine Stämme, präparirt nicht das Erdreich, nein — ſtattliche 10 bis 12 Fuß hohe Stämme werden aus dem Walde herbeigeſchleppt und förmlich eingerammt und dies geſchieht von Leuten, welche unter gehöriger Anleitung nie einen Baum gepflanzt haben und dennoch wächſt alles fort.

Wie gewöhnlich in allen kleineren braſilianiſchen Städten, ſo war auch hier die Matriz (Hauptkirche) nicht fertig, obgleich beſtändig daran gebaut, gebeſſert und geflickt wird. Iſt man hinten am Gebäude fertig, ſo fällt vorn der Bau wieder ein, oder es iſt ſonſt ein Grund zum Weiterbau vorhanden. Dieſe Beobachtung mit dem Schickſal der Kirchen traf ziemlich in jedem Orte zu, ich mochte hinkommen, wohin ich wollte, die Matriz war nicht fertig.

Freundlicher als Paranaguá und geſünder zugleich liegt das Städtchen Antonina, auch Pilar*) genannt, 4 Stunden weiter an der landeinwärts ſich hinziehenden Seebucht gelegen, wohin das Dampfboot nach kurzem Aufenthalte fährt. Seit man die Lage Antoninas für den Verkehr mit der Hochebene gegen Paranaguá zum Vortheil erkannt hat, hebt ſich dies Städtchen raſch und wird in nicht gar langer Zeit ſeiner Nachbarſtadt den Rang ablaufen. Dazu kommt noch die Verlegung der Dampfſchiffslinie hierher, eine vom Gouvernement für 10 Conto de Reis (etwa 8000 Rthlr.) erkaufte Vergünſtigung. Von Antonina beginnt der Weg zu Lande auf Maulthieren, wiewohl man auch noch flußaufwärts eine Strecke bis Morretes und Porto de Cima reiſen kann. Ich ſchlug jedoch den Landweg ein. In allmählicher, kaum bemerkbarer Steigung gelangte ich nach Porto de Cima und Baixa da Serra (Itupava), etwa 7 Legoa oder 9 Stunden von der Meeresküſte entfernt. Von letzterem Orte beginnt die eigentliche Erſteigung der Serra (Gebirge), die hier das Hochland ſchroff vom Küſtengebiet abſchneidet. Eine merkliche Veränderung in der Vegetation nahm ich bis dahin noch nicht wahr, außer daß die Gegend kurz vor Porto de Cima mit einer außerordentlichen Menge Bambus, Bambusa Tagoara Mart. beſtanden iſt, welche Pflanze dann völlig verſchwindet, um auf meiner Route nicht früher als nach einigen Tagereiſen auf dem Plateau in deſto größerer Menge wieder zu erſcheinen. Zu beiden Seiten des Weges ſich hinziehend, verhindert dieſer Bambus durch ſein dichtes Wachsthum den Blick in das Innere des Waldgebietes. Auf anderem Wege, den ich auf der Rückreiſe einſchlug, fand ich ihn auch auf der Serra in großer Ueppigkeit wieder. Eigenthümlich, wohlgefällig iſt der Anblick der Schluchten und Abhänge von hohem Bergſaume

*) Der Leſer wird in Folge häufiger zwei Benennungen für einen und denſelben Ort finden, wovon die eine indiſchen Urſprunges iſt.

herab, sobald sie, wie es dort der Fall war, mit Bambus angefüllt sind. Local in seinem Vorkommen, verbreitet sich dieses Rohr, wo es dann vorkommt, in desto größeren Massen. Das reiche Laub fügt sich zu allen geisterhaften Formen und kaum läßt es etwas Anderes neben sich aufkommen.

Sobald ich die Barrière von Ytupava, wo Weggoll gezahlt wird, im Rücken hatte, windet sich der Weg in steilen Schneckenlinien zur Höhe hinan; so steil, daß wir stellenweise wohl thaten abzusitzen. Mit schnellen Schritten ging es nun dem Reiseziele entgegen und begierig hoffte ich des langersehnten Anblicks der Araucarien theilhaftig zu werden, die das Hochland von Curitiba*) bekanntlich so sehr characterisiren. Nicht früher aber, als der Gebirgssattel erstiegen ist und das Auge weithin über unermeßliches Campo**) schweifen konnte, zeigten sich jene schwarzen Riesen, mit ihren düsteren Kronen zum Himmel aufragend. Da standen sie zu Tausenden und aber Tausenden, kerzengerade wie ferne Heerschaaren zur Musterschau aufgepflanzt. Je näher, desto lebhafter der Eindruck, den dieselben in ihrer Masse auf den Beschauer machen. An Masse, Schönheit und Wachsthumskraft weicht ihnen nunmehr jede andere Pflanzengattung, ja selbst die hohe, stolze Palme hat ihnen ihr Recht abgetreten, indem sie ihre Vertreter bis auf etliche wenige jenseits des Bergkammes zurückgelassen.

In zwei Hauptzügen markirt sich der Vegetationscharacter der Hochebene, den eben erwähnten Araucarien und dem sogenannten Campo.

Vier Stunden waren zur Ersteigung der Serra erforderlich, sodann ritt ich noch weitere drei Stunden, um ein Nachtquartier zu erreichen. Andern Morgens die Reise fortsetzend, betraten wir bei gutem Ritt bald nach Mittag die Hauptstadt der Provinz, Curitiba, die ich mir zum einstweiligen Aufenthalte ersehen.

Vielerlei sind die Eindrücke, unter denen man die Vegetation des Hochlandes — je nach den verschiedenen Standorten — kennen lernt. Wende ich die Augen von den Araucarien, dem einzig tropischen Wahrzeichen, ab und sehe ich auf den Boden, so könnte ich mich einbilden mich auf den Alpen zu befinden, denn in allen Formen deprimirt, finden sich Pflanzen vor. Strauchpartieen durchwandernd (von Bäumen nahmen wir außer der Brasilfichte im Ganzen wenige wahr), erinnern Habitus und Blattformen an Europas oder besser Australiens Kinder, da war es mir denn, als sähe ich Melaleuken, Agathosma und ähnliche in Australien vorkommende Pflanzen vor mir. Zu den in dieser Region am meisten vorkommenden Gewächsen gehören eine Menge Syngenisten, Myrtaceen, einige Rubiaceen, feinblättrige Melastomaceen, Escallonia, Podocarpus, von dem ich erst taxifolia (15—20 Fuß hoch wachsend) fand, später aber eine Art mit breiten, stumpfen Blättern. Die Syngenisten mehren sich hier aufwärts in ähnlicher Weise, wie es im Littoral (Küstengebiet) der Küste entlang nach den Steppen Montevideos zu der Fall ist. — Besuchte ich endlich den Landmann auf seinem Acker, so fühlte

*) Der Name der Hauptstadt Curitiba ist indischen Ursprunges und leitet sich ab von curii und tiba, was „Vereinigung von Fichten“ bedeutet.

**) So der Name für die weiten, oft öden, mit Gras bewachsenen Fluren der Hochebenen Brasiliens.

ich mich im Geiste nach Deutschland versetzt. An die Stelle der so gewohnten tropischen Gewächse treten uns hier eingewanderte Gemüse, Obstarten ꝛc. entgegen. Da sah ich keine Kaffeestaude, das Haus schmückt keine Banane, kein Zuckerrohr, keine Baumwollenpflanzung ist sichtbar. Dem Auge wird eine andere ungewohnte Weide zu Theil: es schweift mit innigem Behagen über wogende Kornsaaten hin. Das tief in jedes Menschenherz gepflanzte Heimathgefühl soll auch unter fernem tropischem Himmel nicht ganz ersterben; es erglüht bei dem Anblick altgewohnter, an die Eindrücke frühester Jugend erinnernden Formen nur um so lebhafter zumal da, wo man es am wenigsten ahnt. So auch hier. Mit eigenthümlicher Lust übersah ich in Blüthe stehende Erbsenbeete (October), verschiedene Kohlarten, Rüben, Gurken ꝛc. Auch der Spargel gedeiht gut, wenn auch nicht besser als in Deutschland. Wein, Aepfel, Birnen, Steinobst, Wallnüsse, ebenfalls den Anbau lohnend, waren an den Feldsäumen angepflanzt, wenn auch von diesen noch wenig gute Resultate erzielt worden sind. Der Obstbau, wie überhaupt die gesammte Landwirthschaft liegt aber noch sehr im Argen, da sie ein Kind deutscher Colonisation ist, deren Bestehen selbst erst wenige Jahre zählt. Das Klima thut hier mehr als der Boden, der jedoch meist nur mager ist und in seiner Zusammensetzung aus wenig Lehm und vielem Sande besteht, so daß der Landbauer bald mit Dünger zu Hülfe kommen muß. Nach Mittheilungen, die mir später geworden sind, soll der Boden in dieser Gegend, sowie auch in der nahegelegenen Provinz San Paulo einen kleinen Salztheil enthalten. Ohne Dung trägt der Boden nur 2—3 Jahre, im Littoral auf geschlagenem Urwald dagegen 5—7 Jahre. Die Bearbeitung des Bodens ist dem Pfluge unterworfen, dessen Gebrauch die Deutschen hier eingeführt haben, und die Regierung hat jetzt auch eine Anzahl Pflüge angeschafft, um sie ärmeren Colonisten zu unentgeltlicher Benutzung zu leihen. Doch nun hinunter nach jener Niederung, um zu sehen, was es dort Neues giebt. Wiederum nur kleine zierliche Pflanzen! Ueberall etwas Neues, Seltsames, wie wenn es gälte, jede Erinnerung an die Tropen zu verwischen. In theilweiser Verwandtschaft und Aehnlichkeit erinnerten viele Pflanzen an Deutschlands Flora; es waren unter Anderen: **Potamogeton, Utricularia, Drosera, Gratiola, Hydrocotyle, Polygonum, Ervum, Lathyrus.** Sodann **Juncus, Scirpus, Carex** und **Oxalis** in je mehreren Species vorhanden. Ferner **Buchosia aquatica, Xyris, Sagittaria ranunculoides, Ranunculus muricatus** u. s. w. An trocknen Stellen **Polygala, Senecio amabilis, Poterium Sanguisorba, Anchusa officinalis, Marrubium, Hypericum** diverse Species, deren eine mit stengelumfassenden Blättern (nach Art der Lonicceren), gelb blühend, 1½—2 Fuß hoch, viel vorkam. **Dracaena brasiliensis** sah ich um Curitiba zum ersten Mal. Welche auffallende Veränderung in so kurzer Zeit! Mir war dies Alles doppelt neu und interessant, und wohl aus gutem Grunde, da ich seit drei vollen Jahren ununterbrochen nur an den Anblick glühenderer, großartigerer Formen gewöhnt war, so daß ich anfangs mich nicht recht hineinfinden konnte. Durch den, den Tropen eigenen ewigen Frühling erklärt es sich, wie viel leichter und schärfer sich dem Gedächtnisse die bestehenden Pflanzenformen einprägen müssen. In gemäßigteren Himmelsstrichen könnte daher ein derartiger Uebergang nur von geringerem Eindrucke sein. Doch

dies Alles nur erst ein Vorspiel! Interessanter, bestimmter noch gestaltet sich die Vegetation, je weiter man sich von der Küste entfernt, je tiefer man in das Innere des Landes eindringt. Die Senkung des Plateaus nach Westen zu ist fast unbemerkbar; selbst die Gewässer, die auf dieser Seite ablaufen, haben nur ein sehr ruhiges Gefälle, im Gegensatz zu den Flüssen, welche ostwärts, dem Atlantischen Ocean zuströmen. Nach halbtägigem Ritt auf der Weiterreise (nach Villa do Principe) kam ich durch ausgedehnte Araucarienwälder. In mächtigem Umfange strebten diese Colosse zur Höhe hinan. An den Stämmen unterhalb der flachen Krone keine zurückgebliebene Spur von Aesten, aus deren völliger Vernarbung man auf ein sehr hohes Alter schließen muß. Höchstens finden sich hin und wieder vernarbte Spalten vor. Je höher und älter der Baum ist, desto flacher ist seine Krone; in der Jugend ist der Wuchs pyramidal oder conisch. Nicht allein die Stärke der Stämme, sondern auch der scheinbar äußerst geringe Nachwuchs rechtfertigen die Vermuthung auf ein sehr hohes Alter, da ja im andern Falle das Aussterben in wenig Generationen vorauszusetzen wäre. Wunderbar ist der Contrast eines eben aufsprossenden Araucariensämlings neben einem solchen Veteran. Wie viele Jahrhunderte mögen erforderlich sein, diesem würdig zur Seite zu stehen! Das Wurzelvermögen der Brasilfichte ist verhältnißmäßig wenig tiefgehend. Die Verpflanzung verträgt der Baum nur in sehr jungem Alter, in der Höhe von ein bis drei Fuß, was einem Alter von ein bis zwei Jahren entspricht. Der Brasilianer verpflanzt freilich keine Araucarien, außer wenn er zur Zierde etwa einige auf seinem Grundstück anbringen will. Bei vorgeschrittenem Alter erweist sich der Baum von sehr zäher Natur. Umgeworfene Stämme, der Wurzeln beraubt, sah ich aus ihrer armdicken Rinde häufig Sprossen hervortreiben. Der Nutzen dieser Bäume besteht in der Verwendung als Bauholz, zu welchem Zweck einige Schneidemühlen angelegt sind. Die in Asche gebratenen Früchte werden gern gegessen, selbst als Dessert gereicht. Nach stürmischem Wetter wäre eine gute Holzlese unter diesen Bäumen zu halten, wenn nur Menschen, die dergleichen bedürfen, da wären! Die wenigen Bewohner verbrennen aus Bequemlichkeit Alles, was sie nur eben Brennbares in nächster Nähe erwischen können, Dracaena, Bambus ꝛc. Die riesigen Aeste der Araucarien sind wegen ihrer horizontalen Lage, am Ende mit schwerem Büschel Zweige belastet, in Stürmen wenig haltbar und stürzen herab, zu vielen etwa klafterlangen Stücken zertrümmernd. Mit Leichtigkeit ließe sich unter einem einzigen Baume ein Wagen voll von abgebrochenen Zweigen aufladen. Die Majestät der Riesenbäume beschäftigt einen so sehr, daß man anfangs kaum noch Sinn und Auge für den übrigen Pflanzenwuchs hat, wo sich unter Myrtaceen, Melastomaceen, Laurineen, Bignonien, Solanaceen, Pisoldia, Canella ꝛc. dem Wanderer leicht die brasilianischen Dracänen präsentiren. Sie besonders sind es, die neben einigen hohen Farrn (Alsophila und Cyathea?) der Landschaft ein tropisches Ansehn bewahren, einige äußerst verloren vorkommende Cocos flexuosa und Cecropia nicht zu rechnen. Von sonstigen tropischen bekannten Pflanzenarten fand ich wieder: Bromelien, Philodendron Imbé Schott, Lantanen, Franciscea, Pythonium Arisaema, Tillandsia usneoides ꝛc. Letztere im Vereine mit kleinen Bromeliaceen und einer zinnoberfarbenen Parmelia,

Stamm und Aeste der Araucarien bewohnend. Im Ganzen jedoch nichts besonders Bemerkenswerthes. Eine weiße Viola und im Gräben ein Myosotis, unserm M. palustris sehr ähnlich, waren mir bis dahin noch neu. Jener Philodendron Imbé entbehrte hier oben seiner langen Luftwurzeln, die in den wärmeren Regionen aus den höchsten Wipfeln zur Erde sich herablassend, ihn so characterisiren. Auch das Gewirre von Schlingpflanzen fehlte.

Araucarien-Haine wechselten meist mit Bambusen ab, denn kaum war ich aus einem Araucarien-Haine getreten, so wanderte ich durch dichte dunkle Bogengänge von Bambusa Taguara Mart. oft wohl eine halbe Legoa ununterbrochen hindurch. Dann aber hörten auch diese wie abgeschnitten auf und es traten an deren Stelle wieder Araucarien-Haine, dann Syngenisten u. s. w.; stets eine Pflanzenart in großer Anzahl. Es ist dies eine Eigenthümlichkeit der Campos, die ich auch bei kleineren krautartigen Pflanzen sich wiederholen sah, was ganz mit den Gesetzen alpiner Regionen übereinstimmt; ja, später wird man selbst ersehen, wie zwischen Gattungen und Species, ihrer relativen Zahl nach, ein alpines Verhältniß eintritt.

In einem kleinen Dorfe, Quintaqueira, auch Iguassu genannt, wurde übernachtet und am andern Morgen die Reise fortgesetzt. Nachmittags berührte ich eine Fazenda (Landgut), auf der mir eine Anzahl Bäume mittler Größe mit dichten schwarzgrünen Kronen besonders auffiel. Es war dies der anfangs besagte Maté, Ilex Paraguensis, dessen getrocknetes Laub in Brasilien und einigen andern Ländern einen beliebten Thee bildet. Hier hatte ich zugleich Gelegenheit, an Ort und Stelle Erkundigungen über die Bereitung des Matés einzuziehen. Die Bäume werden, wenn man es gut mit der Pflanzung meint, unterhalb frei gehalten, viel gelichtet; das Laub wird alle drei Jahre abgenommen, indem man die Zweige zu 1½—2 Fuß Länge abbricht. Die älteren Blätter sollen besser sein als die jüngeren, die einen zu strengen Geschmack haben. Die besagten Zweige werden zu Bündeln gebunden und unter einem Schuppen (bei günstiger Jahreszeit auch im Freien) auf einer Lattenroste zum Trocknen aufgehängt, um aber das Trocknen zu beschleunigen, unterhält man 24 Stunden lang ein Feuer unter der grünen Decke. So eingetrocknet — man sollte es eingeräuchert nennen — kommt das Laub auf Mühlen, um durch diese gänzlich zu gröblichem Pulver zermahlen zu werden, wonach das Product zur Ausfuhr fertig ist und auf Maulesein in Ladungen von je ca. 250 Pfund nach Paranaguá geschafft wird. Je öfter ein Baum entlaubt wird, desto mehr und saftigeres Laub liefert er, desto dichter und dunkler wird die Krone, die ihm zum Schmuck gereicht. Die kultivirten Bäume sind mit denen der Wildniß gar nicht zu vergleichen. In der Ferne ist man versucht, sie für pyramidal zugestutzte Orangenbäume zu halten. Das Blatt ist breit und stumpf gesägt, kommt im Ansehn etwa einem Kirschenblatte gleich. Der Thee aus diesen Blättern ist in der Provinz so allgemein im Gebrauch, daß er in vielen Häusern ganz die Stelle des Kaffee vertritt, um so mehr, da solcher hier nicht cultivirt wird *). Man rühmt

*) Kaffee war oft in einer ganzen Ortschaft für Geld und gute Worte nicht aufzutreiben, wohl aber stets Herva! Herva! Einmal bei Gelegenheit eines Bivouak

den Thee als besonders der Brust wohlthuend. Die Art ihn zu trinken ist, ihn mit einem kleinen dünnen Rohr, an dem sich ein fein geflochtenes Kölbchen befindet, aufzuschlürfen. Im Kostenpreise kommt er geringe und noch billiger als der Kaffee zu stehen. —

Mein Nachtquartier für den heutigen Tag mußte im Freien genommen werden, was sich mir von nun an überhaupt öfters ereignete. Thierhäute (die man zum Decken der Güter stets mit sich führt) gaben das Material zu Matratze und Dach. Ein Feuer wurde durch die Tropeiros (Truppenführer) die Nacht hindurch unterhalten und obgleich es stark thaute, so schlief ich nach anstrengendem Ritt recht gut.

Bevor ich am andern Morgen das Städtchen Villa do Principe erreicht, überraschte mich der Anblick einer Menge niedriger, halbstrauchiger Petunien, welche in der Fülle ihrer Blumen wahren Prachtexemplaren gleich sahen. Fabiana thymifolia und eine andere ihr in Wuchs und Blume sehr ähnliche Art, jedoch mit halbzölligem linealen Blatt, waren gleichfalls zierend. Letztere blühte ebenfalls roth und in einer Spielart weiß. Es sind zierlich aussehende Gewächse von schönem Habitus und mit schönen Blattformen, schade, daß sie sich so wenig in Cultur befinden, um so mehr, da sie in der Färbung ihrer Blumen sehr variiren. Die Ueppigkeit dieser Pflanzen nimmt um so mehr Wunder, da sie hier auf magerm, steinigen Boden standen.

Cupheen, Verbenen, Salvien, Oxalis, darunter auch die schöne delta, Xyris, Echites, Convolvulus, Utricularia waren es, die ich in der Umgebung von Villa do Príncipe besonders bemerkte. Von den vielen herrlichen zwergartigen Echites, die den Campos von Paraná und Minas geraes eigen sind, hebe ich zwei der schönsten hervor, illustris und augusta, beide in der Fl. flum. aufgeführt. Erstere mit reichlich großen, weinrothen, flachen Blumen; letztere auf gerade erhobenem, 9 Zoll langem Tubus 3—5 Zoll breite, weiße, gefranzte Blumen tragend. Leider bewährt sich die Zwergform in der Cultur nicht, da die Pflanze alsdann leicht in die Eigenschaft des Kletterns, wie die meisten übrigen Arten, übergeht. Datura scandens, in Felsspalten eingewurzelt und leicht am Felsen herunterliegend, nahm sich im Blüthenstande gut aus; sie wächst stets im Schatten. In der Nachbarschaft fand ich noch: Nicotiana Langsdorffii, Gesneria punctata, Epidendron calcaratum fl. flum, Columnea, Eriocaulon *), Andromeda und ein Melocactus, den einzigen, den ich bis jetzt gefunden habe. Nie sah ich Opuntien in solcher Ueppigkeit, wie hier oben; die Stämme drohen unter der Last ihrer Früchte zusammenzubrechen, was auch nicht selten geschieht. Unter den Sträuchern und Bäumen waren Lantanen, eine reichblühende blaue Bignoniaceae, deren Zweige in Dornen (wie bei wilden Pflaumen) endigen, Piscidia, Cestrum, Melia, Schinus, Berberis, Melastomaceae in allen möglichen Abweichungen, klein und traubenförmig blühend, wie unsere heimische Actaea, bis zur Größe von 3 Zoll Durchmesser. Mit

---

in Ermangelung irgend welcher Erquickung kam ich in die Lage den Thee selbst zu präpariren. Die grünen Zweige wurden vom Baum gebrochen, schnell über Feuer gedörrt und so das Getränk hergestellt.

*) Die Eriocaulen ein in Brasilien reich vertretenes Genus; Dr. Riedel fand deren allein 88 Species in den verschiedenen Provinzen des Landes.

dem Roggen eingebürgert fand ich viele alte heimathliche Bekannte, als: Bromus secalinus, Lolium, Plantago media und minor. Andere Cosmopoliten gewöhnlich in der Nähe menschlicher Wohnungen zerstreut, wie: Conium maculatum, Datura Stramonium, Sonchus arvensis, Arctium Lappa, Anagallis coerulea und arvensis, Amaranthus viridis, sehr gemein, Alsine media, Cerastium vulgare, Lepidium americanum, Leonurus Cardiaca, bleibt hier jedoch niedrig und kümmerlich, Atriplex patula u. s. w. Uebrigens fand ich diese Weltumsegler hier nicht zum ersten Mal in Brasilien, in der Provinz Santa Catharina wächst dergleichen auch. An nassen Stellen sah ich Myosotis und Typha angustifolia.

Nicht wenig überraschte mich auf meiner Weiterreise nach Castro (drei Tagereisen nordwärts) das Vorhandensein von Apfelsinen, die mir nach längerer Entbehrung doppelt angenehm waren. Die Bäume waren dicht belaubt und die Früchte von gutem Geschmack. Eryngium aquaticum fand ich in mannshohen Exemplaren auf feuchten Gründen wachsend; jedoch nur wenige Stunden weit, dann hörte es gänzlich auf. Banisterien, die unten im Littoral so reichlich wachsen, fand ich nur in einem einzigen Repräsentanten, einem kleinen, am Boden hinkriechenden Pflänzchen, im Habitus unserm Hypericum humifusum ähnlich, dagegen Malpighia desto häufiger. Der Campo zwischen letztgenannten zwei Orten Villa do Principe und Castro ist, scheinbar wie von Menschenhand, mit einer kleinen Palme bewachsen, nämlich von der Diplothemium campestre; sie stand gerade zur Zeit, Monat November, in Blüthe, welche durch ihre Gestalt eines Aronkolbens bekanntlich das Genus characterisirt.

Nach dem bisher Gesagten kann man sich den Effect der landschaftlichen Scenerie wohl ungefähr selbst schon berechnen, der jedoch eben kein erfreulicher ist. Wohin das Auge sieht — überall ein ewiges Einerlei, der weite Campo wie erstorben; das Gras, wenn nicht durch Feuer versengt*), doch durch die Sonne verbrannt oder vom Winde zerschlagen; wenig sind der Sträucher, noch weniger der Bäume so wie der Wohnstätten, und auch die starren Massen der Araucarien nicht geeignet, die Einförmigkeit zu heben. So reist man tage-, ja selbst wochenlang, ohne eine interessante Abwechselung, oder für die kommende Nacht ein gastlich Dach wahrzunehmen. Rechnet man nun die vielen Schwierigkeiten, mit denen der Reisende in diesem Lande (wie überhaupt in Brasilien) zu kämpfen hat, wie das häufige Bivouakiren, die schlechten Wege und noch schlechteren Brücken, Flüsse zu durchwaten oder zu durchschwimmen, plötzliche Gewitter mit Hagel ꝛc. ꝛc., so leuchtet es ein, wie wenig erbaut ein für die Vegetation Gleichgültiger heimkehren muß.

Den landschaftlichen Standpunkt im Auge behaltend, so wirkt in so monotoner Scenerie das Vorhandensein von dichten malerischen Baumgruppen um so überraschender; ein solcher Schmuck taucht wirklich wie durch Zauber an einigen wenigen Stellen auf, wodurch ich zum ersten Mal zu der Ueberzeugung gelangte, daß Brasilien auch von unten auf geschlossene Gruppen erzeugt, was hier bei den ihnen eigenen dunkeln

*) Hier muß noch die Bemerkung angefügt werden, daß an mehreren Orten dieser wie der benachbarten Provinz San Paulo der Graswuchs niedergebrannt wird, um dem Boden dadurch neue Nahrung zuzuführen.

Tinten im Abstich gegen das helle Rasengrün einen angenehmen Effect macht*). Besondere Erwähnung verdient hierbei die Familie der Myrtaceen, die in einigen Gliedern zu den wenigen Pflanzen gehört, welche sich durch eine dichte, auch wohl kuppelförmige Belaubung auszeichnet, und zwar so, daß sie weithin schon erkennbar sind. Z. B. die zu großen Bäumen heranwachsende Guaviroba, Myrtus Guaviroba, deren Früchte genossen werden. Dann die Pitanga, Eugenia uniflora, mit kleinem Blatt und schöner weinsäuerlicher, kühlender Frucht. Die Jabuticaba, Eugenia cauliflora, deren etwa kirschenförmigen schwarzen Früchte unmittelbar aus dem Stamm und den Aesten hervorwachsen, so daß man nicht im Stande ist, einen solchen Baum zu besteigen, ohne Hunderte von Früchten abzustreifen oder zu beschädigen.

Die Begrenzung größerer Grundstücke (Aecker) geschieht hier nicht wie an anderen Orten durch Pfahlzäune, sondern einfach durch tiefe Gräben, wodurch dem Terrain eine scheinbare Erweiterung gegeben wird. Es ist dies eine mühsame und kostspielige Methode, die jedoch mehrere Vortheile für sich hat. So z. B. einen geregelten Wasserabzug, freie Luftcirculation, sowie Abhaltung verschiedenen Ungeziefers, dem auf die Art weder Schutz noch Zuflucht gestattet ist. Kleinere Grundstücke, Gärten, Hofräume ꝛc. umgrenzt man mit Reihen nebeneinander eingerammter Stämme von Baumfarrn und selbst der brasilianischen Dracaena. Den Farrnstämmen kappt man die Kronen, was sie doch nicht hindert, weiter zu grünen; im Gegentheil, sie vegetiren dann um so kräftiger, indem sie mehrere Seitentriebe hervorbringen **).

Ueber das Klima konnte ich wegen nur dreimonatlichen Aufenthaltes keine umfassenden Beobachtungen anstellen; ich bemerke nur, daß das Thermometer in der Hochebene stets um 3—5 °R. niedriger stand als im Litoral. Zudem ist die Differenz zwischen Tag und Nacht hier oben bedeutender. So niedrigen Temperaturstand, wie ich allgemein beobachtet, hätte ich für die Wintermonate wohl vorausgesetzt, nicht aber für November und December, die dem Sommer angehören. Mittagswärme notirte ich als Maximum in obengenannten Monaten von 18½ bis 11° hinab. Ich sage hinab, weil seltsamer Weise die Temperatur im December sich kälter erwies als im vorhergehenden Monate. Häufige Regen und starke Gewitter trugen wahrscheinlich auch das Ihrige zur rauhen Witterung bei. Ein Gewitter war mit starkem Hagel begleitet, was den Brasilianern hier oben indeß nichts Neues war; sie bezeichnen es mit dem Ausdrucke: „Steine regnen“. Die Höhe dieser Gegenden beträgt nach dem Mittel der verschiedenen Angaben 3000 Fuß, die der Residenz Curitiba 3500 Fuß.

Eigentliche rationelle Landwirthschaft trifft man auf dem Hochlande, wie schon erwähnt, nicht. Dagegen ist die Viehzucht nächst der Käsebereitung und der Theeausfuhr um so bedeutender. Unübersehbar dehnt sich der Campo aus, der theils kaiserliches, theils Privat-Besitzthum ist;

---

*) Für diese Parthieen die indische Benennung: Capão, von Ca, Wald, und pão, rund, eigentlich Zitzen, abgeleitet.

**) Anmerk. der Redact. In der Kultur ist unsers Wissens es nur sehr selten erzielt worden, daß Baumfarrn Seitentriebe machen, sobald ihnen der Kopf genommen.

in ihm liegen nur sparsam einzelne Fazendas (Landgüter) zerstreut, gewöhnlich in oder nahe dichter Waldstellen, da diese Kühlung und meist Wasser geben und der Boden daselbst einer Cultur am lohnendsten ist. Des Landbauers Pflanzgegenstände beschränken sich auf türkischen Weizen, Staudenbohnen (die kleinen schwarzen Phaseolus derasus Schrank) und einige europäische Gemüse. Von tropischen Nutzpflanzen höchstens nur einige Cará (Dioscorea) und Bataten (Convolvulus Batatas). Eine Parthie gut bestandenen Roggens trifft man hier und da; bei den Deutschen unfehlbar. Zieht der Brasilianer Obst, so sind dies gewöhnlich Feigen, Pfirsich, Apfelsinen, Jabuticaba (Eugenia cauliflora), Jambo (Eugenia Jambos), Quitten, Wallnüsse, Aepfel und Pflaumen; letztere zwei, da die Pflege mangelt, von sehr dürftigem Geschmack. Der Wallnußbaum erreicht in diesem Lande eine beträchtliche Größe und wölbt sich zu ansehnlicher Kuppel aus. Seine Tragfähigkeit beginnt im 15. bis 18. Jahre.

Nach einem sechstägigen Ritt gelangte ich wieder nach Paranaguá, wo ich mich nach Rio de Janeiro einschiffte.

Zum Schluß erlaube ich mir einen vergleichenden Hinblick auf die nördlicher gelegene Provinz Minas Geraes zu machen, die ich hernach zwischen dem 22. und 23. Breitengrade bereiste. Wie viel anders der Vegetationscharacter gegen die Provinz Paraná! Ein jahrelanges Reisen in derselben brachte mir nicht den Genuß, nicht so viel Originelles, wie ich hier in jenen wenigen Tagen hatte. Ueber zwei Gebirgsreihen hinweg, bei durchschnittlich 4000 Fuß Höhe ist noch keine auffällige Vegetationsveränderung bemerkbar. Es reifen dort Orangen zur halben Zeit, wie um Rio de Janeiro; selbst Zuckerrohr und Kaffee wird noch gebaut, ersteres indeß kaum zum eigenen Bedarf im Lande ausreichend und letzterer nur in Gärten vereinzelt. Jede Provinz hat ihr Eigenes, die Provinz Paraná ihren Maté, Minas Geraes viel Taback und im Norden die Copernicia cerifera; die Provinz Rio de Janeiro Kaffeekultur, Espirito santo nutzbare Hölzer ꝛc. Die Tabackskultur bildet für Minas Geraes fast den einzigen Erwerbzweig, da die Gold- und Diamantengräbereien zum Theil verlassen oder in Privathände übergegangen sind. Außer dem Taback wird noch Reis, Mais und Bohnen gebaut, jedoch nur zum eigenen Verbrauch. Mandioca (Jatropha Manihot L.) zieht man auch wohl in begrenzten Grundstücken, ebenso den Aypi, von dem man schon nach 6 Monaten genießbare Knollen erntet. Folge des weniger geeigneten Klimas. Im kommenden, kälteren Winterhalbjahre würde die Frucht dann leicht eine holzige Beschaffenheit annehmen. (Im Littoral dagegen läßt man die Knollen 1 bis 3 Jahre im Boden stehen.)

Der Winter brachte so kalte Tage, daß längere Zeit hindurch (Monat Juli und August) sich allnächtlich Reif einfand — für mich in Brasilien bis dahin noch Ungesehenes.

Der Boden in den von mir bereisten Gegenden ist größtentheils sehr eisenhaltig. Cinchona ferruginea und das Product blauer Blumen der Hydrangien sind sprechende Zeugen hierfür. Daß Hydrangien ursprünglich roth blühen, ist den Bewohnern daselbst nicht einmal bewußt. Eine dritte bereits in Brasilien gefundene Podocarpus-Art mit schönen

glänzenden 3 Zoll langen Blättern, in hoher ſtrauchiger Form, fand ich an ſolchen eiſengeſchwängerten Stellen häufig.

Einige Pflanzen,

welche im Samen-Verzeichniſſe des Kaiſ. botaniſchen Gartens zu St. Petersburg pro 1858 theils als neu beſchrieben, theils als berichtigt aufgeführt ſind.

Da ſich mehrere von den im gedachten Samen-Verzeichniſſe beſchriebenen Pflanzen auch in den deutſchen Gärten befinden, ſo glauben wir im Intereſſe vieler unſerer geehrten Abonnenten zu handeln, wenn wir ſie mit dieſen Pflanzen näher bekannt machen. Die ausführlichen Beſchreibungen hier wiederzugeben, würde jedoch zu weit führen, wir geben daher nur die Namen nebſt einigen ſonſtigen Bemerkungen. Die mit einem * bezeichneten Arten befinden ſich auch im bot. Garten zu Hamburg.

Juniperus Bregeoni Hort.

Eine dem J. caesia nahe ſtehende Art, mit ſchlaffen, faſt hängenden Zweigen.

*** Juniperus caesia** h. Petrop. Carr. Conif. p. 45.

Ein niedlicher kaum 2 Fuß hoher Strauch, der auch bei uns aushält.

Pinus pumila Rgl.

P. Cembra pumila Endl. Syn. Conif. pag. 142. Dem Pinus Cembra nahe ſtehend; aus Sibirien, Amur.

Koeleria multiflora Rgl. & Herder.

Eine einjährige Art, die ſich von allen bisher beſchriebenen Arten der Gattung Koeleria durch das 5—15blüthige Aehrchen unterſcheidet.

Yucca aspera Rgl.

Im Habitus der Yucca aloifolia nahe ſtehend. Aus Mexico ſtammend, von Karwinsky eingeſandt.

Allium Lallemantii Rgl. & Rach.

(A. chloranthum Lall. h. Petrop. non Boiss.)

Cordyline violascens Rgl.

Dieſe Art erhielt der bot. Garten zu Petersburg unter dem Namen Cord. rubra aus Neu-Holland von Herrn Baron Hügel, von der ſie jedoch ganz verſchieden iſt.

*** Octomeria graminifolia R. Br.**

Hiervon die Varietät:

α. **genuina Rgl.**; foliis lanceolato-lincaribus, usque 8 poll. longis et 1/2—3/4 poll. latis; floribus glomeratis, glomeratis 1-multifloris; sepalis petalisque ovalo-oblongis, 1/4 poll. longis et 1/8 pall. latis. — Octom. graminifolia Hook. Bot. Mag. 2764. Bauer Illustr. of Orch. pl. genera tab. 4. A. Oct. ophioglossoides Hort. Hamb.

β. **lancifolia Rgl.**; foliis lanceolatis, usque 5 poll. longis, 5/8—1 poll. latis; floribus glomeratis; glomeratis 1-multifloris; sepalis petalisque lanceolatis, 3/8 poll. longis et vix 1/8 poll. latis. — Oct. lancifolia Hort. et Reichb. fil. in Catalog der Orchideen-Sammlung von Schiller, pag. 49.

Bolbophyllum umbellatum Lindl. β Bergemanni Rgl.

Differt a planta genuina (Bot. Reg. XXXI, tab. 44. Bot. Mag. tab. 4267) deficiente dente setarum columnae, columnae alis basi truncatis et sepalis magis erectis.

Maxillaria (Xylobium) cylindrobulba Rgl.

M. elongata Lindl. (Paxt. Fl. Gard. III, No. 536) cui proxima affinis, foliis lanceolatis 3-costatis, scapo erecto bivaginato, racemo denso pseudobulbos aequante et labello ovato-oblongo dignoscitur.

Von Galeotti aus Mexico lebend an den bot. Garten zu Petersburg eingesandt.

Maranta noctiflora Rgl. & Kcke.

Im botanischen Garten zu Berlin unter dem Namen Maranta gracilis kultivirt.

*** Calathea micans Kcke.**

var. α **genuina**, niedriger, nur 1/2 Fuß, die Blätter oberhalb an der Mittelrippe weiß gestreift, unterhalb braun-violett. (Phrynium micans Kl. in Otto & Dietr. Gtztg. 1854 pag. 249.)

var. β **robustior**, höher und kräftiger, bis 3/4 Fuß, Blätter oberhalb an der Mittelrippe grün, gegen den Rand weiß variirend, unterhalb blaßgrün, oft gegen den Rand braun-violett gefärbt. (Maranta sp. e Cayenne Hort.)

Strelitzia Nicolai Rgl. & Kcke.

Diese Art ist bereits früher von uns besprochen worden.

Urostigma simile Rgl.

Aehnlich dem U. euomphalum und nymphaefolium. Diese Art geht in den Gärten als Ficus amazonica.

*** Urostigma magnificum Rgl.**

Vergleiche Hamburg. Gartenztg. 15. Jahrg. p. 369.

Urostigma benghalense Gasp. var. cordifolium Rgl.

Dem Urost. tomentosum Miq. nahe stehend, jedoch durch foliis cordato-ovalis acutis v. acuminatis leicht unterschieden.

Urostigma atrovirens Rgl.

Dem Ficus puberula Kth. & Bche., Tweediana Miq. und fuliginea Miq. nahe stehend.

Aphelandra tenuiflora Rgl. & Rach.

(A. fulgens Hort.) Der A. Deppeana am nächsten stehend, durch die ganzen Bracteen, den einfachen Blüthenstand und längere Blumenkrone unterschieden.

*** Correa Backhousiana** Hook. var. **uniflora** Rgl.

Unterscheidet sich von C. Backhousiana genuina foliis supra glabris, floribus 1—3 et calycibus truncatis. C. rufae Gaertn. (Mazeatoxeron rufum Lab.) corolla semi uncialis campanulata, quadrifida. In den Gärten unter Corr. Grevillei gehend.

Cytisus genistoides Rgl.

Wurde von den Herren J. Booth als Cytisus elegans verbreitet.

Die übrigen außer diesen hier angeführten, im Verzeichnisse beschriebenen Arten haben ein mehr botanisches Interesse, weshalb wir dieselben übergangen haben.

Ein Verzeichniß von Getreide-Arten,

die Behufs der weiteren Beobachtungen und Prüfung zu Anbau-Versuchen empfohlen und verkauft werden in der Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei von Herrn Carl Appelius in Erfurt, ist so eben von dem jetzigen Inhaber dieser altrenommirten Handlung, Herrn Garteninspector Jühlke, herausgegeben worden.

Die in diesem Verzeichnisse aufgeführten Getreide-Arten enthalten die vorzüglichsten Varietäten eines Sortiments, welches Herr Jühlke nach sorgfältigster Prüfung auf seinem Versuchsfelde für geeignet erachtet, den Herren Landwirthen und insbesondere den Vorstehern von Versuchsgärten der landwirthschaftlichen Vereine ꝛc. Behufs der weiteren Beobachtung und Prüfung zu Anbau-Versuchen zu empfehlen.

„Bei dem comparativen Anbau dieser Sorten," bemerkt Herr Jühlke, „ist die Reihen-Aussaat der breitwürfigen vorzuziehen, indem erst dadurch die Pflanzen ihre vollkommen normalen Eigenschaften entwickeln," und fährt dann fort: „Während der Anbau mehrerer Varietäten des Roggens, der Gerste und des Hafers in einigen Gegenden Deutschlands bereits an Ausdehnung gewinnt, ist die große Mehrzahl der Weizensorten in Bezug auf Gesundheit, reichliche Bestockung, Dünnschaligkeit, Mehlreichthum und Scheffelgewicht ꝛc. noch gar nicht beobachtet. Obgleich ich die Höhe der Pflanzen, die Länge der Aehren ꝛc. angegeben habe, so sind diese Eigenschaften doch in so fern nicht als

maßgebend für den Gebrauchswerth der Sorten zu bezeichnen, als die Neigung zum Lagern, Beſtockung ꝛc. von der Kultur und Beſchaffenheit des Bodens, von der Beſtellungsweiſe ꝛc. zuweilen mit bedingt wird. Dieſe Angaben ſind deshalb auch nur als eine vorläufige Information zu betrachten; ſie können nur für ſehr kräftigen Weizenboden Geltung behalten. Wenn dieſe Sorten nun ſchon in der Form und Farbe der Aehren, der Samenkörner, der Höhe des Halmes ꝛc. auffallende Verſchiedenheiten darbieten, ſo iſt dies noch mehr in ihren lohnenden Eigenſchaften der Fall. Die Beobachtungen werden hierüber noch fortgeſetzt und bleiben die Reſultate derſelben einer ſpäteren Mittheilung vorbehalten. Die meiſten dieſer Weizen-Sorten werden von einer kräftigen Halmbildung, gedrängter Aehre und von einer glänzenden, dünnſchaligen Beſchaffenheit des Samens gekennzeichnet."

Unter den Sommer-Getreidearten macht Herr Jühlke beſonders auf die große Ertragsfähigkeit der Gerſte aus der Mandſchurei aufmerkſam. Dieſe Form iſt in unſerm Vaterland noch ganz unbekannt; im hohen Norden von Rußland iſt dieſelbe dagegen wegen ihrer Härte und großen Zuträglichkeit ſehr geſchätzt. Die Halmbildung dieſer Sorte iſt ſtraff, 4 Fuß hoch; die Aehren erreichen eine Länge von 3½ Zoll, ſie ſind ſechszeilig; die Körner ſind voll und ſchön. Wegen ihrer Maſſe gebenden Eigenſchaften ſcheint ſie ſich, bei recht früher Ausſaat, auch zum Anbau als Grünfutterpflanze zu empfehlen, doch müſſen darüber noch weitere Verſuche entſcheiden.

Da es eine Thatſache iſt, daß unſere Getreide-Arten in der Menge und Güte des Ertrages ſehr weſentlich von einander abweichen und dieſe Verſchiedenheiten beſonders dann recht in die Augen fallend hervortreten, wenn mehrere der vorzüglichſten Sorten neben einander beobachtet werden, ſo hält Herr Jühlke bei der Prüfung der Sorten eine möglichſt zahlreiche Betheiligung für um ſo erwünſchter, als wir damit auf dem Wege der Erfahrung ſchneller zum Ziele gelangen, indem wir alsdann für die verſchiedenen Lagen und Bodenarten die lohnendſten Formen im Anbau localiſiren, wie dieſes in den Weizen bauenden Diſtricten von England und Schottland mit Erfolg bewirkt wird.

Das ganze Sortiment von 72 Sorten incl. Verpackung koſtet bei Herrn C. Appelius in Erfurt 6 ℳ.

E. D—o.

Gartenbau - Vereine.

Hildesheim. Der Hannoverſche Gartenbau-Verein hielt, ſeiner Gewohnheit getreu, alljährlich einmal außerhalb der Mauern Hildesheims an geeigneten Orten zu tagen, am 3. Juli d. J. eine General-Verſammlung in dem idylliſch gelegenen Banteln ab, zu der ſich denn auch eine große Anzahl Mitglieder dieſes und des bienenwirthſchaftlichen Vereins eingefunden hatten.

Durch die Güte eines Vorſtands-Mitgliedes ſind wir in den Stand

gesetzt, der in dieser General-Versammlung besprochenen Gegenstände von allgemeinem Interesse und Nutzen unserer Zeitung ausführlich gedenken zu können.

Eröffnet wurde die General-Versammlung durch den Präsidenten des Vereins, Obergerichtsanwalt und Notar Dr. jur. Helmboldt, welcher Namens des Vorstandes seine Genugthuung darüber an den Tag legte, daß sich die Mitglieder in so großer Anzahl zur Versammlung eingefunden hatten; er glaubte diese Theilnahme, namentlich unter jetzigen Zeitverhältnissen und bei dem immer mehr abnehmenden Interesse an Vereinen, als ein gutes Zeichen für die Lebensfähigkeit des Vereins deuten zu können, und stellte das Ersuchen an die Versammlung, mit allen Kräften dahin zu streben, daß der Verein zu immer größerer Wirksamkeit gedeihe, immer mehr Leben entwickle.

Da dem Vereine ausreichende Mittel zur Anschaffung literarischer Werke, deren er zu einem glücklichen Bestehen so bedürftig sei, nicht zu Gebote stehen, so wurde es von dem Präsidenten und der Versammlung mit großem Danke anerkannt, daß die Herren Factor Kircher, Waisenhaus-Inspector Palandt und Obergerichtsanwalt Straub, sämmtlich zu Hildesheim, der Vereinsbibliothek mehrere schätzenswerthe Werke über Horticultur geschenkt und daran die eben so freundliche als dringende Bitte geknüpft, daß die resp. Mitglieder hinter jenen Gebern nicht zurück bleiben möchten.

Diesem vorgängig schritt der Präsident zur Besprechung der Tagesordnung, deren erster Gegenstand eine im Herbste d. J. in Hildesheim zu veranstaltende Ausstellung von Obst, Gemüse und Blumen betraf, die auf den 18., 19. und 20. September d. J. in Hildesheim anberaumt worden ist. (Siehe das nachstehende Programm.)

Hiernächst sprach Herr Gartenmeister Heicke aus Banteln in einem kürzeren Vortrage:

Ueber den Einfluß des Sommerschnittes an Espalierbäumen, Stein- und Kernobst

und stellte dessen Wichtigkeit für die Erzielung von Obst in ein klares Licht. Wiewohl nicht zu verkennen sei, daß der Winterschnitt die Hauptsache bleibe, so werde doch durch den Sommerschnitt die Wirkung hervorgerufen, daß die Bäume gute Früchte, ja überhaupt Früchte trügen. Die unzähligen langen Triebe, von Heicke prägnanter Weise Räuber genannt, seien zu stutzen, damit das junge Holz sich zum Fruchttragen kräftige; doch müsse das Abstutzen weder zu früh vorgenommen werden noch zu tief geschehen; komme der Trieb wieder, so sei die Operation noch einmal vorzunehmen; bei Aprikosen und Pfirsichen müsse der Schnitt gerade über dem alten Holze gemacht werden.

Das Verfahren Heicke's wurde in aller Maße vom Kunstgärtner Enger aus Hildesheim als richtig bestätigt; ebenfalls vom Gartenmeister Tönnies zu Brüggen und dem Gärtner Lorberg zu Poppenburg.

Hierauf ergriff der Wegbauaufseher Butterbrodt aus Hildesheim das Wort, um in gewohnter, gründlicher Weise über den Stand der diesjährigen Obsternte eingehende Mittheilungen zu machen.

Einleitend bemerkte der Redner, die beiden letzt verflossenen trocknen Jahre seien bekanntlich reiche Obstjahre gewesen, und das alte Sprich-

wort „Sonnenjahr gewonnen Jahr“ habe sich auch bezüglich der Obsterträge so recht bestätigt.

Im jüngst verwichenen Frühjahre haben nun die Obstbäume im Verhältniß zu den vorigjährigen Erträgen fast ohne Ausnahme wieder reichlich geblüht, und dieses volle Blühen mehrere Jahre hinter einander lasse sich daraus erklären, daß in wasserarmen Jahren manches Auge an den Zweigen statt wie in nassen Jahren bei hinreichender Feuchtigkeit der Atmosphäre zu Sommerschossen und längeren Trieben anzusetzen, wegen Mangels an Vegetationsstoff Fruchtaugen und Blüthenknospen entwickelte.

Indeß trotz der letzten reichen Blüthe seien seit der Blüthezeit vielfache Klagen über geringen Fruchtansatz vernommen und ein obstarmes Jahr sei in Aussicht gestellt.

So weit sich nun die Beobachtungen über den Stand des Obstes auf hiesige Gegend erstrecken, so haben dieselben nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebniß geführt, daß im Allgemeinen doch mehr Obst vorhanden ist, als anfänglich vielfach in Aussicht gestellt wurde.

Was nun die einzelnen Obstgattungen betreffe, so möchte folgende Zusammenstellung maßgebend sein.

Im Vergleich zu einem obstreichen Jahre ergeben in diesem Sommer:

1) Aepfel eine reiche Mittelernte;

2) Kirschen eine Mittelernte, wobei jedoch zu bemerken sei, daß die Sommerkirschen in Verhältniß zu ihrer Ertragsfähigkeit voller tragen, als viele Süßkirschen, namentlich die hier allgemein gebaute Münsterkirsche.

3) Zwetschen werden nahezu eine Mittelernte repräsentiren, jedoch machen die zarten Pflaumen eine Ausnahme hiervon, indem diese wohl weniger als die gemeine Hauszwetsche, dahingegen die gemeine Kreike reichlicher Früchte angesetzt und bis jetzt behalten habe;

4) Birnen scheinen der oft ausgesprochenen Befürchtung wegen Obstmangels Raum zu geben, indem dieselben in ihrem Ertrage hinter den vorgenannten Obstsorten zurückstehen, mithin nur eine geringe Ernte ergeben werden;

5) von den übrigen unwesentlicheren Obstsorten liefern z. B. Wallnüsse nahezu eine Mittelernte; einen mindern Ertrag Aprikosen, Pfirsiche u. dgl.;

6) über den muthmaßlichen Ertrag des Weines vermochte Redner bestimmte Nachweise nicht zu geben; dagegen versicherte Enger, daß die Weinstöcke einen reichen Ertrag versprechen, und wurde solches auch von anderer Seite bestätigt.

Ueber die Ursachen des Mißverhältnisses der diesjährigen reichen Blüthe zu dem Ertrage ließ sich Redner dahin aus, daß, so wie die Frühlingswärme zunehme, die Blüthenknospen der Bäume sich entwickeln, bis zuletzt jede einzelne Blüthe, jedoch geschlossen, zum Vorschein komme. Bei gehöriger Zeit und Wärme öffne sich die Blume, und die bis dahin von den Blumenblättern eingeschlossenen und geschützten Staubfäden — als männliches — nebst dem Fruchtboden als weibliches Organ stehen jetzt frei da, und eine Befruchtung des Fruchtbodens (Pistille) durch die Staubfäden findet unter den dazu erforderlichen günstigen Witterungsverhältnissen statt.

Haben wir an einem Tage, wo die Blumen eines Baumes sich geöffnet, warmes, trockenes, mit einem sanften Windstrom verbundenes Wetter, so geht die Befruchtung, zumal wenn die Blüthen noch von Bienen und andern Insekten besucht werden, und der männliche Fruchtstaub desto mehr dadurch in Bewegung geräth, am besten von statten und ein reicher Fruchtansatz folgt.

Haben wir dahingegen während der Befruchtungsperiode der Blumen starken Regen, so wird der Blüthenstaub weggewaschen, und es erfolgt keine Wirkung; treten ferner gleich, nachdem die Pistille von den äußern Blumenblättern nicht mehr geschützt wird, starke Nachtfröste ein, so zerstören diese die Befruchtungsröhre, und die Blume fällt ab. So können die vollsten Blüthen eines Baumes ohne Folge bleiben, und bei der reichsten Blüthe kann eine totale Mißernte eintreten; und so verhält es sich zum Theil mit der diesjährigen Ernte, indem nämlich, namentlich die Birnbaumblüthen, durch Frost erheblichen Schaden erlitten. Daß solche Einflüsse nicht überall gleichmäßig sind, versteht sich von selbst, indem der Frost, der oft wie ein Strom über die Erde zieht, die eine Gegend empfindlicher berührt als die andere.

Nach einigen weiteren kurzen Bemerkungen über diejenigen Insekten — Käfer, Wespen, Raupen, Läuse — die dazu beitragen, daß eine schlechte Obsternte erfolgt, und nachdem dringend empfohlen war, zur Vertilgung dieses Ungeziefers die Vögel, namentlich die Meisen zu schützen, indem diese Tausende der Obstzerstörer vertilgen, wurde der Gegenstand verlassen.

Die in neuerer Zeit, namentlich in England mit besonderer Vorliebe behandelte Cultur der Erdbeere hatte den Vorstand veranlaßt, den Gartenmeister Tönnies in Brüggen zu ersuchen, sich über dieselbe ausführlich auszulassen. Derselbe entledigte sich seines Auftrages, indem er zugleich von den zwanzig Sorten, die seiner gärtnerischen Pflege anvertraut sind, die zwölf besten auswählte und der Versammlung deren Früchte vorlegte.

Rücksichtlich der Vorbereitung des Landes, muß man im Herbste für ein gut mit Rindviehmist gedüngtes Feld sorgen, das Land recht tief mit schmal abgestochenen Aufwürfen graben; man läßt es in rauher, ungeharkter Form den Winter über liegen, damit es gehörig durchfrieren kann. Nachdem es im Frühjahr wieder gegraben ist, setzt man darauf die im Sommer piquirten Pflanzen; hat man deren nicht, so wartet man bis Juli oder Anfangs August mit der Bepflanzung. Die sich an den ablaufenden Ranken bildenden jungen Pflänzlinge sucht man gut bewurzelt herauszuheben. Auf eine Rabatte von 4 Fuß Breite setze man 3 Reihen in einer Pflanzenentfernung von 1½ Fuß. Sind die übrigens sorgfältig von Unkraut rein zu haltenden Beete im Herbste steif und hart geworden, so sind sie mit Vorsicht wieder umzugraben; bei eintretendem Froste ist dem Beete eine nicht zu starke Decke zu geben, weil die Pflanzen sonst faulen oder ersticken würden. Will man keine Pflänzlinge ziehen, so sind im Sommer die Geizranken, die viele Frucht entziehen, zu nehmen; im Herbst sind die Blätter abzuschneiden.

Als empfehlenswerthe Sorten wurden genannt:

1) Rasberry, eine zwar alte, aber nicht zu übersehende Sorte mit

kurzem Blattstiel, länglicher Frucht von sehr aromatischem Geschmack; sie ist sehr gut zum Treiben;

2) Elton Pine, mit großer, bienenkorbförmiger Frucht von dunkelrother Farbe; sehr ergiebig und zum Treiben geeignet;

3) British Queen, mit runder, mattrother Frucht, delikaten Geschmackes, sehr ergiebig und zum Treiben geeignet;

4) Myatt's Elize, große, lange, breite Frucht sehr aromatischem Geschmack;

5) Myatt's Globe, längliche Frucht, volltragend;

6) Comte de Paris, dunkelrothe, runde Frucht, schöner Geschmack; eignet sich zum Treiben;

7) Royal, lange, tiefgeäugelte Frucht, sehr volltragend und wohlschmeckend;

8) Myatt's New Seedling, runde, hellrothe Frucht, volltragend und geschmackreich;

9) Myatt's Lamspriſe Strawberry, trägt eine lange, dunkelrothe, schöne, sehr zu empfehlende Frucht;

10) Barn's Seedling, mit runder, weißer Frucht, von ausgezeichneter Ergiebigkeit und herrlichem Geschmack;

11) Lainton Seedling, dicke, lange, tiefgeäugelte Frucht;

12) Kittley's Goliath, sehr große, mitunter breitwachsende Frucht, sehr schön in Geschmack und Ergiebigkeit; die erste große Erdbeere, welche Furore machte; eine eben so große, 14 Tage frühere, ist Cremont.

Hiernächst gab der Vortragende umfassende Vorschriften über die Erdbeerentreiberei im Allgemeinen und in Häusern. Die zwar nicht zur Gemüsetreiberei gehörende, wohl aber sich damit leicht verbindende Erdbeerentreiberei geschieht am besten mit der Scharlacherdbeere, welche auch schon im Garten früher als die andern Sorten reift, sowie mit einer Varietät derselben, der Rasberry. Man nimmt dazu von April bis Juni kräftige Ausläufer und pflanzt sie in 4- bis 5-zöllige Töpfe auf Laub- oder gut verrottete Misterde und stellt diese an einer sonnigen Stelle im Garten auf eine Unterlage oder gräbt sie in die Erde. Um die Pflanzen zu kräftigen, werden alle Blüthen und Ausläufer entfernt. Im Juni und Juli geschieht die Verpflanzung. Auch einer Augustpflanzung, die das Verpflanzen erspart, erwähnte der Vortragende ausführlich und bemerkte dann, daß die Töpfe gegen den Frost durch eine Laubdecke zu schützen seien. Die Erdbeere verlangt beim Treiben nur mäßige Wärme, wonach sich also die Anlage der Kasten richten muß, aus denen man den Dunst dann und wann durch Oeffnen ziehen läßt; die in Sägespäne oder alte Lohe eingesetzten Töpfe müssen nahe unter die Fenster zu stehen kommen. In Mistbeeten ist die Treiberei vor Ende Februar nicht zu beginnen; Temperatur 8—10°, später auf 14—15° zu steigern, während der Blüthe auf 10—12° zu ermäßigen, beim Reifen der Früchte 16°. Das Lüften ist nicht zu versäumen; geschieht dieses nicht, so entstehen Blattläuse. Die abgetriebenen Pflanzen, im Frühjahr auf ein Beet gesetzt, geben oftmals im Herbst noch eine Ernte. Haben sie sich hier ein Jahr erholt, so können sie wieder zum Treiben benutzt werden. Schließlich sprach Herr Tönnies noch über die der Erdbeere feindlichen Thiere, Ratten, Mäuse, Grillen, Enger-

linge, Frösche, Tausendfüße ꝛc. und empfahl dagegen, namentlich gegen den in großer Anzahl bei den Erdbeeren sich einfindenden Tausendfuß, ein Aufrechtstehen der Frucht, welches durch zwischen die Büsche zu legende Besenreiser am besten zu erwirken sei. Rücksichtlich der Vermehrung setzte Kunstgärtner Enger hinzu, daß man rings um die Pflanzen kleine Töpfe zu versenken und die Ranke am zweiten Knoten mit ihren Häkchen darauf zu befestigen habe; werden die Ballen im August eingesetzt, so liefern die Pflanzen schon im ersten Jahre Frucht; wo nicht zu steriler Boden, bedürfe es nicht des Umgrabens im Herbste, statt dessen vielmehr des Compostes oder gut verrotteten Düngers; das öftere Lockern verursache den Pflanzen zu viele Störung, auch müßten die Beete nicht älter als 3 Jahre werden, gegen welche letztere Vorschrift Tönnies sich erhob und anführte, daß, wenn die Pflanzen zu hoch geworden, der Boden zu erhöhen sei. Bezüglich richtiger Einpflanzung bemerkte Registrator Söchting, daß die Wurzeln der Erdbeere speichenartig in die Erde zu bringen seien.

Nachdem sodann noch Gartenmeister Heicke den Verein ersucht hatte, bei einem etwaigen ferneren Tagen außerhalb Hildesheims sich Bantelns wieder erinnern zu wollen, schloß der Präsident die Versammlung, deren Mitglieder darauf den herrlichen gräflich Benningsen'schen Garten besuchten.

Wir möchten unsrerseits den Verein ersuchen, seine Wanderversammlungen öfter eintreten zu lassen; der Nutzen derselben liegt zu sehr auf flacher Hand, als daß es in dieser Beziehung noch einer Ausführung bedürfte.

Programm der Herbst-Ausstellung von Gemüsen, Obst und Blumen des Hannoverschen Gartenbau-Vereins.

§ 1. Die Ausstellung wird am 18. September d. J. Morgens 11 Uhr beginnen und am 19., 20. und 21. desselben Monats von Morgens 9 bis Abends 6 Uhr im Schauspielhaussaale des Rheinischen Hofes hieselbst stattfinden.

§ 2. Jeder, er sei Mitglied des Vereins oder nicht, hat das Recht mit geeigneten Gartenproducten aller Art, so wie mit schön gearbeiteten oder neuerfundenen Gartengeräthschaften und Ornamenten die Ausstellung zu beschicken.

§ 3. Die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände müssen bei einem der unterzeichneten Vorstandsmitglieder wenigstens drei Tage vor der Eröffnung der Ausstellung schriftlich angemeldet werden und am Tage vor derselben, also spätestens am 17. September bis 12 Uhr Mittags, im Ausstellungslocale mit deutlichen Etiketten versehen, auch mit einem genauen Verzeichnisse der verschiedenen Species oder sonstigen Gegenstände, sowie der Namensunterschrift und Angabe des Wohnorts des Einsenders eingeliefert und die verkäuflichen Sachen mit den festen Verkaufspreisen bezeichnet sein.

Daneben haben die außerhalb Hildesheim wohnenden Aussteller zu bemerken, ob und welche Vergütung von Transportkosten sie verlangen; unterbleibt dieses, so wird angenommen, daß sie darauf verzichten. Verkäufliche Sachen sind kostenfrei einzuliefern und zurückzunehmen.

§ 4. Die Empfangnahme der eingehenden Gegenstände, sowie das Arrangement der Ausstellung, leitet der Vorstand.

§ 5. Ausgezeichnete und vom Aussteller selbst cultivirte oder angefertigte Gegenstände werden vom Vereine durch Diplome in drei Classen prämiirt und zwar:

1. für Gemüse,
2. für Obst und Obstbäume,
3. für Blumen und Pflanzen,
4. für Gartengeräthe und Ornamente.

§ 6. Prämien können sowohl Nichtmitgliedern als Mitgliedern des Vereins zu Theil werden.

§ 7. Das Preisgericht besteht aus drei befähigten Männern; ihre Ernennung geschieht so, daß der Vorstand sechs solcher Männer der Generalversammlung des Vereins vorschlägt und diese von denselben drei wählt.

§ 8. An den Tagen der Ausstellung tragen die Vorstandsmitglieder ein rothes, die übrigen Vereinsmitglieder ein grünes Band, als Zeichen der Mitgliedschaft.

§ 9. Jeder, die Ausstellung Besuchende, welcher nicht Mitglied des Vereins ist, zahlt beim Eintritt in dieselbe 2½ Ngr. Sämmtliche Vereinsmitglieder, sowie jeder Aussteller, haben — jedoch nur für ihre Person — freien Zutritt.

§ 10. Vor der Beendigung der Schaustellung dürfen die zur Ausstellung eingesandten Sachen, verkaufte oder nichtverkaufte, nicht zurückgenommen werden. Dieselben sind aber am Tage nach geschlossener Ausstellung bis Mittags 12 Uhr abzufordern.

§ 11. Am Schlusse der Ausstellung, den 21. September Nachmittags 2 Uhr, findet eine Verloosung von den auf derselben vorhandenen Blumen u. s. w. statt, zu welcher Loose, à 6 Ngr., bei den Vorstandsmitgliedern, sowie am Eingange der Ausstellung zu haben sind.

Hildesheim, den 31. Juli 1859.

Der Vorstand des Hannoverschen Gartenbau-Vereins.

Helmboldt, Dr. (Präsident), Obergerichtsanwalt. — Enger (Vicepräsident), Kunstgärtner.

F. Schweckendieck (Rechnungsführer), Fabrikant. — Butterbrodt (Secretär), Wegbauaufseher.

F. Marheinecke, Kunst- u. Handelsg. — F. Sperling, Kunst- u. Handelsg. — Chr. Brehme, Lederfabrikant. — G. Thormeyer, Fabrikant.

Beisitzer.

Eldena. Zur Feier der 15. Jahres-Versammlung des Gartenbau-Vereins für Neuvorpommern und Rügen am 12. September findet in Eldena eine Ausstellung von Erzeugnissen des Gartenbaues in mäßigem Umfange statt und hat der Vorstand nachstehendes Programm für die Prämirungen festgestellt und veröffentlicht.

I.

No. 1. Für die beste Sammlung der neuern und empfehlenswerthesten Knollengewächse, wie Kartoffeln, Körbelrüben, Dioscorea Batatas, Convolvulus Batatas u. s. w. 3 ℛ.

No. 2. Für die schönsten und preiswürdigsten Kohlsorten, und zwar: weißer, rother, Zuckerhut- und Wirsingkopfkohl in je 2 Exemplaren 3 ₰.

No. 3. Für die beste Sammlung von Mohrrüben und Speiserüben 2 ₰.

No. 4. Für die beste Sammlung von Kohlrüben (Wrucken) und Runkelrüben 2 ₰.

No. 5. Für die werthvollste und reichhaltigste Sammlung gangbarer Gemüse, wie z. B. Blumenkohl, Sellerie, Erbsen und Bohnen (im grünen Zustande), Salat, Porree u. s. w. 4 ₰.

No. 6. Für das beste Sortiment Gurken 2 ₰.

No. 7. Für zwei der besten Melonen 2 ₰.

No. 8. Für die schwerste und schönste Ananas 2 ₰.

No. 9. Für das werthvollste Sortiment verschiedener Obstsorten 3 ₰.

No. 10. Für das zweitbeste Obstsortiment 2 ₰.

II.

No. 11. Für die geschmackvollste Zusammenstellung einer Gruppe blühender und nicht blühender vorzüglich gut kultivirter Topfpflanzen 5 ₰.

No. 12. Für die schönste Zusammenstellung von Fuchsien, Verbenen, Petunien u. s. w 3 ₰.

No. 13. Für die reichhaltigste Sammlung abgeschnittener Herbstblumen, besonders Astern und Georginen 3 ₰.

No. 14. Für sechs Stück der im besten Kulturzustande befindlichen Coniferen 3 ₰.

No. 15. Für sechs Stück der besten Schaupflanzen 3 ₰.

No. 16. Für das geschmackvollste leichtgebundene Vasenbouquet 1 ₰.

No. 17. Für den bestarrangirten Fruchtkorb 1 ₰.

No. 18. Zur Verfügung der Preisrichter 6 ₰.

Bedingungen.

a. Nur Vereinsmitglieder werden zur Concurrenz zugelassen.

b. Das Arrangement der eingelieferten Gegenstände, welches jeder Aussteller selbst zu übernehmen hat, muß bis 9 Uhr Vormittags am Ausstellungstage bewerkstelligt sein. Die Zulässigkeit der Aufstellung späterer Einlieferungen ist von den Festordnern, resp. dem Vorstande abhängig.

c. Die Transportkosten trägt jeder Aussteller selbst.

d. Jede Einlieferung muß von einem specificirten Verzeichnisse der auszustellenden Gegenstände, mit Namensunterschrift und Wohnort des Ausstellers versehn, begleitet sein. Auch ist auf dieser Liste denjenigen Pflanzen der Preis beizufügen, welche für die beabsichtigte Verloosung käuflich überlassen werden sollen.

e. Alle eingelieferten Producte, Pflanzen, Geräthe u. s. w. müssen sauber geputzt und etiquettirt sein und wird bei der Prämirung auf Erfüllung dieser Bedingung besonders mit Rücksicht genommen werden.

f. Die Ertheilung der Prämien für die ausgestellten Gegenstände bleibt lediglich der Entscheidung der Preisrichter, welche vom Vorstande

ernannt werden, überlassen: etwa ausfallende Prämien werden den Preisrichtern zur Verfügung gestellt.

Eldena, den 6. Juli 1859.

(gez.) Foerstner. Macks. C. Ott. Rohde. Sturm. Zarnack.

Das vorstehende Programm der Prämien wird hier mit genehmigt, und der regen Theilnahme der Mitglieder bestens empfohlen.

Der Vorstand des Gartenbau-Vereins für Neuvorpommern und Rügen.

(gez.) Graf v. Krassow. G. A. Wollenburg, Pastor. Rohde. C. Ott. Zarnack.

London. Die Gartenbau-Gesellschaft in London hielt am 20. Juli eine besondere General-Versammlung ab, in der es nach langen Debatten zum Beschluß kam, daß von der Gesellschaft wieder ein eigener Garten in Kensington Gore in London angelegt und zu horticulturistischen Zwecken benutzt werden soll. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Gesellschaft dadurch wieder eine große Kraft erhält und dies um so mehr, da dieser Beschluß von einer sehr großen Anzahl der reichsten und angesehensten Mitglieder befürwortet und durch Zeichnungen bedeutender Summen unterstützt wurde.

In Kensington Gore, auf welchem Platze der neu anzulegende Garten errichtet werden soll, wird einen Flächenraum von 22⅝ Acres (engl. Morgen) erhalten und somit noch um mehrere Acres größer sein als der berühmte Regent's Park, der einen Flächenraum von 18¾ Acres hat.

Die Subscription zur Erlangung der erforderlichen Geldmittel hatte bis zum 6. August bereits die Summe von 23,000 Pfund St. ergeben. Es fehlt jedoch noch ein bedeutendes Sümmchen, um die erforderlichen 100,000 Pfd. aufzubringen. Die Königin hat 1000 Pfd., der Prinz Gemahl 500 Pfd. und die Prinzeß Friedrich Wilhelm von Preußen ebenfalls 500 Pfund gezeichnet.

Correspondenz.

Clianthus Dampieri.

Dem Redacteur der Hamburger Gartenzeitung.

Greenock-Creek, Tanunda, Süd-Australien, den 16. Juni 1859.

Ihr liebes Schreiben ꝛc. vom 16. April erhielt ich in der unglaublich kurzen Zeit von 51 Tagen und beeile mich, mit dieser Monatspost Ihnen vorläufigen Dank auszusprechen, so wie Ihnen eine Prise Samen von der unstreitig seltsamsten, wenn vielleicht nicht schönsten Leguminose Süd-Australiens beizulegen. Die Pflanze ist Clianthus Dampieri, vom Capitain Stuart auf einer seiner Entdeckungstouren im Norden unserer

Colonie gefunden, verschiedenen Personen zwar als Samen mitgetheilt, aber bis vorletztes Jahr ohne rechten Erfolg für die Gartenkultur geblieben. Sobald es indeß gelang, die Pflanze unsern Gärten einzubürgern, hat sie schnell vielseitig Eingang gefunden, und wohl kein Garten von einiger Bedeutung schließt den Besitz derselben aus, dessen sich selbst der von Kew nicht schämen dürfte. (Sie ist daselbst längst vorhanden. Die Redact.) *)

Clianthus Dampieri (Stuart Pie) ist, wie erwähnt, eine Leguminose, bis jetzt annuell (?), wie Kennedya prostrata auf dem Boden kriechend, erhält durch einen weichhaarigen Ueberzug seiner unpaarig gefiederten Blätter und Axen ein hellgraugrünes Ansehen, trägt an 5—6 Zoll aus den Blattwinkeln entspringenden Stielen 2 bis seltener 4 ponceau-rothe Blüthen, deren Fahne zum auffallendsten Contrast mit einem ½ Zoll großen, dunkelpurpurnen, wachsglänzenden, hervortretenden Fleck am Grunde geschmückt ist. Ueberhaupt macht die Pflanze durch die Vereinigung dreier so abstechender Farben einen leuchtenden Effekt. Unzählige Blüthen sah ich indessen im letzten Sommer unbefruchtet abfallen (will indessen aus Mangel mehrjähriger Erfahrung ungesagt lassen, ob in Folge lang anhaltender Dürre). — Die Frucht ist eine schlauchige, schnablig-spitz zugehende Hülse, deren Samen wahrscheinlich wechselweise an den innern Wänden leicht angeheftet sitzen, obgleich ich an den von mir geöffneten Hülsen stets die Samen frei umherliegend vorgefunden habe.

Die Kultur dieser Pflanze für Norddeutschland möchte folgende sein. Da die meisten unserer Leguminosen sehr empfindlich gegen Verletzung ihrer Wurzeln sind, so wäre die Aussaat der Samen möglichst einzeln in kleine Töpfe anzurathen, um sie mit unversehrtem Ballen nach Erforderniß weiter zu verpflanzen. Die Erde möchte eine nahrhafte, mit fast kiesgrobem Sand durchmischte Lauberde sein, im Verhältniß von drei zu zwei Theilen, ferner für Wasserabzug gut gesorgt sein. Die so gefüllten und besäeten Töpfe dürfte am besten ein nicht zu warmes Mistbeet Ende März oder Anfang April aufnehmen, dessen feuchte Luft aber der behaarten Textur der Pflanze leicht Fäulniß zuziehen könnte, sonach so häufig als thunlich durch trockene Luft von außen her ausgeglichen werden muß. Eben so wenig möchte die Stuart Pie Kältegrade ertragen. Sowie die Stengel kriechender Pflanzen auf dem Boden und die Wurzeln entsprechend dieser Natur unter demselben sich möglichst auszubreiten suchen, so möchte ein Auspflanzen in's freie Land, das mäßig feucht und nahrhaft, dabei grobsandig ist und den freien Genuß der Sonne gewährt, das Rathsamste sein. Um indeß sicherer Samen zu gewinnen, sollte man einige Pflanzen in Töpfen lassen und diese in einem temperirten Gewächshause behandeln.

---

*) Clianthus Dampieri ist bereits vor ein Paar Jahren in England eingeführt und auch schon in den meisten Gärten auf dem Continent zu finden. Im März 1858 blühte diese Pflanze zuerst bei den Herren Veitch in Exeter und wurde sie im Bot. Mag. tab. 5051 abgebildet (siehe Hamburg. Gartenztg. XIV, p. 318). Es ist unstreitig eine sehr empfehlenswerthe Pflanze. Im Herbste 1858 erhielten wir durch die Güte des Herrn Dr. F. Müller in Melbourne Samen derselben, der ausgesäet auch bald keimte, jedoch gingen im Winter die sehr kleinen Pflanzen wieder zu Grunde. Die Redact.

Diese hübsche Pflanze aus Stecklingen zu vermehren, habe ich bis jetzt einerseits aus Ermangelung eines geeigneten Raumes dazu unterlassen, wie ich andererseits das zu Grunde Gehen derselben im freien Lande, unsern schweren, kalten Winterschauern und leichten Fröſten nur zu sehr zuschreibe. Dies Wenige vorläufig über die Stuart Pie, und will ich nur wünschen, daß es Ihnen gelingen möge, aus den beifolgenden Samen recht viele Pflanzen zu erziehen.

Eine andere nennenswerthe Pflanze, die vielleicht noch nicht beschrieben, eben so wenig der Gartenkultur zugegangen, jedenfalls aber derselben werth ist, ist eine Compositee, wenn ich recht bin, aus der Gruppe der Senecioideen. Dieselbe entdeckte eine mir befreundete Dame, die Frau des Pastors Dr. Mücke in Tanunda an einem Hügelgelände unweit dieser Ortschaft und verehrte sie mir ein Exemplar davon. Ehe ich auf die nähere Beschreibung der Pflanze eingehe, kann ich nicht unterlassen zu bemerken, daß weit und breit kein zweites Exemplar, so viel ich nach allen Richtungen darnach suchte, aufzufinden war. Ohne darüber zum Phantast zu werden, muß ich gestehen, scheint es mir, als habe ein freundlicher Stern die große Liebe für Blumen der genannten Dame im Hinweisen auf die gewiß seltene Pflanze an einem gefährlichen, abschüssigen Standort vergelten wollen, auch scheint der Umstand für ihr seltenes, sporadisches Auftreten zu sprechen, daß von unzähligen Blüthenscheiben im letzten Sommer auch nicht eine einzige reife Samen trug. Die Pflanze ist perennirend, vollständig holzig, übersteigt kaum die Höhe von 3—4 Fuß, indem sie sich bald breit legt und die dann nach Licht strebenden Aeste so die negative Höhe bezeichnen. Das bis jetzt nur uns einzig bekannte Exemplar möchte wohl 20—25 Quadratfuß bedecken. — Das ganzrandige, zuweilen großwellig-auf- und abgebogene harte Blatt ist elliptisch-oval, bis 4 Zoll lang, dunkelgrün, stark glänzend, auf der Unterseite weich flaumig, fast silbergrau, behaart. Die bis 5 Zoll langen, weich behaarten, aus den Blattwinkeln entspringenden Blüthenstiele tragen nur eine Blume, die die Pflanze eher für eine Cynara halten läßt. Die Randblumen sind lang-gezüngelt, rein weiß; die Scheibenblumen krongelb. Der Effekt als wilde Pflanze ist verlockend genug, sie der Gartenpflege zu empfehlen.

Mehrere Wochen nach der freundlichen Mittheilung der Pflanze besuchte ich den mir genau bezeichneten Standort, um möglichst früh Samenernte zu halten; diese und jene Blüthenscheibe deutete auch das Reifen der Samen durch das Ausbreiten des Pappus und die veränderte Farbe an, allein die untersuchten Samen waren taub und ein zu drei verschiedenen Malen wiederholter Versuch war ebenfalls vergebens. (Ich werfe wenige derselben zu Ihrer eigenen Ueberzeugung bei, mit der Versicherung, daß ich mir alle mögliche Mühe geben werde, die Pflanze den Gärten zuzuführen.) Eine nähere Untersuchung unter 22maliger Vergrößerung zeigte die Pappusdrüsen, oder wenn Sie anders wollen, den aus ihnen zusammengesetzten Rand sehr ausgebildet, vielleicht auf Kosten der fehlgeschlagenen Befruchtung. Das Amphispermium vollständig glatt, ohne eine Spur von Befruchtung zu verrathen. Indem ich aber sonst die Staubbeutel vollkernig, sowie die lang-zweitheilige Narbe mit Härchen besetzt zur Befruchtung recht geeignet fand, kam ich auf den Schluß, der Unfruchtbarkeit der Pflanze und ihrem etwaigen Ent-

stehen nach der „ratio equivoca“ noch keinen Glauben beimessen zu müssen und einstweilen mich mit den ungünstigen Witterungsverhältnissen des letzten Sommers zu trösten.

Sollte Ihnen nach dieser leidlich genauen Beschreibung die Pflanze (vielleicht von Dr. Preiß oder Dr. Behr von anderen Orten oder unter günstigeren Verhältnissen gesammelt und eingeschickt) zu Gesicht kommen, so würden Sie durch baldige Mittheilung darüber sicherlich verbinden

Ihren ꝛc.

W. L. Homeyer.

Nachrichten über die Reisenden Appun und Horn.

Bezugnehmend auf unsere Notiz über die Reisenden Herren C. F. Appun und Horn im 5. Hefte S. 237 der Gartenztg. lassen wir hier den Auszug eines Briefes folgen, den Herr Buchhändler C. F. Appun in Bunzlau von seinem Sohne erhalten hat. Obwohl Herr Appun nun jetzt noch mit Verzeichnissen und Preisen nicht aufwarten kann, so würden ihm doch recht baldige Aufträge mit möglichster Angabe der Quantität und der etwa anzulegenden Kaufsumme im voraus sehr angenehm sein, damit Herr A. bei Ankunft der Sachen sofort jeden Auftrag nach bester Auswahl ausführen kann. Die Redact.

Ciudad Bolivar in Venezuela am 27. Juni 1859.

Unterm 26. März trat ich in Begleitung des Photograph Zeiler auf einem gemietheten Boote meine Reise nach dem Delta des Orinocco oder, wie man es hier nennt, nach den Canjos, den verschiedenen Verzweigungen der Orinocco-Mündungen, an, wo wir namentlich die entlegenen Canjos, die von Barima nach dem Essequibo gehen, besuchten. Diese Tour hat in Bezug auf Sämereien, besonders sehr seltener, noch wenig oder gar nicht bekannter, Palmensamen, ein lohnendes Resultat geliefert, weniger jedoch in Bezug auf Orchideen und lebende Pflanzen. Der Reichthum an Orchideen findet sich mehr den Orinocco aufwärts von Caicara und San Fernando de Apure; die in den Canjos liegenden Inseln bieten fast gar keine Orchideen dar; hier sind nur Palmen und große Waldbäume ohne Parasiten. Von hier segelten wir in unserem Boote, wegen Mangel einer Kajüte der glühenden Sonne, so wie dem heftigsten Platzregen ausgesetzt, nach Puerto de tablas, von da nach dem Rio Carony, wo wir 4 Tage an dessen herrlichen, einsamen Wasserfällen verweilten und bis zur verlassenen Mission von Carony vordrangen, wo ich die meisten Orchideen fand. Sodann kehrten wir nach Puerto de tablas zurück, wo ich viele interessante Sämereien sammelte. Von da segelten wir nach Guyana la vieja, wo leider alle Vegetation von der Hitze noch vertrocknet war und wo ich nur wegen Zeiler, der die dortigen alten spanischen Kastelle photographirte, 2 Tage verweilte. Dann wandten wir uns nach dem entlegenen, unbekannten Canjo Piacoa, wo es an dem Ort Piacoa von Flüchtlingen wimmelte, die aus Furcht vor dem revolutionären General Sotillo aus der Provinz Barcelona, namentlich aus dem nahen Ort Barrancas, sich hieher gerettet hatten, so daß wir kaum etwas zu Essen bekommen konnten

und am ersten Tage unser Lager unter einem Baume, wie auf dieser Reise sehr oft, aufschlagen mußten, bis anderen Tages uns ein Kaufmann in seinem Hause aufnahm. Hier durchstreifte ich 3 Tage lang von früh bis Abend die ganze Gegend nach Pflanzen ꝛc. und fand reiche Ausbeute an einigen Orchideen und mehreren Arten Palmensamen.

Am Charfreitag früh 3 Uhr fuhren wir von hier, um uns an diesem hohen Festtage in unserer, von der Reise derangirten Toilette nicht zu präsentiren, nach dem pflanzenreichen Ort San Juan de Guacara und kamen dann Mitternacht in Santa Catalina bei dem sogenannten Könige der Guaraunos-Indianer, Namens Silva, einem Creolen, an, wo wir während der Oster-Feiertage blieben und ich täglich in Begleitung eines Guarauno weite Ausflüge in den nahen Wald machte, der mir manch schöne Pflanze, besonders eine interessante Lilienart, und Palmensamen einbrachte. Es waren hier gerade nur wenige Indianer anwesend, die meisten weiter abwärts, um Bäume zur Erbauung von Curiaras (eine Art Kähne) zu fällen; doch mußten auf Befehl des Häuptlings alle anwesenden Indianer mit Frauen und Mädchen sich photographiren lassen und uns jeden Abend ihre Tänze produciren. Von hier ging es nach der Insel Araguao, wohin wir einen Dolmetscher und eine besondere Empfehlung von Silva an die Häuptlinge der dortigen Guaraunos mitnahmen. In Araguao betraten wir zum ersten Male eine Rancheria der Guaraunos und der Eindruck war großartig und neu. An 800 Indianer, Männer, Frauen und Kinder, nur mit einem 3 Zoll breiten Guajuco bekleidet, umringten uns bei unserer Ankunft schreiend und gesticulirend, als wenn man in der Hölle wäre. Der Häuptling nahm uns überaus gut auf und ließ sich mehrfach mit vielen seiner Untergebenen photographiren, so daß wir bei diesen gutmüthigen Menschen einige Tage zubrachten. Da sie jedoch nur wenig zu Essen hatten, nur Fische oder Käferlarven, kein Fleisch genießen, so war für unsere Magen kein längeres Bleiben hier und wir segelten nach dem Indianerdorfe Zacupana, wo wir von einem Neger, der dort die Guaraunos beherrscht, aufgenommen wurden, wo aber leider auch der Mangel an Lebensmitteln fühlbar wurde und wir außer einem getrockneten Fisch nichts zur Weiterreise erhalten konnten. Um die Samen der seltenen Palme Manicaria saccifera zu erhalten, war ich hierher gekommen, jedoch erfuhr ich zu meinem Schrecken, daß diese ganz abwärts vom Orinoco bei Curiapo und Barima vorkomme, wohin ich noch 4 Tage auf dem Fluß gebrauchte. Was halfs! ich wollte durchaus den Samen haben und so gings weiter, indem wir uns noch 3 Guaraunos als Ruderer mitnahmen, da wir fortwährend Gegenwind hatten, und keine Segel setzen konnten. Diese Tour nahm an 10 Tage weg und war die mühseligste der ganzen Reise, da wir besonders ohne alle Lebensmittel, einige Tage fast ganz hungern mußten, nur Nachts beim Landen ein kleines Stück getrockneten Fisch zur Nahrung hatten. Die Früchte der Manicaria erlangte ich endlich in Menge und ich wäre gern noch weiter vorgedrungen, hätte nicht der gänzliche Mangel an Nahrungsmitteln jede weitere Reise verboten. Die Indianer, die wir antrafen, hatten selbst nichts zu Essen und waren froh, wenn sie einen Fisch fingen, den sie sofort roh oder halbroh verzehrten. Unsere 3 Guaraunos fingen auch in ihrer Sprache an über Hunger zu murren, da

wegen der eingetretenen Regenzeit und dem Anſchwellen der Flüſſe wenig oder gar kein Fleiſch zu erangeln war. Kurz und gut, wir mußten umkehren und kamen über Zacupana, Araguao, Yaya, Barancas, Guayana la vieja, Puerto de tablas nach ſchrecklich langweiliger Fahrt, da wir Strom und Wind gegen uns hatten, am erſten Juni hier in Ciudad Bolivar wieder an. Zeiler hat von der Reiſe eine Menge intereſſanter Photographien und ich eine gute botaniſche Ausbeute mitgebracht, von Palmenſamen unter andern Mauritia flexuosa, Manicaria saccifera, Astrocaryum 2 div. Species, Guilielma speciosa, Bactris cavaro und sacupanensis, Oenocarpus spec. de Orinocco, Copernica tectorum, Cucurrito u. ſ. w., alle Sämereien ſind reif, ſehr gut und friſch.

Die erſten Tage meiner Rückkehr benutzte ich, in hieſiger, durch die eingetretene Regenzeit ſehr ſchön und blühend gewordenen Umgegend eifrig Pflanzen ꝛc. zu ſammeln, und alles bisher Erlangte einzupacken und ſofort nach Deutſchland abzuſenden; da aber machten ſich die Nachwehen der Reiſe ſo gewaltig auf meinen Körper geltend, daß ich von einem ſehr gefährlichen gaſtriſch-nervöſen Fieber ſo ſtark heimgeſucht wurde, daß mich die Aerzte aufgaben. Am erſten Pfingſttag Nachmittag lag ich ganz allein, da die Wärterin eben ausgegangen, im heftigſten Fieberparoxismus und wähnte, es wollten Leute mich mißhandeln und tödten; letzteres wollte ich daher lieber ſelbſt thun, ſprang vom Lager und trank, eh' man mich hindern konnte, ein Glas Schwefelſäure und anderes Gift hinunter, ſo daß ich mich innerlich total verbrannte; herbeigeeilte Aerzte wandten ſogleich Gegenmittel an und es gelang ihrem eifrigſten Beſtreben, mich dem gewiſſen Tode zu entreißen und inſoweit herzuſtellen, daß ich ſeit geſtern wieder Speiſen genießen und mit dem Verpacken der Pflanzen ꝛc. vorgehen kann; nur meine Stimme iſt noch ſehr leiſe. Somit wird meine Sendung, um ſo viel verſpätet, nun über New-York nach Hamburg binnen 14 Tagen abgehen und ich mit nächſtem Poſtſchiff Verzeichniß und Berechnung folgen laſſen.

C. F. Appun.

Sansſoucis Gärten.

Potsdam, den 10. Auguſt 1859.

Geht man durch Sansſouci's Park-Anlagen, namentlich durch die Pflanzungen in der Nähe des Orangeriehauſes, wo doch für die genügende Bewäſſerung das Möglichſte gethan wird, dann möchte man glauben, mitten im October ſtatt im Auguſt zu ſein, ſo gelb iſt die mannigfache Belaubung, ſo dürr und abfallend ſind die Blätter dort überall. Weit trauriger aber noch ſieht es in den weitläufigen Anlagen des königl. Neuengartens, der Pfaueninſel, ſo wie in allen hochgelegenen Terrainflächen der königl. Gärten aus, wo die Ueberrieſelung und Bewäſſerung aus den Reſervoirs der königl. Dampfmaſchinen nicht hinreichen.

Prächtiger und friſcher dagegen hat ſich der Sicilianiſche Garten mit ſeinen ſchönen Tropen-Gewächſen, ſeinen koſtbaren Palmen und Araucarien, ſeinen prächtigen immergrünen Gehölzen, namentlich Coniferen, Ligustrum nepalense, Arbutus Unedo und Andrachne, den ausgezeichneten hohen Lorbeerbäumen, Prunus Lauro-Corasus, Evonymus,

Ilex-Arten erhalten lassen, woneben auch die Blumen aller Art, der niederwärts in den Beeten gezogene Epheu und die Farrn, Saxifraga decipiens und andere Arten, die prächtige buntblättrige Vinca minor herrlich prangen. Am schönsten nimmt sich gegenwärtig die Fülle wechselnd stehender, reichblühender Oleander- und Granatbäume aus, die dort niemals so zahlreich das Auge ergötzten.

In ebenso reicher Vegetation befindet sich der Marly-Garten bei der Friedenskirche zu Sanssouci, wo täglich reichlich gespritzt wird. Die dortigen Anlagen haben sich seit Jahr und Tag so köstlich entfaltet, daß man fast nichts Schöneres sehen kann. Außer den mannigfaltigsten Blumen sind dort auch die schönsten Blattpflanzen vertreten; die Gehölze, wenigstens die an den Hauptwegen gepflanzten, gehören meist den neueren seltenen Sorten an, so blüht zur Zeit jetzt ein 16′ hohes Exemplar der Koelreuteria paniculata. Am schönsten ist jederzeit die kleine Anhöhe, auf welcher die in Marmor gehauene Figur der Göttin „Flora“ steht, mit den mannigfaltigsten Blumen bestellt, an der dort befindlichen Bank wird häufig von den Allerhöchsten Herrschaften der Thee eingenommen.

Im Sicilianischen Garten lenkt auch noch und zwar vor der Mitte der großen Marmorwand, die gegen die Chaussee hin den Garten begrenzt, eine schöne plastische Gruppe die Aufmerksamkeit auf sich, die länger schon hier in der Bildergallerie und zuletzt im unteren Saale des Belvederes beim Drachenhause stand. Es ist das gediegene Bildwerk von Franz, welches einen Schäfer liegend darstellt, der einen ihn am rechten Arme erfassenden Panther unter Beistand seines Hundes von sich abwehrt und erwürgt, in Zink gegossen von Geiß und im Winkelmannschen Institute galvano-plastisch bronzirt. Mit den gleich dahinter befindlichen Statuen und Thiergruppen, wie mit den oben auf der Marmor-Balüstrade neben der Fontaine noch zu erwartenden Werken der Plastik, mit denen Prof. Franz bereits länger beschäftigt ist, wird sich jener neue Schmuck des Gartens zu einem reichen Gesammtbilde vereinen. Inzwischen hat sich auch die hinterwärts gelegene offene Halle des Orangeriehauses, die unmittelbar sich zwischen den königl. Wohngemächern befindet, mit Skulpturen gefüllt, darunter „Paris, der einen Bogen putzt“, von Wredow in übermenschlicher Größe ausgeführt, und auch diese sind aus jenem reichen Vorrathe in der Bilder-Gallerie entnommen, der noch so Vieles zur weiteren Ausschmückung der königl. Gärten und Schlösser enthält. Zu ihm gehörte auch der jetzt hinter der Halle auf hohem Postamente stehende kolossale Kopf der „Juno Ludovisi“, dann der vorn befindliche kolossale Kopf eines bärtigen Alten, der als ein Jupiter gelten mag, so wie die nahe dabei auf den Ecken der sandsteinernen Balustrade aufgestellte Victoria, welche von Fischer nach der Antike gegossen wurde, und die sitzende Victoria von Rauch. Bei dem in Angriff genommenen östlichen Flügelbau des Orangeriehauses ist nunmehr das Mauerwerk des Hauptgeschosses so gut wie vollendet und die 24 toskanischen Säulen der offenen Durchfahrt sind mit ihrem Gebälk aufgerichtet. — Noch verdient im westlichen Flügel des Orangeriehauses eine dort vorläufig ausgelegte große Mosaik Beachtung, die, von Giustiniani und Sohn in Neapel gefertigt, eine Schlachtscene darstellt und aus gegen 800 etwa einen Quadratfuß

großen Platten besteht. Auch sie befand sich schon längere Zeit hier im Corridor der Bildergallerie und dürfte durch Sr. Maj. den König nun ihre weitere Bestimmung erhalten sollen.

(Nach einer Bestimmung Sr. Majestät des Königs wird dieselbe als Fußboden in einem der Badezimmer der römischen Bäder auf Charlottenhof verwendet werden.) H. M.

Garten-Notizen.

Die Baumschulen der Herren J. H. Ohlendorff & Söhne.

Als wir im letzten Frühjahre die Gärtnerei der Herren Ohlendorff in Ham besuchten, war es noch zu früh im Jahre, um etwas in den Baumschulen sehen zu können und wir beschränkten uns damals nur auf die Besichtigung der mit so vielen schönen und seltenen Pflanzen angefüllten Gewächshäuser (vergl. Hambg. Gartenztg. 4. Heft, p. 179). Wie wir früher erwähnten, haben die thätigen und umsichtigen Besitzer erst vor etwa zwei Jahren ihre Baumschulen durch Erwerbung eines sehr bedeutend großen Stück Landes vergrößert und waren wir bei unserm letzten Besuche nicht wenig erstaunt, diese neu angelegten Baumschulen auf das Vortheilhafteste mit den gangbarsten Bäumen und Gesträuchen in sehr großen Quantitäten angepflanzt zu sehen, von denen viele Arten schon zu einer bedeutenden Stärke herangewachsen sind. Die jungen Obstbäume, sowohl von Kern- als Steinobst, stehen ganz vorzüglich, nicht minder die verschiedenen Zierbäume, als eine große Auswahl von Robinia, Ulmus, Tilia, Fraxinus, Quercus, Liriodendron tulipifera, Magnolia, Carya, wie die verschiedenartigsten Ziersträucher. Ganz besonders hervorzuheben ist aber die ungemein große Quantität von den verschiedensten im Freien aushaltenden Coniferen, namentlich von Picea cephalonica, balsamea, cilicica, Pichta, Pinsapo, diverse Juniperus, Retinospora ericoides, Taxus, Thuja, Chamaecyparis nutcaensis (Thujopsis borealis), Ch. glauca und viele andere. Gleich schön und in starker Vermehrung sind die Coniferen, die bei uns nicht im Freien aushalten und in Töpfen gehalten werden müssen, ebenso die Ilex, von denen die Herren Ohlendorff ein sehr reiches Sortiment besitzen. Als sehr bemerkenswerth müssen wir noch erwähnen ein sehr reiches Sortiment der Paeonia herbacea und der P. arborea, von letzteren über 50 Sorten, die ganz ausgezeichnet sein sollen. Rosen, sowohl hochstämmige als wurzelächte, sind in vielen Tausenden vorräthig, ferner eine Auswahl der verschiedensten Schlingpflanzen für's freie Land und Trauerbäume jeglicher Art.

Was Fleiß und Thätigkeit, verbunden mit Umsicht und Fachkenntniß in kurzer Zeit zu leisten im Stande sind, beweist diese Gärtnerei recht deutlich, die seit den letzten zwei Jahren einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen hat. Mögen die vielen Mühewaltungen und Kostenaufwände durch recht reichlichen Absatz belohnt werden.

E. O—v.

Der Flottbecker Park.

Die Gewächshäuser der Frau Senatorin Jenisch im Park zu Flottbeck zeichnen sich bekanntlich fortwährend durch einen reichen Blumenflor aus und immer ist es etwas, was die besondere Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich lenkt, entweder sind es die Camellien, Azaleen, Cinerarien, Pelargonien und Calceolarien neben den zu jeder Jahreszeit so zahlreich blühenden herrlichen Orchideen, von denen wieder bei unserm neulichen Besuche, zu Anfang August, prächtige Pflanzen in Blüthe standen, die wir jedoch diesmal unerwähnt lassen wollen, indem sie schon zu öfterem von uns genannt worden sind, nur das Oncidium Limmingii darf nicht unerwähnt bleiben, das freilich nicht in Blüthe stand, doch als eine sehr seltene und hübsche Art zu empfehlen ist. Ganz besonders zu bemerken sind diesmal die Fuchsien, die wir hier in sehr schönen Sorten und in vorzüglicher Kultur fanden. Ganz ausnehmend schön nahm sich eine Anzahl Ampeln aus, die in einer Veranda hingen und mit Fuchsien bewachsen waren. Es dürfte sich so leicht keine andere Pflanze finden, die sich so gut wie die Fuchsie zur Bekleidung von Ampeln eignete. Die von den Ampeln herabhängenden Zweige mit den vielen Blumen gewähren einen äußerst gefälligen, lieblichen Anblick und möchten wir diese Pflanze zur dergleichen Verwendung besonders empfehlen.

Eine andere Pflanze, die hinsichtlich ihrer großen stattlichen Blätter zu den empfehlenswerthesten Blattpflanzen gehört, ist die Laportea crenulata. Die Blätter des im Warmhause stehenden, etwa 5—6 Fuß hohen Exemplares sind gegen 5 Fuß lang und an der breitesten Stelle einen guten halben Fuß breit, ähnlich denen der so berühmten Theophrasta imperialis, jedoch von einer weicheren Consistenz. Die Laportea gehört zu den Urticeae, ist daher auch von schnellerem Wuchs und läßt sie sich wahrscheinlich auch leicht vermehren.

Von der beliebten, hübschen Sonerilla margaritacea besitzt Herr Kramer jetzt drei Varietäten, nämlich S. marg. superba, alba und splendens, die, obgleich unter einander nur wenig verschieden, zu empfehlen sind. E. O—o.

Kew-Garten.

Im 7. Hefte dieses Jahrganges der Hambg. Gartenztg. wurde in einem Berichte über den Königl. Garten zu Kew das Bedauern ausgesprochen, daß die Räumlichkeiten für die Unterbringung und Conservirung der großen Araucarien, Eucalyptus, Acacien und anderer Gewächse für's Kalthaus höchst mangelhaft sind, und jedenfalls ein neues geräumiges Haus erbaut werden muß, wenn diese Prachtgewächse nicht zu Grunde gehen sollen. Nach dem Gard. Chronicle hat die Regierung dem Königl. Garten die erforderlichen Fonds zur Erbauung eines solchen Hauses bewilligt. Welche Form dieses Gewächshaus erhalten wird, ist noch nicht ganz bestimmt, nur so viel weiß man aus dem Grundriß, daß das Haus aus drei Parallelogrammen, durchschnitten von zwei Octagonen, bestehen wird. Von letzteren wird jedes 50 Fuß im Durchmesser halten. Das Mittel-Parallelogramm soll 212 Fuß lang und

137 Fuß breit werden, die beiden anderen jedes 112 Fuß lang und 62 Fuß breit, somit erhält das ganze Haus eine Länge von 536 Fuß. Der Platz, auf dem dieses Haus zu stehen kommt, liegt zwischen dem großen Palmhause und der Pagoda. — In kurzer Zeit wird demnach der Garten zu Kew wiederum eine neue Zierde erhalten, die diesem großen National-Etablissement würdig ist.

Nachtrag zu der Abhandlung:

Ueber die Gattung Pentstemon.

von F. W. Klatt.

(Pag. 386—394.)

Herr Professor Lehmann, dem ich obige Abhandlung mittheilte, hatte die Güte, mir einige Arten dieser Gattung bekannt zu machen, welche Herr Professor John Torrey in den Explorations and surveys for a railroad route from the Mississippi river to the Pacific Ocean bekannt gemacht und von denen er auch zwei abgebildet hat. Obwohl diese Arten sich noch nicht in den Gärten befinden dürften, so führe ich sie dennoch hier mit auf, da sie eben ganz neu und noch nirgends bemerkt sind. Es sind folgende Arten:

1. Pentstemon Fendleri Torrey. Fendler'scher Fünffaden. Abgebildet Plate V. Es ist dieses eine Art, die sich P. nitidus nähert. Sie hat lederartige, ganze Blätter. Die Wurzelblätter sind eiförmig oder verkehrt eiförmig, die Stengelblätter länglich oder eiförmig, sitzend. Die blauen oder purpurfarbigen Blüthen bilden aufrechte, unterbrochene Rispen. Die Kelcheinschnitte sind eiförmig und haben häutige Ränder. Der unfruchtbare Staubfaden ist verbreitert und an der Spitze dicht gebartet. Diese Art wurde auf der Pecas und Llano Estacado gefunden.

2. Pentstemon microphyllus Torrey. Kleinblättriger Fünffaden. Diese Art ist strauchartig und sehr ästig. Die Blätter sitzen gebüschelt, zu 3—7, an den Zweigen und am Stamme, an sehr kurzen Blattstielen; sie sind verkehrt eiförmig oder eiförmig, stumpf, häutig und ganzrandig. Die Blüthentrauben bilden zusammen eine Rispe. Die Kelchspitzen sind länglich-eiförmig. Die Pflanze, zu der Abtheilung Erianthera gehörend, wurde am Colorado entdeckt.

3. Pentstemon spectabilis Thurber. Sehenswürdiger Fünffaden. Die ganze Pflanze ist kahl. Der aufrechte, krautartige, geflügelte, 3—4 Fuß hohe Stengel hat lederartige, rundlich-scheibenförmige Blätter, die von ihm durchbohrt werden. Nur die Wurzelblätter sind gestielt, länglich oder ei-lanzettförmig, oft zugespitzt, ausgebuchtet-gezähnt. Die volle Rispe ist verlängert, ruthig, pyramidal. Die Kronen, über 1 Zoll lang, sind blau, ins purpurfarbene übergehend. Die

Kelchabſchnitte ſind rundlich-eiförmig, fleiſchig, ſtumpf oder ſpitz. Der unfruchtbare Staubfaden iſt fadenförmig, kahl. Dieſe Art, in San Francisco und Neu-Mexico gefunden, gehört zur Abtheilung Cepocosmi.

4. Pentstemon heterandrum Torrey. Andersgeſtalteter Fünffaden. Die kahle Pflanze hat einen ruthenförmigen Stamm, lanzettliche oder länglich-linealiſche, ſtumpfe, ſchwielig-gezähnte, am Grunde ſtumpfe oder faſt geöhrte Blätter. Die Riſpe iſt ährig, unterbrochen. Die faſt weiße Krone iſt oben leicht höckerig und hat 5, faſt gleiche Lappen. Die Staubfäden ſind kahl, aufrecht, von faſt gleicher Länge, alle Staubbeutel tragend oder der fünfte ohne Staubbeutel. Die Art, recht ſchön abgebildet, ward in der Sierra Nevada in Californien gefunden.

Die Diagnoſen dieſer vier neuen Arten habe ich den lieben Leſern dieſer Zeitſchrift nur darum ſo vollſtändig gegeben, weil ich ſie ſelbſt in keiner Schrift bis dahin gefunden habe und weil es doch möglich iſt, daß die eine oder die andere Art einmal in unſere Gärten gelange.

In der Ausführung der vollſtändigen Beſchreibungen iſt mir eine Art entwiſcht, die in unſerm botaniſchen Garten kultivirt wird. Ich hole dieſelbe jetzt nach und gebe dann, damit meine lieben Leſer um ſo mehr befähigt werden, ihre etwa kultivirten Arten ſchnell beſtimmen zu können, eine vergleichende überſichtliche Tabelle ſämmtlicher, bis jetzt in Gärten gezogenen Arten.

Pentstemon cordifolius Benth. Herzblättriger Fünffaden. Dieſe Art, welche im Bot. Mag. Taf. 4497 abgebildet iſt, mußte in meiner Aufzählung nach P. barbatus folgen. Der Stengel iſt kahl oder flaumig-weichhaarig. Die Blätter ſind kurz geſtielt, breit eiförmig, ganzrandig, oder ausgebuchtet-gezähnt, am Rande eingerollt. Die Riſpe iſt ſchlaff, beblättert. Die Krone iſt purpurfarbig. Die Kelchabſchnitte ſind lanzettlich-ſteif. Der unfruchtbare Staubfaden iſt dicht gebartet.

Vergleichende Ueberſicht der in Gärten kultivirten Pentstemon-Arten.

I. Kroneneinſchnitte alle rund, Antheren mit langer Wolle bedeckt, unfruchtbares Staubgefäß an der Spitze behaart. (Sect. Erianthera.)

1. Untere Blätter ſpatelförmig, obere linealiſch-lanzettlich, oft geſägt, Krone blaß purpurfarbig. P. Scouleri Dougl.

2. Alle Blätter verkehrt eiförmig oder länglich lanzettlich, ganzrandig, Kronen violett. P. Douglasii Hook.

II. Kroneneinſchnitte alle rundlich, faſt gleich; Antheren kahl oder ganz kurz behaart. (Sect. Cepocosmus.)

A. Blätter ganzrandig, Pflanzen aufrecht, kahl. (Unterabtheilung Integerrima.)

a. Unfruchtbarer Staubfaden kahl.

aa. Kelchabſchnitte nicht häutig oder mit einem Rande verſehen.

3. Wurzelblätter geſtielt, verkehrt eiförmig; Stengelblätter verbunden, ſtengelumfaſſend, Kronen fahl roth. P. Murrayanus Hook.

4. Blätter gegenſtändig, herzförmig; Kronen purpur-ſcharlachroth. P. giganteus Morren.

bb. Kelchabſchnitte am Rande mehr oder weniger häutig.

5. Wurzelblätter länglich ſpatelförmig, geſtielt; Stengelblätter lanzettförmig, ſitzend, Kronen blau. P. speciosus Dougl.

6. Wurzelblätter elliptiſch, ſpitz, geſtielt; Stengelblätter herzeiförmig, ſtengelumfaſſend, Kronen purpurroth. P. acuminatus Dougl.

7. Blätter lanzettförmig, obere ſtengelumfaſſend; Kronen violett. P. gentianoides G. Don.

8. Blätter lanzettlich, obere ſtengelumfaſſend; Kronen ſcharlachroth. P. Hartwegi Benth.

9. Blätter länglich oder ei-lanzettförmig, obere ſtengelumfaſſend; Kronen ſcharlach brennend roth. P. centranthifolius Benth.

10. Blätter eiförmig, am Grunde abgerundet, ſehr kurz geſtielt; Kronen zinnoberroth. P. miniatus Lindl.

11. Blätter unten verkehrt eiförmig-länglich, oben linealiſch, ſitzend; Kronen blau. P. Torreyi Benth.

12. Blätter unten ſpatelförmig oder länglich, oben länglich eiförmig, ſitzend; Krone tief roſaroth. P. Wrightii Hook.

b. Unfruchtbarer Staubfaden kurz behaart, Kelchabſchnitte am Rande häutig, Antheren behaart.

13. Untere Blätter verkehrt eiförmig-länglich oder ſpatelförmig, geſtielt obere lanzettlich, ſitzend; Kronen purpurroth. P. erianthera Fras.

B. Blätter alle mehr oder weniger geſägt, Pflanzen klebrig, weichhaarig. (Unterabtheilung Serratae.)

a. Kelchabſchnitte ganz.

aa. Unfruchtbarer Staubfaden an der Spitze bärtig.

14. Untere Blätter länglich, geſtielt; obere eiförmig oder lanzettlich, ſtengelumfaſſend; Kronen weiß. P. Cobaea Nutt.

bb. Unfruchtbarer Staubfaden kahl oder kaum mit einigen Borſten beſetzt.

15. Stengelblätter breit eiförmig, verbunden, ſtengelumfaſſend, Kronen bleich violett. P. perfoliatus Brong.

b. Kelchabſchnitte faſt geſägt, unfruchtbarer Staubfaden gebartet.

16. Blätter linealiſch-lanzettlich oder eiförmig-lanzettlich; Kronen dunkel purpurfarbig, violett oder roſaroth. P. campanulatus Willd.

III. Kronen 2lippig, Oberlippe 2theilig; Antheren kahl oder ſelten kurz behaart. (Sect. Eupentstemon.)

A. Der unfruchtbare Staubfaden iſt der Länge nach gebärtet.

a. Die Kelchtheile ſind nicht häutig oder gerandet.

17. Wurzelblätter eiförmig-elliptiſch, geſtielt, Stengelblätter lanzettlich, ſtengelumfaſſend; Kronen weiß oder röthlich. P. Digitalis Nutt.

18. Wurzelblätter eiförmig, geſtielt; Stengelblätter lanzettlich, ſtengelumfaſſend; Kronen blau, violett, roſaroth oder weiß. P. pubescens Soland.

19. Wurzelblätter elliptiſch-länglich; Stengelblätter linealiſch-lanzettlich, ſtengelumfaſſend; Kronen inwendig bläulich, auswendig grünlich. P. gracilis Nutt.

b. Kelchabſchnitte gerandet.

20. Wurzelblätter länglich-lanzettlich, geſtielt; Stengelblätter länglich, ſtengelumfaſſend; Kronen violett oder blau. P. procerus Dougl.

21. Blätter unten länglich, oben linealiſch-lanzettlich; Kronen ſcharlachroth. P. stationaefolius Lind.

B. Der unfruchtbare Staubfaden iſt an der Spitze gebartet.

a. Kelche unbehaart, Kelchabſchnitte am Rande häutig.

22. Untere Blätter geſtielt, verkehrt eiförmig, obere ſitzend, länglich-lanzettlich; Kronen bleich ſchwefelgelb. P. deustus Dougl.

23. Wurzelblätter ſpatelförmig-länglich, geſtielt, Stengelblätter eiförmig oder länglich lanzettlich, ſtengelumfaſſend; Kronen ſchwefelgelb. P. confertus Dougl.

24. Wurzelblätter ei-lanzettförmig, lang geſtielt; Stengelblätter breit, herzförmig, ſtengelumfaſſend; Kronen glänzend purpurroth-blau. P. ovatus Dougl.

b. Kelche behaart.

25. Untere Blätter geſtielt, eiförmig; obere ſtengelumfaſſend, ei-lanzettlich; Kronen himmelblau. P. pruinosus Dougl.

26. Untere Blätter verkehrt eiförmig, geſtielt, obere breit eiförmig, ſtengelumfaſſend; Kronen ſchwefelgelb. P. attenuatus Lindl.

IV. Die Kronen ſind tief zweilippig, die Oberlippe iſt aufrecht ausgerandet, die Unterlippe herabgebogen, tief 3theilig; Antheren kahl oder kurz behaart.

a. Unfruchtbarer Staubfaden dicht bärtig.

27. Untere Blätter länglich, obere linealiſch-lanzettlich; Kronen ſcharlachroth. P. barbatus Nutt.

28. Die Blätter kurz geſtielt, breit eiförmig; die Kronen purpurfarbig. P. cordifolius Benth.

b. Unfruchtbarer Staubfaden kahl.

29. Untere Blätter ſpatelförmig, ganz obere rundlich, alle ſitzend; Kronen ſcharlachroth. P. baccharifolius Hook.

30. Blätter alle lanzettlich; Kronen weiß-röthlich. P. breviflorus Lindl.

V. Die Kronen ſind kaum 2lippig und haben faſt gleiche Einſchnitte; die Antheren ſind kahl oder rauh; die Blätter ſind eingeſchnitten oder gezähnt.

A. Der unfruchtbare Staubfaden iſt oben bärtig.

31. Die Blätter ſind zu 3 oder 4 wirtelſtändig, ſchmal lanzettlich; die Kronen bläulich violett. P. triphyllus Dougl.

32. Die Blätter ſind unten geſtielt, oben ſitzend, eilanzettförmig; die Kronen violett. P. Richardsonii Dougl.

33. Die unteren Blätter ſind geſtielt, eiförmig oder länglich, die oberen eiherzförmig, ſtengelumfaſſend; die Kronen ſind purpurroth. P. diffusus Dougl.

B. Der unfruchtbare Staubfaden iſt kahl.

34. Die untern Blätter ſind geſtielt, linealiſch-lanzettlich oder ſpatelförmig, die oberen linealiſch; die Kronen ſind purpurroth. P. heterophyllus Lindl.

35. Die Wurzelblätter sind eiförmig; die Stengelblätter herzförmig, stengelumfassend; die Kronen blaßrosa. P. glandulosus Lindl.

C. Der unfruchtbare Staubfaden ist gewimpert.

36. Die Blätter sind eilanzettlich, die Wurzelblätter sitzend, die oberen Blätter stengelumfassend; die Kronen purpurroth. P. venustus Dougl.

Ueber die schwarze Malve.

Bezugnehmend auf den im 4 Hefte d. J. der Hamburger Gartenzeitung von Herrn Institutsgärtner Hannemann in Proskau mitgetheilten Aufsatz „die schwarze Malve" lassen wir hier noch eine uns eingesandte, in der „Pomona" bereits auch abgedruckte Notiz über diese Nutzpflanze von Herrn Prof. F. J. Dochnahl folgen. Die Redact.

Wie am Schlusse meiner Schrift: Die Kultur der schwarzen Malve gesagt ist: „Der Verfasser wird sich durch diese Veröffentlichung wohl manchen geheimen Feind erwerben," — so ist es gekommen, laut den Ausfällen des Herrn Heerdegen aus Nürnberg in dem landwirthschaftlichen Anzeiger No. 18 und in der Hamburger Gartenzeitung gegen Herrn Institutsgärtner Hannemann aus Proskau, mithin auch direct gegen mich. Warum geschah das öffentliche Auftreten nicht früher, da doch jene Schrift schon im Jahre 1856 erschienen ist?

Jetzt erst sehen die Nürnberger Handelsleute ein, daß es mit diesem Geschäfte, welches seit Jahrhunderten nur dieser Stadt eigen war, bald zu Ende geht. Und dies bezweckte meine Schrift!

Der Malvenbau hat sich sehr verbreitet und der Gebrauch der Blüthen ist bekannt geworden. Dadurch wurde zwar der Preis von 40 bis 100 fl. im Spätjahre v. J. auf 12 bis 16 fl. pr. Ctr. heruntergedrückt, gegenwärtig werden sie wieder über 20 fl. gehalten. Auch die Handelskrisis scheint, wie bei dem Tabak eingewirkt zu haben. Uebrigens lohnen die Malven dennoch mehr, als jedes andere Handelsgewächs, zudem sie in jedem Jahre gesucht werden und gleichmäßig ihren größten Ertrag liefern. Der landwirthschaftliche Verein in Bayern hat daher auch den Anbau dieser nützlichen Pflanze schon mehrere Male dringend anempfohlen.

Die Malve giebt den sichersten Bau unter allen Pflanzen! Das muß der Züchter, der Gärtner wissen, der Nürnberger Kaufmann kann oder will und braucht es nicht zu wissen. Genug, wenn die meisten Landleute in Mittelfranken den hohen, sicheren Ertrag durch ihre bedeutenden Pflanzungen beweisen.

Nicht allein Herr Heerdegen, sondern mehrere Geschäftshäuser in Nürnberg kaufen die Blüthen an, namentlich Herr J. Murschhaeuser, welcher den Ankauf sogar in öffentlichen Blättern ausgeschrieben hat. Auch in Fürth haben mehrere Häuser große Quantitäten zusammengekauft. Ich selbst habe über 20 Ctr. versendet.

Dieser Handel ist übrigens von einem gewissen Vertrauen bedingt, denn die Weinhändler wollen nicht haben, daß die Verwandlung des weißen Weines in rothen mit Malven im Publikum bekannt werde.

In England werden die Malven, laut mündlicher Mittheilung des Herrn Professors Dr. Rudolph Wagner in Würzburg, im Großen zur Bereitung der Farbe, welche man Orseille nennt und seither aus der Färberflechte gewonnen wurde, die jetzt aber immer seltener wird, verwendet. Auch sagt man hier allgemein, daß dieselbe dort dem Indigo beigesetzt werde, was aber noch nicht bewiesen ist. Viele Malven gehen auch von Nürnberg und Fürth nach Frankreich und Amerika. Selbst in die Türkei werden viele geliefert.

Sind einmal die Absatzwege besser bekannt, daß die Kaufleute außerhalb Bayern sich dieses Artikels annehmen können, dann wird die Kultur nicht mehr von Nürnberg allein abhängen und diese für die Landwirthschaft höchst wichtige Pflanze in allgemeinen Anbau kommen.

Wegen Näherem verweise ich auf mein Circular, welches auf portofreie Briefe zu Diensten steht, so wie auch auf meine Mittheilungen im „Telegraphen", Stuttgart 1858, No. 46.

Was nun Herr Heerdegen für Gründe hatte, Etwas für falsch zu erklären, was in seiner nächsten Umgegend als Thatsache allgemein bekannt und schon längst in den Lichterhofer Blättern ganz in seiner Nähe ebenso besprochen wurde, wie es Herr Hannemann gethan, wird man leicht erkennen, um zu glauben, daß derselbe wohl am allerwenigsten berechtigt sein dürfte, strebsame Leute, welche nur Gutes bezwecken wollen, verdächtig zu machen.

Zirndorf bei Nürnberg, im Juni 1859.

Friedrich Jacob Dochnahl.

Literatur.

Die Parthenogenesis im Pflanzenreiche. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Versuche und Schriften über Samenbildung ohne Befruchtung nebst Beleuchtung derselben nach eigenen Beobachtungen von Dr. E. Regel. Mit zwei Tafeln. St. Petersburg 1859. Eggers und Co. in Petersburg und Leopold Voß in Leipzig. gr. 4. 20 Ngr.

In dem hier genannten Werke giebt der Verfasser eine Zusammenstellung der Beobachtungen über Samenbildung ohne Befruchtung im Pflanzenreiche derjenigen Männer, die von Spallanzani (1767—1779) bis auf unsere Zeit bekannt geworden sind und den meisten Einfluß auf die hin- und herschwankende Ansicht der Naturforscher gehabt haben. Als diejenigen Männer, welche die wichtigsten Schriften über Parthenogenesis im Pflanzenreiche geliefert haben, führt Herr Regel an: 1) Spallanzani, 2) A. de Marti (1791), 3) Volta, 4) Lecoq, 5) Henschel (1817—1828), 6) Giron de Buzareignes (1828, 1830), 7) F. X. Ramisch, Geoffroy, Alston, Camerarius, Link (1837), 8) Fre-

fenius (1832), 9) Bernhardi, Linné, Schreber (1839), 10) C. F. Gärtner (1844), 11) John Smith (1841), 12) Gasparini, 13) Tenore (1853), 14) Naudin (1856), 15) Radlkofer (1837), 16) A. Braun und Th. Decke (Bergema) (1856), 17) Klotzsch (1857), 18) F. J. Ruprecht (1858) und Radlkofer's neueste Schrift (1858). Nach der Mittheilung der Ansichten und Beobachtungen der hier genannten Gelehrten, folgt dann die Darstellung und Besprechung der vom Verfasser selbst gemachten Erfahrungen und Versuche, nebst kurzer Würdigung der bis zur neuesten Zeit von anderen Beobachtern für die Parthenogenesis gegebenen Beispiele. Das Werk ist somit das Vollständigste was über diesen so wichtigen und zugleich so interessanten Gegenstand erschienen ist, weshalb wir die sich dafür interessirenden Leser unserer Zeitung darauf aufmerksam machen. E. O—o.

Feuilleton.

Nymphäen. Pflanzen- und Blumenfreunde, die nicht im Besitze eines größeren tropischen Aquariums sind, bedauern es oft, nicht die so herrlichen Arten der Gattung Nymphaea mit Erfolg kultiviren zu können. Gedeihen dieselben auch in manchen Jahren in kleinen Wasserbehältern im Freien recht gut, so ist dies doch zu ungewiß, zumal der Sommer nicht sehr heiß ist oder das in dem Bassin befindliche Wasser nicht durch Zufluß von warmem Wasser erwärmt werden kann. Mit Vortheil lassen sich die Nymphäen auch in etwa 1—2 Fuß weiten und ½—1 Fuß hohen glasirten Näpfen kultiviren. Im Frühjahre, etwa im März oder April, pflanzt man die Knollen der Nymphäen in die Näpfe, die man jedoch nicht ganz, sondern etwa nur bis zu ⅔ ihrer Höhe mit Erde anfüllt, damit reichlich Wasser darauf stehen bleiben kann und stellt die Näpfe dann auf ein warmes Mistbeet. Kann man diese Näpfe in ein größeres Gefäß mit Wasser setzen, um so besser für die Pflanzen, jedoch blühen die Nymphäen auch sehr leicht, wenn die Näpfe jeder für sich frei stehen. Da nun aber ein verschlossener Mistbeetkasten oft viel Unbequemes hat, die in ihm blühenden Pflanzen zu betrachten, so darf man nur die aufgeblühten Blumen abschneiden und sie in ein Glas mit Wasser stellen, so daß man den Genuß des Blühens dieser Pflanzen auch bequem im Zimmer genießen kann. Mehrere der herrlichsten Nymphäen blühen bekanntlich erst am Abend auf und schließen sich des Morgens, als N. dentata, Lotus, Devoniensis und die verschiedenen rothblühenden Bastarde, und gewähren daher abgeschnittene Blumen eine schöne Zierde auf einer Abendtafel. Die abgeschnittenen Blumen halten genau die Zeit des Oeffnens und Schließens, wie die an der Pflanze befindlichen und währen auch eben so lange.

Betula. In den zoologischen Aufsätzen von Kaltenbach in den Verhandlg. des naturhist. Ver. der preuß. Rheinlande u. Westphalens.

Neue Folge: 5. Jahrg. heißt es: Die Betula (Birke) wird von 243 Insekten angefressen, muß man sich nicht wundern, daß es noch grüne Birken giebt? —

Wir bemerken hierzu, daß fast sämmtliche Birken in hiesiger Gegend seit 3 Jahren ein höchst trauriges Aussehen haben, an mehreren Orten sind dieselben sogar fast gänzlich abgestorben, im Allgemeinen sind sie blätterarm und die Blätter fleckig oder gelb.

Begonien-Sämlinge. Bei einem Besuch der Gärtnerei des Herrn L. L. Liebig in Dresden fand ich Mitte Juli ein ganzes Haus voll Sämlinge von Begonia Rex, welche sämmtliche bis jetzt vorhandene Begonien in den Hintergrund drängen! Es war im ganzen Hause keine einzige Pflanze, welche nicht durch Glanz und Colorit ihre Mutter überragte. Es ist nur zu wünschen, daß Herr Liebig diese Sämlinge selbst in den Handel giebt, damit diese deutschen Züchtungen auch einmal für deutsche Preise den Gärtnern zugängig werden.

E. Boettger.

(Die Anzucht von Begonien-Hybriden ist jetzt so allgemein geworden, daß schwerlich noch ein Geschäft mit neuen Sämlingen zu machen sein dürfte. Im Consul Schiller'schen Garten bei Hamburg hat Herr Obergärtner Stange bekanntlich Tausende von Samenpflanzen, die aus den verschiedensten Befruchtungen hervorgegangen sind, erzogen. Wir sahen unter diesen Sämlingen mehrere, von deren schöner Blattzeichnung und Colorit man sich kaum einen Begriff machen kann, namentlich unter denen, die aus der Befruchtung der B. Rex hervorgegangen sind. Die Redact.

Die **Cactusliebhaberei** scheint wieder mehr im Zunehmen begriffen zu sein, wenigstens nach den Aussagen mehrerer Besitzer größerer Cactussammlungen zu urtheilen, von denen einige in letzter Zeit mehr Cactus abgesetzt haben, als während der letzten Paar Jahre. Die Cactussammlungen in Hamburg sind, nachdem die Liebhaberei für diese Pflanzen immer mehr und mehr schwand, fast ganz eingegangen, nur zwei Privat-Sammlungen von Bedeutung bestehen noch, es ist die des Herrn C. H. Droege und die des Herrn P. H. Lohmann. Erstere berühmt durch die herrlichen, ungemein großen Originalpflanzen, aus denen die Sammlung fast ausschließlich besteht. Die Sammlung des Herrn Lohmann hingegen ist sehr reichhaltig an Original-, wie an selbst herangezogenen Exemplaren, unter denen sich sehr seltene und werthvolle Arten befinden. Von den meisten Arten ist reichliche Vermehrung vorhanden und Herr Lohmann ist stets eifrig bemüht seine Sammlung durch Tausch und Ankauf zu vergrößern, wie denn auch bei ihm Exemplare zu sehr mäßigen Preisen zu erhalten sind.

E. O—o.

---

* **Erdbeeren.** So eben am Schlusse des Heftes erhielten wir noch das Erdbeer-Verzeichniß des Herrn Ferd. Gloede in Paris*), das vollständigste und zugleich interessanteste Verzeichniß dieser so beliebten Fruchtpflanze. Im nächsten Hefte werden wir Näheres über den Inhalt dieses Verzeichnisses mittheilen.

---

*) Culture speciale de fraisiers de Ferd. Gloede, Propriétaire aux Sablons près et par Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).

Personal-Notizen.

* Herr **C. F. Liepe**, Obergärtner am Garten des Gartenbau-Vereins in Gothenburg, wird in kurzer Zeit seine bisherige Stelle aufgeben und selbst in Gothenburg eine Handelsgärtnerei eröffnen. Zu seinem Nachfolger ist Herr **Hen. Georg Lowegren** von der Direction des Gartenbaues erwählt worden.

---

† Herr **Louis Nach**, Conservator am botanischen Garten zu St. Petersburg, starb am 28. April dieses Jahres in Folge einer Hirnentzündung in einem Alter von 38 Jahren. Demselben war im genannten Institute die Aufsicht über die carpologische und dendrologische Sammlung und die Bestimmung und Berichtigung der perennirenden Pflanzen übertragen. Gründliche und tüchtige Kenntnisse im Gebiete der Botanik und des Gartenwesens und unausgesetztes reges Streben und Arbeiten zeichneten diesen Mann aus, der durch seine Arbeiten über die Eriken und die Beschreibungen neuer Pflanzen in den Samenverzeichnissen des botanischen Gartens zu Petersburg dem botanischen Publikum bekannt ist. (Gartenflora.)

---

† Am 10. August Abends 8 Uhr starb zu Sanssouci (Potsdam) der Königl. Hofgärtner Herr **Eduard Nietner** nach mehrjährigem Leiden.

Correspondenz-Notizen.

Hrn. L. S. Coswig. Besten Dank für das mir unterm 8. August Gesandte, das im nächsten Hefte Aufnahme finden soll. Die Abdrücke sende Ihnen seiner Zeit. —

Hrn. H. in P. Vielen Dank für Ihre Zusendungen, brieflich nächstens ausführlich.

Hrn. S. in H. Ihre Abhandlung kam leider für dieses Heft zu spät und muß bis zum nächsten liegen bleiben. Das Beanspruchte soll Ihnen werden.

Hrn. S. in Ch. Das Manuscript ist mir durch Herrn Th. O. geworden und danke ich Ihnen bestens dafür. Das Gewünschte soll erfolgen.

Hrn. S. in G. Die Notizen des reisenden Nelkenfreundes waren sehr willkommen und erscheinen im nächsten Hefte.

Hierdurch erlaube ich mir auf mein beiliegendes Verzeichniß von **Harlemer Blumenzwiebeln**, Nachtrag von **schönen Pflanzen**, sowie **Sämereien** zur Herbstsaat und zur Frühtreiberei ergebenst aufmerksam zu machen, und bitte mir Aufträge hierauf bald gefälligst zukommen zu lassen.

Erfurt, Anfang August 1859.

Ernst Benary,
Kunst- und Handelsgärtner.

Die geehrten Leser der Hamburger Gartenzeitung erlaubt sich die Unterzeichnete auf die diesem Hefte beigegebenen zwei Verzeichnisse besonders aufmerksam zu machen. Außer den Blumenzwiebeln werden sie in denselben eine hübsche Auswahl der beliebtesten und schönsten Pflanzen verzeichnet finden und darunter mehrere Neuheiten, die erst im Laufe dieses Jahres in den Handel gekommen sind. Die Redact.

Das
Erdbeeren-Verzeichniß des Herrn Ferd. Gloede.*)

Im vorigen Hefte machten wir die geehrten Leser der Hamburger Gartenzeitung auf das für den Herbst 1859 und Frühling 1860 gültige, so eben erschienene Preisverzeichniß der neuesten und älteren Erdbeersorten, welche bei Herrn Ferd. Gloede zu haben sind, aufmerksam.

Herr Gloede besitzt unstreitig die reichste Sammlung Erdbeersorten, die wohl existirt. Durch seinen neuen Katalog offerirt er den Freunden dieser herrlichen Frucht nicht nur das Beste und Neueste, was von den berühmtesten Züchtern erzielt worden ist, sondern auch noch alle bekannten älteren und alten guten Varietäten.

Wie groß das Heer der verschiedenen Erdbeersorten ist, beweist uns das in Rede stehende Verzeichniß und enthält dies eigentlich doch nur das Beste. Hunderte von Sorten, wenigstens mit anderen Namen, finden wir noch in anderen Gärten und Verzeichnissen. So brachte auch die „Wochenschrift von Koch & Fintelmann“ in No. 30 und 31, nach einer vorangegangenen sehr schätzbaren Abhandlung über „Erdbeeren und Erdbeerenzucht“ in den vorhergehenden Nummern, ein alphabetisches Verzeichniß der Sorten, die sich heut zu Tage hauptsächlich in Kultur befinden und welche zu den besseren gehören. Seitdem hat sich diese Liste der besseren Sorten schon wieder vermehrt, wie dies der neueste Gloede'sche Katalog beweist.

Da Herr Gloede speciell und mit großer Liebe die Erdbeerzucht betreibt, so kann man auch ganz sicher sein, von ihm die verlangten Sorten unter richtigen Namen zu erhalten.

Der diesjährige Katalog führt 8 Sorten auf, die Herr Gloede dies Jahr zum ersten Male als Neuheiten in den Handel bringt, sämmtliche sind von ihm erprobt, wie die Beschreibungen von ihm selbst angefertigt wurden. Es sind die Erdbeeren:

Beauty of England (Frewin). Frucht sehr groß, von länglicher, flacher Form, zuweilen ungleich geformt, die Farbe ist leuchtend dunkelroth; das Fleisch roth, saftreich, süß und aromatisch; die Samen im Fleische vertieft liegend. Wuchs der Pflanze kräftig und zugleich sehr ergiebig. Preis 2 Fr.

Brighton Pine. Eine amerikanische Varietät; die Frucht ist groß, in Form eines zugespitzten Herzens, die Farbe lebhaft roth, das Fleisch fest, gelblich weiß, sehr süß und eigenthümlich aromatisch. Eine üppig wachsende Pflanze, sehr fruchtbar und frühzeitig. Preis 1 Fr.

Général Havelock (Tiley). Frucht groß, in Form eines stumpfen

*) Culture spéciale de Fraisiers de Ferdinand Gloede, Propriétaire aux Sablons près et par Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne). Paris.

Kegels, Farbe lebhaft roth; das Fleisch rosa, süß, wenig säuerlich. Die Pflanze ist sehr kräftig wachsend, reich und früh tragend und läßt sie sich gut treiben. Preis 5 Fr.

Oscar (Bradley). Sehr große Frucht, von runder abgeplatteter Form, zuweilen hahnenkammförmig, dunkel glänzend roth gefärbt; das Fleisch fest, besonders saftreich, sehr süß und von einem scharf hervortretenden Aroma. Die Pflanze wächst sehr kräftig, ist fruchtbar und trägt während einer langen Zeit, so daß man sie zu den früh- wie spättragenden rechnen kann, zudem läßt sie sich vorzüglich gut treiben. Sie ist eine Frucht ersten Ranges. Preis 2 Fr.

Princess Frederick William (Nevin). Die frühzeitigste aller großfrüchtigen Erdbeersorten. Die Frucht von guter Größe, von hübscher runder Form, zuweilen jedoch hahnenkammförmig, Farbe lebhaft rosa; das Fleisch rosa, süß und aromatisch; sie läßt sich leicht treiben und ist sehr ergiebig.

Peabody's Seedling. Eine amerikanische Varietät. Die Pflanze ist von sehr kräftigem Wuchs und fruchtbar. Frucht groß, von eigenthümlicher Form, ähnlich einer Geldbörse, mit sehr deutlich ausgeprägtem Halse. Die Farbe der Frucht ist roth, sammtig, das Fleisch roth, saftig, süß und nach Moschus schmeckend. Preis 6 Pflanzen 5 Fr.

Royal Victoria (Stewart et Neilson). Eine hübsche runde Frucht, groß, orangenfarbig, das Fleisch sehr zart, süß und aromatisch. Die Pflanze fruchtbar und sehr kräftig, mit schönen Blättern. Reifzeit frühzeitig. Preis 1 Fr. 50 Cent.

Scott's Seedling. Eine amerikanische Varietät, Frucht groß, von conischer Form, Farbe lebhaft roth; das Fleisch rosa, süß, aromatisch. Die Pflanze kräftig mit einer unvergleichlichen Fruchtbarkeit. Preis 6 Pflanzen 5 Fr.

Wilson's Albany. Ebenfalls amerikanischen Ursprungs, eine interessante Form. Sie gedeiht ohne Unterschied in jedem Boden gleich gut; die Frucht ist groß, abgerundet, Farbe lebhaft roth, das Fleisch roth, süß-säuerlich.

Nach diesen 8 neuen Varietäten bringt das Verzeichniß noch 16 Sorten mit genauen Beschreibungen, die jedoch schon im vorjährigen Kataloge bereits aufgeführt und ganz besonders empfohlen worden sind. Es sind die Erdbeeren:

Bicolor (de Jonghe); Bonté de Saint-Julien (Carré); La Constante (de Jonghe); La Châlonaise (Dr. Nicaise); Élisa Champin (Jamin et Durand); Helena Jamin (J. et D.); Empress Eugénie (Knewett); Impératrice Eugénie (Gauthier); Kaminsky; Duc de Malakoff (Gloede); May Queen (Nicholson); Chili orange; Gélinena (Gélin.); La Délicieuse (Lorio); La grasse sucrée (de Jonghe); Quinquaefolia (Myatt); Souvénir d'Emilie (J. et D.); Wonderful (Jeyes). Es sind dies alles, wenn auch nicht neue, doch sehr empfehlenswerthe Sorten, von denen auch mehrere in der so eben ausgegebenen „Herbst-Offerte zur Winter- und Frühlings-Flora" von Herrn Heinemann als „außerordentliche Novitäten" angepriesen werden und zwar zu bedeutend hohen Preisen, so kostet z. B. eine Pflanze von Duc de Malakoff bei Herrn Heinemann 15 Sgr., dagegen bei Herrn Gloede 12 Pflanzen nur 3 Fr.

Die älteren Erdbeer-Arten und Varietäten, von denen viele als anerkannt gut bekannt sind, hat Herr Gloede in 6 Classen getheilt und aufgeführt, nämlich:

Cl. I. Wald-Erdbeeren (Fraisiers de Bois).

Die Erdbeeren dieser Classe geben im Jahre nur einmal Früchte, auch haben mehrere Arten dieser Classe nur einen mehr botanischen Werth. Es gehören hierher die Fragaria vesca L., collina u. a. Herr Gloede kultivirt aus dieser Classe 23 Arten und Unterarten.

Cl. II. Fragaria semperflorens oder Alpen-Erdbeeren und Untervarietäten. Mehrmals blühende Erdbeeren.

Hierher gehörend führt Herr Gloede 10 Arten und Varietäten auf.

Cl. III. Die Caproniers, Hautbois oder Moschus-Erdbeeren.

Es ist dies diejenige Art, welche von unseren Vorfahren ihres moschusartigen Geschmackes wegen viel angezogen wurde. Jetzt findet man sie jedoch seltener kultivirt, obgleich die Varietäten, welche durch die Befruchtung mit englischen Varietäten entstanden sind, nichts zu wünschen übrig lassen.

Um die Früchte in ihrer vollen Perfection zu erhalten, muß man die Pflanzen stark begießen, sobald die Früchte angesetzt haben, und man muß die Früchte nicht eher genießen, als bis sie völlig reif sind. Die Urspecies dieser Classe ist die Fragaria elatior.

Cl. IV. Scharlach-Erdbeeren (Frag. virginiana).

Die Früchte dieser Classe sind gewöhnlich nur klein oder mittelgroß, ihr Hauptverdienst besteht in der frühzeitigen Reife der Früchte, von denen viele einen sehr guten Geschmack haben.

Herr Gloede besitzt aus dieser Classe 16 Arten und Varietäten.

Classe V. Die Chilier-Erdbeere (Frag. chiloensis).

Die Arten und Varietäten dieser Classe erzeugen meistens Früchte von enormer Größe, sobald man sie auf einem ihnen zusagenden Boden kultivirt. In heißen Sommern besonders liefern sie Früchte von ausgezeichneter Qualität und reifen die Früchte meistentheils später als die aller sonstigen Erdbeeren.

Cl. VI. Ananas- und Hybride-Erdbeeren.

In diese Classe gehören die meisten der jetzt beliebtesten Erdbeer-Varietäten. Herr Gloede führt allein 137 Sorten oder Varietäten auf, von jeder eine kurze, genügende Beschreibung gebend.

Diese Classe enthält fast alle die Sorten, die in oben erwähntem deutschen Verzeichnisse als „außerordentliche Novitäten“ zu hohen Preisen empfohlen werden. —

Dieselbe Eintheilung, wie sie Herr Gloede in seinem Verzeichnisse gegeben hat, haben auch Professor Koch und Hofgärtner Fintelmann in der „Wochenschrift“ mit ausführlichen Erläuterungen gegeben. Dagegen hat der Hofgärtner Th. Ed. Rietner in seiner „Erklärung und Beschreibung verschiedener Varietäten Erdbeeren nach James Barnes“ im 5. Jahrg. (1857) der „Allgem. Gartenztg.“ von Otto & Dietrich S. 332 sq. sieben Classen aufgestellt und charakterisirt. Rietner führte schon im Jahre 1837 aus den ersteren fünf Classen 54 Erdbeersorten mit ihren Synonymen an, zweifelt jedoch nicht, daß außer diesen noch eben so viele andere Sorten kultivirt werden, so daß wohl über

100 Sorten (1837) existiren möchten, von denen noch jetzt mehrere in den Gärten kultivirt werden.

E. D—o.

Bemerkungen
über schön oder selten blühende Pflanzen
im botanischen Garten zu Hamburg.

Lycopersicum pyriforme Dun. Ueber die Verwendung des allbekannten **Solanum Lycopersicum** oder **Lycopersicum esculentum** sowohl als Zier- wie Nutzpflanze befindet sich in einem der früheren Jahrgänge der Hamburger Gartenzeitung ein schätzenswerther Aufsatz. Schöner noch als das L. esculentum, namentlich als Zierpflanze, ist das hier genannte L. pyriforme. Herr Theodor von Spreckelsen, Handelsgärtner hierselbst, führte im vorigen Jahre diese Pflanze aus Frankreich hier ein und verdient diese eine allgemeinere Verbreitung. Im Frühjahre ausgesäet, erreicht diese Art, als Spalierpflanze behandelt, eine Höhe von gegen 8 Fuß und gewährt gegen Ende Sommers mit ihren zahlreichen, hübschen, dunkeloraugerothen Früchten einen sehr hübschen Anblick. Die Früchte sind nur 1—1½ Zoll lang, haben aber, wie schon der Name andeutet, genau die Form einer Birne und sind, wie die des gewöhnlichen **Solanum Lycopersicum**, eßbar. — Eine Abbildung befindet sich in den **Ann. Sc. nat. III. 19. 14.**

Die Samen säe man im Monat März oder April in Töpfe und stelle dirse auf ein Warmbeet. Haben die jungen Pflanzen einige Zoll Höhe erreicht, so pflanze man sie einzeln in Töpfe, härte sie allmählig ab und wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, werden sie ausgepflanzt. Ein sonniger, warmer Standort sagt ihnen am besten zu.

Hypericum aegyptiacum L. Ein sehr niedlicher kleiner, sich stark verästelnder Strauch, der selten mehr als einen Fuß hoch wird. Die kleinen, etwas fleischigen, ovalen, sitzenden, grau-grünen Blätter geben der Pflanze, sobald sie nicht in Blüthe ist, das Ansehen von der **Melaleuca thymifolia**. Die kleinen, gelben Blumen stehen einzeln an den Endspitzen der Zweige.

Diese Art, schon seit 1787 durch Thouin eingeführt, scheint bis vor wenigen Jahren wieder aus den Gärten verschwunden gewesen zu sein. Zu kleinen feinen Gruppen im Freien oder auch als Topfpflanze behandelt, ist das **Hyp. aegyptiacum** zu empfehlen; aus Egypten stammend, hält es im Winter jedoch nicht im Freien bei uns aus.

Spiraea sorbifolia ∂ Lindleyana C. Koch. Diese ausgezeichnete Zierstaude stammt vom Himalaya und wurde von Dr. Wallich's Sammler in Kamaon und Sirmore gefunden und durch dieselben vor etwa 9—10 Jahren in England eingeführt. Obschon seit mehreren Jahren im Besitze dieser Pflanze, während welcher Zeit sie auch öfters geblüht hat, konnten wir uns doch nicht von deren angepriesener Schönheit überzeugen. Die Blüthenrispen erreichten kaum eine Länge von 6 bis

8 Zoll und die Pflanzen selbst starben fast alljährlich bis auf den Grund ab. Erst in diesem Jahre haben wir uns, wie Jeder, der die Pflanze im hiesigen botanischen Garten blühen sah, mit deren Schönheit ausgesöhnt. In Folge des letzten milden Winters erfroren die Triebe nicht nur nicht, sondern erreichten in diesem Jahre eine Länge von 10–12 Fuß, wie dann auch die heiße Witterung auf die Entwickelung sehr kräftiger Blüthenrispen eingewirkt haben muß, denn diese hatten hier, wie in mehreren anderen Gärten, eine Länge von über 2 Fuß erreicht und gewährten einen reizenden Anblick.

Die Spiraea Lindleyana Wall. steht, namentlich im dürftigen Zustande, der Sp. sorbifolia sehr nahe, und hat sie C. Koch auch mit Recht als eine Abart derselben in seinem Hortus Dendrologicus p. 108 aufgeführt. Die Sp. sorbifolia ist jedoch ganz hart und erfriert nie, während die Sp. Lindleyana es meistens alljährlich thut. Der Hauptunterschied dieser beiden Arten liegt aber noch besonders in den Blättchen, diese sind größer, zahlreicher und länger zugespitzt und genau eiförmig, während die der Sp. sorbifolia mehr oval sind.

Datura Wrightii Hort. In der Flore des serres II (2. Ser.) tab. 266 ist die hier genannte Pflanze fälschlich als D. meteloides DC. abgebildet, unter welchem Namen wir sie früher ebenfalls empfohlen hatten. Da die Datura nun auch bei uns geblüht hat und jetzt, Ende September, noch in voller Blüthe steht, so sind wir im Stande, nach voller Ueberzeugung sie als eine herrliche Pflanze zu empfehlen und sie für eine schätzenswerthe Acquisition für die Gärten zu halten. Herr Vilmorin-Andrieux in Paris erhielt diese Datura von Herrn Prof. Asa-Gray in den Vereinigten Staaten Nordamerikas unter dem richtigen Namen Datura Wrightii und soll sie nach den Aussagen in Californien heimisch sein. Die „Gartenflora“ bringt gleichfalls im Juliheft d. J. eine Abbildung dieser Pflanze und zwar unter der richtigen Benennung D. Wrightii.

Wir säeten die erhaltenen Samen Mitte April in Töpfe und stellten diese auf ein warmes Mistbeet. Dieselben keimten bald und wurden darauf einzeln in Töpfe gepflanzt und noch einige Wochen, bis Ende Mai, unter Glas gehalten und dann ins Freie ausgepflanzt. Die Pflanzen, die sich von unten auf zwei- auch dreigabelig verästeln, haben eine Höhe von 3–4 Fuß erreicht und stehen seit Ende Juli in Blüthe. Die Blumen, von der Größe der bekannten Datura arborea (Brugmansia arborea), sind zart hellviolett, während der Rand des Blüthensaumes etwas dunkler gefärbt ist, und verbreiten einen äußerst lieblichen Duft. Sie öffnen sich gewöhnlich des Morgens früh und schließen sich gegen Abend, um sich dann noch ein- auch zweimal zu öffnen. Selbst ohne diese schönen Blumen ist die Pflanze schon als Blattpflanze sehr empfehlenswerth und eignet sie sich ganz vorzüglich zu größeren Gruppen oder auch als einzelne Pflanze auf Rasenplätzen. — Die Pflanze ist keineswegs, wie es öfters angegeben ist, einjährig, sondern perennirend. Die Wurzeln sind stark fleischig und mit einem knollenartigen Wurzelhals versehen und lassen sie sich sehr leicht, ähnlich den Georginen ꝛc., überwintern.

E. O—o.

Die Nelke.

Notizen eines reisenden Nelkenfreundes.

Wie in menschlichen Verhältnissen nicht allein jede Völkerfamilie ihre Geschichte hat, sondern sogar das Leben einzelner Individuen eine hervorragende Stellung einnimmt, wodurch sie ihren Namen für alle Zeit in den Annalen der Völker verewigen, so treten uns auch in der Blumenwelt, namentlich in derjenigen, in welcher sich vorzugsweise der Geschmack und die Vorliebe des Volkes bewegt, Erscheinungen entgegen, die eine ziemlich vollständig ausgebildete Geschichte haben.

Unter diesen finden wir die Nelke in erster Reihe.

„Die Nelke ist in der That seit Jahrtausenden eine Lieblingsblume des Volks, wie mit Recht einer unserer ersten Schriftsteller bemerkt hat; sie ist, wie er sagt, bescheiden, nimmt mit einem Scherben vorlieb und ist dabei doch charaktervoll, farbenprächtig und gewürzduftig; habe ich Unrecht, wenn ich sie die Lerche unter den Blumen nennen möchte?“

Es ist wahr, die Nelke ist unter den Blumen das, was die Lerche unter den Sängern der Luft.

Der Landmann mit gebräunter, schweißtriefender Stirn lauscht den Jubelhymnen der Lerche bei seiner beschwerlichen Arbeit, und in seinem bescheidenen Garten blüht das Kind des Volkes — die Nelke. — Die Wohnung der Lerche ist niedrig auf der Wiese, unter den Halmen, in der Furche; die Nelke steht gesenkten Hauptes fast auf jedem Boden und ziert das ihr angewiesene Plätzchen durch ein frisches Grün, durch Farbenschmuck und Wohlgeruch; der wirbelnde Gesang des Vogels der Himmelbläue entzückt Reich und Arm, Hoch und Niedrig, und die Nelke blüht vor dem Fenster des Proletariers eben so häufig und in gleicher Pracht, wie vor den Prunkgemächern der Lieblinge des Glücks.

Aber auch in noch anderer Beziehung ist die Nelke ein Kind des Volkes, die, wie dieses, überall gedeiht, sich unzählig fortpflanzt und wenn auch einmal verdrängt, aus den Rechten verdrängt, die ihr ihrem äußeren und inneren Werthe nach gebühren, sich doch wieder Anerkennung zu verschaffen weiß.

Das lehrt uns in der That die Geschichte der Nelke und ihre Litteratur.

Die Nelke, die der Erbmarschall von Behr, einer der berühmtesten Nelkenisten seiner Zeit, in seinem bekannten System der Nelke die Königin der Blumen nennt, weil sie in Rücksicht ihres schönen Baues und vortrefflichen Aromas alle Sprößlinge Floras übertrifft, war schon seit den ältesten Zeiten eine Zierde der Gärten und der Vater der Dichtkunst, Homeros, erzählt uns von der Liebe seiner Helden zur Nelke und daß die Jungfrauen der Urzeit Griechenlands Busen und Lockenhaupt mit dieser Blume schmückten.

Den Römern war sie keine Fremde, und in den Ghaselen des Ostens duftet die Nelke und schimmert ihre Farbenpracht mit aller Gluth der Phantasie und aller Sanftheit lebender Empfindung.

Auch die christliche Sage hat sich der Nelke bemächtigt. Ludwig der Heilige soll sie im 13. Jahrhundert aus der Gegend, wo einst das

stolze Karthago geherrscht, nach Europa mitgebracht haben. So prangt sie auch auf vielen Heiligenbildern und in der Hand der Ritterjungfrau ist sie keine seltene Zierde.

Das Land der Blumenraserei, die Niederlande, ward bald der Boden, wo die Nelke selbst der Tulpenzucht den Rang streitig machte und ein Nelkenverzeichniß aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts weist nach, daß man Nelken, z. B. den „Staatsminister von Bernstorff“, „Clarissa“, den „Grenoble“, den „Preis von Schneeberg“, „Baron Dahlberg“ ꝛc. mit 3 bis 4 Pistolen bezahlte. Der berühmte Nelkenist von Rheden auf Rheden zahlte einst für den „Acteur“ 5 Pistolen und die Kosten einer Extrapostfuhr zu einer Reise von 8 Meilen!

Das hörte indeß auf, als die Nelke im Herzen des Volkes immer größeres Terrain gewann. Denn wie hätte die Mode der Vornehmen noch das lieben können, zu dem sich der gesunde Sinn des Volkes mit besonderer Vorliebe hingezogen fühlte?

Die sogenannte Nelkenistik, ein Zweig der Blumistik, entstand mit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts durch die Bemühungen der Holländer und Deutschen, obgleich schon der große Condé, der bei blutigem Handwerk die sanften Freuden der Blumenkultur nicht verschmähte, um 1600 über die Erziehung der Nelken eine Monographie veröffentlicht hatte.

Die Blüthe der Nelkenistik fällt in den Zeitraum von 1760 bis 1800, um welche Zeit ihr Reich in immer größeren Verfall gerieth; man vergaß ihrer um der vielen Novitäten willen, die aus den transatlantischen Ländern in unseren Gärten das Bürgerrecht zu gewinnen suchten.

Erst vor 15—20 Jahren haben deutsche, englische, französische und belgische Gärtner und Dilettanten einen Wetteifer in der Kultur der Nelke gezeigt, der die letztere gegenwärtig auf eine sehr hohe Stufe der Vollkommenheit gebracht hat; doch urtheilt ein bedeutender Kenner ganz richtig, wenn er sagt, daß deutscher Fleiß eine besonders hervorragende Rolle in der Nelkenzüchtung übernommen habe.

Davon habe ich kürzlich die schlagendsten Beweise zu sammeln Gelegenheit genommen. Mich führte eine Erholungsreise, auf der ich zugleich, obgleich nur mit dem Auge des Dilettanten, eine Nelkenschau vorzunehmen mir vorgesetzt hatte, zu der Erkenntniß, daß unser Norddeutschland Bedeutendes in der Nelkenzucht hervorgebracht hat.

Mein Weg führte mich eines Nebenzweckes wegen zuerst nach Bückeburg. Dort besah ich den fürstl. Schaumburg-Lippe'schen Garten, der indeß einen gewaltigen Abstich gegen die dortige romantisch-schöne Gegend gewährt. Von einem fürstlichen Etablissement darf man doch mehr erwarten, als die vielleicht durch Jahrhunderte sich fortschleppende Kultur abgestandener Stauden, Gebüsche und Sommerpflanzen; Neueres scheint hier, vielleicht aus zu weit getriebener Sparsamkeit, keinen Eingang gefunden zu haben.

Dagegen bietet die dortige Orangerie eins der kräftigsten und reizendsten Tableaux, die mir je zu Gesichte gekommen.

Ich verließ den Garten, um durch das Weserthal nach Blomberg zu gelangen, wo ich allerdings viel zu finden hoffte, meine Erwartungen aber bei weitem übertroffen fand. Kam ich auch erst spät Abends mit

der Poſt dort an, ſo konnte ich doch meine Sehnſucht, den vielgerühmten Nelkenflor Böchting's nun gleichſam von Auge zu Auge zu ſehen, nicht überwinden und ſo ging ich denn ſofort in den Böchting'ſchen Garten. Der Altmeiſter der Nelkenkunſt, Böchting, der, beiläufig geſagt, Alles, ſelbſt das Kleinſte, durch ſeine eigenen Hände beſorgt, war gerade vor ſeinem Nelkenflor beſchäftigt. Er nahm uns — mich und einen Reiſegefährten — freundlichſt auf und ſchon die erſten Minuten der herzlichen Unterredung zeigten einen Mann, deſſen Herz voll iſt von den ſanften und erhebenden Eindrücken der Natur, die ſich, wo ſie rein empfunden werden, auf alle Verhältniſſe des Lebens ſichtbar wirkend und veredelnd übertragen. Die Dunkelheit unterbrach indeß dieſe erſte, oberflächliche Revue, die jedoch bereits einen ſehr guten Eindruck auf mich machte, obgleich ich denſelben theilweiſe auf Rechnung des Rufes zu ſchreiben geneigt war, deſſen Böchting ſich erfreut. Doch am andern Morgen, als ich abermals vor dieſem Nelkenflor ſtand, kehrte jener erhebende Eindruck in verdoppelter Stärke zurück. Man erzählt von dem alten, ehrenfeſten Dr. Weißmantel, jenem berühmten Vater der Nelkenliſtik, daß er ſich, als er den „Generalſtaaten“ gezogen, vor Entzücken auf die Erde geworfen und gejubelt habe. Ich muß geſtehen, daß die Vaterfreude ſo weit fortreißen kann; mich, den Beſchauer der unzähligen Sprößlinge der Böchting'ſchen Nelkenſchule, überkam ein entgegengeſetztes Gefühl: ich fühlte mich von Bewunderung ſo hingeriſſen und von der Achtung vor der Kunſt und der Pracht der Natur ſo gehoben, daß ich alles Irdiſche um mich her eine Zeit lang gänzlich vergaß.

Am andern Morgen ging es an eine Specialreviſion. In dem unter der alten Burg Blomberg belegenen Garten ſtanden vor meinem entzückten Auge 3000 Nelkenſtöcke in Blüthe, gehoben durch die Thauperlen, welche den Diamantenblüthen ein Relief gaben. Unter den 3000 Nelkenſtöcken notirte ich etwa 800 Sorten, jede derſelben auf 3—4 Töpfen vertreten. Den Glanzpunkt derſelben bilden die Doubletten und Bizarden; doch nicht minder ſchön ſind die Böchting'ſchen gelbgrundigen Picotten mit ihren verſchiedenen Zeichnungen, gleichwie einige von Böchting in dieſem Jahre ſelbſt gezogene Faxe und Flambanten meine vollſte Aufmerkſamkeit auf ſich zogen. Nach Beſichtigung der Nummernelken in den Stellagen ging es an eine Muſterung der diesjährigen Samennelken, ungefähr 3500 an der Zahl. Alle einfachen und halbgefüllten Blumen waren einander gleich, nachdem ſie ſich gezeigt, der Vernichtung Preis gegeben. ſo daß jede Pflanze, die noch da ſtand, als Landnelke einen Garten geziert haben würde. Böchting hatte aber aus der großen Anzahl nur ungefähr 80 zu Nummernelken mit dem Auge des erfahrenen Künſtlers und mit der Gewiſſenhaftigkeit des redlichen Handelsgärtners ausgewählt. Ja, dieſe Auswahl zeigte nicht nur Gewiſſenhaftigkeit und ängſtliche Sorgfalt, ſondern ſogar vielleicht einen pedantiſchen Eigenſinn, ſo daß die Ueberzeugung in mir entſtand, daß Böchting die Nelke nicht vorzugsweiſe oder ausſchließlich als Nelkenhändler, ſondern als begeiſterter Künſtler mit inniger Liebe zu ſeinen Zöglingen behandelt. Einzelne Nelken zu beſchreiben halten wir für überflüſſig, da die Hamburger Gartenztg. bereits früher die Elite gebracht hat; die neuerdings hinzugekommenen Sorten mögen hier ſpäterhin ihre Analyſe finden.

Einige Worte über die Böchting'schen Arrangements dagegen möchten den Lesern nicht unlieb sein.

Wir bemerkten 1. eine offene Stellage unter welche B. die Nelken stellt, sobald sie, im Frühling ausgepflanzt, ins Freie transportirt werden. Diese Stellage kann mittelst halbständiger Arbeit mit Laden gedeckt werden, um sie gegen etwaigen Hagelschlag zu schützen. 2. Eine andere bedeckte Stellage bildet das sogenannte Nelkentheater, bestehend aus einem 2 Fuß hohen und 6 Fuß breiten, aus Backsteinen aufgemauerten Postamente; gedeckt ist dasselbe mit Ziegeln und mit Dielen unterwölbt, welchen B. einen himmelblauen Anstrich gegeben, wodurch dem Flor eine ausgezeichnete Folie verliehen wird. In dieser Stellage befinden sich die Nelken nur während der Blüthezeit, worauf sie zur Kräftigung und um sie an Wind und Wetter zu gewöhnen, wieder in die erstere zurückgestellt werden. 3. Ein dritter Bau nimmt die Nelken im Winter auf. Er ist von Westen nach Osten gelegen, hat an der Südseite Fenster und der Grund desselben ist mit Mergel ausgefüllt. Stellagen sind darin nicht angebracht, da B. die Erfahrung gemacht hat, daß die Nelke in ihrem Scherben auf dem mergelichen Untergrunde sich besser conservirt, was schon darin seine praktische Bestätigung findet, daß B. der anerkannt beste Durchwinterer ist, eine Eigenschaft, die man als den Probirstein eines tüchtigen Nelkenisten ansehen muß. Bei solchen umfassenden Anlagen versteht es sich wohl von selbst, daß den Werkzeugen und Hülfsmitteln zur Nelkenkultur die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet ist; so sahen wir z. B. Senkringe von eigenthümlicher Construction.

Ueber den Ruf des Böchting'schen Etablissements etwas hinzuzufügen scheint überflüssig; er geht durch ganz Europa und bei meinem Dortsein kamen sogar Bestellungen aus Warschau und Athen, aus letzterem Orte vom Königl. Hofgärtner Schmidt auf 500 Stück in eben so vielen Sorten.

Voll von diesen Eindrücken trat ich meine Rückreise über Schieder, die Sommerresidenz des Fürsten von Lippe-Detmold, an. Der dortige fürstliche Garten macht wegen seiner schönen Lage, Nettigkeit und Sauberkeit einen ausgezeichneten Eindruck. Der dasige Hofgärtner ist ein Meister in der Gruppirungskunst und der Ornamentirung durch lebende Pflanzen; besonders anziehend erschien mir die kunstvolle Zusammenstellung hochstämmiger Rosen und Fuchsien, verbunden durch entsprechende Schlingpflanzen.

Dem Wesergebirge folgend, gelangte ich über Pyrmont und Hameln nach Hannover, wo, wie ich vernommen, voriges Jahr ein Nelkenarium auf besonderen Wunsch der Königin eingerichtet ist, das sich vorzugsweise aus der Samuel'schen Sammlung rekrutirte. Es ist ungefähr mit 300 Sorten dort der Anfang gemacht; die Hälfte davon wird in Monbrillant gepflegt, die andere Hälfte in Herrenhausen, jene unter Aufsicht des Gartenmeister Weber, diese unter dem verstorbenen Bayer, jetzt Hof-Gartenmeister Erblich. Die Nelken in Monbrillant zeigten Kräftigkeit und Schönheit, lauter erquisite Sachen; die in Herrenhausen waren minder kräftig; es schien dieses am schlecht gewählten Standorte, so wie an der den Nelken gewiß nicht zusagenden, zu fetten Erde und an den unzweckmäßigen glasirten Scherben zu

liegen. Indeß konnte man auch diesen Nelken ansehen, daß sie aus guter Quelle stammten, nämlich aus dem Nelkenarium des Pastor Samuel zu Brüggen und dem des Waisenhaus-Inspectors Palandt zu Hildesheim, deren Ansicht nun mein nächstes Object war und ich darf gleich vorläufig bemerken, daß der Umweg, den ich dieserhalb einschlagen mußte, mich durchaus nicht reut, sondern mir des Lohnenden gar vieles brachte.

Palandt's Nelkenflor, zusammengesetzt aus den schönsten Blumen der bedeutendsten Nelkenisten Deutschlands, Belgiens und eigener Züchtung, besteht aus ungefähr 300 Sorten, die indeß eine Elite bilden, wie sie schöner in ganz Deutschland kaum zu sehen sein wird. Mögen andere Nelkenisten auch die dreifache Zahl der Palandt'schen Nummern haben, der innere Werth seiner Collection überwiegt bei weitem die größere Anzahl. Dazu rechne ich auch das gesunde, kräftige Exterieur der Pflanzen, das den Böchting'schen Blumen durchaus nicht nachsteht. Die verschiedenen Sorten der Nelken von der Farbenblume bis zum buntesten Bizard-Far waren in den vollkommen reinsten Zeichnungen und im verschiedenartigsten, guten Bau vertreten. Man konnte es dieser Sammlung ansehen, daß deren Besitzer nicht Vieles, sondern viel leisten will und daß sein ganzes Streben getragen wird von der reinsten Liebe zur Sache selbst, welche ihn auch veranlaßt, mit Muth und Energie gegen Unrechtfertigkeiten im Blumenhandel aufzutreten und so nicht bloß sich, sondern auch überhaupt den Freunden Floras zu dienen. Nebenbei darf ich bemerken, daß es mir eine wohlthuende Erscheinung war, daß die Pfleglinge des unter Palandt's Aufsicht stehenden protestantischen Waisenhauses wie ein geschäftiger Bienenschwarm im Garten ab- und zugingen und daß die verständigeren Knaben unter ihnen in den Freistunden zur Gärtnerei angehalten wurden, einige selbst die Handgriffe der Nelkenzucht bereits inne hatten und daß diesen die betreffenden Kunstausdrücke nicht mehr fremd waren.

Von Hildesheim fuhr ich nach Brüggen, wohin sich kurz vorher auf höheren Befehl die drei Hofgartenmeister aus Hannover zur Besichtigung der dortigen Nelken begeben hatten. Von dem freundlichen Pastor Samuel gastlich aufgenommen, schritten wir zur Nelkenstellage, wo ich 400 Sorten vorfand, unter denen mancher Edelstein, der in andern Sammlungen nicht angetroffen wird. Besonders scheint Samuel auf Blumen vom reinsten Bau und reinster Zeichnung zu halten, weniger auf die größere oder mindere Fülle der Blüthen zu geben. In der That ist seine Sammlung ausgezeichnet; es scheint das Wesen eines Meisters in der Nelkenzucht ihm angeboren zu sein, was nicht zu verwundern, da wir erfuhren, daß er von Kindheit an sich mit den Nelken beschäftigte und hierin schon von seinem Vater die gediegenste Anweisung erhielt, welcher zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu den besten Nelkenisten des Vaterlandes gehörte. Man bedenke nun den von seinem Vater überkommenen Stamm unter fortwährender Vermehrung und Veredelung des als Nelkenisten weithin bekannten Sohnes und man wird dann leicht ermessen, in wie weit die Samuel'sche Sammlung verdient, dem Besten, was wir an Nelken besitzen, beigesellt zu werden.

Im nächsten Sommer gedenke ich weitere Reisen behuf Nelkenschau zu unternehmen, deren Resultate dann den Lesern mitgetheilt werden

ſollen; habe ich dann die wichtigſten Nelkenflores die Revue paſſiren laſſen, ſo beabſichtige ich die trefflichſten Blumen zuſammenzuſtellen und zur öffentlichen Kunde zu bringen.

Ein Spaziergang durch Breslau's Gärten.

Auch in Breslau hat ſich zu Anfange dieſes Jahrhunderts, als nach Abtragung der Feſtungswälle 1807 die jetzige Promenade, die unter des verſtorbenen Bauraths Knorr Leitung angelegt worden war, vielleicht mit dadurch angeregt, die Gartenkultur gehoben und hat beſonders in den letzten Jahren zum ſichtlichen Vortheil der Phyſiognomie der Stadt raſche Fortſchritte, ſowohl in wiſſenſchaftlicher als äſthetiſcher Richtung gemacht, ſo daß es nicht unangemeſſen erſcheinen mag, eine gedrängte Ueberſicht der bedeutendſten Schöpfungen auf dieſem Gebiete zu verſuchen.

Unter allen Gartenanlagen Breslaus ſteht natürlich als die erſte und vorzüglichſte die Promenade oben an, deren vortreffliche Verwaltung ſich durch die von Jahr zu Jahr zunehmende Verſchönerung derſelben und die dadurch bewirkte Geſchmacksveredelung und Anregung ein nicht hoch genug anzuſchlagendes Verdienſt erworben hat, das den Namen des allverehrten Herrn Geh. Medicinalraths Profeſſor Dr. Göppert denen der großen Wohlthäter Breslaus würdig anreiht. Auch des Herrn Promenaden-Inſpectors Schwager, deſſen Werk beſonders die ſchönen Schlingpflanzen um die Fontaine ſind, ſei an dieſer Stelle rühmlich gedacht.

Von den Gärten nun, die mir auf meinem Gange vom Bahnhofe nach der Stadt begegneten, verdient beſonders der des Kaufmann Herrn E. H. Müller, unter Leitung des Gärtners Herrn Appel, wegen der vortrefflichen Kultur tropiſcher Pflanzen reiches Lob. Von ganz ausgezeichnetem Wuchs und ſeltener Schönheit iſt dort die Familie der Farnkräuter, unter dieſen beſonders Adiantum cuneatum, capillus, tenerum, formosum und trapeciforme. Auch die ſchönſten Exemplare von Selaginella uncinata Spring (Lycopodium cassium Hort.) mit 2—3 Ellen langen Ranken ſah ich dort. Nicht minder üppig und ſchön ſtanden die Aroïdeen, unter dieſen ganz beſonders Philodendron giganteum, Phil. pertusum und Phil. pinnatifidum, außerdem ſchöne neue Fuchſien und das ſchönſte Exemplar der chineſiſchen Grabcypreſſe (Cupressus funebris), das ich je geſehen. Der Garten war ſehr ſauber und nett gehalten und exiſtirte vor 18 Jahren, das letzte Mal, ſeit ich Breslau geſehen, noch nicht, wenigſtens nicht in ſolcher Geſtalt wie heute.

Ebenſo wie die Stadt ſelbſt, bietet auch deren Umgegend dem Gartenfreunde reichen Genuß, beſonders Scheitnig, wo die Gärten der Herren Dr. Rutſch, Kaufmann Philippi und Buchhändler Max in Reichthum und Mannigfaltigkeit der Arten und geſchmackvoller Anordnung

mit denen der Stadt wetteifern. In ersterem erfreute mich die schöne Sammlung von Coniferen, worunter namentlich Cryptomeria japonica und Cryt. Cunninghami, Araucaria excelsa, imbricata und brasiliensis sich durch Stärke und Schönheit auszeichnen. Ebenso die schöne Sammlung Orchideen und Palmen; von letzteren ist ganz besonders Chamaedorea humilis durch üppigen, stolzen Wuchs bewunderungswürdig und macht dem trotz seines Alters geistig und körperlich noch jugendlich rüstigen Gärtner Bauditsch alle Ehre.

Der zweite der dortigen Gärten, Herrn Kaufmann Philippi gehörig, erfreute mich zuerst durch die große Sauberkeit der Parkanlagen. Besonders merkwürdig ist hier das außerordentlich starke Exemplar der Salisburia adiantifolia oder Gingko biloba, des Gingkobaumes, der an Höhe und Stärke wohl in ganz Deutschland seines Gleichen sucht. Auch die Magnolia japonica (?) und grandiflora hat der dortige Gärtner, Herr Wagner, in vortrefflicher Kultur.

Ist nun dies Alles schon schön und interessant, so sind die herrlichen Parkanlagen in dem Max'schen Garten geradezu entzückend. Reich an romantischen Abwechselungen, an schönen Gehölzen und starken, schönen Eichen, hat dieser Garten ein wahrhaft königliches Gepräge, wozu das sinnvolle Arrangement der Villa und die saubere Haltung des Ganzen allerdings nicht wenig beiträgt. Es fehlt diesem Garten Nichts, als — die Seele der Landschaft, das ist — Wasser, welche Schwierigkeit selbst ein Gartenkünstler, wie Herr Hauptmann Nees von Esenbeck nicht beseitigen konnte, da dies jedenfalls ungeheure Kosten verursacht hätte, die zu dem Ganzen in keinem Verhältniß gestanden haben würden.

Besonders interessant für den wissenschaftlich gebildeten Gartenfreund ist auch das Baumschulen-Etablissement des Herrn Julius Mohnhaupt auf der Sterngasse vor dem Sandthore. Die Sammlungen von Eichen-, Magnolienarten und Coniferen, die sich hier befinden, dürften von andern Handelsgärtnereien Deutschlands wohl schwerlich übertroffen werden. Ueberhaupt sind hier die neuesten und schönsten Gehölze aufs reichhaltigste vertreten und die Verwaltung von Herrn Kirchner eine vortreffliche, so daß gewiß kein Freund der Baumzucht dies Etablissement unbefriedigt verlassen wird.

Nicht weit von demselben, ebenfalls auf der Sterngasse, liegt die Kunst- und Handelsgärtnerei von Herrn Rother, deren liebliches Entrée, eine sehr geschmackvolle Zusammenstellung interessanter Gewächse auf einem schönen, sammetartigen Rasenplatze, gleich Anfangs angenehm berührt. Außerdem ist die schöne Zusammenstellung einer Freilandgruppe von tropischen Pflanzen, die dem Ganzen ein orientalisches Ansehen verleihen, hervorzuheben, sowie der erschöpfende Reichthum in den neuesten Gewächshauspflanzen, worin Herr Rother allen übrigen Handelsgärtnern Breslaus überlegen ist. Sehr lobenswerth ist auch die allerdings erst in der Entwickelung begriffene Gärtnerei des Herrn Eistert, besonders dessen Sammlung von Himalaja-Rhododendron und Coniferen, wogegen sich Herr Eduard Mohnhaupt, der Bruder des oben erwähnten, außer der Zucht schöner Orchideen mit dem Ruhme begnügt, hier am Orte die größte Auswahl von Sommergewächsen, besonders von Astern, Balsaminen, Daturen ꝛc. zu besitzen.

Die Perle aber von Breslaus Gärten und gewiß einer der schönsten in der Provinz, ist die prachtvolle Villa Eichborn, in welcher auf einer Bodenfläche von 4—5 Morgen Alles vertreten ist, was im Gebiete der ästhetischen Gartenkunst nur irgend möglich scheint. Romantische Waldparthieen, vom krystallenen Wasserspiegel lieblich durchschlängelt, wechseln mit den schönsten Rasenplätzen, mit schönen einheimischen, wildwachsenden Pflanzen geschmückt, ab — mit einem Worte: hier hat die Kunst die Natur gemeistert und findet der angehende Landschaftsgärtner unerschöpflichen Stoff zum Studium. Welch reichhaltige Sortimente von Rhododendron, Azaleen, Camellien und Fuchsien, welch prächtige Exemplare von Palmen und andern tropischen Pflanzen in den Warmhäusern! Die letztern erinnern lebhaft an den Urwald in Afrika. — Doch auch für den gemeinen Sinn ist hier gesorgt; denn die französischen Anlagen vor der Hauptfaçade der Villa erfreuen ebenso das Auge des Laien, wie des wissenschaftlich gebildeten Kenners.

Hierbei sei auch noch des großen Gartens an dem nächstes Jahr zu eröffnenden großen Etablissement des Brauermeisters Herrn Friebe erwähnt, das zwischen Höfchen und Kleinburg gelegen ist und sich durch auffallend dicht gepflanzte Gehölzgruppen auszeichnet. Schließlich sei noch der Kunst- und Handelsgärtnerei des Herrn Eduard Breiter wegen ausgezeichneter Obst- und Baumsortimente rühmlichst gedacht und der Wunsch diesem einfachen Berichte beigefügt, denselben vielleicht später einmal ausführlicher wiederholen, respective ergänzen zu können.

Hannemann,
Institutsgärtner und Docent an der Königl. landwirschaftl. Academie Proscau a/S.

Melonen im Freien unter Glaskasten zu ziehen.

Könnten Melonen nicht anders, als in einem Mistbeetkasten zur Reife gebracht werden, so müßte jeder Gartenliebhaber, der nicht im Besitz eines solchen Kastens wäre, sich der Freude entsagen, Melonen selbst zu ziehen. Doch sie lassen sich im Freien unter einem Glaskasten oder einer Glasglocke fast zu derselben Größe wie im Mistbeete heranziehen. Hat man nun die Absicht, diese Zucht vorzunehmen, so ist es vor allen Dingen nöthig, nach Anschaffung älterer guter Kerne die Pflanzen so weit heranzubilden, bis selbige unter die Glaskasten gepflanzt werden können, welche Anzucht auf folgende Weise geschieht:

Anfangs März fülle man kleine Töpfe, in welche unten ein Scherben gelegt ist, bis an den Rand mit einer guten Holzerde, die mit Sand vermengt ist. Auf diese Erde werden zur Sicherheit des Aufgehens 2 Kerne gelegt und mit dem Finger so weit eingedrückt, daß dieselben ganz leicht bedeckt werden. Zum schnellen Aufgehen ist Wärme erforderlich, weshalb man die Töpfe auf den Ofen, jedoch nicht auf zu heiße Stellen, setzt. Hier werden die Kerne bei öfterem Begießen des Tages

über nach 4—5 Tagen aufgehen; man lasse sich aber nach Verlauf dieser Tage nicht täuschen, wenn dieselben noch nicht aufgegangen, da die Kerne oft länger liegen und dennoch gut kommen. Sind die Kerne gekeimt und fangen die Samenlappen an, sich aus der Erde zu heben, so schneide man, wo zwei aufgegangen, eins heraus und stelle die Töpfe, um die Pflanzen zu kräftigen, an das Fenster, wo sie alles Licht genießen. Hier werden die Pflänzchen bei nicht zu vielem Gießen gezackte Blätter treiben und hierauf wird, nachdem 3 Blätter außer den beiden Samenlappen hervorgekommen, der erste Schnitt vorgenommen.

Derselbe besteht in dem Ausschneiden der Spitze über dem zweiten gezackten Blatt, um die Pflanze zu zwingen, aus jedem Winkel der zwei bleibenden Blätter eine neue Ranke zu treiben. Sobald man nun sieht, daß sich in beiden Blattwinkeln neue Ranken zeigen, so kann das Auspflanzen in das Freie vorgenommen werden. — Um den Pflanzen so viel wie möglich einen geeigneten Standort zu geben, wähle man am liebsten eine gegen Mittag gelegene Rabatte vor einer Mauer, wo rechte Prellsonne stattfindet. Ist jedoch solche Rabatte im Garten nicht vorhanden, so läßt sich auch auf jedem beliebigen Beete, welches volle Sonne genießt, die Anlage vornehmen.

Geschieht diese auf einer Rabatte oder auf einem Beete, so ist es beiderseits nöthig, die Pflanze erhöht zu setzen, damit sich das Wasser nicht nach dem Stamme ziehen kann, wodurch eine Fäulniß desselben entstehen würde. — Die Anlage selbst geschieht folgendermaßen:

Man grabe eine viereckige Grube, welche noch mal so groß sein muß, als der Glaskasten selbst, und fülle selbige mit Pferdedünger, der erwärmt ist, so an, daß er einen Fuß über die gewöhnliche Erdfläche kommt; hierauf bringt man fette Erde, die aus verrottetem Dünger oder aus einer guten Gartenerde besteht, einen halben Fuß über dem Dünger, und forme das Ganze so, daß nach allen Seiten zu ein Abfall ist; dann wird der Glaskasten aufgesetzt. Nach etlichen Tagen wird die Erde so erwärmt sein, daß die darin zu pflanzende Melone die nöthige Wärme zum Anwachsen findet. Das Auspflanzen selbst geschieht wie folgt:

In der dazu erhöhten Erdanlage wird ein Loch, das nicht viel größer als der Topf, worin die Pflanze sich befindet, gemacht, dieselbe behutsam ausgetopft, in das Loch eingesetzt, mit der herausgenommenen Erde zugefüllt und etwas angedrückt, so daß die Pflanze bis ziemlich unter dem Samenlappen in die Erde zu stehen kommt. Ist die Erde feucht genug, so ist ein starkes Angießen nicht erforderlich; geschieht es aber wegen Trockenheit, so sehe man darauf, nicht zu viel Nässe an den Stamm zu bringen. Hierauf setzt man den Glaskasten auf und gebe, wenn heißer Sonnenschein nach der Pflanzung erfolgen sollte, durch Vorstecken von Zweigen Schatten.

Die hierauf folgende Arbeit ist der zweite Schnitt. Da nach dem ersten Ausschneiden des dritten Blattes 2 Blätter geblieben sind, so werden aus den 2 Blattwinkeln 2 Ranken herauswachsen, die so lange ungestört fortlaufen, bis an jeder derselben das dritte Blatt erscheint. Diese Spitze wird über dem zweiten Blatte ebenfalls abgeschnitten und jede der 2 Ranken nun gezwungen, 2 neue Ranken zu treiben, wodurch man an der Pflanze 4 Ranken erhält, an denen nichts wieder geschnit-

ten wird, bis deren Seitenränkchen Früchte zeigen. Sollte der Glaskasten von Ranken ausgefüllt und selbiger an dem Weiterwachsen gehindert werden, so stelle man unter jeder Ecke des Kästchens einen halben Mauerstein, damit die Ranken hindurch gehen und sich breiten können. Wären noch Fröste zu befürchten, so müssen die sich außer dem Glaskasten befindlichen Ranken durch Ueberhänge geschützt werden.

Außer dem Gießen wird jetzt nichts weiter an der Pflanze vorgenommen; die Seitenränkchen und Früchte, die sich zeigen, lasse man fortwachsen, bis letztere die Größe einer großen Wallnuß haben, worauf nochmals ein Schnitt erfolgt.

Den 4 Ranken, deren Seitenränkchen die Früchte angesetzt, werden die Spitzen genommen; die Ränkchen, an denen die Früchte sitzen, zwei Blätter über jeder Frucht verschnitten, die übrigen Ränkchen, welche ohne Früchte sind, weggeschnitten und so die Pflanze gezwungen, den daran befindlichen Früchten alle Nahrung und allen Saft zuzuführen.

Werden die Früchte größer, so lege man Dachziegel unter, um Fäulniß oder Flecke, welche die Früchte durch das Liegen auf der nassen Erde bekommen, zu verhindern. Von dem letzten Ausschneiden an ist die Arbeit bis auf das Gießen vollendet, welches bei Trockenheit wöchentlich zweimal in etlichen Kannen besteht, jedoch stets ohne den Stamm zu begießen, und bis auf das Ausschneiden solcher Ranken, die nur sogenannte taube Blüthen haben, welche keine Früchte erzeugen. Sollte es bei aller Aufmerksamkeit vorkommen, daß sich dennoch Fäulniß am Stamme und an den Ranken vorfindet, so kann man die Pflanzen dadurch retten, daß man den Fleck ausschneidet und die Wunde mit Holzkohlenpulver bestreut, wodurch wenigstens die zunehmende Fäulniß verhindert wird. Auch bei jedem Schnitte ist es rathsam, die Wunde mit trockener Erde zu bestreuen, um den Saftauslauf zu verhindern, welcher leicht die Fäulniß hervorbringt. —

Durch solche Behandlung erzieht man fast eben so schmackhafte und große Früchte im Freien wie in den Mistbeeten, und der Gartenliebhaber wird sich mancher Frucht erfreuen, die er durch Mühe und Aufmerksamkeit erzogen hat. Ist die Melone reif, welches man am Lösen der Frucht vom Stiele und am Geruch erkennt, und will man den rechten Genuß davon haben, so thut man wohl, die Frucht einen Tag im Keller aufzubewahren, da die Melone durch die hier annehmende Kühle mehr erquickt, als wenn sie bald nach dem Abnehmen vom Stocke genossen wird.

L. Schroeter.

Bemerkung. In diesem Sommer, der allerdings ein ausnehmend heißer und trockener ist, sind meine Melonen im Freien ohne Düngerunterlage und ohne Glaskasten vollkommen gerathen. Die warmen Nächte haben gleichfalls zum schnellen Wachsthum der Pflanze und zur Ausbildung der Früchte beigetragen. Derselbe.

Der Wörlitzer Garten

mit seinen bemerkenswerthen Bäumen und Gebäuden.

Das Dessauerland, in welchem dieser Garten liegt, bildet an und für sich einen großen Landschaftsgarten und die Wege, die zu denselben führen, bieten so manche schöne Naturscene, welche dem Gärtner nicht blos zur Anschauung dienen, sondern zum weitern Nachdenken anspornen wird. Ich will hier nur die zwei Hauptwege, die zu dem Wörlitzer Garten führen, erwähnen, nämlich die von den Städten Dessau und Coswig; beide führen durch schöne Eichenwälder, in denen man die alten riesigen Eichen staunend bewundern muß, welche entweder zum Walde vereinigt, gruppenweise oder einzeln auf den Wiesen vertheilt stehen. Gleichsam, als wären Wald und Wiesen mit dem Parke zusammengelegt, als wäre Alles zu einem Garten von Künstlerhand eingerichtet, fallen besonders einige Bäume des Gartens, der von dem kunstsinnigen Fürsten Franz im Jahre 1768 angelegt wurde, auf. Mögen auch Stimmen wach geworden sein, die den Wörlitzer Garten dem neuen Gartengeschmack fern erklären, welche die darin aufgeführten Gebäude, Tempel, Brücken, Grotten und Einsiedeleien für Spielerei halten, so treten wir damit entgegen, daß in einem so großen Parke solche Abwechselungen nöthig waren und gewiß an dem rechten Orte angebracht wurden. Zudem ist es auch nicht so leicht, einen nach einem gewissen Plane ausgeführten und lange bestehenden großen Landschaftsgarten in seiner Grundlage zu ändern, wo auch zuletzt die Pietät ihr Wort mit geltend macht; er wird für einen Landschaftsgarten stets schön bleiben, und die Baumgruppen und einzeln stehenden Bäume werden, so lange sie stehen, immer einen bleibenden Eindruck auf den Beschauer machen. —

Im Hintergrunde von dunkeln Tannen, im Vordergrunde von alten Lindenbäumen umgeben, liegt das freundliche Schloß, in dessen Nähe sich die schöne in gothischem Style erbaute Kirche befindet, welche von vielen Punkten des Gartens ein schönes Bild bietet. Von hier aus führt der Weg an dem großen See entlang über eine Fähre nach dem eigentlichen Garten. Schon beim Ueberfahren gewahrt das Auge die schönen massenhaften Baumgruppen, welche sich im Wasser abspiegeln und einen Theil der im Garten befindlichen Gebäude, als: den Stein, das Nymphäum und das Gothische Haus, an denen der Wanderer auf seinem Spaziergange gewiß gern einige Zeit verweilt, um theils die Aussichten, theils das Aeußere wie das Innere der Gebäude näher in Augenschein zu nehmen, da manches Interessante und Lehrreiche darin aufbewahrt wird. Sobald man mit der Fähre gelandet, verfolgt man den Weg über eine schwimmende Brücke nach dem Nymphäum, wo mehrere Bäume zu bemerken sind, die gewiß nicht nur den Kenner, sondern auch den Laien gleich in Erstaunen setzen. Vor Allem eine dicht am Wasser stehende abendländische Platane, Platanus occidentalis L., die ihre riesenhaften Zweige weit über das Wasser hinausbreitet, und ein Taxodium distichum Rich. (Cupressus distichа L.), zweizeilige Eibencypresse, von bedeutender Höhe und Stärke, welche namentlich im Herbste durch ihre rothe Färbung eine gute Schattirung hervorbringt. Eine Gruppe von

schönen Weihmuthskiefern, Pinus Strobus L., eine Gruppe großer Scharlacheichen, Quercus coccinea Mchx., deren scharlachrothes Laub im Herbste von malerischem Effecte ist, einzelne riesige Schierlingsfichten, Pinus canadensis Ait., die mit ihren unteren Zweigen förmliche Hütten bilden, treten auf der nahe daranstoßenden Wiese besonders hervor. Beim Ueberschreiten dieser Wiese trifft man eine riesenhafte Eiche mit Weidenblättern, Quercus Phellos L., die von Keinem unberücksichtigt gelassen wird, denn es ist unstreitig eine überraschende Erscheinung, wenn man den großen Eichenbaum mit Blättern, der Weide ganz ähnlich sieht. Ein dunkler schattiger Weg, an dem namentlich die rothe Ceder, Juniperus virginiana L., von bedeutender Höhe und Stärke massenhaft vertreten ist, führt an der Ruhestätte des Garteninspectors Schoch vorbei, der diesen Garten anlegte und bepflanzte. Von diesem Punkte aus wird es nöthig, einen kleinen Seitenweg einzuschlagen, welcher nach dem Dianenhain führt, auf welchem eine ungeheure rothe Eiche, Quercus rubra L., besonders hervortritt. Ein Blick nach dem naheliegenden Monument, von dem weiter unten noch ein Wort gesagt wird, über einen kleinen Binnensee, an dessen Ufer sich starke Trauerweiden, Salix babylonica L., mit ihren hängenden Aesten abspiegeln, bietet dem Wanderer gewiß ein schönes Bild dar. Man muß sich von hier aus wieder zurück wenden, um nach dem Gothischen Hause zu kommen, das manche Kunstschätze als Bilder, Rüstungen, Waffen u. dgl. enthält. In der Nähe dieses Gebäudes, welches wohl das am wenigsten gelungene zu nennen ist, da neben dem gothischen Style die vielen Thürmchen mehr im chinesischen Geschmacke gehalten zu sein scheinen, steht eine große Pyramidenreihe Quercus pyramidalis hort., die ihrer Form nach im Augenblick mehr für eine Pappel gehalten wird, große Zürbelnußkiefer, Pinus Cembra L., die im Verein mit italienischen Pappeln, Populus italica du Roi, (dilatata Ait.) der Bauart des sogenannten Gothischen Hauses angepaßt sind. Der Weg führt von hier aus über eine natürliche Zackenbrücke nach dem Floratempel.

Von demselben führt der Weg über eine Kettenbrücke nach einer Einsiedelei, die jedenfalls am passenden Orte angebracht ist; es weht dem Wanderer hier in der That unter den großen Rothtannen Pinus Abies L., Lerchenbäumen Pinus Larix L. (Larix europaea DC.) und Schwarzpappeln Populus nigra L. Ruhe und Friede an. Unterirdische Gänge führen auf stille Plätze, an denen sinnreiche Sprüche angebracht und enden in einem dunklen Thale, dessen Hintergrund der Venustempel bildet. Von demselben bietet sich ein lachender Blick über große Wiesen; thätige Menschen mit ihren Sensen, weidende Heerden beleben dieses Bild und hier trägt der Garten ganz den Charakter eines englischen Parkes. Von diesem Punkte aus verfolgt man nun immer den großen Damm, der den Garten vor dem austretenden Elbufer schützen muß; zur linken Seite die Wiesen, den Wald; zur rechten den Garten, dessen Gebäude und Brücken oft unverhofft in der Ferne erscheinen. Alles scheint, so weit das Auge reichen kann, harmonisch mit einander zu einem großen Landschaftsgarten vereint zu sein. Der nächste Ruhepunkt ist das Monument, ein von rohen Steinen aufgeführtes Gebäude, in welchem die Büsten der Anhaltischen Fürsten aufbewahrt werden. Ein zweiter Halt ist auf diesem Damme das Pantheon, zur Aufbewahrung verschiedener

Statuen und Antiken aus Rom. Dieſes Gebäude macht die Grenze und der Wanderer verfolgt nicht weiter den Damm, ſondern wendet ſich ſeitwärts, nachdem er den Blick von dieſem Gebäude aus über einen Binnenſee gerichtet, auf dem die weiße Seeroſe, Nymphaea alba L., in großer Anzahl vertreten iſt, wieder dem Schloſſe zu, von dem er ſeine Wanderung begonnen. Auf dieſem Wege, der an Wieſen und Aeckern vorbeiführt, bleibt noch der letzte Punkt in Augenſchein zu nehmen, nämlich der Stein, den ich beim Ueberfahren von der Fähre aus erwähnte. Mehr dem Fremden ſeines Aufbaues wegen beliebt, wird dem Auge des Gärtners hier weniger als in den andern Partien geboten, der Beſucher des Gartens lenkt ſeinen Weg, der eine Verbindung mit dem Garten und der Stadt iſt, direct dem Schloſſe zu und der Beobachter wird ſich manches Landſchaftsbild eingeprägt haben, welches ſo lange auch der Garten ſchon beſtehen mag, immer ſchön bleiben wird.

L. Schroeter.

Gartenbau-Vereine.

Bericht über die vom 20. bis 25. October 1858 in Chriſtiania abgehaltene Ausſtellung zur Beförderung der Landwirthſchaft und des Gartenbaues in Norwegen.

Nachſtehender Auszug des von mir über obige Ausſtellung veröffentlichten Berichtes dürfte auch bei auswärtigen Freunden der Landwirthſchaft und der mit ihr verwandten Zweige einiges Intereſſe erregen, inſofern er geeignet iſt, ein klareres Bild von den Vegetationsverhältniſſen Norwegens zu geben, die dem Fremden, der mit den hieſigen, auf das Pflanzenleben hauptſächlich influirenden klimatiſchen Lokalverhältniſſen nicht aus eigener Anſchauung vertraut iſt, immer noch manches Neue und Ueberraſchende darbieten. —

Der gedachte Bericht findet ſich vollſtändig in dem April- und Mai-Hefte 1859 der in Chriſtiania erſcheinenden, von der Königlichen Geſellſchaft „Für das Wohl Norwegens“ herausgegebenen, landwirthſchaftlichen Monatsſchrift: „Budstikken“; und es iſt hier nur dasjenige aufgenommen worden, was mir auch in weiteren Kreiſen der Beachtung werth ſchien. —

Es iſt leicht erklärlich, daß man in einem Lande wie Norwegen, wo der Ernte-Ertrag in einem ſo hohen Grade von den Witterungs-Verhältniſſen abhängig iſt, ein größeres Gewicht auf ſolche Zeichen legt, die der allgemeinen Erfahrung gemäß ein mehr oder minder günſtiges Jahr vorher zu verkünden pflegen, als ſolches in andern Ländern, die ſich eines milderen Klimas erfreuen, der Fall iſt. — Verdienen nun auch im Allgemeinen vielleicht die meiſten dieſer prophetiſchen Zeichen keineswegs das blinde Vertrauen, welches die Menge ihnen ſchenkt, ſo läßt ſich doch nicht läugnen, daß es einzelne darunter giebt, die man ſo viel-

fältig bestätigt gefunden hat, daß es nicht zu verwundern ist, wenn ihnen auch von Seiten der Aufgeklärteren eine mitunter übertriebene Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zu solchen, auf das kommende Frühjahr deutenden Zeichen gehören auch hier zu Lande, wie an anderen Orten, das frühere oder spätere Eintreffen der Zugvögel und das erste Blühen der gewöhnlichen Frühjahrspflanzen. Beides ließ im vorigen Jahre auf einen frühen und günstigen Frühling für Norwegen schließen; dennoch aber trat gegen Ende Mai eine so ungewöhnlich niedrige Temperatur ein, daß viele Gewächse dadurch in ihrer Entwicklung gehemmt wurden. Da es übrigens immerhin einige Beachtung verdienen mag, wie sich die Anzeichen des einen Jahres zu denen des andern verhalten, so habe ich seit einigen Jahren mehrere hierhergehörige Merkmale verzeichnet, und dabei zu beobachten gesucht, in wie fern das frühere oder spätere Eintreten des Frühjahrs einen merklichen Einfluß auf die Entwicklung der Pflanzen und ihren Ernte-Ertrag ausübt. Fortgesetzte, in verschiedenen Gegenden eines und desselben Landes mit der erforderlichen Genauigkeit gemachte Beobachtungen dieser Art könnten möglicherweise nach einer Reihe von Jahren zu einem einigermaßen haltbaren Resultat führen.

Von den von mir 1858 gemachten Notizen will ich, da sie auch in anderer, mehr allgemeiner Beziehung nicht ganz ohne Interesse sind, folgende wenige hier anführen. Einzelne Beobachtungen können, selbstverständlich, von Anderen an einem früheren Datum gemacht worden sein.

Am 24. März blühten im hiesigen botanischen Garten, woselbst meine Beobachtungen stattfanden: **Corylus Avellana, Alnus incana** und **Tussilago Farfara. Die erste Lerche.**

28. März blühte **Galanthus nivalis.**

31. März blühte **Hepatica triloba.**

15. April blühte **Crocus vernus** und **Daphne Mezereum.**

18. April. **Die erste Bachstelze (Motacilla alba).**

25. April blühten Pfirsiche und Aprikosen am Spalier.

13. Mai blühten **Primula veris, Prunus Padus,** Kirschen und Winterrübenraps **Brassica Rapa oleifera biennis var. Biewitz). Die erste Schwalbe (Hirundo urbica).**

21. Mai 7 Uhr Morgens war der Erdboden gefroren und mit starkem Reif bedeckt.

23. Mai blühte der Birnbaum.

26. Mai Schnee auf einer Bergspitze, ungefähr eine Meile von der Stadt.

27. Mai ¼ Zoll dickes Eis während der Nacht.

1. Juni stand der Apfelbaum in voller Blüthe und Winterroggen hatte an mehreren Stellen Aehren angesetzt.

9. Juni Aehren an der Wintergerste.

10. Juni blühte der Winterroggen.

15. Juni wurden reife Feld-Erdbeeren (**Fragaria vesca**) feilgeboten.

26. Juni reife Süßkirschen.

27. Juni reifer Winterrübenraps.

15. Juli reife Himbeeren.

16. Juli reife Wintergerste.

20. Juli reifer Winterroggen.

10. August reife Phönixgerste; gesäet den 14 Mai.

12. Auguſt reifer Winterweizen (Triticum tardicum, Engliſcher Wunderweizen mit doppelten Aehren).
14. Auguſt reifer Sommerweizen (100tägiger Sommerweizen), reifer Sommerroggen und reife Reisgerſte; ſämmtlich den 14. Mai geſäet.
21. Auguſt reifer Mais (Cinquantino, Gelber Hühner-Mais), geſäet den 18. Mai.
6. October. Die erſte Froſtnacht, ſo daß die Blätter der Kürbis, Gurken, Bohnen, Mais, Wallnüſſe, Sida tiliaefolia, Guizotia oleifera, Coix Lacryma und mehrerer anderer Pflanzen Schaden litten.

Ein paar Beiſpiele können vielleicht dazu dienen, eine Idee von der Fortentwickelung der Pflanzen in der zweiten Hälfte des vorigen Sommers zu geben. Am 28. Juni ließ ich daſſelbe Beet, auf dem Tags vorher reifer „Biewitz“ geerntet worden war, umarbeiten; die eine Hälfte wurde mit Erbſen beſäet (Early wonder pea), die andere mit Jeruſalem-Gerſte. Die Erbſen waren reif am 28. Auguſt (= 62 Tagen); die Gerſte reifte den 28. September (= 93 Tagen).

Um, ſo weit es möglich iſt, hier eine deutliche Vorſtellung von den Witterungs-Verhältniſſen im Sommer 1858 in der Umgegend von Chriſtiania zu geben, laſſe ich eine Ueberſicht über den Thermometer- und Barometerſtand, die Regenmenge und die Bewölkung für das betreffende Jahr folgen, ſo wie ſolche auf dem hieſigen aſtronomiſchen Obſervatorium beobachtet worden ſind. Auf den weſentlichen Einfluß desjenigen Zuſtandes der Atmoſphäre, der unter „Bewölkung“ gemeint iſt, hier näher einzugehen iſt überflüſſig.

Thermometerſtand, Reaum.

	1857.			1858.		
	Mittler	Höchſter	Niedrigſter	Mittler	Höchſter	Niedrigſter
Januar . . .	— 5,67	+ 5,26	— 17,55	— 0,89	+ 5,36	— 6,69
Februar . .	— 1,66	+ 6,31	— 10,82	— 1,72	+ 7,65	— 10,32
März	— 0,64	+ 5,66	— 11,17	+ 0,53	+ 11,74	— 11,42
April	+ 2,33	+ 9,65	— 3,63	+ 4,14	+ 13,84	— 2,65
Mai	+ 8,36	+ 20,15	+ 1,12	+ 8,02	+ 16,43	+ 2,91
Juni	+ 11,96	+ 21,69	+ 5,56	+ 13,97	+ 23,57	+ 7,00
Juli	+ 12,91	+ 18,72	+ 8,74	+ 14,17	+ 23,63	+ 8,84
Auguſt . . .	+ 14,82	+ 21,99	+ 8,89	+ 14,18	+ 21,74	+ 7,35
September .	+ 10,69	+ 18,08	+ 2,70	+ 10,60	+ 17,30	+ 3,90
October. . .	+ 6,06	+ 12,64	+ 0,66	+ 4,06	+ 10,24	— 2,17
November. .	— 0,12	+ 7,95	— 8,51	— 2,15	+ 4,86	— 8,21
December . .	+ 1,17	+ 6,95	— 7,30	— 1,52	+ 4,36	— 11,52
Für's ganze Jahr	+ 5,06	+ 21,99	— 17,55	+ 5,32	+ 23,63	— 11,52

Barometerstand.

	1857.			1858.		
	Mittler	Höchster	Niedrigster	Mittler	Höchster	Niedrigster
Januar . . .	335‴,24	345‴,74	326‴,78	337‴,15	336‴,31	320‴,70
Februar . . .	337, 14	342, 94	327, 74	338, 86	347, 01	326, 42
März	336, 80	347, 23	325, 27	331, 55	342, 07	317, 41
April	336, 96	340, 95	325, 64	334, 61	340, 87	326, 26
Mai	337, 46	341, 57	332, 35	334, 83	340, 16	328, 11
Juni	335, 79	339, 91	329, 97	336, 48	339, 95	331, 13
Juli	333, 71	337, 39	329, 33	334, 50	339, 18	325, 86
August . . .	337, 02	341, 68	333, 64	336, 37	341, 46	330, 59
September .	336, 18	341, 09	331, 25	335, 61	340, 88	329, 16
October. . .	335, 47	340, 82	327, 61	335, 02	342, 38	324, 07
November. .	339, 14	345, 10	325, 00	335, 67	343, 26	329, 12
December. .	335, 90	342, 87	328, 65	336, 87	344, 23	326, 17
Für's ganze Jahr	336‴,34	347‴,23	325‴,00	335‴,60	347‴,01	317‴,41

Regenmenge.

	Norwegische Fuß	
	1857.	1858.
Januar . . .	0,083	0,055
Februar . . .	0,072	0,029
März	0,073	0,054
April	0,094	0,010
Mai.	0,029	0,261
Juni	0,123	0,155
Juli.	0,445	0,370
August. . . .	0,067	0,250
September. .	0,144	0,195
October . . .	0,338	0,108
November . .	0,043	0,060
December . .	0,094	0,103
Für's ganze J.	1,605	1,651

Bewölkung.

	1857.			1858.		
	Klare	Bewölkte	Trübe	Klare	Bewölkte	Trübe
	Tage.			Tage.		
Januar . . .	8	1	22	11	2	18
Februar . . .	7	2	19	16	2	10
März	11	2	18	13	3	15
April	8	4	18	19	5	6
Mai.	17	3	11	12	4	15
Juni	18	5	7	20	4	6
Juli.	15	5	11	13	5	13
August. . . .	24	3	4	23	3	5
September. .	12	4	14	15	6	9
October . . .	9	3	19	16	3	12
November . .	7	3	20	17	2	11
December . .	14	5	12	5	2	24
Für's ganze J.	150	40	175	180	41	144

Als allgemeines Ergebniß der durchschnittlichen Ernte von 1858 in Norwegen stellt sich nach dem officiellen Berichte, welchen das Departement des Innern alljährlich bei der Regierung einzureichen hat, heraus: daß die Heuernte, mit Ausnahme einiger wenigen Districte, im ganzen Lande sehr zufriedenstellend ausgefallen ist. Mit der Kornernte war das freilich nicht so durchgängig der Fall, doch konnte auch diese als eine gute Mittelernte bezeichnet werden. Die Kartoffelernte ist

als faſt überall fehlgeſchlagen anzuſehen, da die leidige Krankheit ganz ungewöhnliche Verwüſtungen angerichtet hatte, ſchon während die Frucht ſich noch auf dem Acker befand. Dagegen haben faſt ſämmtliche Baumfrüchte im vorigen Jahre einen außerordentlich reichen Ertrag geliefert, und hiervon gab die große Auswahl des, ſelbſt von den nördlichſten Gegenden des Landes, zur Ausſtellung eingeſandten Obſtes ein erfreuliches Zeugniß. In dem Ausſtellungs-Locale war ein Flächenraum von 716 □Fuß mit kleinen Pyramiden des herrlichſten Obſtes dicht bedeckt, was, wenn man auch nur von Aepfeln und Birnen 10 Früchte pr. □Fuß rechnet, ſchon eine Summe von über 7000 Stück ergiebt und nach unſeren Verhältniſſen als ein überaus befriedigendes Reſultat betrachtet werden darf. Es ſpricht ſich darin auf's deutlichſte aus, daß die geſammte Bevölkerung, nachdem man den Nutzen dieſer (zuerſt im October 1852 von mir veranſtalteten) Ausſtellungen ſchon nach einigen Jahren mehr und mehr erkannt hat, dieſelben mit immer ſteigendem Intereſſe umfaßt; was denn nicht verfehlen kann, einen günſtigen Einfluß auf die Hebung des Land- und Gartenbaues auszuüben. — Nicht allein für Baumfrüchte, ſondern auch für die Entwickelung der meiſten Küchengewächſe war der vorige Sommer ungewöhnlich günſtig, und auch dies gab ſich durch reiche, von fernen Gegenden herbeigekommene Beiträge kund.

Die Menge und Schönheit der ausgeſtellten Gegenſtände erregte die freudige Verwunderung ſowohl der zahlreichen einheimiſchen Beſucher als auch das Erſtaunen der anweſenden fremden Gäſte; nach deren offener Erklärung die hieſige Ausſtellung nicht nur die kurz vorher in Stockholm abgehaltene an Reichhaltigkeit und Intereſſe übertraf, ſondern ſich ſogar mit der vorigjährigen Dresdener Ausſtellung meſſen konnte.

So weit der Raum dieſer Blätter es zuläßt, will ich verſuchen, eine kurze Ueberſicht der namhafteſten unter den ausgeſtellten Gegenſtänden zu geben. — Von den verſchiedenen Getreidearten verdienen Erwähnung:

Winter-Weizen aus Thelemarken, urſprünglich von den Vereinigten Staaten eingeführt und erſt ſeit einigen Jahren hier kultivirt. Das Korn war von gutem Ausſehen. Daſſelbe war der Fall mit mehreren anderen Sorten, theils aus der Umgegend, theils aus dem Innern des Landes. Ich hatte nur drei Arten vorzuweiſen, worunter eine in den Rheinprovinzen ziemlich allgemein verbreitete, die mir unter der Benennung Blé brun d'Heidelberg zugekommen iſt. Dieſe Varietät, die in Frankreich auch unter der Bezeichnung „Froment rouge, très estimé sur les bords du Rhin“ vorkommt, ſcheint ſich, nach den bisher von mir gewonnenen Erfahrungen, beſonders für das hieſige Klima zu eignen. Eine andere Varietät, die ich unter dem Namen „Winter-Igel-Weizen“ (Froment commun d'automne à épi barby et compacte) erhielt, gab zwar weniger Ertrag, ſcheint aber gleichfalls einer rauheren Witterung gut zu widerſtehen und ſich mit einem ärmeren Boden zu begnügen.

Sommer-Weizen. Recht gutes Getreide aus hieſiger Umgegend und der Nähe von Frederikshald. Ich hatte folgende Sorten ausgeſtellt: Club Spring Wheat, Montreal Spring Wheat, Victoria-Sommer-Weizen, Sommer-Igel-Weizen, 100tägiger Sommer-Weizen, Toskana-Weizen und eine eigene Art ſehr großkörnigen und hellſamigen Sommer-Weizen, den ich (ohne Namen) früher aus Waſhington erhalten hatte. Dieſe

Varietät wurde am 14. Mai gesäet und am 13. September reif geschnitten, gebrauchte also 123 Tage zu ihrer Entwickelung. Ich habe jedoch nach meiner, mit anderen Getreidearten gewonnenen Erfahrung allen Grund anzunehmen, daß auch diese Varietät bei fortgesetzter Kultur nach einigen Jahren so viel weniger Zeit zur Reife erfordern wird, daß sie in den wärmeren Gegenden unseres Landes eine sichere Jahresernte abgeben kann. Schon im zweiten Jahre seiner Cultur hatte dieser Weizen hier einen Vorsprung von mehreren Tagen vor dem Originalkorne von Washington gewonnen, welches ich unmittelbar neben dem hier geernteten Samen in die Erde gebracht hatte. Die hier nur beiläufig berührte Thatsache gewinnt im Zusammenhang mit anderen Beobachtungen ein so bedeutendes Gewicht und scheint einen so wesentlichen Beitrag zur Theorie der Pflanzencultur und Acclimatisation zu liefern, daß ich das Wesentliche der in dieser Beziehung bisher von mir gewonnenen Resultate ehestens in einer besonderen Abhandlung dem sich dafür interessirenden Publikum vorzulegen beabsichtige.

Unter den übrigen Sorten reiften Club Spring Wheat, wovon ich das Probekorn bei Gelegenheit der Pariser Weltausstellung als von Canada eingeführt, erhielt, und der 100tägige Sommer-Weizen am frühesten. Beide lieferten ein schönes Korn. Ersteren säete ich den 12. Mai und erntete den 11. August (= 92 Tage), letzteren den 14. Mai und erntete den 14. August (= 93 Tage). Der Montreal-Weizen gebrauchte 107 Tage; der Victoria- sowie der Sommer-Igel- und Toskana-Weizen erforderten 99 Tage um zu reifen. Für die letztgenannte Varietät interessire ich mich besonders wegen der Verwendbarkeit des Strohes zu Flechtarbeiten, auf welchen Betrieb ich bemüht bin, die Aufmerksamkeit unserer Bevölkerung hinzulenken. — Von

Sommer-Dinkel-Weizen (Triticum Spelta) hatte ich verschiedene Sorten ausgestellt; doch habe ich noch zu geringe Erfahrung über die versuchsweise cultivirten Varietäten, um etwas Bestimmtes über ihr Verhalten sagen zu können. Der Director der Landwirthschaftlichen Academie in Hohenheim, Herr Walz, empfiehlt die Cultur des Dinkels unter Verhältnissen, die mit den hiesigen ziemlich genau übereinstimmen, und seine Gründe scheinen mir so beachtenswerth, daß ich meine Versuche damit fortsetzen werde; so wie ich gleichfalls andere Cultivateure aufgemuntert habe, ein Gleiches zu thun.

Winter-Roggen war von verschiedenen Gegenden in guten Qualitäten und folgenden Sorten ausgestellt: Vasa-, Eldenaer-, Bastard-, Probstei-, Abyssinischer-, Sibirischer- und Johannistag-Roggen.

Sommer-Roggen, den ich am 14. Mai gesäet hatte, wurde nach 93 Tagen geschnitten. Man hat seit einigen Jahren in dem südlichen Theile Norwegens weniger Sommer-Roggen gebaut als früher, und angefangen anstatt dessen Sommer-Weizen einzuführen; im Stifte Bergen ist dagegen der Sommer-Roggen noch sehr allgemein.

Gerste, gewöhnliche zweizeilige, war von verschiedenen Seiten eingeschickt worden. Von Thelemarken erschien eine besondere Varietät, die in dortiger Gegend unter einem provinziellen Namen vorkommt, der ungefähr so viel als „gespreizte Gerste“ ausdrückt, indem sie mit fächerartig auseinanderstehenden Grannen versehen ist. Diese Gerste hat mehrere Jahre nacheinander auf gutem Boden 25fältigen Ertrag gege-

ben; und da sie sich frühzeitig und beiläufig um ⅓ dünner aussäen läßt als die gewöhnliche Gerste, sich ihres kurzen und derberen Halmes wegen selbst auf fettem Boden nicht so leicht legt, endlich auch ein vortreffliches Malz liefert, so scheint sie für Norwegen sehr geeignet. Ohne die Pflanze gesehen zu haben, halte ich sie, dem Korne nach, für s. g. „Pfauengerste“ (Hordeum Zeocriton).

Sechszeilige Gerste war, außer mehreren anderen Orten, auch von Alten und dem Kirchspiele Skjervö, acht Meilen nördlich von der Stadt Tromsö (70° nördl. Br.), eingetroffen. Die Reife und das Aussehen der ausgestellten Proben ließ nichts zu wünschen übrig. Selbst hatte ich eine ziemlich ansehnliche Suite von sechs-, vier- und zweizeiliger, so wie von nackter Gerste aufzuweisen, die ich jedoch noch nicht lange genug in Cultur gehabt habe, um mir ein bestimmtes Urtheil über ihre verschiedenen Eigenschaften erlauben zu dürfen. Von den nackten Sorten scheinen mir folgende unter den hiesigen Verhältnissen die meiste Verbreitung zu verdienen, da sie zu den am zeitigsten reifenden gehören:

1. Peruanische Gerste; bedurfte im vorigen Jahre bei mir 96 Tage zu ihrer vollständigen Entwicklung. Aussaat den 14. Mai, Ernte den 17. August.
2. Reisgerste und
3. Nepalgerste (Hord. trifurcatum), erforderten nur 93 Tage.

Eine andere, mir von der Landwirthschaftlichen Academie in Tharand zugekommene Probe von nackter zweizeiliger Gerste, die ich im vorigen Sommer den 14. Mai säete, war schon am 2. August völlig reif, und brauchte somit nur 81 Tage zu ihrer völligen Entwicklung, ungeachtet dies der erste Versuch war sie hier zu acclimatisiren. Nach der oben beiläufig berührten Erfahrung, nach welcher die mehrere Jahre fortgesetzte Cultur, unter nördlicheren Breitegraden, eine Abkürzung der Zeit zur Folge hat, welche die Pflanze in ihrer südlicheren Heimath ursprünglich bedurfte, um ihre Reife zu erlangen, hege ich keinen Zweifel, daß die erwähnte Gerste bei fernerer Cultur rücksichtlich ihrer frühen Reife ein für unser Land sehr geeignetes Getreide geben wird.

Von zweizeiliger Gerste befanden sich unter den von mir ausgestellten, hier weniger bekannten, auch Schwarze abyssinische Gerste, die, ungeachtet sie im Auslande lange bekannt ist, doch erst in unsern Tagen größere Ausbreitung in England gefunden hat, und gegenwärtig, ihres großen Kornes wegen, in Schottland allgemein gebaut wird. Ich erntete von ihr 95 Tage nach der Aussaat ein gutes Korn. — Chevalier- und Annot-Gerste, so werthvoll sie an sich sind, zeigten sich in ihrer Entwicklung langsamer als sämmtliche bisher von mir versuchte nackte Arten; beide bedurften 105 Tage, um hier zu reifen.

Wintergerste, die sich in den letzt verlaufenen drei Jahren hier gut gehalten hat, stand im vorigen Jahre am 9. Juni in Aehren, blühte den 12. und war am 16. Juli reif. Ich habe zu wiederholten Malen verschiedene Varietäten Wintergerste gesäet, und dazu vom Auslande bezogenes Getreide benutzt; regelmäßig aber ist die Saat im Winter untergegangen. Einem meiner Bekannten ist der Versuch, dies Korn zu durchwintern, besser gelungen, und von dem von ihm geernteten Samen erhielt ich jene Probe, die sich nun zwei Winter hindurch auch auf

meinen Verſuchsfeldern geſtanden hat, während vom Auslande erhaltenes, unmittelbar daneben geſäetes Korn verloren ging.

Hafer. Neben anderen, von verſchiedenen Ausſtellern producirten Haferſorten hatte ich Kamtſchatka-Hafer und ungewöhnlich großen chineſiſchen nackten Hafer (Avena sativa nuda s. chinensis) ausgeſtellt. Beide gehören vielleicht zu den vorzüglichſten Varietäten dieſer Getreideart. Man hatte ſeit einigen Jahren angefangen in verſchiedenen Gegenden Norwegens Kamtſchatka-Hafer zu cultiviren, iſt aber an manchen Orten wieder davon zurückgekommen, indem man die Erfahrung gemacht haben will, daß er ſchon nach 2—3 Jahren nicht nur in die gewöhnliche Stammart, ſondern gar in ſogenannten „Flughafer“ (Avena fatua) umſchlägt. Daß Hafer, unter ungünſtigen Verhältniſſen, bei ſchlechtem Saatkorn und eben ſo ſchlechter Behandlung, ausarten kann, iſt wohl nicht zu bezweifeln und wird u. A. von James Backmann (in the natural List of british meadow and pasture grasses; London 1858, p. 68—71) behauptet, indem er zugleich mit Beſtimmtheit annimmt, daß man den „Flughafer“ durch geeignete Behandlung in einigen Jahren zu einer oder der anderen jetzt cultivirten nutzbaren Gattung zurückführen könne. Wie dem nun ſein möge, ſo unterliegt es jedenfalls keinem Zweifel, daß man bei ſorgfältiger Reinigung und Behandlung des Saatkornes, ſowohl den Kamtſchatka-Hafer als jede beliebige andere Varietät, auf dem für ſie dienlichen Boden völlig rein erhalten kann. Auch meine Erfahrung beſtätigt das. Kamtſchatka-Hafer, der wie erwähnt behandelt wurde, hat ſich bei Chriſtiania jetzt 7 bis 8 Jahre conſtant erhalten, und wog nach der unlängſt angeſtellten Probe 160—162 Pfund norwegiſch pr. Tonne (à 4½ Cubikfuß rheinländiſch).

Der nackte chineſiſche Hafer iſt bekanntlich ſeit langer Zeit in Europa einheimiſch, doch ſcheint er nirgends recht beliebt zu ſein; vielleicht weil das Korn bei erlangter Reife leicht verloren geht? — oder ſollte er das Schickſal mancher Culturpflanzen theilen, die zuweilen, man weiß nicht wie und warum, eine lange Zeit gänzlich verſäumt werden, um durch irgend einen zufälligen Umſtand wieder an's Licht gezogen und zu Ehren gebracht zu werden. In der geſammten mir bekannten agronomiſchen Literatur konnte ich Nichts entdecken, was die Untauglichkeit des nackten Hafers zur Cultur im Großen bewieſe, wenn nicht etwa das leichte Ausfallen des Samens bei eingetretener Ueberreife. Ich habe dieſen Hafer eine Reihe von Jahren cultivirt und angefangen ihn ringsum im Lande zu vertheilen, da er, meiner eigenen Erfahrung nach, ſelbſt auf kümmerlichem Boden gut gedeiht, beſonders wenn derſelbe torfartige Beſtandtheile enthält, in welchem Falle er ſich ſogar recht üppig entwickelt, reichlichen Ertrag giebt und, was für Norwegen immer das wichtigſte bleibt, zeitiger reif wird, als irgend eine der übrigen mir bekannten Varietäten. Das völlig nackte Korn hieſiger Ernte hat dieſelbe Fülle (Mehlgehalt) wie das Korn von gewöhnlichem großen Hafer. Nach meinen, mit möglichſter Genauigkeit vorgenommenen Meſſungen habe ich das Gewicht der norwegiſchen Tonne als durchſchnittlich 186 Pfund reines Korn ermittelt. Wie ſich der chineſiſche Hafer hier unter den verſchiedenen localen Verhältniſſen arten wird, muß die Zeit lehren. — Von der gemeinen

Hirſe (Panicum miliaceum) hatte ich ſieben Sorten in den ver-

schiedenartigsten Farbenabstufungen des Samens, von schwarz, braun, grau, bronce, röthlich und gelb bis zur weißen Farbe hinab, ausgestellt. Außerdem fanden sich von Kolbenhirse oder italienischer Hirse (Setaria italica) zwei Varietäten, roth- und gelbsamig; nebst deutscher Hirse (Set. germanica) und endlich noch eine Kolbenhirse, von Algier eingeführt, mit ungewöhnlich großen Aehren; wahrscheinlich eine neue Species. Die Hirse ist, wie Jedermann weiß, auch auf weniger kräftigem, ungefähr dem Buchweizen genügendem Boden noch ziemlich ergiebig, und ihr feiner Same liefert eine vortreffliche Grütze (Gries). Die gewöhnliche Hirse (Panicum miliaceum) bedarf hier, um vollständig zu reifen, ungefähr dieselbe Zeit wie der Hafer (106 bis 120 Tage); und ich habe dabei die Beobachtung gemacht, daß die dunkelsamigen Varietäten früher reifen als die hellsamigen. Auch unter dem Einfluß der feuchten und geringere Triebkraft entwickelnden Atmosphäre der Westküste unseres Landes gedeiht sie gut. Ich empfehle den Anbau der Hirse in unseren Gegenden mit aus Rücksicht auf die Federviehzucht, wozu sie ein äußerst dienliches und leicht zu gewinnendes Nahrungsmittel abgiebt, während ihre frischen und saftvollen Halme und Blätter auch nach erfolgter Reife der Saat noch ein vortreffliches Grünfutter liefern. Auch von dem gewöhnlichen Durrha (Sorghum vulgare) hatte ich eine hier geerntete Probe ausgestellt. Aus Barth's und Livingstone's Reise ist hinlänglich bekannt, daß diese in Bengalen und Hindostan allgemein verbreitete Getreideart in Afrika sowohl nördlich als südlich vom Aequator vorkommt und in jenen Ländern neben dem Mais die wichtigste Kornart ausmacht. Das von mir gewonnene Korn keimte am 2. Juni, nachdem es den 14. Mai in die Erde gebracht war. Am 6. August zeigten die Pflanzen die erste Spur von Aehren, welche am 18. August in Blüthe standen und den 24. September reifen Samen lieferten. Es konnte, was ich hier wohl kaum zu bemerken nöthig habe, bei dem mit Durrha angestellten Versuche nicht im entferntesten meine Meinung sein, daß diese oder ihr ähnliche Pflanzen jemals in Norwegen zu ökonomischen Zwecken cultivirt werden sollten; allein theils giebt der Grad der Entwicklung, welchen eine rein tropische Pflanze unter dem 60. Breitengrade überhaupt zu erreichen im Stande ist, schon an und für sich einen wichtigen Beitrag für die Beurtheilung des Einflusses der Witterungsverhältnisse auf das Pflanzenleben im Allgemeinen; theils läugne ich nicht, daß mir in diesem Falle nebenbei darum zu thun war, die zahlreichen Besucher meiner Ausstellung mit einer, den meisten bis dahin fremden Feldfrucht bekannt zu machen, der Millionen unter anderen Himmelsstrichen wohnende Menschen Nahrung und Kleidung verdanken.

Mais war nur von zwei Freunden der Pflanzencultur, sowie von der in der Nähe der Hauptstadt liegenden Privat-Domaine des Königs ausgestellt worden. Dagegen hatte ich selber von vorigjähriger Ernte eine Sammlung von 50 verschiedenen Varietäten in einer Auswahl von einigen hundert Kolben aufzuweisen. In so fern die besondere Aufmerksamkeit, die ich, wie hieraus ersichtlich, der genannten Kornart zugewendet habe, Befremden erregen möchte (was hier mitunter vorgekommen ist), erlaube ich mir meine Gründe kurz anzuführen. Es kann bei meiner, nun bereits seit Jahren hier angestellten Pflanzen-Cultur und Acclimatisations-Versuchen nicht nur darauf ankommen, solche Resultate zu

gewinnen, die sich ohne weiteres in's praktische Leben hinüberführen lassen; sondern es ist mit ihnen der wesentliche Zweck verbunden, durch comparative Beobachtungen möglichst brauchbare Beiträge zur Erklärung und zum Studium weniger bekannter und zweifelhafter Verhältnisse in der Pflanzen-Geographie, Physik und Physiologie zu liefern, und streitige, das Gesammtgebiet der Theorie der Pflanzencultur betreffende Punkte zum Gegenstande wissenschaftlicher Forschung zu machen. Man wolle hierbei immer an den 60. Breitegrad denken, wodurch die hier zu gewinnenden, — und ich darf sagen, zum Theil schon gewonnenen — Resultate erst in's rechte Licht treten.

Der Eifer, mit dem man sich seit einigen Jahren in der botanischen Welt der Acclimatisations-Sache gewidmet hat, scheint davon zu zeugen, daß die Bedeutung der sich an diese Bestrebungen knüpfenden Fragen und die Wichtigkeit ihrer Lösung für das praktische Leben zum allgemeinen Bewußtsein geworden ist. Da nun namentlich die mit Universitäten verbundenen botanischen Gärten nach meinem Dafürhalten den natürlichen Ausgangspunkt und die Stütze dieser Wissenschaft zu bilden berufen sind, so habe auch ich mich, so viel meine Stellung es erlaubte, nach Kräften bemüht, mein Scherflein dazu beizutragen.

Daß ich bei diesem Streben in der Maispflanze ein vorzüglich geeignetes Versuchsmaterial finden mußte, ist bei ihrer Geneigtheit, sich überall zu acclimatisiren, leicht erklärlich. Ich habe bei ihrer Cultur manche Beobachtung gemacht, die ich für interessant und wichtig genug halten muß, um ihrer an geeigneter Stelle zu erwähnen. Hier muß ich mich auf Folgendes beschränken: Mais gebrauchte auf meinen Versuchsfeldern von 90 bis 145 Tage zur vollständigen Entwicklung. Als zeitigste Varietät erwies sich auch hier der Gelbe Hühner-Mais (Cinquantino). Einen Theil des Ertrages einer im Jahre 1852 aus Hohenheim erhaltenen Probe dieser Sorte, deren Cultur ich seitdem regelmäßig fortsetzte, immer den Samen der vorhergehenden Ernte benutzend, säete ich den 25. Mai 1857 und das Korn war am 22. August, also nach 90 Tagen, reif. Zu den spätesten Sorten gehörte der sogenannte Amerikanische Pferdezahn-Mais, von welchem ich den 19. Mai v. J. einige Körner säete. Die männliche Blüthe zeigte sich am 12. August, die weibliche sechs Tage später. Anfang October hatten sich von den wenigen Körnern, die ich gelegt hatte, drei Kolben entwickelt, die zu reifen versprachen; als ich diese am 9. October abnehmen wollte, fand ich mich um zwei Kolben bestohlen; nur die dritte, am wenigsten entwickelte, war mir geblieben. Ungeachtet der unvollständigen Reife dieses einen Kolbens war das Korn doch so weit entwickelt, daß mehrere Körner, die ich vor einiger Zeit versuchsweise in Töpfe legte, gekeimt haben. Um diesen Grad der Entwicklung zu erreichen, hat der Mais also, mit Inbegriff des Tages der Aussaat und dessen, an welchem die Kolbe abgenommen wurde, 144 Tage gebraucht. Sugar Corn und Tuscarora Corn hatten beide, den Aussaat- und Erntetag mitgerechnet, 145 Tage nöthig, um eine eben so vollständige Entwicklung zu erlangen, als die mir aus Philadelphia zugekommenen Kolben, von denen sie abstammten.

Gräser. Samen von Timothei-Gras (Phleum pratense) war von mehreren Gegenden eingetroffen. Die Verbreitung dieser Grasart hat seit einigen Jahren in unserem Lande bedeutend zugenommen. In mei-

nem Ausstellungs-Berichte habe ich auf die Bemerkung Peter Lawson's in der vierten Ausgabe der Agrostographia (Edinburgh 1853, p. 65) aufmerksam gemacht, zufolge welcher das Thimotei-Gras ungleich mehr Nahrungsstoffe enthalten soll, wenn es erst nach erfolgter Reife der Saat geschlagen wird, als wenn dies während der Blüthe geschieht. Ich habe diese Behauptung, die mit der Wahrscheinlichkeit in Widerspruch zu stehen scheint, sonst nirgends gefunden und bisher auch keine Gelegenheit gehabt, ihre Richtigkeit in Erfahrung zu bringen. Es wäre doch der Mühe werth, darüber in's Reine zu kommen. Von mir waren drei Proben von Timothei-Samen ausgestellt; die eine, Original-Samen aus Canada; die zweite, von der erstjährigen hiesigen, und die dritte Probe von der Ernte des zweiten Jahres derselben Saat. Der Gewichtsunterschied dieser drei Proben, den schon der bloße Augenschein vermuthen ließ, war auffallend und erwies sich wie folgt. Ich zählte genau 1000 Körner von jeder Probe, wog sie auf einer Probirwage und fand das Gewicht in Grammen

des Originalsamens aus Canada = 0,336 pr. 1000 Körner.
" Samens der ersten Ernte 1857 = 0,483 " " "
" " " zweiten " 1858 = 0,542 " " "

Ich gebe hier nur das (keinesweges einzeln stehende) Factum ohne weiteren Commentar, da ich binnen Kurzem Gelegenheit finden werde, auch die in dieser Beziehung gewonnenen Resultate im Zusammenhang mit sonstigen Beobachtungen ausführlicher zu besprechen.

Unter den übrigen hier von mir cultivirten Gräsern befanden sich ferner auf der Ausstellung: Samen von Avena elatior L., „Hafergras" und Poa nemoralis angustifolia, „Waldrispengras". Beide verdienen in Norwegen Aufmerksamkeit. Ersteres hat mir, ungeachtet der Fleck, auf dem ich es stehen habe, im Schatten hoher Bäume liegt, jedes Jahr zweimal reifen Samen gegeben. Von letzterem giebt George Sinclair an (siehe Hortus gramineus Woburnensis; 4. Edit. p. 114), daß es auf freiem Felde vor Eintritt der Blüthe leicht vom Rost angegriffen werde. Hier hat sich diese Wahrnehmung nicht bestätigt, da mir diese Art, die auch hier allerdings wildwachsend in der Regel nur in Waldungen oder im Schatten von Bäumen vorzukommen pflegt, seit drei Jahren auf einem dem Sonnenlichte völlig ausgesetzten, freien Ackerstücke jeden Sommer ebenfalls zweimalige reife Saat getragen hat, wobei die Pflanze eine Höhe von 2 Fuß erreichte, ehe die Blüthe eintrat. Auch von Dactylis glomerata, „Hundsgras, Knaulgras", welches nach Parnell („The grasses of Britain", Edinburgh & London 1855, p. 68) zum Theil die üppigen Wiesen in Devonshire und Lincolnshire bildet, und sich, der meisten seiner Eigenschaften wegen, ohne Zweifel als eine für Norwegen vorzüglich geeignete Grasart bewähren wird, je mehr es aufmerksam und verständig kultivirt wird, zeigte ich von mir geernteten Samen vor. Ihre Eigenschaften hier zu berühren ist unnöthig. Ich empfehle, unseren Zuständen angemessen, eine Mischung von gleichen Theilen Hundsgras und Alopecurus pratensis zur Aussaat, besonders an Stellen, wo das Wiesenland feucht liegt.

Von den ausgestellten Hülsenfrüchten nenne ich zuerst eine gelbe Felderbse, von welcher einer der Einsender, der am 28 April gesäet und am 10. August geerntet hatte, einen $10^{4}/_{7}$-fältigen Ertrag erzielt

hatte. Auch mehrere Arten grüner Felderbſen waren vorhanden, und unter ihnen zeichnete ſich die ſ. g. „blaue preußiſche Erbſe“ (blue prussian pea) vor den übrigen vortheilhaft aus. Auch an Zuckererbſen fehlte es nicht; ebenſo fanden ſich vortrefflich entwickelte Proben von einer Menge von Schnitt- und anderen Stangenbohnen, die ſogar bis nach Drontheim hinauf reifen Samen tragen, in ſchönſter Auswahl von verſchiedenen Gegenden eingeſandt, vor. Noch reichlicher war die braune Zwergbohne vertreten. Einer der Ausſteller hatte dieſe Bohne den 29. Mai geſäet und den 4. September eine 11½-fältige Ernte davon gehabt. Mehrere Sorten der „weißen Bohne“ und zwei Sorten „Feuerbohnen“ (Phaseolus multiflorus) befanden ſich ebenfalls unter den ausgeſtellten Gegenſtänden. Ich erwähne der letzteren, weil ſich in unſerm Lande gezeigt hat, daß ſie noch recht gut gedeiht, wo die Witterung für die gemeine Stangenbohne ſchon zu rauh und unſicher iſt. Die 3 bis 4 Zoll langen Schoten werden beim Kochen eben ſo mürbe wie die der Stangenbohne und geben in jenen Gegenden, ſowohl friſch genoſſen als geſalzen, ein geſundes Nahrungsmittel. Bei Phaseolus multiflorus hat es ſich bewährt, daß die weißſamige Bohne zum Grünkochen der farbigen vorzuziehen iſt.

Von Futterwicken (Vicia sativa vulgaris) und Pferdebohnen (Saubohnen, Vicia Faba) erwähne ich nur einer Probe der letztgenannten, von der die Bohne, am 10. Mai geſäet und am 6. September geerntet, 17fältigen Ertrag gegeben hatte.

Von mir war ausgeſtellt:

Die weiße Wicke (Vicia leucosperma Whld.). Im Herbſte 1853 erhielt ich dieſe Sorte zuerſt von der rühmlichſt bekannten Samenhandlung des Herrn Carl Appelius in Erfurt unter dem Namen „Amerikaniſche Erbslinſe“; bei der Ausſaat in 1854 zeigte es ſich jedoch, daß die erhaltene Sorte nichts anderes war, als — die weiße Wicke. Im darauf folgenden Jahre erhielt ich von Lüttich eine Probe unter dem Namen „Vesce hâtif blanche“, die ſich ebenfalls als die gewöhnliche weiße Wicke herausſtellte. Ich habe ſie nunmehr drei Jahre cultivirt, und ſie namentlich wegen ihrer, hier um ungefähr zwei Wochen früher eintretenden Reife vor der gewöhnlichen Futterwicke empfohlen, und, da dieſer Umſtand, wie leicht begreiflich, für Norwegen von größter Wichtigkeit iſt, ſie ſo viel wie möglich hier zu verbreiten geſucht, wozu nebenbei die letztjährigen hohen Preiſe der Futterwicke aufforderten. Die Zeit wird lehren, wie es damit gehen wird. Zwar erreicht ſie bei ihrer Entwicklung nicht die Höhe der Futterwicke (Vicia sativa vulgaris), allein ſie beſtaudet ſich beſſer und liefert daher eine jener völlig entſprechende Futtermaſſe. Der Same der weißen Wicke iſt etwas größer als der der gewöhnlichen Wicke; mäßig flachgedrückt und von hellgelbweißlicher Farbe. Sein hübſches Ausſehen und der Umſtand, daß er beim Kauen in ungekochtem Zuſtande nicht den unangenehmen Geſchmack der Futterwicke zeigte, veranlaßte mich den Verſuch zu machen, ihn nach Art der gewöhnlichen Linſe zuzubereiten. Ich fand den Samen ſehr leicht zu kochen und ſeinen Geſchmack, der mir ſo ungefähr die Mitte zwiſchen Erbſe und Linſe zu halten ſchien, recht angenehm. Er ließ ſich ebenſowohl in Suppen als gedämpft genießen. Fortgeſetzte Verſuche werden zeigen, ob die Cultur dieſer Wicke ſich bei uns lohnen wird,

und in diesem Falle, ob es richtiger sei, sie als Grünfutter oder als Nahrungsmittel für Menschen zu verwenden.

Während ich mit dem Niederschreiben meines Berichtes beschäftigt war, erhielt ich die 13. Nummer der „Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde“ von Professor Dr. K. Koch und Hofgärtner G. A. Fintelmann, in welcher sich ein Aufsatz befindet, überschrieben: „Die Erbslinse. Ein sogenannter Blendling der Linse mit der Honigerbse“. Ich fand in diesem Aufsatze meine früher gemachten Beobachtungen im wesentlichen bestätigt; indem daraus hervorgeht, daß die s. g. „Erbslinse“ nichts anderes ist, als die hier besprochene „weiße Wicke“; daß sie bereits seit langer Zeit bekannt und namentlich in Frankreich als Nahrungsmittel cultivirt worden ist, woselbst man sie sogar im Anfange unseres Jahrhunderts Napoleon I. zu Ehren Vicia Napoleonis nannte; daß sie in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit mehrerer Autoritäten unter den Botanikern und Gärtnern Englands, Frankreichs und Deutschlands erregt hat u. s. w. In letzterer Beziehung enthält der Aufsatz die Bemerkung, daß „die ganze Geschichte der Erbslinse auf einen „„Yankee-Pfiff““ hinauslaufen würde“. Ich bin derselben Meinung. Wer weiß, wie bald die „weiße Wicke“ einmal über Nacht unter einer abenteuerlichen Maske, von einigen tausend glänzenden Attesten escortirt, als eine zweite „Revalenta arabica“ dem Gehirn eines modernen Speculanten entspringen, die Beutel der Leichtgläubigen leeren und die Casse des „Erfinders“ füllen wird.

Die Sache hat übrigens, wissenschaftlich betrachtet, auch ihre ernste Seite. Wie man auch das Wort „genus“ definiren möge, so darf doch bei Anwendung selbstgewählter Benennungen der ihnen ursprünglich zum Grunde liegende „Begriff“ nicht verrückt oder wohl gar aufgehoben und vernichtet werden. Wenn mir nun die Möglichkeit einer erfolgreichen Kreuzung zweier so verschiedener Gewächse, wie Ervum und Pisum schon von vorn herein nicht einleuchten will, so muß ich um so mehr gegen den Ausdruck „Blendling“ opponiren. Gesetzt aber auch, sie könne an und für sich stattfinden, so muß ich noch immer die Keimfähigkeit und Fortpflanzungstüchtigkeit des durch eine so widernatürliche Procedur möglicherweise gewonnenen Samens in Abrede stellen. Erscheint mir hiernach klar, daß von einem „Blendling“ der Linse mit der Erbse vernünftigerweise nicht die Rede sein kann; bei der Menge freilich, „wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“

Die Gruppe der Wurzelgewächse war in der Ausstellung außerordentlich reich und in vortrefflichen Exemplaren repräsentirt. Unter der Menge des von rings umher im Lande eingesandten

Rotabaga erreichten nicht wenige ein Gewicht von 15 Pfund; es befanden sich darunter herrliche Exemplare aus Alten (70° n. Br.). Auch unter den eingesandten

Turnips befanden sich 18-Pfünder. Mehrere hübsche Exemplare hatten eine Reise von über 10° vom Norden her gemacht, um sich hier bewundern zu lassen. — Gelbe und rothe

Runkelrüben waren hauptsächlich aus der nächsten Umgegend von Christiania eingesandt. Einer der Aussteller hatte auf einem ca. 15,000 □Fuß großen Felde 60 Tonnen geerntet, was hier zu Lande eine brillante Ausbeute genannt werden muß.

Rothebeeten in mehreren vorzüglichen Varietäten waren nicht nur von verschiedenen, nahe bei der Stadt wohnenden Gärtnern, sondern auch von Privaten aus weiter Ferne eingesandt.

Gelbe Wurzeln, worunter eine Menge verschiedener Varietäten, waren von mehr als 40 Einsendern zur Stelle. Das Gewicht vieler betrug 4 Pfund und darüber, und von Gegenden unter dem 70.° waren Proben herbeigekommen, die von sorgfältiger Cultur und gutem Gedeihen zeugten. Nahe bei der Stadt (Christiania) hatte man auf einer Fläche von ca. 10,350 □Fuß 40 Tonnen geerntet, was als der hier gewöhnliche jährliche Durchschnitts-Ertrag angesehen werden kann. Ein noch günstigeres Resultat hatte ein anderer Aussteller aus der Umgegend erzielt, indem ein über 300 Fuß kleineres Feld ihm gleichfalls 40 Tonnen gebracht hatte. Bei der Dürre des vorigen Sommers waren dies recht gute Ernten.

Die Einführung von Verbesserungen in der Landwirthschaft, von neuem und zweckmäßigerem Ackergeräth u. s. w. hat in unserem Lande vielleicht größere Schwierigkeiten als in andern Ländern. Im Allgemeinen zeigt sich aber doch seit einigen Jahren ein regeres Streben nach Fortschritt in der Agricultur auch bei unserer Landbevölkerung; und so beschäftigt man sich denn unter Anderem auch viel eifriger mit der Cultur von Rotabaga, Turnips und Moorrüben, die in Beziehung auf eine der wichtigsten Erwerbsquellen und Existenzmittel unseres Nordens, die Viehzucht, von so außerordentlicher Wichtigkeit sind, und deren Cultur durch das häufige Fehlschlagen der Kartoffelernte noch dringender nothwendig wird.

Kartoffeln waren von einigen Gegenden ausnahmsweise in schöner und kerngesunder Frucht eingegangen. Drei von Finnmarken (70°) gekommene Sorten zeichneten sich besonders durch ihr gutes Aussehen aus.

Man ist auch hier darauf bedacht gewesen, Nutzen aus kranken Kartoffeln zu ziehen, indem man z. B. Stärkemehl daraus gewinnt. Auf meiner vorigen Ausstellung hatte ich mehrere Proben dieses Produktes, sowohl aus kranken als gesunden Kartoffeln bereitet, an denen sich kein Unterschied in Beziehung auf die Beschaffenheit des dazu verwendeten Materials erkennen ließ.

Nach einer andern Methode behandelte kranke Kartoffeln, wonach diese in Scheiben geschnitten, darauf in Wasser mit einem sehr geringen Zusatze von Schwefelsäure bearbeitet und hernach auf einer Darre getrocknet werden, hatte ich zur Probe ausgestellt. Dasselbe war von einem in Norwegen als eifrigen Beförderer gemeinnütziger Unternehmungen bekannten Mann, Herrn Professor Maschmann, geschehen. In meinem Berichte habe ich das von ihm beobachtete Verfahren genauer angegeben. Die so behandelten Kartoffeln lassen sich vermahlen, wobei der verdorbene Theil abgesondert wird. Auf diese Weise gewinnt man ungefähr 25 % reines, gesundes Mehl, welches sich zu Brot und sonstigen Haushaltungszwecken verwenden läßt.

Es geht mit den Krankheiten der Menschen bekanntlich nicht selten so, daß man von ihrem eigentlichen Wesen nicht mehr weiß, als man bis dato von der Natur der Kartoffelseuche kennt, und dennoch hat man Mittel zu ihrer Heilung gesucht und gefunden. Warum sollte man nicht auch gegen die räthselhafte Kartoffelkrankheit einmal einem probaten

Mittel auf die Spur kommen? Es ist mir unmöglich gewesen, die gesammte, diesen Gegenstand betreffende Literatur zu verfolgen, — worüber sich Niemand wundern wird, — ich kann daher auch nicht wissen, ob das Mittel dem Ausbruche der Krankheit vorzubeugen, auf welches ich mir erlaube bei dieser Gelegenheit aufmerksam zu machen, vielleicht in ähnlicher Weise bereits in anderen Ländern versucht worden ist. Ich verdanke es der mündlichen Mittheilung eines unserer intelligenten Oekonomen, Herrn Juel, Besitzer des Hofes Eeg bei Drammen. Derselbe verfährt auf folgende Weise: Früh Morgens, wenn der Thau noch auf den Blättern liegt, nimmt er einen einfachen niedrigen Handschlitten, auf welchem eine eiserne Pfanne (Gragen) angebracht ist, die von unten mittelst Holzkohlen mäßig erwärmt wird. Die Pfanne enthält eine kleine Quantität Schwefel; sobald dieser anfängt zu rauchen wird diese äußerst einfache Einrichtung zwischen die Reihen der Kartoffeln hindurchgezogen, was so langsam geschehen muß, daß sich der Rauch (Schwefelsäuerling) nach beiden Seiten verbreiten kann, was bei ruhiger Luft sehr gleichmäßig geschieht. Am Ende der ersten Furche angekommen, wird auf dieselbe Weise zwischen dieser und der nächsten hindurchgezogen, so daß jede Reihe zweimal geräuchert wird. Herr Juel wandte dies Verfahren 1857 kurz vor dem Eintritt der Krankheit (Anfang August) an, und theilte mir mit, daß kurze Zeit darauf die Blätter der unmittelbar neben dem geräucherten Stücke stehenden Kartoffeln, von einer und derselben Art, und mit Ausnahme des Räucherns auf eine und dieselbe Weise behandelt, von der Krankheit ergriffen wurden, während die geschwefelten gesund blieben. Auch im Keller haben die so behandelten Kartoffeln sich besser gehalten als andere.

Der glückliche Erfolg, mit welchem man den Schwefel gegen die Krankheit der Weinrebe angewendet hat, bestärken mich in dem Vertrauen zu dem von meinem Gewährsmann vorgeschlagenen Mittel, und es würde mich freuen zu erfahren, daß das von ihm befolgte Verfahren auch an anderen Orten Nutzen gestiftet hätte.

Erdäpfel (Helianthus tuberosus) hatte ich, außer meinen eigenen, nur von drei Einsendern aufzuweisen. Die Cultur dieser nützlichen Frucht hat in unserm Lande in eben dem Maße abgenommen, als der Kartoffelbau zunahm. Es dürfte doch, wenigstens in Norwegen, an der Zeit sein, dem Erdapfel wieder ernstliche Aufmerksamkeit zu schenken. Unter der Menge der ausgestellten

Petersilienwurzeln befanden sich nicht wenige, die bis zwei Pfund wogen und deren Qualität dennoch allen Anforderungen an eine gute Petersilienwurzel vollkommen entsprach. — Von

Sellerie, ebenfalls in großer Menge und von weit auseinander liegenden Orten eingesandt, wogen viele Exemplare über 1½ Pfund bei voller Entwicklung ihrer characteristischen Eigenschaften.

Skorzoner- und Cichorienwurzeln waren nur schwach vertreten, was aber da war zeugte von sorgfältiger Behandlung.

Bortfeld'sche Rüben waren nur von der Gärtnerei der Königl. Privat-Domaine ausgestellt.

Kohlrabi, grüner und purpurfarbener, so wie der gewöhnliche englische Glaskohlrabi, waren von einigen wenigen ausgestellt. — Von

Meerrettig, als mehrjährige Pflanze cultivirt, welches hier noch

die gewöhnliche Behandlungsart ist, waren recht gute Proben geliefert; doch hatten sich auch einzelne Einsender mit Exemplaren von als einjährig behandelten Pflanzen eingefunden. Die Stangen der letzteren waren 12 bis 18 Zoll lang und wogen von ½ bis 1 Pfund. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten die einjährige Cultur des Meerrettig empfohlen, und u. A. das dabei zu beobachtende Verfahren in meinem „Gartenbuch für das norwegische Volk“ ausführlich beschrieben, was dem Anscheine nach nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist. — Schwarzer, weißer, rother und violetter

Winterrettig war von mehreren Seiten in gut entwickelten Exemplaren zum Vorschein gekommen. Von den Wurzeln des genießbaren

Sauerklees (Oxalis esculenta, das „Oca“ der Peruaner), sowie von Cyperus esculentus (Erdmandeln) hatte ich nur von einem Aussteller Proben erhalten.

Schalottenzwiebeln waren besonders gut in der Gegend von Frederikshald gerathen, wogegen weiße und rothe Exemplare der gewöhnlichen Zwiebel in schönster Auswahl von mehreren Gegenden ausgestellt waren. — Die von

Sommer- und Winter-Porree diesmal eingetroffenen Proben übertrafen in jeder Beziehung alles von dergleichen auf meinen früheren Ausstellungen dagewesene.

Kopfsalat war u. A. von einem seit vielen Jahren hier ansässigen Engländer, Herrn Goodchild, der unser National-Interesse mit Wärme umfaßt, eingesandt worden. Die ausgestellten Exemplare waren auf seiner Besitzung auf einer, an der Ostseite des Meerbusens von Christiania liegenden, zur Gruppe der s. g. „Hvalerne“ (wörtlich „Wallfisch-Inseln“) gehörenden Insel gewachsen, und in Betracht der dortigen klimatischen Verhältnisse von besonders gutem Aussehen. Herr Goodchild machte bei der Einsendung als Curiosum darauf aufmerksam, „daß die Bewohner der genannten Inselgruppe sich noch heutigen Tages der Blätter des Kopfsalats als Thee bedienen“. — Auch

Stengelsellerie (Apium dulce Mill.) war von verschiedenen ausgestellt worden, obgleich er im Allgemeinen noch sehr selten hier im Lande vorkommt.

Phytolacca esculenta, eine neue Spinatpflanze, war von einem eifrigen Cultivateur ausgestellt. Die Pflanzen hatten völlig reifen Samen und waren, meines Wissens, die ersten hier zu ökonomischem Gebrauch cultivirten. Bei der mit ihrer Pflege verbundenen Mühe ist nicht zu erwarten, daß sie als Küchengewächs für's erste allgemeinen Eingang bei uns finden werde, was doch ihrer sonstigen Eigenschaften wegen zu wünschen wäre. (Siehe „Agronomische Zeitung“ 1858 No. 21.) Eine andere zu demselben Geschlecht gehörende Art, P. decandra, macht auf Rasen gruppirt, einen hübschen Effect. — Die verschiedenen

Gewürzpflanzen, Salvei, Thymian u. s. w. fehlten nicht.

Gurken waren in ausgezeichneten Exemplaren ausgestellt. Ich hatte folgende Sorten, die den 1. Juni in freiem Felde gelegt und schon vor Ausgang September vollkommen gereift waren, ausgestellt: Empereur Romain, Cornichon blanc, long, Gladiator-, St. Patrick-, Libanon- und frühe grüne Erfurter. Einzelne Exemplare der Gladiator-Gurke

hatten die Länge von 15 bis 16 Zoll erreicht und maßen 8 bis 9 Zoll im Umfange. — Von

Melonen fanden sich Melon de Honfleur und Sucrin de Tours von einem hiesigen Aussteller. Ein anderer hatte eine 4 Pfund wiegende, im freien Lande gezogene Varietät ausgestellt, über deren Namen ich unsicher bin. Unter den meinigen, die sämmtlich im freien Lande gezogen waren, befanden sich: Vier-Wochen-Melone, Mai-Melone (3 ℔ 8 Loth), Sarepta-Melone (3 ℔ 12 Loth) und „frühe Amerikanische“ (3 bis 3½ ℔). Alle meine Melonen waren den 1. Juni gelegt und zwischen dem 8. und 15. September reif geworden. — An

Cucurbita Citrullus in 6- bis 8-pfündigen Exemplaren fehlte es nicht.

Solanum Lycopersicum (Trauben) waren von einigen Gärtnern der Umgegend und von mir ausgestellt. Die meinigen waren in freiem Lande gewachsen und vortrefflich gediehen. Kleine Pflanzen mit 2 bis 3 Blättchen wurden den 8. Juni ausgepflanzt und die ersten reifen, 16 Loth und darüber wiegenden Früchte vor Ende September abgenommen. Ich habe wiederholte Versuche gemacht, die Tomata durch krautartiges Pfropfen auf Kartoffeln zu vermehren; habe die Pflanzen aber nie weiter bringen können, als bis zur Blüthe Die Tomata ist übrigens bei uns noch wenig bekannt. Ein auf meiner vorigen Ausstellung anwesender Fremdling vom Lande, der sie, von dem „lieblichen“ Ansehen der Frucht getäuscht, für einen Apfel hielt, von dem „gut zu essen wäre“, fand sich in seiner Erwartung sehr betrogen!

Solanum Melongena, mit weißer, gelber und purpurfarbiger Frucht befanden sich gleichfalls auf der Ausstellung. Ich hatte meine Pflanzen theils im Zimmer, theils im freien Lande gezogen. Am 8. Juni setzte ich die ein paar Zoll großen Pflänzchen aus, am 28. Juni zeigte sich die erste Blüthe und am 25. September hatte ich reife Früchte. — Große, wohlentwickelte Blumenköpfe der violetten

Artischocke, zur Abart Cynara Scolymus mutica gehörend, waren von einem Liebhaber eingesandt.

Rhabarberstengel (Royal Albert) und Mangold mit rothen und gelben Blattrippen hatten ebenfalls ihre Aussteller. — Einer Menge von

Kürbissen, die hier als Gartenspielzeug dienen und sich durch große Verschiedenheit der eigenthümlichsten Formen und Monstrositäten bemerkbar machten, erwähne ich nur beiläufig.

Blumenkohl, in diesem Jahre weniger gut entwickelt als auf früheren Ausstellungen, war u. A. auch von einem Hofe, 10 Meilen nördlich von der Stadt Tromsö (70°) eingesandt. Der Käse war für eine so nördliche Gegend über Erwarten gut entwickelt.

Rosenkohl, gewöhnlicher rother und weißer Kohl, namentlich letzterer, waren nicht nur von vielen Seiten, sondern auch durchschnittlich in bester Qualität ausgestellt.

Nun noch wenige Worte über den bereits Eingangs erwähnten, ungewöhnlichen Reichthum an Baumfrüchten, welchen die Ausstellung darbot. — Reife

Wallnüsse (Juglans regia) waren hauptsächlich aus der Umgegend von Christiania, jedoch auch von einigen Orten an der Westküste,

z. B. den Städten Brevig, Kragerö und Arendal, herbeigekommen. Aus Christiansund (63° 8′) erschien eine eigene dünnschalige Nuß, die ihre völlige Reife erlangt hatte, was jedoch, der Bemerkung des Einsenders zufolge, in jener Gegend nicht oft der Fall ist. Daß die hier gemeinte Abart (Juglans reg. fragilis, dünnschalige Baumnuß, Buttermuß oder Meisennuß) unter einem so hohen nördlichen Breitegrad und so nahe am offenen Meere zur Reife kommen kann ist unstreitig in pflanzengeographischer Beziehung von Interesse; auch hier weckten die vorliegenden Exemplare nicht allein die Aufmerksamkeit der anwesenden Fremden, sondern auch der einheimischen Besucher. Nach Schluß der Ausstellung erfuhr ich, daß ein Bauersmann in der Nähe von Christiansund ebenfalls reife Wallnüsse in seinem Garten erhalten hatte, von denen mir leider keine Probe zu Gesicht gekommen ist.

Obgleich der Wallnußbaum in vielen Gegenden Norwegens recht gut gedeiht, und da, wo er wächst, auch ziemlich sicher jährlich reife Nüsse giebt, so wird er doch im Allgemeinen wenig beachtet. In meiner kleinen Schrift „Ueber die geographische Verbreitung der Obstbäume u. s. w.," Hamburg 1857, habe ich eines Wallnußbaumes erwähnt, der im Garten des Predigerhofes Frosten, nördlich von Throndhjem (ungefähr 63° 34′ n. Br.) wächst, nach einer kürzlich direct erhaltenen Mittheilung des Probsten Berg, der daselbst wohnt, jetzt etwa 50 Jahre ist, in der Höhe 26 Fuß und an der Wurzel 4 Fuß im Umfange mißt und im vorigen Jahre reife Nüsse trug, was aber nur in trockenen und warmen Sommern der Fall ist. Ueber 63½° n. Br. hinaus wird man schwerlich Wallnußbäume finden, und so wäre denn der hier erwähnte Baum der nördlichste seiner Art in der Welt. — Auch von

Juglans nigra (Hickory) waren Nüsse ausgestellt. — Vollkommen reife

Mandeln waren von Mandal (58° 1′ 2″) eingeschickt. Der Aussteller bemerkte dabei, daß der 1852 von Hamburg eingeführte Baum, von dem er die Mandeln geerntet, nicht am Spalier sondern ganz in freiem Lande steht und jetzt 15½ Fuß hoch ist. Zwei Fuß über der Erde mißt er 10½ Zoll im Umfang. Die ersten reifen Früchte trug er 1858, wo er deren 136 Stück gab. Auf meiner Ausstellung in 1855 hatte ich reife Mandeln aus Frederikshald von einem in freiem Lande wachsenden 8 bis 9 Fuß hohen Baume.

Kastanien (Castanea vesca) waren im vorigen Jahre im hiesigen botanischen Garten nicht reif geworden. Der Baum trug zum ersten mal und war 2 Jahre vorher von der renommirten Travemünder Baumschule des Herrn Behrens bezogen. 1855 hatte ich dagegen reife Kastanien von Horten erhalten, und auch bei Christiania gab es vor ein paar Jahren in mehreren Gärten reife Kastanien.

Haselnüsse waren von verschiedenen Orten herbeigekommen. — Barcellonanüsse (die Cob Nut der Engländer und vermeintliche Nux pontica der Römer) waren in der Nähe von Christiania gewachsen. Zwei andere Varietäten der s. g. Zellernuß, die Gunslebener und die Hallische Riesennuß, aus Nüssen der erstgenannten entstanden, waren gleichfalls von Mandal eingesandt. Ebenso Lambertsnüsse, die auch aus Arendal und der hiesigen Umgegend ausgestellt waren.

Birnenquitten (Pyrus Cydonia oblonga), bis 15 Loth wiegend, waren von Christianſand und von einem tüchtigen Gärtner nahe bei Chriſtiania ausgeſtellt.

Apricoſen und Pfirſiche waren u. A. aus dem Kirchſpiele Sogn (61 °) in Menge eingeſandt. Leider hatten die in zwei ziemlich große, flache Kiſten verpackten Früchte, ungeachtet ſie mit weichem Papier und Baumwolle umgeben waren, durch den langen Transport ſo ſehr gelitten, daß nur verhältnißmäßig wenige Exemplare von der überraſchend ſchönen Beſchaffenheit der Früchte bei ihrer Abſendung Zeugniß ablegen konnten. — Von den verſchiedenen auf der Ausſtellung befindlichen Barietäten von

Weintrauben waren die meiſten im Freien am Spalier gezogen und die Trauben waren durchgängig gut entwickelt. Zu den am beſten gerathenen gehörten die Blaue Leipziger und die Muscateller-Traube. Beiſpielsweiſe führe ich an, daß einer der Ausſteller von einer ſeiner Reben 24 ℔ und von einer zweiten 48 ℔ Trauben geleſen hatte, die ſich durch Süße und feinen Geſchmack beſonders auszeichneten. Auch von Trauben kamen mehrere Sendungen von entfernteren Orten in beſchädigtem Zuſtande an. Inſofern dies der mangelhaften Verpackung zuzuſchreiben iſt, worin man beim Obſttransport nicht leicht zu vorſichtig ſein kann, dürfte das einfache Verfahren, welches ich bei meinen Fruchtverſendungen ſtets mit beſtem Erfolge angewendet habe, hier Erwähnung verdienen.

Nach ſorgfältigem Abtrocknen mittelſt eines nicht zu groben leinenen Tuches, umwickle ich jede einzelne Frucht (Aepfel, Birnen u. dgl.) mit feinem ungeleimtem Papier, indem ich durch eine drehende Bewegung der Hand die Enden des Papiers feſt um die Frucht biege, ohne ſie durch zu ſtarkes Drücken zu beſchädigen. Der Boden und die Wände der zur Aufnahme der Früchte beſtimmten Kiſte oder Tonne werden mit einer doppelten Lage Packpapier ausgeſetzt. Eine mäßig hohe Schicht völlig trocknen Rhabarberſamen wird nun auf dem Boden ausgebreitet und die erſte Lage Obſt darauf gelegt, ſo daß die Stiele nach oben wenden. Die Zwiſchenräume werden durch aufgeſtreuten Rhabarberſamen gleichmäßig ausgefüllt, was durch leiſes Rütteln der Kiſte und vorſichtiges Drücken befördert wird. Auf die erſte Lage folgt nun die zweite und ſo fort, bis der Raum beinahe voll iſt und die Kiſte mit einer der unteren Schicht entſprechenden Lage Rhabarberſamen und darüber ausgebreiteten doppelten Lage Packpapier geſchloſſen wird.

Der Same der Rhabarberpflanze iſt ſeiner großen Elaſticität wegen zu dieſem und ähnlichen Zwecken das vorzüglichſte mir bekannte Emballationsmittel. Er iſt überall leicht zu gewinnen, entwickelt nach einmal erlangter Trockenheit keine Feuchtigkeit in dem dicht geſchloſſenen Raume, die er vielmehr, wenn ſie entſteht, abſorbirt, hat wenig Gewicht und iſt völlig geruchlos. Dieſer Eigenſchaften wegen iſt er allen anderen Stoffen, deren man ſich bei Verſendung von Obſt zu bedienen pflegt, z. B. Sägeſpäne, Kleie, Häckerling, Heede, Papierſchnitzel, Moos, Laub, Baumwolle, Watte, Heu (Gummet, Oehmd) u. ſ. w., deren ich mich nur im Falle der Noth bediene, vorzuziehen. In Ermangelung von Rhabarberſamen habe ich auch den Samen der Rüſter (Ulme) geeigneter zur Obſtverpackung gefunden, als ſämmtliche ſo eben genannte Surrogate. Das

von dem Herrn Garteninſpector Ed. Lucas in Hohenheim in ſeiner Schrift »die Obſtbenutzung« (1856) p. 80 erwähnte Verfahren der Gärtnerfrauen von Thomery bei Verpackung von Weintrauben entſpricht dem hier angegebenen, mit dem Unterſchiede, daß jene Damen ſich der abgeſtreiften, trocknen Blätter von Pteris aquilina oder Aspidium Filix bedienen, während ich mit noch beſſerem Erfolge den Samen von Rheum dazu benutze.

Auch die an einigen Orten gebräuchliche Benutzung der Hirſe, die ſich zwar durch ihre Appetitlichkeit empfiehlt, iſt weniger zweckmäßig, weil ſie theurer iſt und das Gewicht der Colli bedeutend vermehrt.

Im vorigen Herbſte ſandte ich u. A. ein Töpfchen feineres Obſt von der Ausſtellung an Herrn Profeſſor Eduard Morren in Lüttich, zur Probe und Beſtimmung. Die Früchte hatten ſchon vorher einen langen Transport überſtanden, die Ausſtellungszeit in der warmen und feuchten Atmoſphäre des Ausſtellungs-Locales durchgemacht und bedurften noch geraumer Zeit, um ihren Beſtimmungsort zu erreichen. Demungeachtet äußert ſich Herr Morren im diesjährigen Februar-Heft der Belgique horticole über ihren Zuſtand bei der Ankunft in Lüttich wie folgt: „Les fruits qui nous avaient été envoyés de Christiania au commencement de novembre se sont maintenus dans un état parfait de conservation, dans notre bureau, jusqu'à la fin de janvier, et cela malgré les fatigues du voyage et la température trop élevée d'un appartement habité. Il est vrai que l'emballage avait été si parfait, qu'aucun fruit n'avait souffert de la longueur du transport. Il n'est peut-être pas inutile de faire connaître le procédé usité avec tant de succès par M. Schubeler. Chaque fruit était enveloppé d'un morceau de papier non collé et fort souple quoique d'épaisseur moyenne: un papier trop rude ou simplement collé présenterait beaucoup de dangers et blesserait facilement l'épiderme, dès que celui-ci est légèrement entamé la décomposition fait de rapides progrès. Les intervalles entre chaque fruit étaient remplis par de la graine de Rhabarbe, substance trés legère, sèche, élastique et souple et bien préférable sous tous ces rapports à la sciure de bois, au son (Kleie), ou à la mousse.“

So weit Morren. — Ich bin über dieſen Gegenſtand hier ſo weitläufig geworden, weil er für manche Gegenden des Auslandes von weſentlicher Bedeutung iſt.

Zur Vervollſtändigung der ſchon Eingangs gemachten Bemerkung über die Menge und Schönheit der auf der Ausſtellung befindlichen Aepfel und Birnen kann ich noch anführen, daß ich, mit Ausſchluß des nicht geringen Theils von minder werthvollen Sorten, von Wirthſchaftsobſt, ſo wie einer nicht unbedeutenden, nach Schluß der Frucht-Ausſtellung in Bergen eingetroffenen Sendung, von mehr als 125 verſchiedenen Ausſtellern directe Beiträge erhalten hatte.

Das in meinem Original-Berichte enthaltene Verzeichniß der ſpäter größtentheils durch die Güte der Herren Superintendent Oberdieck in Hannover und Hofgärtner Carl Fintelmann in Potsdam beſtimmten Sorten nimmt 18 enggedruckte groß Octav-Spalten ein, und enthält viele der werthvollſten, in Mittel-Europa heimiſchen Varietäten. Ich ſandte nämlich nach Schluß der Ausſtellung an Herrn Fintelmann

eine Auswahl von 1011 Nummern, worunter ſich freilich eine Menge Doubletten der häufiger vorkommenden Sorten, z. B. Gravenſteiner, Prinzenapfel, Calvillen u. ſ. w., befanden. Keine derſelben war aber an einem und demſelben Orte gewachſen oder von einem und demſelben Ausſteller eingeſandt, und inſofern hatte jede einzelne Nummer ihr beſonderes Intereſſe. Herr Fintelmann hatte die Güte, diejenigen Exemplare meiner Sendung, über deren Beſtimmung er Zweifel hegte, an den Herrn Superintendenten Oberdieck einzuſchicken, und es iſt mir eine wahre Freude, dieſen hochverehrten Herren, deren Verdienſt um die geſammte Pomologie ich nicht nöthig habe hervorzuheben, hier öffentlich meinen herzlichen Dank ausſprechen zu können für die vielfältige, mit der Unterſuchung und Beſtimmung meiner, allerdings ſehr umfangreichen Sendung verbundenen Arbeit und Mühe.

Möge es den genannten Herren einigen Erſatz gewähren, durch die mir erwieſene Bereitwilligkeit weſentlich zur Förderung der genaueren Kenntniß von den in Norwegen vorkommenden Obſtſorten beigetragen, und damit der Pomologie einen neuen Dienſt geleiſtet zu haben.

Ueber das Schickſal einer anderen, ziemlich reichhaltigen Sendung, die ich gleichzeitig mit der obigen an Herrn Siebenfreud in Tirnau (Ungarn), deſſen Name in der pomologiſchen Welt einen guten Klang hat, abſandte, habe ich leider bis heute Nichts in Erfahrung bringen können.

Unter den, wie vorhin bemerkt, an Herrn Prof. Morren geſchickten Aepfeln befand ſich auch die Norwegen angehörende, zuerſt von Herrn Lucas in Hohenheim beſchriebene neue Varietät, die ich mir erlaubt habe unter dem mit ihrem Geburtsorte gleichlautenden Localnamen: „Kaupanger“ Apfel einzuführen.*) Herr Morren hat dieſen Apfel beſonderer Aufmerkſamkeit werth gefunden, und ich glaube er hat Recht. Er begleitet ſeine Beſchreibung deſſelben im Februar-Heft 1859 der Belgique horticole mit einer naturgetreuen Abbildung, auf welche ich mir erlaube aufmerkſam zu machen, und giebt dem Apfel bei dieſer Gelegenheit den Namen: „Reinette de Norwège“.

Nun weiß Jedermann, wie ſtörend und verdrießlich die Unmaſſe von Synonymen in der Botanik überhaupt iſt; ganz beſonders aber in der an und für ſich ſchon hinreichend ſchwierigen Pomologie. Um daher in gegenwärtigem Falle das meinige zu thun, bitte ich die ſich dafür intereſſirenden Pomologen, die allgemeinere Benennung des in Rede ſtehenden Apfels (Reinette de Norwège) fallen zu laſſen, und dagegen die beſtimmtere: „Kaupanger Apfel“ mit mir zu adoptiren.

Wenn Herr Morren ſchon im December-Heft 1858 der von ihm redigirten Belgiſchen Gartenzeitung von den, ihm von hieraus geſandten Früchten im Allgemeinen bemerkt: „Ces fruits, consistant en pommes et en poires, appartenaient à d'excellentes variétés, et avaient toute l'apparence des plus beaux produits récoltés dans notre pays,“ ſo

*) Kaupanger iſt der Name eines in alten Zeiten adeligen Beſitzthums und liegt am Meerbuſen von Sogn unter dem 61.° n. Br. An demſelben Orte lag in noch früherer Vorzeit eine Stadt gleiches Namens, die im Jahre 1134 auf Befehl des damals regierenden, hiſtoriſch berühmten norwegiſchen Königs Sverrer eingeäſchert wurde.

rühmt er von dem Kaupanger Apfel im Besonderen, daß: „La variété dont nous parlons est particulièrement recommandable; — elle est d'une fort belle apparence, d'une forme irréprochable, d'une conservation très longue et d'une saveur délicate," und ferner, daß „pendant les trois mois qu'elle a pu être conservée elle n'a cessé de répandre un arôme fin et très pénétrant. — La chair est ferme et aromatisée" u. s. w., und bemerkt endlich: „notre pomologie nationale ne peut donc que gagner en recrutant les meilleures variétés issues du rude climat de la Norwége."

Unter Beziehung hierauf erbiete ich mich nun mit besonderem Vergnügen, denjenigen Pomologen und Freunden der Obstcultur, die es interessiren möchte, Edelreiser des Kaupanger Apfels und einiger anderen der edleren, ächt norwegischen Varietäten, über die ich gegenwärtig gebieten kann, (ohne Entgelt) so weit mein Vorrath reicht, zu überlassen; wenn sie die Güte haben wollen, sich deshalb schriftlich an mich zu wenden.

Freuen wird es mich, wenn mein Anerbieten Beachtung findet.

Christiania, im August 1859.

Fr. Chr. Schübeler.

St. Petersburg. Nach einer Notiz in der „Gartenflora" fand die große Ausstellung des Gartenbau-Vereins zu St. Petersburg zwischen dem 30. April und 7. Mai statt. Dieselbe ward von ungefähr 30,000 Personen besucht und übertraf in Bezug auf Decoration alles bisher Dagewesene. Für werthvolle Prämien und Einrichtungskosten gab der Verein nahe an 10,000 R. S. aus.

Correspondenz.

Herrn Wilhelm Maak's Handelsgärtnerei.

Auf meiner Geschäftsreise nach Magdeburg berührte ich auch Schönebeck, und als Blumenliebhaber besuchte ich daselbst zum erstenmal den Handelsgärtner Herrn Wilh. Maak. Ich wurde in der That überrascht, hier Sachen zu finden, die ich nicht erwartet hatte, und so will ich es daher auch nicht unterlassen, das Publikum auf diese Gärtnerei aufmerksam zu machen, zumal da sämmtliche Pflanzen in ausgezeichneter Cultur sich befinden, sowie auch die Preise im Vergleich zu denen vieler Etablissements niedrig gestellt sind. Ich erlaube mir Ihnen meine in Eile genommene Notiz hiermit zu übersenden.

Von Leucopogon Cunninghami fand ich einige hundert Exemplare vorräthig, von

Acacia Drummondii und celastrifolia starke Vermehrung.

Callicarpa purpurea wohl an 200 Pflanzen im Freien.

Juniperus virginiana circa 7000 Stück von 8—24 Zoll Höhe.
Dracaenopsis indivisa 40 Pflanzen, prachtvoll.
Primula chin. rubro & albo pl. in Masse.
Eriken, namentlich hyemalis, prachtvoll.
Araucaria excelsa aus Kronenstecklingen, prachtvoll.
Sarracenia purpurea üppig und prachtvoll.
Cephalotus follicularis gesund und üppig.
Ein Sortiment der neuesten indischen Azaleen mit Knospen.
Ein Sortiment von den schönen Topf-Staticen.
Lilium lancifolium in Masse, das 100 zu 25 ₰.
Thujopsis borealis in großen Massen.

Von schönen Cultur-Pflanzen waren besonders **Chorozema Henchmannii** und **elegans**, ferner **Genethyllis macrostegia**, **Yucca quadricolor**, **Dasylirion angustifol.**, **Aralia Sieboldii**, **Dracaena nobilis**, **Cyanophyllum magnificum**, prachtvoll, diese Pflanze hatte 4 Fuß im Durchmesser.

Neu schienen mir zu sein 2 Pflanzen von **Bonapartea stricta** und eine **Dianella** spec. nov.

Im Orchideenhause, das freilich nur klein ist, fand ich zu meinem Erstaunen, daß alle Pflanzen hier förmlich wucherten, ich sah hier die Orchideen einmal wieder im Laube schön, auch waren die seltensten Arten vertreten, so z. B. **Uropedium**, **Cypripedium Candollei**, **Odontoglossum naevium** und **Phalaenopsis**, **Vanda**, **Anguloa** und ein starkes Sortiment von Cattleyen und Laelien in üppigen Exemplaren.

Magdeburg, den 22. Septbr. 1859.

A constant Reader.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Obgleich eine deutsche Gartenzeitung in einer ihrer letzten Nummern sich gemüßigt sieht, es zu tadeln, daß die meisten deutschen Gartenzeitungen (unsers Wissens aber auch englische, belgische und französische) wie auch die unsrige regelmäßig die in anderen deutschen und ausländischen Zeitschriften abgebildeten oder beschriebenen Pflanzen namhaft machen, respective empfehlen, so werden wir dennoch fortfahren, unsere Leser mit den in anderen Zeitschriften publicirten neuen wie älteren Pflanzen nicht nur bekannt zu machen, sondern auch diejenigen Arten empfehlen, die unserer Ansicht nach einer Empfehlung werth sind, denn es ist wohl nicht anzunehmen, daß alle Pflanzen- und Gartenfreunde im Besitze der vielen Gartenschriften sind, und mit allen darin abgebildeten Pflanzen bekannt werden. Durch die Erwähnung fast aller in anderen Zeitschriften abgebildeten oder auch nur beschriebenen Pflanzen in unserer Zeitung eignet sich dieselbe daher auch ganz besonders zum Nach-

ſchlagen, denn nur ſelten dürfte man vergebens in dem alljährlich am Schluſſe des Jahrganges beigegebenen Inhaltsverzeichniſſe nach einer im Laufe des Jahres in den Gärten bekannt gewordenen Pflanzenart ſuchen.

Die Redact.

* Iridorchis gigantea *Bl.* *)

(Cymbidium giganteum Wall., Cymb. iridioides Don.)

Orchideae.

Die Iridorchis gigantea iſt faſt in allen Orchideenſammlungen allgemein unter dem Namen Cymbidium giganteum bekannt und iſt eine Pflanze, die ſich durch ihre ſchönen großen, glänzend grünen Blätter, wie durch ihre großen hübſch braunroth und gelblich grün gezeichneten Blumen, die in einer 1—2 Fuß langen Riſpe beiſammen ſtehen, empfiehlt, und ſich in jedem Warmhauſe kultiviren läßt.

Das 5. Heft dieſes Jahrg. der „Ann. d'Hortic. et de Bot. ou Flore des jardins du Royaume des Pays-Bas“ giebt eine Abbildung dieſer ſchönen Pflanze unter dem oben angeführten Namen und außer der Diagnoſe von Blume auch noch eine Bemerkung über die Benennung dieſer Art von demſelben Gelehrten. Profeſſor Blume iſt nämlich derſelben Meinung wie Lindley in ſeinen Genera and Species of Orchid. plants p. 16], daß nämlich die Gattung Cymbidium, ſo wie man ſie jetzt kennt, in mehrere beſtimmte Gattungen getrennt werden muß. So ſei namentlich das Cymbidium iridioides Don von den wahren Cymbidien zu trennen. Es unterſcheidet ſich von jenen durch das Gynoſtemium, das nach unten ſtark angeſchwollen iſt, wo es mit der verengten Baſis der Lippe einen kleinen Sack oder kleine Taſche bildet.

Thalictrum anemonoides *Mich.*

(Anemone thalictroides L., Ranunculus nemorosus L.)

Unter den vielen Arten der Gattung Thalictrum iſt dieſe hier eine von den anderen ganz abweichende. Die Stengel erreichen eine Höhe von nur höchſtens 1 Fuß, an deren Spitzen die großen weißen Blumen doldenartig geſtellt ſind und die ſehr an unſere Anemone nemorosa erinnern, weshalb ſie auch ſchon früher zur Zeit Plukenet's und Linné's für eine Anemone gehalten worden iſt. In England 1768 eingeführt, wurde nach London zur ſelben Zeit auch eine Varietät mit gefüllten Blumen eingeführt, was jedoch nach Sweet um's Jahr 1822 geſchehen ſein ſoll.

Die reine Art ſowohl wie die gefüllt blühende Varietät ſind zwei ſehr zu empfehlende Pflanzen. Von der einfach blühenden giebt „die Illustrat. hortic.“ tab. 214 eine hübſche Abbildung und obgleich im Texte der gefüllt blühenden Varietät gedacht wird, ſo wundert es uns, daß neben den vielen Citaten zu dieſer Pflanze nicht auch die Abbildung in der „Flore des serres etc.“ (tab. 1155, Jahrg. 1856) angegeben

*) Die mit einem * bezeichneten Pflanzen ſind im bot. Garten zu Hamburg abgebbar. E. D—c.

worden ist. Die Varietät mit gefüllten Blüthen wurde auch schon früher in der Hamburg. Gartenztg. von uns empfohlen.

Literatur.

Signaturen für das Herbarium. Mit besonderer Rücksicht auf die in der Pharmazie, Land- und Forstwirthschaft, Technik und Oekonomie benutzten, in Deutschland wachsenden Pflanzen. Zum Gebrauch für Jedermann bearbeitet von **Fr. Hoffmann.** Mit einem Vorworte von Dr. Otto Berg. Stettin 1859. R. Graßmann.

Die Ausgabe dieser Signaturen dürfte Vielen sehr willkommen sein, denn mit Sachkenntniß und Fleiß angelegte Herbarien erhalten durch eine sorgfältige und schöne Gruppirung und Bezeichnung der Pflanzen einen großen Theil ihres praktischen Werthes.

Die Bearbeitung der Signaturen ist die von Dr. Otto Berg in dessen Handbuche der pharmazeutischen Botanik befolgte systematische Anordnung zum Grunde gelegt und zerfallen nach derselben die Signaturen in folgende Arten:

auf hellgelbem Papiere: Signaturen für die Familiengruppen,
auf grünem Papiere: Verzeichnisse der in die Familiengruppen gehörigen Familien,
auf intensiv gelbem Papiere: Signaturen für die Familien,
auf blauem Papiere: Signaturen für die Unterabtheilungen der Familie Compositae,
auf weißem Papiere: Signaturen für die Pflanzenspecies mit alphabetischem Register der Gattungsnamen.

Außerdem sind für diejenigen, welche zur Eintheilung des Herbariums das Linné'sche Sexualsystem vorziehen, oder vorläufig beibehalten wollen, Signaturen für dessen 24 Klassen beigegeben.

Zum Gebrauche werden die Signaturen ausgeschnitten und mittelst Stärkekleisters aufgeklebt.

Nach der gewählten Anordnung zerfällt das Herbarium in 15 Familiengruppen, deren jede in eine oder mehrere Mappen geschlossen wird. Auf die Außenseite des vorderen Pappblattes wird die Signatur für die Familiengruppe, auf dessen innere Fläche das Verzeichniß der in jene Gruppe gehörigen, in der bezeichneten Reihenfolge zu sortirenden Familien geklebt.

Die zu einer Familie gehörigen Pflanzenspecies werden in größere starke Papierbogen geschlagen und auf deren vorderen Außenfläche die Signatur für die Familie geklebt.

Für diejenigen Familiengruppen, wo die Zahl der Familien und Species, und für diejenigen Familien, wo die Menge der Species eine Aufbewahrung in mehreren Mappen und Umschlagsbogen wünschenswerth machen, sind mehrere Signaturen und für die Familie der Compositae Signaturen für deren Unterabtheilungen beigegeben.

Die Signaturen für die Pflanzenspecies werden in eine der

Ecken der inneren oder äußeren Fläche des Blattes, worauf die Pflanze ruht, geklebt. Auf derselben ist zur Bezeichnung des Fundortes und der Zeit, wo die Pflanze eingelegt wurde, Raum gegeben.

Zur weiteren Completirung des Herbariums sind von der Verlagshandlung unausgefüllte Signaturen für die Pflanzenspecies und die Familien ausgegeben und ist auf den Familienverzeichnissen für die Familiengruppe Raum zum Nachtragen neu hinzukommender Familien gegeben.

Wie die Pflanzen einzulegen und zu trocknen sind, ist vom Herausgeber dieser Signaturen genau angegeben, ebenso die fernere Behandlung der getrockneten Pflanzen zur Erhaltung derselben ꝛc. ꝛc.

Obst-Buch für Schleswig, Holstein und Lauenburg, enthaltend Beschreibung und Abbildung der 50 Obstsorten, welche von dem Gartenbau-Verein für die Anpflanzung empfohlen worden sind. Herausgegeben vom Vorstand des Gartenbau-Vereins. Kiel 1859.

Der Vorstand des Vereins für Gartenbau in Schleswig, Holstein und Lauenburg hat bereits in seinem Jahresberichte für 1859 eine Auswahl von 25 Sorten Aepfeln und 25 Sorten Birnen aufgestellt, welche nach dem Urtheile sachkundiger Pomologen zum Anbau in den Herzogthümern zu empfehlen sind. Da indessen viele der genannten Sorten in den Herzogthümern noch gänzlich unbekannt, oder unter anderen Namen verbreitet sind, oder aber unter den aufgeführten Namen andere Sorten sich finden, so hielt es der Vorstand des gedachten Vereins für zweckmäßig, von den empfohlenen Sorten eine zwar gedrängte, aber alle wesentlichen Merkmale berücksichtigende Beschreibung und eine den Umriß oder Längsdurchschnitt der Frucht darstellende Abbildung zu geben, was den Inhalt des hier genannten Obst-Buches ausmacht.

Der Obstbau liegt im Vergleich zu anderen Ländern in den Herzogthümern noch sehr im Argen und kann man es dem Vorstande des Vereins nicht genug danken, daß er auf diese gewiß äußerst praktische Weise zur Förderung des Obstbaues hier im nördlichen Deutschland beizutragen so eifrig bemüht ist.

Die in dem Buche gegebenen Beschreibungen und Abbildungen sind dem bekannten neuesten und besten Werke über diesen Gegenstand: „Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, unter Mitwirkung Mehrerer herausgegeben von den Herren Fr. Jahn, E. Lucas und J. G. C. Oberdieck“ entlehnt, und dürften sie bei aller Kürze wohl genügen, um dem aufmerksamer prüfenden Leser die Gewißheit zu gewähren, ob eine gewisse Frucht, von der er ein in Größe, Gestalt und Färbung normal gebildetes Exemplar vor sich hat, die betreffende Sorte sei oder nicht.

Die in dem 1. Hefte des Obstbuches beschriebenen und abgebildeten Früchte sind: 1. Weißer Winter-Calvill; 2. Rother Herbst-Calvill; 3. Gravensteiner; 4. Prinzen-Apfel; 5. Rother Astrakan; 6. Danziger Kantapfel; 7. Pariser Rambour-Reinette; 8. Ananas-Reinette; 9. Orleans-Reinette; 10. Winter-Goldparmäne; 11. Champagner-Reinette; 12. Königlicher Kurzstiel; 13. Große Casseler Reinette. Von Birnen: 1. Graue Sommer-Butterbirn; 2. Sommer-Dechantsbirn; 3. Punktirter Sommerdorn; 4. Holländische Feigenbirn; 5. Wildling von Motte; 6.

Rothe Bergamotte; 7. Köſtliche von Charnau; 8. Bosc's Flaſchenbirn; 9. Napoleons-Butterbirn; 10. Diel's Butterbirn; 11. die Regentin; 12. Hardenpont's Winter-Butterbirn.

Das Büchelchen dürfte nicht nur allein in den Herzogthümern Schleswig, Holſtein und Lauenburg, ſondern überhaupt im ganzen nördlichen Theile von Deutſchland von großem Nutzen ſein.

E. D—o.

Seit dem 1. Januar d. J. erſcheint in Chriſtiania unter der Redaction des auch in Deutſchland durch mehrere ſehr gediegene Abhandlungen, namentlich in der Hamburger Gartenzeitung veröffentlicht, bekannten Herrn Schübeler eine Gartenzeitung in monatlichen Heften von 3 Octavbogen.

Die Zeitung, die von dem Verein zur Beförderung des Wohles Norwegens (Societas regia pro salute Norwegiae) ausgegeben wird (d. h. die Koſten werden von dem Vereine bezahlt), wird frei durch die Poſt befördert und beträgt der Abonnements-Preis nur 36 ß Courant jährlich für 36 große Octavbogen. — Im Januar fing die Zeitung mit 900 Abonnenten an und jetzt hat ſie ungefähr 2000 Abonnenten. Die Zeitung „Budstikken“ (wörtlich der Gebotſtock) umfaßt Landwirthſchaft und Gartenbau und die damit in Verbindung ſtehenden Erwerbszweige für die Landesbevölkerung.

E. D—o.

Havebog for Almuen af Fr. Chr. Schübeler. 1 Kjokkenhave. Tredie ogede Oplag. Udgivet efter Opfordring og med Underſtottelſe af det kongelige Selſkab for Norges Vel. Chriſtiania 1859. J. W. Cappelen.

Das Gartenbuch für das Volk von Fr. Chr. Schübeler. Der Verfaſſer ſpricht ſich über ſein Werk und über die Beweggründe der Herausgabe folgendermaßen aus: Da kein Theil der Landwirthſchaft ſo nützlich und lohnend iſt, als der Gartenbau, der zugleich auch noch gar wenig Kraft erfordert und von allen Leuten, Frauen und Kindern beſchafft werden kann, ſo hat ſich der Verfaſſer veranlaßt geſehen, den Norwegern das zu lehren, was ſchon das Brudervolk, die Schweden wiſſen, den Garten zu bearbeiten und Bäume zu ziehen. Beſonders iſt er aber zu der Herausgabe des Büchelchens durch die Direction der Königl. Geſellſchaft für Norwegens Wohl veranlaßt worden. Da der geringe Mann wenig Zeit zum Leſen hat, ſo hat der Verfaſſer ein Büchelchen von wenig Bogen gemacht, er hat ſich immer auf das Genaueſte und Kürzeſte gefaßt, ohne undeutlich zu werden.

Der Druck der kleinen Schrift iſt ausnehmend gefällig, deutlich und ſchön, eben daſſelbe läßt ſich von den vielen beigegebenen Holzſchnitten ſagen.

In dem erſten Stück (pag. 5—18) beſpricht der Verfaſſer die Gartenin ſtrumente und ihren Gebrauch, ſo wie die Bearbeitung des Bodens und die Pflanzen, wie dieſe geſäet und gepflanzt werden können, ſowie die beſte Zeit dazu; doch dieſes letztere nur allgemein.

Im 2. Abſchnitt (pag. 19—32) behandelt er die verſchiedenen Gewächſe, als: 1. Kohlgewächſe, 2. Wurzel-, 3. Stangen-, 4. Zwiebel-,

5. Salat-, 6. Spinat- und 7. Gewürzgewächse. Alle diese Abhandlungen sind in 90 Paragraphen gefaßt.

Von diesem „Gartenbuche für das Volk“ sind in 3 Jahren 11,000 Exemplare (die 2 ersten Auflagen) vergriffen, wohl eine natürliche Folge davon, daß dasselbe in einer sehr einfachen und für das Volk abgepaßten Sprache geschrieben ist, und dann in Folge des enorm billigen Preises, denn es kostet nur 2 Schillinge Courant und in Parthien von 50 Stück 1½ Schill.

Von der 3. Auflage hat Se. Majestät der König eine große Anzahl Exemplare für eigene Rechnung gekauft, um diese im Lande vertheilen zu lassen. E. D—o.

Feuilleton.

Lapageria rosea R. et P. Den meisten Pflanzenfreunden wird diese ausgezeichnete Zierpflanze wohl nur nach der Abbildung im Bot. Mag. tab. 4447 und in der Flore des serres V, pag. 491 bekannt sein, denn nur sehr wenige Cultivateure dürften sie bis jetzt in Blüthe gehabt haben. Dem Obergärtner Herrn Boysen im Booth'schen Etablissement ist es nun nach mehrjährigen Versuchen endlich geglückt, diese schwer blühende Pflanze zur Blüthenerzeugung gebracht zu haben. Das Exemplar steht in einem Kalthause, wo es auf dem Erdbeetz ausgepflanzt ist und sich daselbst an einem der eisernen Träger 6—8 Fuß hoch hinaufgewunden hat, und jetzt, Mitte September, eine Menge der herrlichsten, großen, scharlachrothen Blumen trägt.

Die Lapageria rosea gehört zu den Smilaceae, und wurde zuerst bereits im Jahre 1847 durch R. Wheelwright Esq. von Conception (Chili) in Kew eingeführt. Im Jahre darauf erhielten auch die Herren Veitch durch ihren Reisenden Herrn Lobb lebende Pflanzen.

Die Pflanze treibt einen viele Fuß hohen windenden Stamm, der sich, namentlich nach oben hin, verzweigt. Die Blätter sind gestielt, eirund-lanzettförmig, lederartig, glänzend, zugespitzt, fünfnervig und netzartig geadert. Die Blüthenstengel stehen einzeln, achselständig, sind länger als die Blattstengel und tragen eine schöne, lilienartige, hängende Blume von dunkelrosa Färbung, im Innern weiß gefleckt. Wir machen die Pflanzenfreunde nochmals ganz besonders auf diese Pflanze aufmerksam, deren Blüthenpracht jede auf ihre Kultur verwendete Mühe reichlich belohnt.

Begonien-Bastarde. Im vorigen Hefte wurde mitgetheilt, daß Herr Liebig in Dresden ein ganzes Haus voll von Sämlingen der Begonia Rex aufzuweisen habe, die alle bis jetzt vorhandenen Begonien in den Hintergrund drängen. Wir kennen die Liebig'schen Begonien-Sämlinge nicht, möchten aber doch bezweifeln, daß sie denen von Herrn Obergärtner Stange im Consul Schiller'schen Garten erzogenen Sämlingen gleich kommen. Das Farbenspiel und die Zeichnungen, welche diese Begonien bieten, ist nicht zu beschreiben. Unter den vielen Hunderten von Pflanzen sind sich nur sehr wenige ganz gleich und alle ohne Ausnahme schön zu nen-

nen. Mehr als ein Dutzend Sorten, die sich durch eine prächtige Blattzeichnung vor allen übrigen ganz besonders auszeichnen, sind mit Namen bezeichnet worden und ist somit Aussicht vorhanden, daß diese auch vermehrt und weiter verbreitet werden dürften. Mit der **Begonia Rex** hat Herr Linden und andere Handelsgärtner bekanntlich ein sehr gutes Geschäft gemacht und keine Pflanze hat eine so schnelle und so ausgedehnte Verbreitung gefunden, als eben diese Begonia. Ob aber ein so günstiges Resultat mit dieser Pflanze erzielt worden wäre, wenn einer oder der andere der neuen Blendlinge vor ihr bekannt gewesen wäre, möchten wir bezweifeln, denn die vorzüglichsten Sämlinge lassen die B. Rex weit hinter sich zurück.

Die prächtigsten, benannten Sorten im Schiller'schen Garten sind: **Alexander von Humboldt; quadricolor; Prinzessin von Preussen; Prinz Regent von Preussen; Frau Consulin Schiller; Paul Schiller; Magdalene Schiller; Mathilde Schiller; Mad. Mathieu; Reichenbach filius; Mathilde Valentiner; Inspector Bouché; gracilis; Johannes Mastern; Alexander Braun; Lorenz Braun; Inspector Otto u. a.** Von allen diesen genannten Begonien sind bereits sehr ansehnliche Exemplare vorhanden und gewähren im Hause einen reizend schönen Anblick.

Die Sequoia gigantea (Wellingtonia) im Consul Schiller'schen Garten, im freien Lande stehend, hat bereits eine Höhe von fast 5 Fuß erreicht und einen Durchmesser ihrer fast vertical vom Stamme abstehenden Zweige von 3 Fuß.

Pelargonien zu Gruppen. Es giebt bekanntlich sehr viele Sorten von Pelargonien, die sich zu Gruppen eignen; ganz besonders dazu geeignet möchten wir aber die hybriden Pelargonien **Witmot's surprise, Unique coccinea, lilac** und **excellent** empfehlen. Diese Sorten zieren nicht nur schon mit ihren hübschen brillanten Blumen, sondern auch schon mit ihren vielfach geschlitzten saftgrünen Blättern. Sie sind in den Gärtnereien der Herren J. Booth & Söhne, Ohlendorff & Söhne, wie bei den Herren P. Smith & Co. zu haben.

Dauer der Keimkraft. In der Generalversammlung des Hannoverschen Gartenbau-Vereins am 31. Juli leitete der Präsident desselben, Herr Dr. Helmboldt, die durch die Pflanzenphysiologie noch nicht vollkommen gelöst'te Frage mit einer umfassenden und eingehenden Darstellung alles dessen ein, was die Wissenschaft bislang über die Zeit der besten Keimkraft und deren Dauer an die Hand gegeben hat.

Hiernach sind die Requisite der Keimfähigkeit vollkommene Reife, Befruchtung und Jugend, obgleich auch ermittelt ist, daß es Samensorten giebt, die, vor Luft, Licht und Feuchtigkeit geschützt, eine beträchtliche Reihe von Jahren ihre Keimkraft conserviren.

Zum Processe des Keimens sind Wasser, Wärme und Luft erforderlich, jedoch in einem bestimmt bemessenen Grade, so daß z. B. Samen seine Keimkraft verliert, wenn er einer Wärme von 30° R. ausgesetzt war, die Sonnenlinie passirte und Getreide eine halbe Stunde in 40° heißem Wasser lag.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen traten Einzelne aus der Versammlung zur Motivirung und Erweiterung derselben mit ihren praktischen Erfahrungen hervor.

Herr Kunstgärtner Enger führte an, daß Samen, natürlich mit Ausschluß des Samens der Wasserpflanzen, welcher sich unter Wasser befindet, nicht keime; beim Ausschlagen von Flüssen, Teichen ꝛc. werde die Mudde gar bald mit Pflänzchen überzogen und er habe gesehen, daß auf solcher, die sich in der Nähe von Waldungen befunden, kurze Zeit nachher Eschen, Eichen, Birken ꝛc. entstanden seien.

Waisenhaus-Inspector Palandt war der Ansicht, daß frischer Samen doch immer die beste Keimkraft enthalte, mit Ausnahme von etwa Gurken und Melonen, die, nach der Meinung von Praktikern, mehrere Jahre keimfähig bleiben, ja mit den Jahren einen bessern Ertrag liefern. Daß der Samen in dem einen Jahre besser keime als im andern, lasse sich wohl erklären. Eine Pflanze verlange zur Keimung gewisse Stoffe; z. B. die Kohlarten müssen mit Oel durchtränkt sein; ist dieses im Samen gehörig entwickelt, so keimt der Samen kräftig; bei den Cerealien muß Stärkemehl, Zuckerstoff und Eiweißstoff in gehöriger Quantität und Mischung vorhanden sein; dies zeige sich im sogenannten eisdröhnigen Weizen, in welchem Zuckerstoff und Eiweißstoff gegen Stärkemehl zu stark entwickelt sei.

Rücksichtlich der Samenaufbewahrung wurde eine Conservirung in Beuteln empfohlen, welche luftig, trocken und nicht zu heiß aufzuhängen seien; in Schoten aufgehängt, hält sich indeß der Samen länger.

Nach einer Recapitulation der verschiedenen laut gewordenen Ansichten, neigte man sich doch im Allgemeinen zu dem von Palandt stark betonten Grundsatze hin, daß frischer Samen überall den Vorzug verdiene.

Personal-Notizen.

Dr. **Fr. Körnicke**, bisher Conservator der Herbarien des Kaiserl. bot. Gartens in Petersburg, ist als Lehrer der Botanik an die landwirthschaftliche Schule zu Waldau bei Königsberg berufen worden und hat seine neue Stelle bereits angetreten. An seine Stelle wird Herr Maximowicz, Reisender des Kais. bot. Gartens, nach seiner Rückkehr aus Japan, treten.

Herr **M. Kolb**, seit Jahren im **Bois de Boulogne** bei Paris, ein geborner Münchner, ward an die vor beinahe vier Jahren durch den Tod Weinkauff's erledigte Stelle zum botanischen Gärtner in München ernannt. (Gartenfl.)

Herr Hofgärtner **Nietner**, zur Zeit in Schwedt a/O, ist zum Nachfolger seines verstorbenen Bruders Eduard als K. Hofgärtner in Sanssouci, der bisherige Titular-Hofgärtner Herr **Kellner** in Charlottenburg dagegen als wirklicher Hofgärtner in Schwedt a/O, und der bisherige Gartengehülfe Herr **Michaelis** in Charlottenburg zum Obergehülfen daselbst ernannt worden.

Durch die Gnade Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden ist der Großherzogl. badische Gartendirector Herr **Held** von der Direction des botanischen Gartens zu Karlsruhe entbunden.

Herr **Joh. Gottlob Ausfeld** hat die Samen- und Pflanzenhandlung des Herrn C. F. Brückner in Arnstadt in Thüringen seit Februar d. J. käuflich übernommen.

Das Hauptgeschäft des Herrn Ausfeld besteht in der Samenzucht der an diesem Platze zur größten Vollkommenheit gebrachten Blumen, als: Levkoyen, Goldlack, Astern, Balsaminen, Salpigloffen u. s. w., jedoch sollen von dem jetzigen Besitzer die übrigen Zweige der Gärtnerei nicht vernachlässigt werden. Durch die Bekanntschaften des Herrn Ausfeld mit den ersten Notabilitäten der Hortikultur, durch seine vielen und weiten Reisen (Herr Ausfeld hat sich eine Reihe von Jahren in Australien aufgehalten) ist er in den Stand gesetzt, den geehrten Gartenfreunden stets das Neueste und Beste darzubieten. —

Das von Herrn Ausfeld auszugebende Samenverzeichniß wird Anfangs December zur Vertheilung bereit liegen und wird dasselbe auf frankirte Briefe franco zugesandt, auch wird die Redaction dieser Zeitung auf frankirte Anfragen die Zusendung dieser Verzeichnisse gern übernehmen und ersucht, im Namen des Herrn Ausfeld um recht zahlreiche Anforderungen, indem sie eine solide und prompte Bedienung von Seiten des Herrn Ausfeld zuzusichern im Stande ist.

Correspondenz-Notizen.

Hrn. O. T. — Sagan. Ihre gütige Einsendung ist mit Dank angenommen.

Hrn. F. G. — Paris. Mit vielem Vergnügen bin ich ihrem Wunsche entgegengekommen. Jede Notiz von Ihnen soll mir stets angenehm sein.

Hrn. J. — Magdeburg. Es freut mich, aus dem von Ihnen mir gütigst Zugesandten zu ersehen, daß Sie mich nicht ganz vergessen haben. Ich werde das Erhaltene so bald als möglich benutzen.

Blumenzwiebeln.

Den geehrten Blumenfreunden und Gartenbesitzern die ergebene Anzeige, daß mein Verzeichniß über wirklich ächte Harlemer Blumenzwiebeln erschienen ist und steht dasselbe auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten.

Ergebenst

Altona, kleine Bergstraße No. 27. **C. Kühne.**

Kalt flüssiges Baumwachs.

Dieses unübertreffliche BAUMWACHS, zum Bedecken der Brandwunden, Veredeln etc. etc., wird kalt aufgetragen, verhärtet sich in der Luft als auch im Wasser und wird bei einer Temperatur von 45 ° nicht flüssig. In 1/4, 1/2 und 1 Pfund Blechdosen, grössere Quantität billigst berechnet. Wiederverkäufern angemessenen Rabatt, pr. Comptant zahlbar, Briefe franco.

Darmstadt. **Georg Liebig Sohn.**

Hiesigen Gärtnern steht die Redaction dieser Zeitung mit kleinen Proben dieses Baumwachses zu Versuchen zu Diensten.

Verfall der Pflanzen-Ausstellungen.

Von mehreren Seiten sind uns über den Verfall der Blumen- und Pflanzen-Ausstellungen verschiedener Gartenbau-Vereine Klagen zu Ohren gekommen, namentlich von Vereinen, deren ganzes Wirken eigentlich nur in der Abhaltung von einer oder zweien Ausstellungen des Jahres besteht, wie z B. in Hamburg. Jene Klagen sind in der That begründet, denn es läßt sich nicht läugnen, daß die Ausstellungen im Allgemeinen, namentlich in Hamburg, wie aber auch an anderen Orten, nicht mehr das sind, was sie vor mehreren Jahren gewesen und ist die Ursache wohl hauptsächlich nur der Theilnahmlosigkeit von Seiten der Herren Gärtner selbst, weniger der des Publikums zuzuschreiben. Bedenken wir die große Zahl der Handelsgärten und die vielen Privatgärten, die sich in und um Hamburg und Altona befinden, so muß man wahrlich staunen, daß sich von diesen vielen Handels- und Privatgärten durchschnittlich meist nur 6—8 bei jährlich hier stattfindenden Ausstellungen durch Einsendungen von Pflanzen, Blumen oder Früchten betheiligen Die wenigen Gärten, durch deren Einsendungen die Ausstellungen jetzt noch zu Stande gebracht werden, liefern allerdings jedesmal ganz Ausgezeichnetes und Schönes. Diese Einsendungen kommen indeß meist aus Gärten, die so berühmt und bekannt sind und so vielfältig von fremden wie einheimischen Pflanzenfreunden besucht werden, daß letztere dann keine große Neigung fühlen, die aus diesen Gärten zu einer Ausstellung eingesandten Pflanzen in einem engen Lokale in Augenschein zu nehmen, wenn sie dieselben vielleicht kurz zuvor in den betreffenden Etablissements gesehen haben, wo die Pflanzen sich in ihren Gewächshäusern gewiß um vieles schöner ausnehmen als in einem zu einer Pflanzenausstellung so wenig geeigneten Lokale, wie das in Hamburg ist. Leider besitzt Hamburg kein Lokal, das sich zu Pflanzenausstellungen eignete, und wir gestehen es offen, ehe es dem gewiß unermüdlichen Vorstande des Vereins, der bisher alles versucht hat, die Theilnahme für die Ausstellungen zu erhalten, nicht gelingt, ein anderes passenderes Lokal als das jetzt zur Verfügung stehende zu erhalten und nicht im Stande ist, dem Publikum etwas Neues zu bieten, wird auch die Theilnahme für unsere Ausstellungen nicht wieder zunehmen. Nur an Orten, wo sich erst Vereine gebildet haben und von diesen Ausstellungen veranstaltet werden, finden diese noch meist ungetheilten Beifall, eben weil sie noch etwas Neues sind. Wird jedoch dem Publikum alljährlich meist nur dasselbe Bild und mehr oder weniger dieselben bekannten Pflanzen vorgeführt, so verliert sich natürlich die Theilnahme und das Interesse für solche Ausstellungen und die Sache schläft dann zuletzt von selbst ein. So war es von jeher, so wird es immer sein! Eine neue gute Idee findet indeß viele Freunde, Freunde, die, von der Neuheit gefesselt, eine Zeitlang dann auch selbst thätig wirken und selbst andere

zur Theilnahme animiren. Damit nun aber diese Thätigkeit nicht erkalte, ist es die Aufgabe einer jeden Ausstellungs-Commission, die Gärtner zur Betheiligung an den Ausstellungen anzuregen, was am besten durch einen recht zahlreichen Besuch von Seiten des Publikums geschieht und um diesen zu erzielen, ist es Sache der Ausstellungs-Commission, auch für Abwechselung im Arrangement der Ausstellungen zu sorgen, damit nicht nur der Kenner und Pflanzenfreund, sondern auch der Laie von einer Ausstellung befriedigt heimkehre. Ein jeder Gärtner wird gewiß kein Opfer scheuen und mit Freuden seine Pflanzenschätze zu den Ausstellungen liefern, sobald er sieht, daß seine Bemühungen und Leistungen beim Publikum Anerkennung finden, die ihm oft mehr werth ist, als manche Prämirung von Seiten des Vereins.

Daß die Ausstellungen an allen Orten und in jedem Lande zur Hebung der Pflanzenkulturen wesentlich beigetragen haben und noch stets beitragen werden, ist hinlänglich erwiesen und somit wollen wir wünschen, daß an Orten, wo die Ausstellungen sich nicht mehr solcher Theilnahme wie früher zu erfreuen haben, dieselben recht bald ihre alte Berühmtheit wieder erlangen mögen und zwar zuerst durch regere Theilnahme der Gärtner, wo dann auch bald das größere Publikum wieder anfangen wird sich für die Ausstellungen mehr zu interessiren.

Reiseskizze.

Als nach einem gelinden Januar und Februar im milden Wetter der Märztage Sträucher und Bäume knospeten, Hyacinthen und Crocus ihre Blumen entfalteten, und die Zugvögel in großen Schwärmen wiederkehrten, da begrüßte wohl freudig Jedermann den zeitigen Frühling, und schaute mit frohen Hoffnungen dem Sommer entgegen. Auf Aprikosen und Pfirsichen schwärmten die emsigen Bienen, mit Erfolg konnten die zarteren Schmuckpflanzen dem freien Lande anvertraut werden, und in den wunderschönen ersten Tagen des April saß man des Abends um 8 Uhr bei 12° R. Wärme behaglich vor seiner Thür, wie an warmen Sommertagen den melancholischen eintönigen Ruf der Unken und Frösche im nahen Teich vernehmend. Und wurden auch die Tage noch einmal kühler, so überzog sich doch das weite Reich der Natur merklicher mit jenem köstlich hingehauchten duftigen Grün, durch das sich der Frühling, von Tag zu Tag sein Gefieder in gesättigtere Farben tauchend, in den Sommer metamorphosirt. Aber der Sommer hat fast überall schlecht gehalten, was der Frühling versprochen: durstende Fluren, verkümmernde Gewächse, verschmachtende Vegetation statt der gehofften reichen Lebensthätigkeit in der Jahreszeit der vollen Entfaltung; Thermometergrade, wie sie wohl den Tropen angehören, aber nicht der gemäßigten Zone!

Kein Wunder also, wenn der naturbetrachtende Touriſt auch weniger frohen Muthes sein Ränzel schnürt, da er weiß, daß seine Erwar-

tungen nicht zu hoch gespannt sein dürfen. Ermattend, wie auf die Flur, senkt sich der schwüle Druck der Atmosphäre, die versengende Glut der Sonne auch auf ihn hernieder, zumal wenn er die langen öden Chausseen der Mark Brandenburg zu durchreisen hat, um eine Oase zu erreichen, die er in des „heiligen römischen Reichs Streusandbüchse“ belegen weiß.

Eine solche ist Branitz bei Cottbus, der zweite Wohnsitz des weltberühmten Fürsten Pückler-Muskau, der Ort, in dem sich der greise Fürst der Landschaftsgärtner einmal zur Ruhe legen wird.

Man wird es bald inne, wenn man in die größere Nähe von Branitz kommt, daß hier eine verschönernde Hand thätig sein muß. Einzelne Wiesen, auf denen Erlengebüsch emporsteigt, liegen vor den Waldsäumen, und in breiteren Gürteln ziehen sich unter den bläulichen Kieferwaldungen Laubholzgruppen hin. Bald auch erblickt man niedliche Förster- und Portier-Häuschen und endlich Säulen, an denen die Bestimmungen, welche den Besuch des Parks betreffen, angeschlagen sind. Kein Zweifel also, das Ziel ist erreicht!

Der Eingänge giebt es mehrere. Uns führte der Verlauf der Straße zuerst zur Schloßfreiheit, übrigens wohl die geeignetste Stelle zum Eintritt; denn hier gleich kann man beurtheilen, mit welchem Geschick der Anleger durch geeignete Gruppirungen um die wenigen vorhandenen schönen Bäume sein Terrain zu benutzen wußte.

Eigentlich ist es nur eine gewisse Fläche um das Schloß, in deren Umkreis sich zahlreiche Bilder befinden. Sie sind größtentheils hervorgerufen durch geschickte Trennung mehrerer ziemlich nah an einander belegenen Gebäude, die mit ihren oft bunten schachbrettartigen Dächern der Anlage einen eigenen Reiz verleihen, und die malerischen Formen, welche der vortreffliche Bildner von Wasserparthieen, auch hier einem zum Teich erweiterten Flußarm gab; im Ganzen aber ist auch im übrigen Park wieder jenes Streben nach characteristischen Scenen ausgeprägt, das den Fürsten Pückler auszeichnet.

Das Fesselndste liegt indeß im Reiz der nächsten Umgebung des Schlosses, welches, einfach, aber geschmackvoll erbaut, den Mittelpunkt eines reichen Blumengartens bildet. Ein schwer zu bestimmender Eindruck bemächtigt sich hier des Gemüths, wenn man diese separirten Räume betritt; wie Märchenzauber umschwebt es uns alsbald! Ist es die eigenthümliche Schattenvertheilung, in die, wie zündende Blitze, die vielen Blumenbeete hineinleuchten, sind es die Sonnenstrahlen, die durch das bewegliche dunkle Laubdach der Bäume unruhig um die Bronzestatuen spielen, welche uns erregen, oder erweckt das orangengeschmückte Schloß, in dem man den vielgereisten phantastischen Fürsten wohnen weiß, diese Gefühle? Jedenfalls vereinigen sich die Blumenmassen, welche in stufenweiser Abschwächung oder Steigerung der Farben meist in Gürteln um einzelne erhabene Gegenstände, wie Statuen, angebracht sind, oder in oft grell gewählten Schattirungen einzelne Beete bilden, mit den tiefgrünen Rasenstücken, durch und um welche sich die rothbraun bekiesten Wege und der Fluß ziehen, und über welchen ausgebreitete Baumkronen schweben, zu einem den Geist eigenthümlich anregenden Farbenbilde. Uebrigens sind die Blumenbeete in den Formen von wohlthuender Einfachheit, theils Rondele, theils Ovale; der Rasen prangt

durch mühevolle tägliche Bewässerung im schönsten Grün, und eine große Sauberkeit herrscht in diesem ganzen „Pleasuregrounds“, den man beim Eintritt von der Schloßfreiheit aus kaum ahnt, da ihn ein im Innern verandenartiger Vorbau am Schlosse den Blicken verbirgt.

Leider hat der glühende Sommer den weiteren Parthieen des Parks seinen Stempel nur zu sehr aufgedrückt; denn nicht allein die Rasenflächen sind total verbrannt, auch viele Gehölzgruppen haben bedeutend gelitten, ein Schicksal, was freilich andere Parks, wie Sagan und Muskau, in gleichem Grade betroffen hat.

Neben manchen kleineren Baulichkeiten, an Aussichtsplätzen angelegt, sei als Merkwürdigkeit besonderer Art hier noch der Tumulus erwähnt, eine Erdpyramide, die sich an 40 Fuß hoch erhebt und mit Wasser umgeben werden soll; sie ist der Sage nach bestimmt, die irdischen Ueberreste des geistreichen Fürsten dereinst aufzunehmen. Und in der That, als er am Tage unserer Anwesenheit gerade an diesem Mausoleum hinschritt, sein Leib umgeben von bequemen orientalischen Gewändern, sein weißer Bart auf die Brust herabwallend, der Körper gebeugt von Krankheit, wer wollte zweifeln, daß sein Geist, der sich in die Formen jener Länder so eingelebt hat, auch in der großartigen Monotonie einer solchen Begräbnißstätte einen Reiz gefunden hätte? —

Branitz, als Ergänzung zu Muskau zu sehen, ist ein angenehmer Genuß; den großartigen Schwung aber, den in dieses sowohl Lage als Bepflanzung hineingebracht haben, hoffe man nicht in jenem anzutreffen. Beschränkter in der Räumlichkeit, fast ganz eben gelegen, haben schon die größten Anstrengungen dazu gehört, einige Bewegung durch Bodenerhöhungen und Wasseranlagen in das undankbare Terrain zu bringen. Des Fürsten Pflanzungen in Muskau sind Musik: wie der Accord, der erst leise erklingend, stärker und stärker anschwillt, um in einem stürmisch wogenden Meer harmonischer Töne zu gipfeln, und dann in schwächeren und schwächeren Schwingungen von diesen Höhen herniedersteigend, endlich im leisesten Adagio hinstirbt, so wogen seine Pflanzungen harmonisch in- und auseinander. Aber wie nicht jeder Raum den Tönen der Musik volle Entwickelung gestattet, so hindert Beschränktheit der Localität auch die großartigere Formenentfaltung der Pflanzungen, und deshalb eben darf man in Branitz in dieser Beziehung nicht suchen, was Muskau so reichlich bietet. Muskau selbst erweitert sich, beiläufig gesagt, unausgesetzt, und wenn das neue Arboretum, zu dem gegenwärtig eine Fläche von 300 Morgen Landes und Forstes urbar gemacht wird, einmal erst als Park voll eigenthümlicher Reize dasteht, so ist Deutschland um eine große Zierde sowohl der Kunst als der Wissenschaft reicher.

Die Zeit aber für Branitz ist abgelaufen, lenken wir unsere Schritte nach dem nahen Cottbus, um die Abendpost nach Guben zu benutzen. Im Fluge führt uns von da der Dampfwagen nach Preußens Metropole, und wir versäumen nichts, wenn wir die frühen Reisestunden einem wohlthätigen Schlummer widmen; denn monoton breitet auch hier die weite Ebene sich rings um uns aus. Endlich ertönt des Schaffners Ruf: Berlin! — und wir rollen ein in die ewig bewegliche, lebendurchfluthete, prächtige Residenzstadt, so reich an Denkmälern der bildenden Künste wie jeglicher Wissenschaft.

Im Innern Berlins findet man natürlich, abgesehen von Verschönerungsplätzen wie der Lustgarten am Schloß, keine Gartenanlagen. Die Handelsgärtner haben sich meist in den Vorstädten ansässig gemacht, und die Sommerwohnungen der reichen Privatleute liegen selbstverständlich ebendaselbst, oder sie haben sich dem Gewühl der Stadt auf größere Entfernungen entzogen; aber gerade diese Privatgärten sind es, die ihrer luxuriösen Ausstattung und Pflanzenschätze wegen für den Gärtner ein besonderes Interesse darbieten.

Obenan steht unter ihnen das berühmte Borsig'sche Garten-Etablissement zu Moabit, eben so erwähnenswerth des kleinen allerliebsten Parks als seiner Gewächshäuser wegen. Die Anlage, so beschränkt sie auch ist, hat ihre stattlichen Bäume, ihre sammetnen Rasenteppiche, ihren Wasserspiegel, ihre Anhöhe und Fernsicht, ganz wie ein größerer Park, was sie jedoch besonders auszeichnet, ist die außerordentliche Sauberkeit, die jedes noch so geringe Zeichen von Ungehörigkeit daraus verbannt, und der gut geordnete Blumenflor, dessen Wirkung die geschickt durch den Garten vertheilten ausländischen Gewächse erhöhen. Darunter sind besonders die Coniferen mit ihren großen Exemplaren von Araucarien, Pinus Deodara und Dacrydium cupressinum bemerkenswerth. Auch Thuja gigantea ihres schönen Laubwerks wegen, Pinus pygmaea mit dichtgedrängter Bezweigung, und die schnell in Ruf gekommene Wellingtonia gigantea fallen auf. Unter den Blattpflanzen macht Senecio Farfugium mit seinen lebhaft gefärbten bunten Blättern einen guten Eindruck und wird gewiß zu einem bleibenden Schmuck unserer Rasenflächen erhoben werden.

Eine Ueberraschung eigener Art für unser nordisches Klima gewährt fast am Schlusse des Gartens ein Teich, auf dem sich die stolzen Blätter und Blumen der Nymphäen und Nelumbien so freudig wiegen, als umspielten sie die lauen Fluthen ihrer heimathlichen Gewässer. Es ist ein bezaubernder Anblick, dieses Arrangement in der Frühe des Morgens zu betrachten: die Blumen der Nelumbien sind dann in aller Grazie entfaltet, unter ihnen erschließen die bald rothen, bald weißen Nymphäen ihre Blüthensterne, bald zwischen den eigenen dunkeln Blättern, bald zwischen den helleren ihrer Genossen emporsteigend, und dazwischen glitzert der blinkende Schein von Hunderten hurtiger Goldfischchen, welche die lichten Wasserperlen auf den Blättern in rollende Bewegung setzen, wenn sie zufällig daran stoßen. Auf einem Hügel am Teich erhebt sich auch das Victoriahaus, in dem die Königin der Gewässer, umgeben von einem ganzen Hofstaat anderer Wasserpflanzen, thront, um das Bild vollständig zu machen. — Und wie es möglich war, ein solch tropisches Gemälde hervorzurufen? Von den nahen Betriebsgebäuden der Fabrikanlagen wird durch einfache Vorrichtungen der Teich stets in den erforderlichen Wärmegraden gehalten, und so ist hier das Nützliche dem Angenehmen auf eine leichte Art dienstbar geworden.

Unendlich größer noch hinsichtlich des Werthes sind die Pflanzensammlungen der Gewächshäuser, namentlich der Palmen, Pandaneen und Cycadeen, der Orchideen und Farrn.

Die Palmen, diese schönste und nützlichste Pflanzenfamilie der Tropen, und die ihnen nahe verwandten Gattungen besitzen hier Vertreter von solcher Stärke, daß unter ihrem Blätterdache sich oft eine ganze

Gesellschaft lagern könnte, und die anmuthigen Wedel der Baumfarrn prangen in solcher Frische daneben, daß man der Cultur nur das größte Lob spenden muß.

Gleich beim Eintritt, der durch eine statuengeschmückte Halle erfolgt, ist es ein isolirt stehendes Exemplar der zierlichen Seaforthia elegans, welches hohe Aufmerksamkeit erregt, im Weitergehen erheben sich vortheilhaft zwischen Farrn Dammara alba und Rhopala corcovadensis, und im daranstoßenden Palmenhaus reißen die mächtigen Stämme von Corypha australis, Encephalartus Altensteinii, Sabal umbraculifera, Latania borbonica, Phoenix farinifera u. a. und neben ihnen hohe Baumfarrn, wie Cyatheen und Hemitelien, Cibotium Schiedei u. a., mancher selteneren kleineren Art nicht zu gedenken, zur Bewunderung hin. — Von Orchideen blühten u. a. Cypripedium superbum, Odontoglossum grande, Epidendrum radiatum, Cattleya Leopoldii mit fast braunen Blüthen, und Calanthe Masuca durch das zarte Lilla der Färbung und die hier sehr reiche Blumenanzahl ausgezeichnet. Auch Nepenthes und Selaginellen standen in üppiger Cultur, und manche schöne Blattpflanzen, wie Maranten ꝛc., zogen die Blicke auf sich. Freilich ist dies nur eine geringe Aufzählung aus dem Pflanzenreichthum des Gartens, da er aber in den Gartenzeitungen schon öfter zur Sprache gekommen und Herr Gaerdt einen wohlbefestigten Ruf als Cultivateur besitzt, so mögen diese Andeutungen genügen.

Eine andere reich dotirte Privatgärtnerei ist die des Herrn Reichenheim, Thiergartenstraße Nr. 19, in welcher neben Palmen, Blattpflanzen ꝛc. vorzugsweise Orchideen cultivirt werden. Ein schönes Exemplar von Vanda tricolor flavescens stand gerade in voller Entfaltung seiner köstlich duftenden Blumen, und eine große Anzahl Anoecochilus, die auch bei Borsig vorzüglich waren, bildete mit Dionaea muscipula eine interessante Zusammenstellung; auch das seltsam geformte Platycerium grande tauchte hier und da unter den Orchideen auf. Durch sein schönes großes Blatt empfahl sich ferner Cyanophyllum magnificum, bis jetzt noch selten und in den Catalogen mit 5—6 ℳ verzeichnet. Auch in diesem Etablissement herrscht durchweg strenge Ordnung und Sauberkeit, und man versäume seinen Besuch ja nicht.

Durch Culturen ragt ferner hervor die Nauen'sche Gärtnerei, Köpnickerstraße Nr. 3, unter Leitung des Herrn Gireoud. Neben mancherlei selteneren Warmhauspflanzen, unter denen wir nur Ouvirandra fenestralis nennen wollen, ist eine Latania in einem siebzehnjährigen Zeitraum zu einer erstaunlichen Größe gediehen; gleiche Freude erweckt der Anblick einiger hochstämmigen Heliotropien und der im üppigsten Wachsthum stehenden Sikkim-Rhododendron, von denen Edgeworthii, Falkoneri ꝛc. besonders auffallen. Auch im freien Lande befanden sich manche Seltenheiten. Leider wird die Räumlichkeit der Gewächshäuser, die sich übrigens in einem recht nett angelegten Garten befinden, bereits knapp zur Aufstellung aller Pflanzen. Sonst hat hier, wie in den vorher genannten Gärten, allein die Erhaltung eines schönen Rasens während des ganzen Sommers große Opfer verlangt; denn es hat eine fast ununterbrochene Bewässerung durch Schläuche erfolgen müssen.

Eine andere Gärtnerei, die Daneel'sche, beschäftigt sich viel mit der Anzucht von Begonien, die man in großen Massen daselbst vereinigt

findet, und unter denen Knerekii, argentea und Humboldtii vielen Effect machen. Schöne buschige Azaleen bemerkt man daselbst ebenfalls, und in Kästen vertheilt manche andere Werthpflanze. Der Garten liegt auf der Langen Gasse Nr. 13 und 14. —

Allerdings könnte diese Aufzählung noch durch manchen sehenswerthen Garten, wie den Decker'schen, das Mathieu'sche Etablissement ꝛc., vermehrt werden, wer aber in der Zeit genirt ist, dem kann der Besuch der geschilderten genügen; denn in ihnen findet er fast Alles vereinigt, was Berlin von Pflanzenschätzen und Luxusgärtnerei aufzuweisen hat. Die Schilderung der Privatgärten möge also hiermit geschlossen sein, um den Königl. Garten-Anlagen um Berlin den Blick zuwenden zu können.

Berlin, eine der schönsten und belebtesten Städte Europas, hat gleichwohl enorme Kosten verursacht, bevor man seiner unwirthlichen Umgegend einen landwirthschaftlichen Schmuck zu geben vermochte, in dem der vielgeplagte Stadtbewohner eine angenehme Stärkung für den Körper und eine anregende Unterhaltung für's Gemüth fand. Indessen haben sich's die preußischen Regenten frühzeitig angelegen sein lassen, durch Promenaden und Gärten, wie die Erschaffung der Linden ꝛc., auch nach dieser Seite hin für das Wohl ihrer Unterthanen zu sorgen, und wer heut dem Geräusch der Stadt entflieht, um in den schattigen Gängen des Thiergartens freier Luft zu schöpfen, ahnt wohl kaum die Mühe, welche seine Erschaffung gekostet.

Der Thiergarten und der Friedrichshain sind die zwei Punkte, in denen sich das Erholungsleben der Gesammtmasse des Publikums concentrirt, während der entferntere botanische und zoologische Garten vorzugsweise von Fremden und den gebildeten Ständen besucht werden. Durchschnitten von geraden, breiten Straßen, von anmuthigen Wegen, die oft zu überraschenden abgeschlossenen Anlagen führen, welche Teiche, Statuen und Blumenstücke in ihre Mitte fassen, dehnt er sich weithin aus, und durch das undurchdringliche Laubdach seiner Bäume schimmert die Sonne in gemildertem Glanze. Der Friedrichshain, neueren Ursprungs, umfaßt gleichfalls eine bedeutende Fläche und ist mehr parkartig auf hügeligem Terrain angelegt. Auch er wird fleißig besucht und erhielt außer dem Denkmal Friedrich's des Großen eine Berühmtheit trauriger Art durch die dichtbepflanzte Grabstätte der in den Märztagen 1848 Gefallenen. Beide Anlagen, von denen die letztere durch den heißen Sommer sehr gelitten hat, wirken im höchsten Grade wohlthätig auf das öffentliche Leben und sind als Beförderer der Gesundheitspflege von großer Wichtigkeit.

Der zoologische und botanische Garten nun haben außer dem allgemeinen noch ein besonderes Interesse, und zwar der letztere speciell für den Gärtner; vom ersteren sei also nur erwähnt, daß er einen nach den Bedürfnissen eingerichteten Park bildet, in dem man sich über das Thierreich durch Anschauung belehren und nebenbei recht angenehm promeniren kann. Der botanische Garten, hinsichtlich der Pflanzenschätze einer der reichsten, und berühmt durch die vorzügliche Palmensammlung, welche in dem großen elegant eingerichteten Palmenhause cultivirt wird, bietet eine solche Masse beachtenswerther Erscheinungen dar, daß ein kurzer Umblick nicht genügt, aus den zahlreichen Pflanzengeschlechtern gleich das wich-

tigste herauszufinden. Neben der Reichhaltigkeit der Sammlungen ist es auch vielfach die Größe der Exemplare, welche den Blick fesselt, außer den Palmen namentlich der Coniferen und einzelner Neuholländer Pflanzen. Als Merkwürdigkeit sei noch erwähnt, daß im Victoriahause gerade Victoria regia zur Blüthe gekommen war. Der Garten selbst besitzt viele angenehme schattige Plätze, die neuen Anpflanzungen aber haben hier wie überall durch den ungünstigen Sommer, der auch namentlich den Baumschulbesitzern empfindliche Verluste beigebracht hat, viel gelitten. Bei Berlin bestätigt es das ausgedehnte Lorberg'sche Etablissement nur zu sehr.

Eine angenehme Pflicht ist es für den Berichterstatter noch, der sorgfältig gehegten und gepflegten Hausgärten Erwähnung thun zu können, auf die sich das Auge aus dem wirbelnden Straßenstaube mit Entzücken richtet. Man muß in der That diese lange Reihe allerliebster Gärtchen längs der Thiergarten- und den angränzenden Straßen sehen, um den Besitzern das Lob zu ertheilen, daß sie gar wohl erkannt haben, wie es den Comfort des Lebens wesentlich erhöht, in einer schönen Umgebung zu leben. Was in großen Gärten eine Unmöglichkeit ist, kann bei einiger Liebe zur Sache und entsprechendem Kostenaufwande in kleineren meist gar wohl erzielt werden: die Erhaltung eines schönen Rasens nämlich, und wenn darin eben die Nachbarn gleich gesinnt sind, giebt die Gesammtwirkung auch das Bild einer größeren Anlage. Und gerade dieser Umstand ist es, durch den die meisten dieser Gärtchen so gefallen; meist mit Geschmack angelegt, sind sie namentlich vor Ueberladung, die sich leider nur zu oft in dergleichen Anlagen fühlbar macht, bewahrt, und einzelne schöne (oft ziemlich seltene) Bäume und Sträucher, kleine Bosquets, ungezwungene Schlußpflanzungen und Wege, sorgfältig gepflegter Rasen sind Vorzüge, die fast jeder einzelne besitzt. —

Eine Meile von Berlin liegt Charlottenburg, der Lieblingsaufenthalt Friedrich Wilhelms III., entfernt. Die kräftigen, schönen, wenngleich nicht gar starken Orangenbäume, die uns schon von der Straße aus entgegenlachen, gewinnen bald unsern Sinn, und in größerer Anzahl noch begegnen uns ihre runden, lebhaft grünen Kronen an der Gartenfront des Schlosses wieder, wo sie vielen erinnerungsreichen Büsten zum Rahmen dienen. Der Park enthält manchen stillen sinnigen Platz, verschiedene größere Aussichten, unter denen die nach dem Schlosse den bestimmtesten Eindruck macht, und am Ende einer düstern Allee das Mausoleum, in dem der vielgeprüfte König an der Seite seiner früh entschlummerten Gattin im schweigenden Tannendunkel ruht. Das Mausoleum ist dem Publikum zugänglich, Charlottenburg selbst bequem mit dem Omnibus zu erreichen, wenn man billig reisen will. Ein Abstecher vorher nach Schloß Bellevue ist auch lohnend.

Günstiger als Berlin lag für landschaftliche Verschönerungen Potsdam, der zweite und liebste Aufenthaltsort der preußischen Könige, der Boden, dem reiche historische Erinnerungen eine so heilige Weihe gegeben haben. Wenn man als Gärtner von Potsdam spricht, ist es natürlich vorzugsweise Sanssouci, welches man damit meint; denn dieses ist der eigentliche Mittelpunkt der Anlagen. Alle Königl. Gärten in und um Sanssouci nun tragen wesentlich dasselbe Gepräge. Prächtige Schlösser, reich an bildnerischem Schmuck, gerade Alleen, schattige Plätze,

unzählige Statuen, überall Fontainen, ganze Strecken Anlagen im englischen Styl, Alles das macht viel mehr den Eindruck einer einzigen weitausgedehnten Landesverschönerung, als eines eigentlichen Parks, wie es z. B. Muskau ist. Weltbekannt sind die verschiedenen Schlösser durch historische Erinnerungen, weltbekannt sind die verschiedenen Gärten durch zahlreiche Schilderungen, in denen auch einzelne neuerdings hervorragende Stücke, wie das neue Orangerie-Gebäude und der sicilianische Garten Erledigung gefunden haben, dürfte eine genauere Beschreibung doch wohl nur Wiederholungen enthalten, und unterbleibt deshalb.

Weniger oft sind die Prinzlichen Schlösser zu Glienicke und Babelsberg genannt worden, ausgezeichnet durch eine Situation, wie sie sich nicht herrlicher denken läßt Erbaut auf Anhöhen, beherrschen sie weithin die prächtigen Seen der Havel, und dienen diesen ebenso zum Schmuck, als sie von ihnen mit unnachahmlicher Grazie zurückgespiegelt werden. Beide Gärten, namentlich die nächsten Umgebungen der Schlösser, sind reich an Schönheiten, und von musterhafter Ordnung. Einfache Blumengruppen, unter denen einige von niedrigen buntblättrigen Pflanzen in Glienicke angenehm auffielen, schöne, zum Theil seltene Bäume, mit großem Kostenaufwande gehegte Rasenflächen und gut gehaltene Wege, erhöhen den Eindruck sehr. Die Parks sodann sind weitläufig, und weniger innerer Schönheiten halber, als der vorzüglichen Panorama's wegen, die sich von ihnen eröffnen, zu nennen: bald fassen sie ganze Theile der Stadt Potsdam, bald einzelne der gegenüber liegenden Schlösser oder Kirchen, in ihre Rahmen, bald sind es unabsehbare oder begränztere Wasserspiegel, die unter uns die dunklen Wogen an ihre unnachahmlich malerisch geformten Büsten rollen, und — um mit Pückler zu reden — „wen entzückte nicht in einsamen Stunden die stille Ruhe des schlummernden See's, in welchem rund umher die Riesen des Waldes sich wie träumend spiegeln, oder der Anblick der schäumenden, vom Sturme gejagten Wellen, auf denen sich lustig die Seemöve schaukelt?“ — Umfluthet von denselben Wassern, erheben sich auch in größerer Entfernung die Gestade der Pfaueninsel, bekannt in der gärtnerischen Welt durch das darauf befindliche Palmenhaus, welches sehr große Exemplare von Corypha australis, Caryota urens und Pandanus utilis zieren.

Um noch einmal von Glienicke und Babelsberg zu sprechen, so haben an den dasigen Anlagen zwei der feinsten Gartenkenner gearbeitet, an ersterem der hohe Besitzer, Prinz Carl von Preußen, selbst, dem letzteren ist der Rath des Fürsten Pückler zu Theil geworden, Umstände, die diesen Gegenden auch eigene Reize in anderer Hinsicht verleihen.

Ein Etablissement von europäischem Rufe gehört bei Potsdam noch der Bewunderung des Reisenden an; es ist das Augustin'sche auf der Wildparkstation. Die Tausende von Palmen und Warmhauspflanzen, deren seltene Gattungen hier immer in Massen anzutreffen sind, die vielen Farrn und Orchideen, das reiche Aquarium, die mancherlei anderen Pflanzen, welche in den zahlreichen Häusern untergebracht, sich unter Leitung des Herrn Fricke in vortrefflichem Culturzustande befinden, fordern den Kenner zu Stunden langem Verweilen auf, und doch stoßen ihm immer und immer wieder neue merkwürdige Gebilde der heißen

Zone auf. Vielleicht daß uns später einmal noch Gelegenheit wird, dieser Anstalt ganz speciell zu gedenken.

Die Augustin'sche Gärtnerei war es, an welcher wir für dieses Mal Abschied nahmen von den reichen Genüssen, welche in Berlin und Potsdam für den Gärtner aufgespeichert sind. Wohlthätig erfrischt, wenn gleich am ganzen Körper durchnäßt, von dem starken Regenguße, der des Nachmittags unablässig dem Himmel entströmte, und die Staubwolken, welche wie ein Feuermeer namentlich über Berlin lagerten, einigermaaßen zerstreuten, rollen wir der preußischen Hauptstadt wieder zu, um nach den sachlichen Sehenswürdigkeiten auch dem allgemein Interessanten einige Tage zu widmen.

In den öffentlichen Gärten erregten dabei in den Springbrunnen die verschiedenen Blechblumen unsere Aufmerksamkeit, welche sehr in Mode zu kommen scheinen; sie würden sich freilich ziemlich steif ausnehmen, wenn nicht die darüber hinfließenden Wasserstrahlen ihnen einige Leichtigkeit gäben. Als eigener Industriezweig machen sich auch die Blumenverloosungen in diesen Oertern bemerkbar, bei denen man für 1 Silbergroschen irgend eine Topfpflanze, freilich meist Exemplare von gar trauriger Gestalt, gewinnen kann; indessen schien der Umsatz lebhaft zu sein. Im Allgemeinen sind der Topfpflanzen, welche durch den Markthandel vertrieben werden, Legion, und fast jede Straße hat ihren Blumenkeller, von dem man zu gar nicht hohen Preisen Ficus, Dracänen und ähnliche Pflanzen, aufgestellt findet; auffallend waren uns auch die Masse Melonen, welche sich gewöhnlich dabei befanden. Welche Massen aber solcher Erzeugnisse muß nicht der tägliche Consum in Berlin bedingen!

Die gar so mannichfaltigen Eindrücke jedoch wecken endlich auch wieder den Sinn für die gewohnten Lebenskreise, und erst in der stilleren Heimath klärt sich das aufgehäufte Material zum heiteren Bilde. Noch einen langen Blick drum aus dem enteilenden Dampfwagen auf das Häuserchaos der Stadt, und — wieder hinein durch den märkischen Sand in Schlesiens Fluren!

Oskar Teichert.

Die vorzüglichsten Gärtnereien Oberschlesiens.

Die Gartenkunst, die gleich der Schauspielkunst die lebende Natur zu ihren Producten nimmt, ist wohl zu allen Zeiten, gemäß dem tief im Menschen liegenden Drange nach Verkehr mit der Natur, gehegt und gepflegt worden, doch hat man sie erst in neuerer Zeit, wie so viele andere bisher bescheiden zurückgetretene Kunstgattungen, wissenschaftlich behandelt, und demgemäß auch in der Praxis ausgeübt.

Auch in dem Regierungsbezirk Oppeln hat sich in den letzten Decennien die Gartencultur außerordentlich gehoben, was in gedrängter Uebersicht hier nach Möglichkeit und in so weit sich die wahrheitsgetreuen Quellen erschöpfen ließen, dargethan werden soll.

Werfen wir unſern Blick zuerſt auf

1) die ſchöne Gärtnerei in Carlsruhe.

Garten und Park-Anlagen umſchließen einen Flächenraum von nahe an 400 Morgen, wovon 45 Morgen zunächſt dem herzoglichen Schloßgarten mit Gemüſe- und Obſtbaumzucht und Frühbeettreibereien bebaut werden. Der Weinbau iſt ſeit 40 Jahren nur auf Spalier-Anpflanzungen beſchränkt geweſen, deren Ausdehnung ſich auf 180 laufende Ruthen berechnet. Eine kleine Schilderung der ſchönſten Punkte dieſer großartigen Anlagen könnte wohl hier richtig angebracht ſein.

Das herzogliche Schloß befindet ſich innerhalb dieſer ſchönen Anlagen. Einige bedeutende und auf's beſte gepflegte Orangerie und Ananastreibereien finden wir hier, ſowie ein Pflanzen-Conſervatorium. Die Ruine, welche der Stifter von Carlsruhe, Chriſtian Erdmann, Herzog von Würtemberg-Oels, als Waſſerkunſt anlegte, iſt durch den Zahn der Zeit zur wirklichen Ruine übergegangen. Der dazu gehörige Theil des Schloßgartens enthält 123 Morgen. In dieſem noch und links hinter der Ruine befindet ſich der ſogenannte Freundſchaftstempel, von welchem ſich eine ſchöne Ausſicht auf eine große Wieſenfläche mit exotiſchen Baumgruppen beſetzt, dem Auge darbietet. Verſchönert ſoll dieſer ohne dem ſchon ſo ſchöne Platz nun noch durch ein Denkmal, einen ſchlafenden Löwen darſtellend, werden, welches dem Schöpfer dieſer Anlagen, dem hochſeligen Herzog Eugen von Würtemberg geſetzt werden ſoll. In der Mitte dieſer Fläche ſelbſt iſt ſeit dem Jahre 1825 der Waldtempel erbaut, mit ſchönen vaterländiſchen Coniferen umgeben, und außerdem ſind die Fernſichten durch einzelne Statuen von Sandſtein, Apollo, Venus, Minerva, und am Eingange in den Schloßgarten zu beiden Seiten Mercur und Flora darſtellend, decorirt. Ebenſo zieren die Büſten der letzten drei Könige von Preußen dieſe Anlagen.

Der engliſche Garten enthält circa 226 Morgen Fläche. In dieſem befinden ſich mehrere Hügel, der ſogenannte Weinberg, welcher eine reizende Ausſicht über eine 200 Morgen große Teichfläche eröffnet. Der öſtliche Theil des Hügelrückens iſt ſeit dem Jahre 1830 mit Ruinenmauern verſehen, an deren Ende ein Pflanzen-Conſervatorium erbaut iſt. Die Südſeite der Mauer iſt mit Wein, Pfirſich und edlen Obſtbäumen bepflanzt, am andern Ende des weſtlichen Theiles liegt die Gärtnerwohnung.

In der Mitte der Hügel liegt das Weinbergsſchlößchen, von wo aus ebenfalls Fernſichten durch Waldgruppen geſchaffen ſind.

Am Fuße des Weinberghügels iſt ſeit dem Jahre 1840 auf einer kleinen Furt das Schießhaus erbaut, verbunden mit einem Salon und einer Reſtauration zur Aufnahme von Reiſenden. Hier hält in den Sommermonaten allwöchentlich die Schützengeſellſchaft von Carlsruhe Scheibenſchießen ab.

Eine Waſſerfläche von 28 Morgen durchzieht dieſe Anlagen; ſie umſchließt die Königs-, Mathilden- und Roſeninſel.

Auf der Mathildeninſel wurde im Jahre 1826 zur Erinnerung der verewigten Herzogin Mathilde von Würtemberg der Mathilden-Tempel erbaut.

Auch von hier aus genießt das Auge die ſchönſten Fernſichten nach allen Richtungen, welche durch die angrenzenden Waldgruppen angelegt wurden.

Stets bereit stehende Gondeln gewähren dem Reisenden auf das zuvorkommendste den Genuß, keinen aller dieser schönen Punkte unbesucht lassen zu dürfen.

Das Schießhaus ist von zwei Seiten mit exotischen Pflanzen geschmückt und dessen Umgebungen, sowie der unterirdische Gang gewähren dem Besuchenden auch die angenehmsten Abwechselungen und Ueberraschungen.

Von der Inselgruppe führt durch luftiges Laubgewölk der Weg nach der Meierei, die seit dem Jahre 1849 in einen Pavillon verwandelt wurde.

Den Schluß des Ganzen bildet das Schwedenschlößchen, an einem bedeutenden Teiche gelegen, welches hier ganz gewiß auch der Erwähnung verdient.

Nimmt man nun an, daß alle diese Schöpfungen einem theils sterilen, theils nassen, kalten, eisenhaltigen Boden durch unermüdlichen Fleiß und Ausdauer, durch die größten Geldopfer gewissermaßen abgezwungen wurden und werden, so kann jeder Kenner und Verehrer solcher Anlagen nur recht aufrichtig wünschen, daß die schaffende und erhaltende Hand nie erlahmen möge.

Wenden wir uns nun zur

2) Gärtnerei in Dambrau.

Auch sie nimmt mit Recht einen Platz im Range der größeren und schöneren Anlagen Oberschlesiens ein.

Eine Schöpfung des Königl. Kammerherrn Baron von Ziegler, zerfallen die Anlagen in zwei Abtheilungen.

Die Ersten sind Parkanlagen, in neuestem englischen Style geschmackvoll ausgeführt. Große, schön angelegte und noch schöner gehaltene Rasenplätze, durchschnitten von Fahr- und Fußwegen, begrenzt von Waldgruppen, bilden das Ganze. Die Rasenplätze selbst sind durchflochten von einzeln und in Gruppen stehenden Laub- und Nadelhölzern feinster Sorten, was dem Ganzen einen imposanten Anblick gewährt.

Die zweite Abtheilung befindet sich in der Nähe des Schlosses. Hier finden wir ein großes Gewächshaus, welches durch ein Blumenhaus mit dem herrschaftlichen Schlosse verbunden ist. Ersteres besteht aus zwei Abtheilungen, die mit Neuholländer-Pflanzen, sowie mit verschiedenen anderen krautartigen Kalthaus-Pflanzen reichlich versehen sind.

Zwei Gemüsegärten schließen sich diesen an. Umfriedigt mit hohen Mauern gewähren letztere der Zucht von Spalierobst bedeutenden Vorschub. In einem dieser Gärten ist eine bedeutende Ananastreiberei, verbunden mit einem Warmhause, in welchem letzteren einige schöne Exemplare von Palmen und verschiedene andere Warmhauspflanzen das Auge erfreuen; 100 Frühbeetfenster bergen die verschiedenartigsten Gemüsearten.

Ein großer Obst- und sogenannter Naschgarten sowie eine bedeutende Baumschule machen hier den Beschluß. Die feinsten Obstsorten, die schönsten jungen Fruchthölzer sind hier zu finden. — Auch

3) Dobrau

bietet eine sehr liebliche Erscheinung im Bereiche der Gärtnereien.

Der Kunst- und Schönheitssinn des Grafen Scherr entfaltet sich auch in seinen Gärtnereien, die in 200 Morgen Garten-Anlagen, in

einem 12 Morgen großen Gemüsegarten und Baumschule, sowie in einem bedeutenden Park und endlich auch in nicht unbedeutenden Treibereien genügenden Raum zu Vervollkommnungen und Verschönerungen finden.

Eine sehr wohlgeordnete und auch umfangreiche Gärtnerei finden wir in

4) Franzdorff.

Sehr schöne geschmackvoll angelegte und reichlich ausgestattete Treibereien, Gemüsegärten, Parkanlagen und Baumschulen findet man hier alle in bedeutenden Dimensionen, geziert mit den beliebtesten und schönsten Gehölzen und Pflanzen in- und ausländischer Gattungen.

Besonders hervorzuheben dürften hier sein:

Die bedeutende Anlage von Riesenspargel, wobei man den Versuch gemacht hat, einen Theil davon auf einer starken Lage von Torfabfall zu cultiviren. Das Resultat hat alle Erwartungen übertroffen; der Spargel liefert die allergünstigsten Erträge, man hat einzelne Stengel bis zur Schwere von 11 Loth gestochen. Stachel- und Johannisbeeren werden hier baumartig gezogen.

Freunden von Rosen, Hortensien, Fuchsien, Cinerarien, Calceolarien, Camellien, Azaleen, Rhododendron, Ericen und anderen Topfgewächsen wird hier in der größten Auswahl die vollkommenste Befriedigung werden.

Eine wenn auch nicht in großen Dimensionen, jedoch sehr nette Gärtnerei finden wir in

5) Jacobsdorff, Kreis Falkenberg, dem Landrath von Koppy gehörig.

Die Treibhäuser stehen in einer Reihenfolge von 92 Fuß Länge und 24 Fuß Breite, welche in ihren inneren Räumen die angemessene Zahl Ananasfruchtpflanzen und ebenso die erforderlichen Folgepflanzen enthält. Auch werden Bohnen, Erdbeeren, Himbeeren, Gurken und Wein darinnen getrieben. Das Ananashaus schmücken verschiedene tropische Pflanzen, wo besonders Musa Cavendishi, Rhapis flabelliformis, Curculigo recurvata, Cordyline arborea und Calodracon heliconiaefol. in Prachtexemplaren hervorragen. Das kalte Haus, anschließend an das Ananashaus, mit gebrochenen Fenstern, 32 Fuß lang und 24 Fuß breit, enthält in seinen inneren Räumen Orangenbäume und circa 2000 Stück neuholländische, capische und andere Topfpflanzen, unter denen sich eine Fuchsie von 8 Fuß Höhe und bedeutendem Umfange als Prachtexemplar vor allen übrigen auszeichnet.

Vor den eben genannten Treibhäusern befindet sich auch die Frühbeettreiberei.

Der Park enthält einen Flächenraum von 97 Morgen, 49 Morgen Wiesen und Rasenplätze und 48 Morgen Baum- und Strauchgruppen. Der Gesammtpark zerfällt in drei Haupttheile. Die eine Abtheilung in der unmittelbaren Nähe des Schlosses, welche sich durch geschmackvoll und gut gehaltene Baum- und Strauchgruppen auszeichnet und in malerischer Zusammenstellung von Tulpen-, Trompeten- und Eichbäumen, Fichten, Weihmuthskiefern, Akazien, Birken ꝛc. mit Blumenpflanzungen den ganzen Sommer hindurch Abwechselung gewährt. Dazwischen die sehr großwüchsigen von englischem Reigras angelegten, sauber gepflegten

Rasenplätze, welche diesem Theile einen besonderen anmuthigen Reiz verleihen.

Die zweite Abtheilung, welche sich vom Schlosse abwärts in einen einige Tausend Morgen großen Forst verläuft, wird durch eine große Wiesenfläche, welche in Folge von Berieselung in einen wahren Blumenteppich verwandelt ist, ist mit dem dem Schlosse zunächst gelegenen Theile in Verbindung gehalten. Zeichnen sich die Baumgruppen des erstgenannten Theiles durch geschmackvolle Zusammenstellung der verschiedenartigsten Blumen- und Straucharten aus, so imponirt die zweite Abtheilung durch Großartigkeit im Umfange und Alter der Baumgruppen; 100jährige geschlossene und abgerundete Fichtengruppen sind gehoben durch das malerische Grün von noch älteren sie umfassenden Eichbäumen. Diese malerische Gruppirung wird durch eine Teichanlage erhöht, welche am Fuße dieses Waldsaumes liegt. Ein Wasserfall an eben genanntem Teiche überrascht einen Jeden durch sein schon in der Ferne vernehmbares Rauschen.

Die Anlage gewinnt dadurch noch an Großartigkeit, daß theils vom herrschaftlichen Schlosse aus, theils bei einer Promenade durch den Park dem Auge eine Menge Fernblicke vorgeführt werden, die, wenn auch unter sich im Zusammenhange stehend, im Ganzen doch, abgesehen von der angenehmen Ueberraschung, einen bei weitem größeren Umfang erscheinen lassen, als es in der Wirklichkeit enthält.

Der Gemüse- und Obstgarten, ein Flächenraum von 9 Morgen, ist mit einer Einzäunung versehen. Ein Theil dient zur Erzeugung des für die Herrschaft gebrauchten Gemüses und der Früchte, der andere Theil wird mit Obstbaumschulen cultivirt, auf welche der Besitzer einen großen Werth legt, da nicht nur in eben genanntem Garten Anlagen von Baumschulen sich vorfinden, sondern auch sämmtliche zum hiesigen Dominium gehörige Straßen und Feldwege mit Obstalleen bepflanzt sind.

Bis jetzt befinden sich über 1200 Stück Obstbäume, größtentheils Kirschen, Aepfel und Pflaumen, auf den Alleen, die in der Pflege des Gärtners sind. Sämmtliche Bäume sind aus den Königlichen Baumschulen zu Potsdam. Die Wände der an den Garten angrenzenden Gebäude sind an der Süd- und Ostseite mit Reben- und Pfirsich-Spalieren besetzt.

6) Die Gärtnerei in Koschentin

gehört jedenfalls auch zu den erwähnenswerthen. Sie besteht aus kalten und warmen Treibereien, Blumen-, Gemüse- und Baumzucht und englischen Anlagen. Eine größere und ausgedehntere Schilderung von dieser Gärtnerei zu geben ist hier nicht thunlich, da genügende Quellen hierzu gänzlich mangeln.

7) Der fürstliche Garten und Park in Krzyzanowitz

verspricht in einigen Jahren auch eine sehr angenehme Erscheinung unter den größeren Gärtnereien Oberschlesiens bilden zu wollen. Auch hier finden wir theils ältere, theils in der Entstehung begriffene, großartige Park-Anlagen, kalte und warme Treibereien, wobei eine bedeutende Ananaszucht nicht zu übersehen ist. Die schönsten Gruppirungen in- und ausländischer Bäume und Sträucher, die in 750 verschiedenartigen Gattungen hier zu finden sind und denen die Natur nicht unbedeutend zu Hülfe kommt, die großartigen Bauten, welche am fürstlichen Schloß und

den Nebengebäuden, die sich im Parke befinden, vorgenommen werden, versprechen die schönsten Resultate.

Auch für die Baumzucht ist ein bedeutendes Feld eingeräumt, welches denn auch schon nach Möglichkeit benutzt wird; — wir wünschen auch hier nur noch, daß der für die Anlagen erwachte rege und thätige Geist in seinen Bestrebungen unermüdlich fortfahren möge.

8) Die Gärtnereien des Herrn von Thiele in Miechowitz zerfallen in drei Abtheilungen, wir finden sie in Miechowitz selbst, in Kattowitz und in Myslowitz.

Die Hauptanlagen sind in Miechowitz selbst allerdings ebenso wie in Krzyzanowitz hauptsächlich im Entstehen begriffen, doch läßt sich auch hier nicht daran zweifeln, daß sowohl bei den bedeutenden Mitteln, die dem Besitzer zu Gebote stehen, als auch hauptsächlich bei der anerkannten Tüchtigkeit seines Garten-Inspektors alle diese Anlagen bald keiner anderen Oberschlesiens nachstehen werden. Die gesammte Garten- und Parkfläche aller drei Abtheilungen besteht aus circa 150 Morgen, wovon 134 Morgen auf Parkanlagen, 5 Morgen auf Baumzucht, der Rest aber auf Gemüsegärten zu rechnen sind, in welcher letzteren sich eine Ananastreiberei, ein Warm- und zwei Kalthäuser, sowie 210 Frühbeetfenster in Thätigkeit befinden. — Von der

9) Gärtnerei zu Pleß

wissen wir nur vom Hörensagen, daß sie eine sehr bedeutende Ananastreiberei und schöne Parkanlagen umfaßt. Eine genauere Beschreibung aller dieser Anlagen, um die wir die dortige Gartenverwaltung zweimal ersucht haben, hat uns dieselbe vorenthalten.

Was Kunstsinn und unermüdliche Ausdauer zu schaffen vermag, sieht man bei den Garten- und Parkanlagen von

10) Rauden.

In den dreißiger Jahren wurde der Grund zu den so großartigen und jetzt im schönsten Flor stehenden Anlagen durch den damaligen Besitzer, den Landgrafen von Hessen-Rothenburg, gelegt.

Sümpfe wurden ausgetrocknet und zu den schönsten Rasenpartieen umgeschaffen, die traurigsten todten Sandflächen in schöne Anlagen und Gruppen umgewandelt und es bietet sich heut dem Gartenfreunde ein Genuß dar, welcher unauslöschlich bleibt und gewiß alle Erwartungen übertrifft.

Allerdings kam wohl auch die Natur dem Kunstsinn hier zu statten, indem die Benutzung des Rudaflusses, sowie ältere Baumgruppen zur Verschönerung des Ganzen sehr viel beitragen, immerhin aber ist doch das Ganze nur der Hand eines großen Gartenkünstlers zu verdanken, welches, sowie die Nichtachtung der unendlichen Geldopfer, gewiß dankend anzuerkennen ist. Die Freundlichkeit des jetzigen Besitzers, Herrn Herzogs von Ratibor, gestattet jedem Besucher den freien Zutritt in die Gärtnereien.

Das Ganze gewährt einen zu imposanten Anblick, als daß wir nicht eine allerdings nur schwach annähernde Schilderung hiermit beifügen sollten.

Vorerst fällt uns ins Auge das in englischem Cottage-Styl erbaute Haus des Parkaufsehers, an dem ein breiter, mit schönen alten Eichen, Weihmuthskiefern besetzter Weg vorüberführt, rechts davon erblickt man,

einen mit Schwänen belebten schönen Teich, in dessen Mitte eine Glockenfontaine sprudelt. Durch das herabfallende Gewässer leuchtet bunter Blumenschmuck und ein darüber angebrachter Blumenkorb vervollständigt das an sich schon schöne Bild. Jenseits des Teiches in dichtem Busch und Baumschatten ergießt sich das abfließende Wasser in einem glatten halbrunden Fall in das Bett eines mit Wasserpflanzen und Farrnkraut decorirten Baches. Wendet man sich nun dem Schlosse zu, so erblickt man zwischen diesem und dem vorher beschriebenen Teiche auf der Ostseite das ehemalige Kloster, jetzt Pfarrkirche, die Perle des Parkes, eine prachtvolle alte, noch ganz gesunde Eiche. Drei Fuß von der Erde hat sie 16 rheinische Fuß Umfang, bis zur Höhe von 25 Fuß einen ganz glatten, runden Stamm und erst von da ab breiten sich die nach allen Seiten hin wohl vertheilten Aeste aus, eine noch 50 Fuß hohe und 100 Fuß im Durchmesser enthaltende Krone.

Von hier aus überblickt man die ansehnlichen Wohngebäude des Stallmeisters und Hofgärtners, letzteres mit seiner von wildem Wein und Caprifolium überwucherten Veranda, sowie unmittelbar vor sich schöne Rasenpartheien, durchbrochen von Blumen und schön gewölbten Fliedergruppen.

Indem man sich nun dem Schlosse nähert, kommt man zur Orangerie, die im Sommer von einer Fülle von Prachtexemplaren der Rhododendron, Azaleen, Camellien, Fuchsien, Pelargonien und anderen Topfgewächsen in einem großen Bogen garnirt ist.

Die Orangerie, noch aus den Klosterzeiten herrührend, hat vor mehreren Jahren durch Krankheit bedeutend gelitten, jedoch wurde durch neue Culturen der Verlust nach Möglichkeit zu ergänzen gesucht.

Einen schönen Ueberblick des Ganzen hat man selbst von der von Marmorplatten hergestellten Freitreppe des herzoglichen Schlosses, welches genauer zu schildern hier nicht der Raum erlaubt und von dem wir nur der schönen Sammlung von Geweihen und Jagd-Emblemen erwähnen wollen. Vom Schlosse bis zur Ruda dehnt sich ein großer, aufs schönste gehaltener Rasenplatz, eingefaßt mit einzelnen Baum- und Fliedergruppen, in dessen Mitte wir einige sehr schöne, alte Linden finden. Jenseits der Ruda setzt sich der Wiesenplan fort bis zu einem Hügel, der mit schönen Eichen besetzt ist, jedoch nicht zu dicht, um den Durchblick in einen breiten Walddurchhau zu gestatten, der perspectivisch angelegt ist und von einem Pavillon in Pilzform abgeschlossen wird.

Die Umgebungen des Schlosses sind sehr mannigfach und überall dem Besucher durch schöne, gut gepflegte Gänge zugänglich, in denen man lange Zeit lustwandeln kann, ehe man alles gesehen hat, da immer wieder etwas Neues und Seltenes auffällt.

Hier finden wir ein großes Bassin, welches ein paar große Fischottern enthält und in dessen Mitte ein Springbrunnen angebracht ist; ferner einen Schießstand, einen Turnplatz und eine Kegelbahn, sowie ein kleines nettes Badehaus, was alles sich dem Auge des Besuchers in lieblicher Gruppirung darbietet. Auch ein paar Gondeln fehlen nicht, die den Spaziergänger zu einer angenehmen Wasserfahrt einladen.

Nicht minder ansprechend sind einige Denkmäler, die man hier erblickt, wie z. B. ein Kreuz mit einer Gedenktafel, auf der die Namen

der Vaterlandsvertheidiger verzeichnet sind, die in den Schlachten 1813/14 mitgefochten und in Folge der empfangenen Wunden in dem dasigen Lazareth starben und auf diesem Platze, der mit Kiefern und Fichten umgeben ist, der Mutter Erde übergeben worden sind.

Die Treibereien sowie der feine Gemüsebau sind hier sehr bedeutend. Pfirsiche und Aprikosen werden in Häusern gezogen, die eine Länge von 398 Fuß einnehmen. Ein 111½ Fuß langes Warmhaus liefert die schönsten Ananas und enthält sehr schöne tropische Gewächse. An dieses reiht sich ein weiteres von 57 Fuß Länge, worin Azaleen, Rhododendron und andere schöne und edle Gewächse gepflegt werden. Ein Camellien- und Feigenhaus von 48½ Fuß Länge, sowie endlich ein Orangeriegebäude von 96 Fuß Länge, 42 Fuß Tiefe und 18 Fuß Höhe im Innern machen den Beschluß. Die Zahl der Fenster, unter denen feinere und zeitige Gemüse gezogen werden, ist nicht unbedeutend, ebenso wird sehr viel für den Obstbau gethan, welcher letzterer des undankbaren Bodens wegen nicht in Rauden selbst, sondern in dem ½ Meile entfernten Vorwerk Weißhoff betrieben werden muß. Sehr sehenswerth ist dieses Vorwerk, da man dort nächst den edelsten und besten Viehracen einen ausnehmend schönen Hühnerhof findet, welchem an Mannigfaltigkeit bis jetzt wohl kein zweiter gleichkommen dürfte. Der Besitzer dieser schönen und großartigen Anlagen beabsichtigt dieselben immer noch mehr und mehr zu heben und will namentlich die Blumenzucht noch mehr erweitern.

Noch müssen wir zum Schluß des im Jahre 1854 angelegten Waldparks gedenken, der auch wegen der Großartigkeit seiner Anlagen, wegen der schönen Stämme von 200jährigen Eichen, Tannen und Fichten seinesgleichen wenigstens in Schlesien kaum finden dürfte.

11) Die Gärtnerei in Rogau bei Krappitz

gehört allerdings nicht zu den größeren Oberschlesiens, verdient jedoch ihrer Freundlichkeit und Lieblichkeit wegen auch ganz gewiß hier der Erwähnung.

Der Park, eine Fläche von circa 30 Morgen, schließt in sich eine Menge alter, schöner Bäume, unter denen sich besonders eine riesenhafte tausendjährige Eiche als Hauptzierde des Ganzen hervorthut. Schön gehaltene Gänge, die mehrere reizende Aussichten namentlich von der Westseite des Schlosses, sowie von der Anhöhe vor dem Orangeriehause ins Oderthal darbieten, machen einen herrlichen Eindruck auf den Besucher.

Das herrschaftliche Schloß, noch aus der Zeit der Tempelherren, ausgeschmückt mit schönen exotischen Pflanzen, bietet, vereint mit dem Parke, eine wahrhaft erhabene, ehrwürdige Gruppe dar, von der man sich schwer zu trennen vermag.

Wir finden hier eine ganz nett gehaltene Baumschule, ebenso einen großen Obstgarten, der die feinsten Obstsorten enthält, sowie Mistbeettreibereien, die sich in dem vortrefflichsten Zustande befinden. Eine Orangerie sowie ein Camellienhaus fehlen nicht, und mit schönen Exemplaren versehen, erfreuen sie sich der besten Pflege.

Durch die Freundlichkeit der Besitzerin, Frau Gräfin von Haugwitz, ist der Zutritt in den Park und die Gärten dem besuchenden Publicum gestattet.

12) Die Gärtnerei in Schillersdorff,
die in früheren Jahren faſt ganz vernachläſſigt war, wird ſeit dem Jahre 1852, da ſie in den Beſitz des Barons A. S. von Rothſchild kam, ungemein gehoben. Der 140 Morgen große Park, ſowie der Gemüſegarten von 10 Morgen ſind die ſprechendſten Beweiſe. Warmhäuſer, Orangerie und Kalthäuſer von ſehr bedeutenden Dimenſionen wurden auch hier geſchaffen, der Park auf alle nur mögliche Weiſe verſchönert, ſelbſt, um ihn mit fließendem Waſſer zu verſehen, ein Hochdruckwerk angelegt, und wir wünſchen daher auch dieſer Gärtnerei das ſegensreichſte Gedeihen, was gewiß nicht ausbleiben wird, wenn die ſchaffende Hand nicht ermattet, denn von den früheren Anlagen ſind noch immer Gegenſtände zurückgeblieben, die, gehörig benutzt, zur Hebung des Ganzen ſehr viel beitragen werden.

13) Die Gärtnerei in Slawentſchütz
verdankt nächſt dem Herrn Beſitzer ihre Entſtehung dem Oberhofgärtner Schwedler.

Um alle Pläne durchzuführen, die jetzt im größten Flor daſtehen, wurden im Jahre 1835 Gebäude weggeriſſen, Sümpfe theils ausgetrocknet, theils zu Waſſerſpiegeln umgeſchaffen, todte Sandflächen tragbar gemacht und jeder nur irgend beachtenswerthe Punkt benutzt, um ein ſchönes Ganzes zu ſchaffen, welches bis heute noch immerwährend erweitert wird. Selbſt Naturhinderniſſen, als Ueberſchwemmungen, wird entgegengearbeitet durch Anlage von Dämmen, und es wird in ſehr kurzer Zeit und da namentlich jährlich Tauſende von Thalern zu dieſem Behuf verwendet werden, die Gärtnerei in Slawentſchütz mit den erſten Rang unter den Gärtnereien in Oberſchleſien einnehmen, beſonders da ſie ſchon jetzt in einzelnen Punkten viele übertrifft.

Gleichzeitig mit den Garten- und Parkanlagen wurden auch großartige Pflanzenhäuſer gebaut, deren beſonders zu erwähnen wohl hier der Mühe werth wäre.

a) Wir finden vorerſt ein 136 Fuß langes Haus in 3 Abtheilungen mit einer Glaskuppel in der Mitte. Die erſte Abtheilung, 60 Fuß lang, enthält 1200 Camellien in 334 Varietäten von 1—14 Fuß Höhe. Die zweite, 54 Fuß lang, enthält 1224 Azaleen in 302 Sorten von 1—8 Fuß Höhe. Die dritte Abtheilung endlich, 22 Fuß Durchmeſſer, enthält die größten Camellien-Exemplare und dient zugleich als Blumenhaus.

b) Ein 72 Fuß langes Haus enthält in verſchiedenen Gruppirungen 800 Stück Rhododendron in 87 Varietäten, als baumartige, pontiſche, gelbe und Sikkim-Himalaja von 1—10 Fuß Höhe, Coniferen, Acacien, Metrosideros und verſchiedene Gattungen Neuholländer aufgeſtellt.

c) Ein 56 Fuß langes Haus mit Doppelfenſterdach enthält Pflanzen wärmerer Klimate, worunter nebſt vielen anderen Seltenheiten 20 verſchiedene Palmen, 16 Dracänen, 62 Begonien, 4 Musa, 5 Araliaceen, 24 Farrn, darunter 4 Baumfarrn, 36 Acanthaceen, Philodendron, Pothos ꝛc., 15 Caladien, 20 Orchideen, darunter 3 Anecochilus, 56 Achimenes, 63 Gloxinien, 6 Heliconien, 5 Phrynium, 4 Pandanus, 16 Ficus zu erwähnen ſind.

d) Ein 107 Fuß langes, 12 Fuß hohes Haus enthält 2500 Stück franzöſiſche und engliſche Pelargonien in 370 Varietäten, 570 Scarlet-

Pelargonien in 22 Sorten, sowie 916 Stück Fuchsien in 182 Species und außerdem noch eine Menge edler Pflanzen zur Decoration der Anlagen.

e) Ein Vermehrungshaus von 18 Fuß Länge und 16 Fuß Breite sorgt für die nöthige Nachzucht und Cultur neuerer Pflanzen und außer diesem sind noch Kasten von bedeutender Größe vorhanden zur Aufbewahrung von Rosen, Verbenen ꝛc. und zum Bau von 400 verschiedenen Gemüsepflanzen.

f) Ein 108 Fuß langes, 14 Fuß breites Feigenhaus.

g) Ein 100 Fuß langes Ananashaus für Fruchtpflanzen.

h) Ein 100 Fuß langes Ananashaus für Folgepflanzen mit einer 30 Fuß langen Abtheilung zur Bohnen-, Gurken- und Champignontreiberei.

i) Einen 210 Fuß langen Bau mit transportablen Fenstern zum Schutz für Wein, Aprikosen und Pfirsich. Endlich

k) Ein Orangeriehaus, in welchem sich 54 Orangen- und Citronenbäume, sowie eine Menge von Myrthen, Rosmarin ꝛc. befinden.

Alle diese Gegenstände sind nun in der schönsten Folge mit den großartigen Parkanlagen und den umfangreichen Obst- und Gemüsegärten verbunden und man kann sich ein nur annäherndes Bild davon denken, wenn man berücksichtigt, daß die jährliche Unterhaltung aller dieser Schönheiten fast die Summe von 5000 Rthlr. erreicht.

13) Die Gärtnerei in Groß Strehlitz,

welche seit ungefähr 30 Jahren mit bedeutender Energie betrieben wird, gehört jedenfalls auch zu den größten Oberschlesiens und wird, da sie wegen der sehr bedeutenden Terrainschwierigkeiten mit vielen Mühen zu kämpfen hat, mit der Zeit ganz gewiß auch eine hervorragende Stellung um so mehr einnehmen, als der Besitzer, Herr Graf von Renarel, keine Opfer scheut, zum vorgesteckten Ziele zu gelangen.

Die jetzt zum Park verwendete Fläche beträgt circa 400 Morgen außer den angrenzenden Ackerflächen, die mit parkähnlichen Anlagen versehen werden.

Besonders erwähnungswerth ist hier die 67 Morgen große Baumschule, in welcher nicht nur die ausgezeichnetsten Obstarten, sondern auch viele andere der edelsten Gehölze gezogen werden.

Ebenso finden wir hier einen Weinberg von 14 Morgen Fläche, der durchschnittlich einen Ertrag von 40 bis 50 Eimer Wein jährlich liefert.

Die Ananastreiberei liefert jährlich circa 300 sehr schöne Früchte.

Indem wir auch diesen Unternehmungen das segensreichste Gedeihen wünschen, kommen wir schließlich zur Betrachtung der Gärtnerei in

14) Proscau.

Hier ist freilich für die ästhetische Gartenkunst wenig gethan, denn Alles, was hier geschaffen, ist den Lehrzwecken angemessen. Dennoch hat man hier das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden gewußt, so daß im Sommer kein Besucher des circa 9 Morgen großen Institutsgartens denselben unbefriedigt verläßt. Finden wir hier auch keine Palmen, Orchideen und andere tropische Pflanzen, so beherbergt doch das schöne, ganz vortrefflich construirte, 40 Fuß lange und 24 Fuß breite Gewächshaus manche schöne Zierpflanze. Ein reichhaltiges Arboretum, welches

alljährlich Zugang erhält, ist eine seltene Zierde dieses Gartens. Das botanische Feld, auf welchem die meisten officinellen und technisch wichtigen Pflanzen, nach den natürlichen Familien geordnet, angebaut sind, worunter sich auch manche schöne perennirende Freilandpflanze vorfindet, gewährt nicht allein einen recht schönen Anblick, sondern es findet auch jeder Freund der Botanik hier vollständige Belehrung. Die Familie der Gramineen ist hier besonders stark vertreten, was für den Botaniker von Fach von außerordentlicher Wichtigkeit ist. — Eine Obstorangerie, bestehend aus 80 Sorten Aepfel, 40 Sorten Birnen und 30 Sorten Kirschen erfreut das Auge des Pomologen. Mit den besten für unser Klima passenden Weinsorten, Pfirsichen und Aprikosen sind die Umfassungsmauern bekleidet. Das Ganze ist höchst geschmackvoll angelegt und die schöne Aussicht nach dem Mährischen Gebirge, welche man von hier aus genießt, verleiht dem Institutsgarten einen ganz besonderen Reiz.

Die Königl. Provincial-Baumschule zu Proscau enthält 12 Morgen Flächeninhalt. Dieselbe ist in 9 Schläge eingetheilt, deren 6 zur Obstbaumzucht und 3 zur Melioration verwandt werden. Jeder Schlag ist 1 Morgen groß und die noch übrigen 3 Morgen sind zur Gehölzzucht bestimmt. Es werden hier nur hochstämmige Apfel-, Birn- und Kirschbäume gezogen und es erfreut sich die Baumschule eines guten Rufes und bedeutenden Absatzes. Für die Demonstrationen im Hopfenbau befindet sich darin eine kleine Hopfenanlage von 400 Stöcken. Es werden hier alljährlich 6 bis 8 Obstbauschüler in der Obstbaumzucht, im Hopfen-, Wein-, Taback- und Gemüsebau systematisch ausgebildet und finden hier unentgeltlich Aufnahme bei freier Beköstigung, Wohnung u. s. w.

Wir schließen diesen Bericht, dessen Ausarbeitung uns großes Vergnügen bereitet hat, mit einem inbrünstigen Gebet zu Gott, der unsere Kunst, die schöne Gartenkunst, die Kinder Flora's so lange beschützt hat, er wolle auch fernerhin uns seine schützende, allwaltende Hand nicht entziehen, uns auch ferner ein guter Vater und dem Fortschritt der edlen, schönen Gartenkunst schirmend förderlich sein.

Hannemann,
Königl. Institutsgärtner und Lehrer des Gartenbaues an der Königl. landwirthschaftl. Academie Proscau.

Frucht- und Gemüsegarten.

Die beiden schönsten Erdbeeren: Carolina superba und Sir Harry.

Wer sich in englischen Gärten aufgehalten, oder wenn auch nur längere Zeit englische Journale über Horticultur gelesen hat, wird die Bemerkung gemacht haben, daß die British Queen-Erdbeere bisher in England obenan stand. Sie ist so zu sagen die National-Erdbeere der Britten, gerade so wie es bei den Franzosen die Poivillain's Princesse

Royale und bei uns Deutſchen die Princesse Alice iſt. Befindet man ſich etwa Anfang Mai in Paris und beſucht die dortigen Gärten von Bedeutung, ſo trifft man vorherrſchend die genannte Sorte, ja man geht ſogar ſo weit, zu behaupten, daß die Fruchthändler nur dieſe mit beſtem Avance veräußern könnten, eben weil die Ueberzeug bei den meiſten Pariſer Erdbeer-Conſumenten Wurzel gefaßt hat, daß genannte die beſte ſei. Erſt in ganz letzter Zeit, höre ich von einem Pariſer Correspondenten, hat ſich auch die ſtolze kaſtanienbraune „Sir Harry“ unter den fruits forcés Bahn gebrochen. Und mit Recht, denn namentlich zum Verkauf in Töpfen lockt ſelbige manchen Erdbeerfreund herbei.

Kommt man nun um genannte Jahreszeit in deutſche Gärten von Rang, ſei es in Hamburg, Berlin, Hannover oder ſonſt wo, ſo trifft man die Alice ganz vorherrſchend an, und man bekommt auf die nämliche Weiſe die Verſicherung, daß letztere ebenfalls die beſte ſei.

Mit dem Blick nach London gekehrt, wird es nun freilich keinem Engländer einfallen zu behaupten, daß die British Queen für die Treiberei die beſte ſei, denn ſo herrlich und pikant auch das Aroma derſelben iſt, ſo liefert ſie an Zahl weit weniger, wenn ſie getrieben wird, iſt alſo aus dem Grunde ſchon nicht die beſte. Nebenher iſt ſie ſehr eigen, will in manchen Bodenarten gar nicht recht fortkommen, trotz aller ſorgfältigen Extra-Pflege und wird bekanntlich leichter als irgend eine unter den bekannten Erdbeerſorten eine Beute der rothen Spinne, was ein ganz fataler Umſtand iſt, denn jeder behutſame Gärtner ſcheut Blume und Frucht mit ängſtlichem Seitenblick, die im Renommé der rothen Spinnenerzeugung ſteht.

Iſt aber die Rede von Früchten, die im Freien gereift und aus dem Garten gepflückt ſind, ſo ſchmunzelte bisher jeder engliſche Gärtner, wenn er »die Königin ſeines Landes« nennen hörte und galt ſie ſo lange als „type de perfection“ bis eine bis dahin ganz unbekannte Sorte dem prüfenden Comité der pomologiſchen Geſellſchaft in London vorgelegt wurde, die nicht allein den unpartheiiſchen Beifall aller Kenner fand, ſondern ſich auch ſeitdem jedes Jahr trotz Dürre, Winterkälte und ſonſtigem Ungemach aufs glänzendſte und zwar als die allerfeinſte aller Erdbeeren bei denen, die ſie cultivirt haben, bewährt hat.

Es iſt dieſe die Carolina superba, von dem Züchter einer ſchon ſehr bekannten Erdbeere, nämlich der Goliath, in dem Städtchen Bath von James Kitley gezogen und nie hat eine Erdbeere ein feineres, ſchöneres Aroma mit einem geſunden, kräftigen Habitus der Staude verbunden. Sie verdient daher die wärmſte Empfehlung und wird ſich Jeder davon überzeugen, wie wahr die Vorzüge ſind, die von derſelben ausgeſprochen werden.

Ich war gerade zugegen, wie ſie Mitte Juli 1858 von James Kitley der Londoner Pomologiſchen Monats-Verſammlung zur Prüfung vorgelegt wurde, und lebhaft iſt mir noch die Erinnerung, mit welch ſichtlichem Wohlbehagen jeder Anweſende die herumgereichten Früchte probirte.

Folgende kurze Beſchreibung entlehne ich den Verhandlungen genannter Geſellſchaft, in welchen der bekannte Pomologe Robert Hogg ſie nebſt anderen Sorten beſchrieb:

»Mr. Kitley aus Bath hatte Früchte ſeiner neuen Erdbeere Ca-

rolina superba ausgestellt, die derselbe im Herbst 1854 in den Handel gebracht hatte. Sie ist ein Blendling der alten bekannten Ananas-Erdbeere mit der British Queen. Die Frucht ist groß, regelmäßig herzförmig, selten oder fast nie hahnenkammförmig und mißt häufig 5 Zoll im Umfang; von Farbe ist sie tief fleischfarben oder mattroth, das sich über die ganze Frucht hinzieht und nicht wie bei der British Queen mit weißlich grüner Spitze; Samenkörner klein und liegen flach im Fruchtfleisch. Das Fleisch inwendig ist klar weiß, von fester Textur, gerade wie bei der Ananas-Erdbeere und voll des schönen Aromas und gewürzhaften Wohlgeschmacks, der beide Eltern characterisirt. Aber die „Alte Ananas" trägt undankbar und die British Queen ist zu zärtlich, Eigenschaften, die der Carolina superba nichts weniger als eigen sind. Eine Pflanze, die Herr Kitley aus dem Lande herausgenommen und in einen Topf gesetzt hatte, war buchstäblich voll von Früchten. — Diese Art wurde von den anwesenden Pomologen für sehr empfehlenswerth erachtet und es ist unzweifelhaft, daß sie eine schätzbare Acquisition von allererstem Range für die Gärten werden wird."

Dieser Ansicht kann ich, so weit es die verflossenen für die Erdbeerzucht nichts weniger als günstigen Sommer auf meinem Boden zuließen, in vollem Maße beitreten. — Trotzdem es in der Zeit, wo die Erdbeere am liebsten warme Regenschauer liebt, in der Schwellungs-Periode nämlich, es im verflossenen Juni fast gar nicht regnete, hatte ich schöne wohlgeformte Früchte von meinem Beet, obwohl nicht so zahlreich, aber der Adel der Frucht verleugnete sich auch unter bedrückten Umständen nicht. Und namentlich ist es der robuste Wuchs, den sie unter ungünstigen Vegetationsverhältnissen beibehält, der ihren Werth so wesentlich erhöht, da sich nur zu häufig Schwächlichkeit des Wuchses den vorzüglichen Eigenschaften hinzugesellen, seltener aber Ausnahmen dieser Beobachtungen vorkommen.

Unser geschätzter Landsmann und Erdbeerfreund in Paris, Herr Ferd. Gloede, sagt in seinem Catalog: Variété tout à fait hors ligne (Eine Sorte, die total außerhalb des Bereichs des gewöhnlichen Werthes zu erachten ist) und ferner: „die in keinem Garten fehlen sollte."

Nach meiner Ansicht lassen sich unter dem ganzen Schwarm von Erdbeersorten die Carolina superba als die feinschmeckendste, die müskirte Bierländer Erdbeere ausgeschlossen, und die stolze Sir Harry als die prahlendste und schönfarbigste hervorheben, ohne daß man der Keen's Seedling, Princesse Alice und der alabasterweißen zuckersüßen Barnes' Bicton Pine in ihren respectiven Rechten zu nahe zu treten braucht.

So mögen wir denn der Sir Harry auch ein Wort gönnen, die es nicht weniger als obige, in reichem Maaße verdient.

Aus derselben Verhandlung entlehne ich folgende Beschreibung:

„Mr. Underhill aus Birmingham hatte sehr schöne Früchte von seiner Sir Harry eingeschickt. Sie ist in der That eine noble Erdbeere und neigt sich mehr einer gefurchten Hahnenkamm- als Herzform hin: Die Farbe ist dunkel braunroth, und wenn voll reif, von tief blutrother Farbe, fast ins Schwärzliche übergehend. Sie ist groß, und hat eine glänzende wie mit Firniß überzogene Haut. Saamenkörner tief einliegend im Fruchtfleisch. Sir Harry ist das Produkt einer Kreuzung zwischen British Queen und Trollopés Victoria."

Diese Abstammung kann man deutlich wahrnehmen und wer es liebt, seine Erdbeeren, Birnen, Aepfel ꝛc. am Blatt und Holzwuchs leicht erkennen zu können, dem wird die Aehnlichkeit in der robusten Belaubung der beiden Erdbeersorten aufgefallen sein. — Als Tafelfrucht steht die Sir Harry bei mir in höchstem Ansehn; denn sie verdunkelt selbst Keen's Seedling, Princesse Alice und die andern Lieblingssorten durch die Größe ihrer Form und den Glanz ihres Ansehns. — In diesem Gesichtspunkt übertrifft sie auch die Carolina superba, jedoch in dem Gewürz des Aromas bleibt die Sir Harry zurück; und wenn auch keineswegs sauer zu nennen, so ist doch von Natur ihrer schönen Farbe ein säuerlicher Beigeschmack hinzugemengt, den weder hohe Reife noch parteiisches Urtheil hinwegzuräumen im Stande ist.

Beide Sorten halten sich gut durch den Winter, weil sie robusten Wuchses sind. — Wem es darum zu thun ist, die Sorten echt in stark bewurzelten Pflanzen zu erhalten, erlaube ich mir zu bemerken, daß ich das Dutzend von der Carolina superba und das Dutzend Sir Harry zu 1 ℳ 4 ß hamb. Crt. = 15 Sgr. pr. Crt. überlassen kann. Für die Treiberei habe ich zum Absatz für die hiesigen Fruchtläden ein starkes Quantum der Sir Harry getopft, die schon im verwichenen Frühling gern genommen wurden, hingegen habe ich von der winzigen Black Prince alles abgeschafft, da nur große Früchte, selbst im Winter, begehrt und genommen werden. Theod. von Spreckelsen.

Die Erdbeere Oscar.

Diese neue Erdbeere wird auf das lebhafteste in England anempfohlen und soll sie eine der vorzüglichsten zum Frühtreiben sein. Im Juli 1858 wurde diese Erdbeere dem Comité zur Prüfung der Früchte und Gemüse der Horticultural Society in London vorgelegt, welches folgendes Urtheil über diese Frucht gefällt hat: „Frucht groß, oval, meist etwas zusammengedrückt oder hahnenkammförmig, scheinend dunkelroth; das Fleisch ist fest und von ausgezeichnetem Geschmacke, ungemein süß und aromatisch.“

Die Oscar-Erdbeere ist von kräftigem Wuchse und trägt besser als die british Queen in einem schweren Boden. Die Herkunft (Herr Bradley hat sie erzogen) dieser Erdbeere ist leider nicht bekannt.

Die Königl. botanische Gesellschaft (Ausstellung in Regent's Park am 15. Juni 1859) ertheilte der Erdbeere Oscar die silberne Medaille.

Am 6. Juli d. J. war diese Erdbeere abermals ausgestellt und schreibt Gard. Chron., daß unter den neuen Erdbeer-Sämlingen die „Oscar“ die beste war und ihr guter Ruf nun wohl gegründet ist. Sie ist unstreitig unter den großfrüchtigen Sorten die schmackhafteste und zugleich reich tragend.

Die Pomologische Gesellschaft zu London ertheilte dieser Erdbeere ebenfalls den Preis und heißt es in dem Berichte dieser ausgezeichneten Gesellschaft über diese Frucht: „Die Frucht ist ungemein groß, oval, eckig und häufig kammförmig, selten flach; die Samen sind groß und liegen tief im Fleische; die Farbe ist schön dunkel, wenn völlig reif noch dunkler werdend; das Fleisch durch und durch roth, fest und saft-

reich; der Geschmack ist sehr reich und wenn die Frucht völlig reif ist, so gleicht sie dem der Sir Harry-Erdbeere, von der die Oscar eine Verbesserung ist. Die Reifezeit fällt gleich nach der von Cuthill's Black Prince und einige Tage früher als Keen's Seedling.

Herr Charles Turner, Besitzer der K. Handelsgärtnerei zu Slough, hat die ganze Vermehrung dieser Erdbeere an sich gebracht und offerirt junge Pflanzen zu 42 Shill. St. das Hundert (ca. 14 ₰).

Alles, was wir über diese Erdbeere haben in Erfahrung bringen können, spricht nur zu Gunsten dieser Frucht, so daß sie sich bald in jedem Garten befinden dürfte.

Herr E. Benary in Erfurt offerirt die Erdbeere „Oscar" in seinem, dem vorigen Hefte beigegebenen Preisverzeichnisse zu 12 Sgr. die Pflanze, worauf wir die Gartenfreunde aufmerksam machen, um so mehr noch, da auch uns diese Erdbeere von mehreren unserer Correspondenten, welche sich von der Vortrefflichkeit dieser Sorte überzeugt haben, empfohlen worden ist. E. O—o.

Große Champignon.

Herr John Hill theilt im Gard. Chron. mit, daß er auf einem Felde bei Loughton, Essex, am 27. September einen Champignon erntete, der 11 Zoll (engl.) im Durchmesser hielt, derselbe war vollkommen rund, die untere Seite ganz glatt und wog 1 Pfd. 20 Lth. Ein ähnliches Exemplar wurde einige Tage früher geerntet, dieses wog 1 Pfd. 10 Lth. Gekocht, waren beide Champignon von ausgezeichnetem Geschmack.

Große Melone.

Die größte oder vielmehr schwerste Melone, von der man bis jetzt gehört hat, wurde in einer der letzten Versammlungen der Gartenbau-Gesellschaft zu Paris vorgezeigt. Die Frucht war ein Cantaloup und wog nicht weniger als 24¼ Pfund und war von Herrn Pageot, Gemüsegärtner zu Vannes, erzogen worden. Eine aber noch schwerere Frucht wurde früher von dem ehrwürdigen J. Phillpotts zu Porthgwidden bei Truro, wo sie erzogen worden ist, erwähnt.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Odontoglossum laeve *Lindl.*

(Odontoglossum Reichenheimii Hort. non Lind. & Planch.)

Orchideae.

Herr Ambr. Verschaffelt erhielt diese herrliche Orchidee direct aus ihrem Vaterlande Guatemala im Jahre 1856. Die Pflanze ge-

langte bald in seinem Etablissement zu einer sehr vollkommenen Blüthenentwickelung und da das ächte O. laeve häufig mit anderen Arten verwechselt wird, so giebt Herr Prof. Lemaire in der Illustrat. hortic. tab. 213 eine sehr naturgetreue Abbildung, wie eine ganz genaue Beschreibung desselben. Das bei dem Herausgeber der vortrefflichen Illustrat. hortic. zur Blüthe gekommene Exemplar dieses Odontoglossum hatte 5—6 Blüthenrispen von mehr als einem Mètre Länge, diese sind hängend, veräſtelt, jeder Nebenzweig mit 4—5 Blumen zum wenigſten. Die Blumen 1—2 Zoll im Durchmeſſer, ſind angenehm duftend, die Petalen und Sepalen gut ausgebreitet, brillant rothbraun gefärbt und gelbgrün quer geſtreift, während die Lippe halb rein weiß und halb hellilla gefärbt iſt.

Nach Lindley (Bot. Reg. 1844, tab. 39) wurde das Odontogl. laeve von den Herren Hartweg und Skinner gleichfalls von Guatemala in England lebend eingeführt, woſelbſt es zum erſten Male im Garten der Gartenbau-Geſellſchaft (Mai 1842) blühte. Das O. laeve ſteht dem O. Reichenheimii Lind. et Planch. (Pescat. fasc. V, Octbr. 1854) ſehr nahe, daher beide Arten auch häufig mit einander verwechſelt werden. Der Hauptunterſchied liegt nur in der Form der Lippe und in der des Gynoſtenium.

---

*Chamaebates foliolosa *Benth.*

Ein ſehr hübſcher immergrüner Strauch, eingeführt von Herren Veitch durch deren Reiſenden Herrn W. Lobb. Er iſt von compactem Habitus mit ſehr zarten, getheilten, farrnähnlichen Blättern, ähnlich denen des Cheilanthes elegans. Die weißen Blumen erſcheinen in großer Menge. Auf der Ausſtellung im Cryſtall-Palaſt ſowohl, wie auf der in Regents Park, erhielt dieſe Pflanze einen Preis als ſchöne Neuheit und darf als eine gute Acquiſition angeſehen werden. Die Herren Veitch offeriren Exemplare von 15—21 Sh. St.

(Gard. Chron.)

*Pothos argyraea *Lindl.*

Dieſe auffallende buntblättrige Art ſtammt von Borneo, von wo ſie von Herrn Thomas Lobb eingeführt worden iſt. Es iſt eine allerliebſte Art von äußerſt niedlichem und compactem Habitus, rivaliſirend in Schönheit mit einigen Anectochilus-Arten. Die Blätter von ovalſtumpfer Form, ſind ſaftig grün, ſilberweiß gefleckt und mit einem unregelmäßigen weißen Streifen längs der Mittelrippe. Die Pflanze fand auf ſämmtlichen diesjährigen Ausſtellungen die größte Bewunderung und erhielt auf allen einen Preis. Starke Pflanzen zu 10, 15 und 21 s, je nach der Stärke, ſind zu haben bei den Herren Veitch zu Exeter und Cheelſea. (Gard. Chron.)

Pteris argyraea *Moore.*

Es iſt dieſe Art unſtreitig eine der ſchönſten Acquiſitionen zu den jetzt ſo beliebten Farrn-Arten. Die Pflanze iſt von noblem Habitus

und leicht wachsend, bestimmt und neu in ihren Characteren. Die Fieder an jedem Wedel, so wie diese selbst haben in der Mitte einen glänzenden silbernen Streifen, der mit der lichtgrünen Grundfarbe einen schönen Contrast bildet. Man kann diese Art mit Recht zu den „buntblättrigen“ Pflanzen rechnen und erregte sie als solche auf den letzten Ausstellungen das größte Aufsehen. Preis einer Pflanze 31 s.

(Gard. Chron.)

Lygodium polystachyum *Wall.*

Gleichfalls ein ausgezeichnet schönes Farrn von Herrn Thomas Lobb aus Mittel-Indien eingesandt. Im Ansehen und Habitus gleicht es einigen hübschen Gleichinien. Die Wedel sind verästelt, von mattgrüner Färbung auf der Oberfläche. In guter Kultur bildet diese Art eine herrliche Pflanze. Junge Pflanzen kosten bei Herren Veitch noch 31 s, stärkere 42 s. (Gard. Chron.)

* Selaginella atroviridis *Spring.*

Eine schöne Art von niedrigem Habitus, von Borneo durch Herrn Thomas Lobb eingeführt. Die Stengel theilen sich wiederholt gabelförmig und ist diese Art unstreitig eine der vorzüglichsten zu dieser Abtheilung gehörenden. Preis 10½ s. (Gard. Chron.)

* Selaginella Lobbi. *)

Eine schöne und bestimmte Art, ebenfalls von Herrn Lobb von Borneo eingesandt. Sie hat den Habitus der Sel. inaequalifolia und dabei den metallartigen Glanz der S. uncinata (caesia). Diese Art sollte in keiner Sammlung fehlen. Preis 15 s bei Herren Veitch.

(Gard. Chron.)

Spragnea umbellata Torrey.

Eine eigenthümliche kleine Pflanze. Sie gehört ohne Zweifel zu den Portulaceae und ist nahe verwandt mit der Gattung Monocosmia Fzl. Torrey hat diese Gattung dem Herrn Isaak Spragne zu Cambridge, Massachusetts, dedicirt, ein daselbst sehr bekannter Botaniker und Droguist. — Die Sp. umbellata ist heimisch an der Mündung des Nezah-Flusses, am Fuße der Sierra Nevada von Nord-Californien.

Herr Veitch sagt im Gard. Chron.: „Diese niedliche harte einjährige Pflanze erhielt ich von Herrn Th. Lobb aus Californien. Mitte Juli stand sie in schönster Blüthe in meinem Garten zu Exeter. Ich erzog sie aus Samen, den ich im vorigen Herbste im freien Lande ausgesäet hatte und wo die jungen Pflanzen ohne alle Bedeckung überwintert haben. Die Pflanze eignet sich aber auch zur Topfcultur, indem der Habitus derselben sehr zwergig, ähnlich dem der Calendrinia grandi-

*) Pothos argyraea, Selaginella Lobbi, atroviridis und Lyalli, sehr schöne Arten, sind bereits bei mir in Vermehrung.

E. Otto.

flora ist. Die Blumen, die man mit denen eines Amaranthus vergleichen möchte, sind schattirt rosa mit purpurfarbenen Staubfäden. (G. Chr.)

Rhododendron Kendrickii *Nutt. var.* latifolium.

Unter den vielen neuen und schönen Rhododendron-Arten von den Bhotan-Gebirgen zeichnet sich diese durch ihre mächtig großen rothen Blumen besonders aus. Herr Booth entdeckte diese Art in Gesellschaft von R. Edgeworthii in der Region der Fichten und sonstigen Nadelhölzer, wo sie ähnlich dem Rh. ponticum dichte Massen bildet, durch die es sehr schwer ist durchzudringen. Früher entdeckte aber auch schon Griffith diesen Strauch, ohne ihn jedoch lebend eingeführt zu haben.

In der Grafschaft Cheshire, England, soll sich dieser Strauch als ganz hart erwiesen haben, was auch möglich ist, da er 7000 Fuß hoch über der Meeresfläche vorkommt. (Bot. Mag. tab. 5129.)

Dendrobium albo-sanguineum *Lindl.*

Paxton's Abbildung dieser seltenen Art in „Paxt. Flow. Gard. II, tab. 5 ist eine mangelhafte und vermuthlich nach einem unvollständigen, getrockneten Exemplare angefertigt. Nach jener Abbildung sind die Blumen zu groß und die Blüthenstengel mit nur 1 oder 2 Blumen tragend angegeben, die aus den alten Pseudobulben hervorkommen. Eine getreue Abbildung bringt nun das Bot. Mag. tab. 5130 und heißt es daselbst: die Pseudobulben, oder hier richtiger Stämme, sind aufrecht, verlängert, fast 1 Fuß lang, an den Endspitzen beblättert. Die Blätter sind 5—7 Zoll lang, fast zweizeilig stehend, linien-lanzettförmig, an der Basis scheidenartig. Blüthenstengel nicht so lang als die Blätter, aufrecht, schlank, bedeckt mit kurzen, scheidigen Schuppen und 5—7 ziemlich große (2 Zoll breite) gelblich weiße Blumen tragend. Die große Lippe ist mit Purpur gestrichelt und gefleckt.

Das Dendrob. albo-sanguineum ist ein Bewohner des Attran-Flusses in Moulmain, von wo es durch die Herren Veitch eingeführt worden ist.

Aeschynanthus cordifolius *Hook.*

Abermals eine der vielen schönen Pflanzen, welche die Herren Veitch & Sohn zu Exeter und Chelsea durch ihren Sammler Herrn Thom. Lobb von Borneo erhalten haben. Diese Art steht dem vor einiger Zeit empfohlenen schönen A. tricolor am nächsten, der aus demselben Lande stammt.

Nach der Abbildung im Bot. Mag. tab. 5131 gehört diese Art mit zu den schönsten und am dankbarsten blühenden, weshalb wir die Pflanzenfreunde darauf aufmerksam machen.

Monochaetum ensiferum *Naud.*

Melastomaceae.

Diese auf Taf. 5132 des B. Mag. abgebildete sehr hübsche und zierliche Pflanze wurde bekanntlich durch Herrn Linden eingeführt und von ihm zuerst in den Handel gegeben. Sie ist bereits vielfältig in den Gärten zu finden.

Brachychiton Bidwilli *Hook.*

Sterculiaceae.

Der K. Garten zu Kew erhielt im Jahre 1851 den Samen dieser merkwürdigen Pflanze von Herrn Bidwill aus dem Widebay-Distrikt im nordöstlichen Australien. Hooker bringt diese Pflanzenart zu der Section Brachychiton der Gattung Sterculia von Schott und Endlicher, aus der Brown mit den Sectionen Poecilodermis und Trichosiphon (sämmtlich aus dem tropischen Neuholland stammend) die Gattung Brachychiton gebildet hat. — Die Pflanze wird im Kew-Garten als eine Warmhauspflanze behandelt und blühte sie zuerst im Herbste 1858.

Diese Art besitzt eine starke knollenartige Wurzel, von der sich der Stamm strauchartig erhebt. Die Blätter, alternirend und an langen an der Basis aufgeschwollenen Blattstielen stehend, sind herzförmig, meist tief dreilappig, oft auch ungetheilt oder fünflappig, weich, dick, rauh auf der Oberseite und noch mehr so auf der Unterseite. Blumen polygamisch-monöcisch, fast sitzend in den Achseln der Blätter. Kelch roth, über einen Zoll lang, glockenförmig in fünf Segmente getheilt; diese sind ausgebreitet, eiförmig, zugespitzt. Jeder derselben hat drei Nerven und innerhalb, nahe der Basis, befindet sich ein Kreis kleiner concaver Schuppen. Männliche Blume: die Säule fast so lang als die Röhre des Kelches, spindelförmig, wollig in der Mitte, bedeckt mit einem dichten kugeligen Blüthenkopf von 15 sitzenden, gelben, zweizelligen Antheren. In den hermaphroditischen Blumen trägt eine viel kürzere Säule einen Kranz oder Ring von Antheren und dieser ist gekrönt mit den fünf dicht gestellten, sehr wolligen, ovalen Ovarien, in Griffel auslaufend, die eben unter den freien, zurückgebogenen, strahlenförmig stehenden Narben angewachsen sind. (Bot. Mag. tab. 5133.)

Dendromecon rigidum *Benth.*

Papaveraceae.

Seit einer Reihe von Jahren in den Herbarien zwar schon bekannt, ist es doch jetzt erst gelungen, und zwar Herrn W. Lobb, diese interessante Pflanze uns durch Samen aus Californien zugeführt zu haben. Bentham beschrieb dieselbe zuerst in den Transactions of the Hort. Soc. Lond. 2. Ser. v. I, p. 407 und gab ihr den äußerst passenden Namen Dendromecon oder Baummohn. Die Pflanze bildet einen kleinen aufrechten Busch mit gelblichen, alternirenden Zweigen. Die Blätter sind 2—4 Zoll lang, kurz gestielt, lanzettförmig, glatt, zugespitzt, bläulich-grün, vielnervig. Die Blumen stehen einzeln an den Spitzen der Zweige und sind 2 Zoll groß, hellgelb.

(Bot. Mag. tab. 5134.)

* Cheirostemon platanoides *Humb. & Bonpl.*

Nur Besitzer von großen hohen Gewächshäusern dürften im Stande sein diesen herrlichen Baum zur Blüthe zu bringen, indem derselbe erst ein ziemliches Alter und eine beträchtliche Höhe erreichen muß, ehe er

zum Blühen gelangt. Das September-Heft des Botanical Magazine bringt auf Taf. 5135 eine Abbildung dieſes Prachtbaumes und wird dabei bemerkt, daß das im Garten zu Kew befindliche Exemplar am 27. Mai d. J. ſeine erſte Blume entfaltete.

Ob dieſer Baum ſchon früher in England geblüht hat, iſt nicht bemerkt. In Deutſchland blühte derſelbe bereits im Jahre 1838 im botaniſchen Garten zu München, das Exemplar war damals 20 Fuß hoch und hatte der Stamm eine Dicke von 6 Zoll (Allgem. Gartenztg. von Otto und Dietrich VI, pag. 294). — Im botaniſchen Garten zu Berlin befanden ſich früher zwei Prachtexemplare dieſes Baumes, von denen das eine im Jahre 1843 zum erſten Mal blühte, es hatte eine Höhe von 22 Fuß und war im genannten Garten im Jahre 1827 aus Samen erzogen worden (Allgem. Gartenztg. von Otto und Dietrich XI, pag. 256.)

Aus dem Texte zu der Abbildung im Bot. Mag. entnehmen wir noch folgende Notizen:

Zu Ende des letzten Jahrhunderts (etwa 1787) wurde eine wiſſenſchaftliche Expedition von der ſpaniſchen Regierung nach Mexico ausgerüſtet. Die dabei betheiligten Botaniker hörten von einem höchſt ſonderbaren Baume, deſſen ſehr große Blüthen fünf Staubfäden haben ſollten, die ähnlich einer Hand arrangirt wären. Man glaubte damals, es exiſtire nur ein Exemplar dieſes Baumes in der Welt, bis es im Jahre 1801 einem Schüler von Profeſſor Cervantes gelang, einen Wald dieſes Baumes in Guatemala, in der Nähe der Stadt gleichen Namens zu entdecken. Von hier wurde der Baum vermuthlich nach Mexico verpflanzt, lange vor Ankunft der genannten Expedition. Der Baum wird von den Indianern unter dem Namen Macpalxochiquauhitl (Handblumenbaum) hoch in Ehren gehalten, ſie pflücken die Blumen ab, noch ehe dieſe ſich völlig entfaltet haben, damit kein Same reifen kann. Humboldt und Bonpland brachten zwar Samen mit nach Paris bei ihrer Rückkehr von Mexico, jedoch kein Korn keimte und erſt einer ſpäteren Zeit war es vorbehalten, dieſen Baum in Europa einzuführen.

Bei uns gedeiht der Cheirostemon ſehr gut im Kalthauſe während des Winters, im Sommer dagegen im Freien und läßt er ſich leicht durch Stecklinge vermehren.

Rhipsalis sarmentacea *Otto & Dietr.*

(Cereus lumbricoides Lem.)

Cacteae.

Eine nur für die Freunde von Succulenten-Pflanzen intereſſante Pflanze. Dieſelbe ſtammt aus Buenos Ayres und Süd-Braſilien, von wo[4] ſie kürzlich wieder in Kew eingeführt worden iſt. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 5136.

Myosotidium nobile *J. D. Hook.*

Boragineae.

Ein hübſches Staudengewächs aus der Familie der Borragineen von den Chatham-Inſeln. Der Stengel iſt krautig, 1—2 Fuß hoch, fleiſchig,

belaubt, glatt nach unten, weichhaarig nach oben. Wurzelblätter zahlreich, sehr groß, herzförmig, stumpf, glatt, fleischig, glänzend, an langen dicken Blattstengeln. Die Stengelblätter nach oben hinauf immer kleiner und kleiner werdend. Blüthendolde endständig, groß, 4—6 Zoll im Durchmesser. Die Blume besteht aus einer kurzen Röhre mit einem breiten, flach liegenden Saum, über ½ Zoll im Durchmesser und ist von hübscher hellblauer Farbe, blasser nach dem Rande zu werdend. Die Pflanze verdient wohl als Zierpflanze empfohlen zu werden. Abgebildet Bot. Mag. tab. 5137.

Aerides Wightianum *Lindl.*

(Aerides testaceum Lindl.; Vanda parviflora Lindl.)

Orchideae.

Die Hauptschönheit dieser Art besteht bei näherer Betrachtung in der verschiedenartig gefärbten Lippe. Das Vaterland dieser Orchidee ist Ceylon, Madras, Concan und Bombay. Bot. Mag. tab. 5138.

*Areca Sapida *Sol.*

(Areca Banksii Mart.)

Bekanntlich eine sehr schöne Palme, die, wie jetzt so manche andere Art, im großen Palmenhause zu Kew zur Blüthenentwicklung gelangt ist und von der das Bot. Mag. auf Taf. 5139 eine Abbildung bringt.

Abgebildete Camellien

in Amb. Verschaffelt's Nouvelle Iconographie des Camellias.

IV. Liv. April 1859.

Taf. 1. Cam. Sophie Chiarugi. Der Herausgeber der vortrefflichen Iconographie, Herr Verschaffelt, erhielt diese Camellie im Jahre 1857 aus Florenz, die ihrer schönen Blumen, ihres schönen Habitus und ihrer kleinen Blätter wegen sehr empfohlen zu werden verdient. — Die Blumen sind fast erster Größe und erscheinen in zahlreicher Menge. Dieselben bestehen aus großen abgerundeten, am oberen Ende leicht gekerbten, lebhaft rosa gefärbten Blumenblättern, die äußerst regelmäßig gestellt sind. Die im Centrum der Blume befindlichen bilden für sich eine Art kleiner Rose.

Taf. 2. Cam. Martha (Bulst). Es ist dies eine Camellie, die in den Vereinigten Staaten aus Samen erzogen wurde, von woher sie Herr Verschaffelt vor mehreren Jahren erhalten hat. Die weißen Blumen bestehen aus sehr regelmäßig dachziegelförmig gestellten Blumenblättern, letztere sind zahlreich, oval und leicht gekerbt. — Eine sehr hübsche weiße Varietät.

Taf. 3. Cam. Dupont de l'Eure. Dem Züchter dieſer Varietät, Herrn Dupont de l'Eure, zu Ehren benannt. Die Blumen ſind nur klein, aber äußerſt niedlich, ſehr regelmäßig dachziegelförmig gebaut und von hübſcher zweifarbiger Zeichnung, nämlich ſchön roſa im Centrum und kirſchroth nach dem Rande zu gefärbt.

Taf. 4. Cam. Amelia Benucci. Eine allerliebſte, kleinblumige Camellie von hübſcher roſa Farbe und jedes Blumenblatt mit einer weißen Binde geziert. Sie iſt italieniſchen Urſprungs und wurde bereits 1857 eingeführt.

V. Liv. Mai 1859.

Taf. 1. Cam. Paolina Maggi. Im vorigen Frühjahre entfaltete dieſe Camellie zum erſten Male ihre herrlichen Blumen und muß man ſie ohne Uebertreibung für eine der ſchönſten unter den einfarbig dunkelrothen Varietäten halten. Herr Verſchaffelt erhielt ſie von Herrn Ceſar Franchetti in Florenz.

Die Blumen ſind faſt erſter Größe, lebhaft dunkel carmoiſinroth. Die Blumenblätter ſind groß, abgerundet, etwas gekerbt, convex, ausgebreitet und äußerſt regelmäßig dachziegelförmig geſtellt. Die im Centrum der Blume befindlichen bilden eine Art Roſe.

Taf. 2. Cam. Storeyii. Dieſe ſchöne Varietät haben die Herren Veitch zu Exeter aus Samen erzogen und verdient ſie mit vollem Recht zu den ſchönſten gezählt zu werden. Sie hat ſeit mehreren Jahren in großer Fülle bei Herrn Verſchaffelt geblüht. Die Blumen ſind groß, 5 Zoll, und beſtehen aus ſehr großen gleichen Blumenblättern, die oval-abgerundet und vollkommen dachziegelförmig geſtellt ſind. Jedes Blumenblatt iſt roſa und mit einem helleren Rande verſehen.

Taf. 3. Cam. Ernesta Visconti. Unter den weißen Camellien iſt dieſe eine der vorzüglichſten. Die Blumen ſind ſehr groß und beſtehen im Verhältniß zur Größe der Blume aus nur wenigen Blumenblättern, dieſe ſind ſehr ausgebreitet, rein weiß, mit einem gelblichen Anflug im Centrum. — Herr Verſchaffelt erhielt dieſe Camellie vor etwa 3 oder 4 Jahren von Herrn Luzzati aus Florenz.

Taf. 4. Cam. Duca di Genova. Wie die vorhergehende, ſtammt auch dieſe aus Italien. Die Blumen ſind groß, ſchön einfarbig roſa, bis auf einzelne Blumenblätter, die weiß geſtreift ſind. Die Blumenblätter ſind groß, liegen regelmäßig dachziegelförmig, die nach der Peripherie der Blume zu ſind größer als die im Centrum.

VI. Liv. Juni 1859.

Taf. 1. Cam. Archiduchesse Marie. Herr Defresne erzog dieſe Camellie aus Samen und Herr Van Houtte brachte ſie zuerſt in den Handel. Es iſt eine ausgezeichnete Varietät, die in jeder Sammlung eine hervorragende Stellung einnehmen wird. Die Blume gehört zu den am regelmäßigſten gebauten und iſt von kirſchrother Farbe, jedes Blumenblatt mit einer weißen Binde geziert. Die Blumenblätter ſind zahlreich, klein, abgerundet und bilden eine Blume mittler Größe, die ſich leicht öffnet.

Taf. 2. Cam. Rose la Reine. Herr Verſchaffelt erhielt dieſe Varietät vor etwa drei Jahren aus Italien und iſt ſie eine Va-

rietät ersten Ranges. Die Blume ist groß, herrlich rosa-carminfarben und fast 5 Zoll im Durchm. Die äußeren Blumenblätter sind sehr groß, abgerundet, ausgebreitet, die nach dem Centrum zu befindlichen sind kleiner und bilden eine Art Herz. Ein leicht.s und dankbares Blühen, schöner Habitus und hübsches Laubwerk sind ebenfalls schätzenswerthe Eigenschaften dieser Camellie.

Taf. 3. Cam. tricolor plenissima. Herr Burdin in Mailand ist der Züchter dieser Camellie, von dem sie Herr Verschaffelt erhielt. Die Blume gleicht einer gefüllten Anemone und bildet einen hübschen Contrast mit den regelmäßig gebauten Varietäten, sie ist groß und besteht aus sehr großen Blumenblättern, die sehr verschiedenartig geformt sind, von denen die im Centrum befindlichen ein Herz bilden. Die Grundfarbe der Blume ist blaßrosa, dicht gefleckt, gestreift und eingefaßt mit carmoisin.

Taf. 4. Cam. imbricata Gulcciardini. Herr Verschaffelt erhielt diese Varietät vor zwei Jahren von Herrn Franchetti aus Florenz. Die Blumen sind sehr groß, von zarter rosa Färbung mit etwas blasseren Längsstreifen gezeichnet. Die Form ist ganz regelmäßig, die Blumenblätter sind groß, abgerundet, gleich groß bis auf die im Centrum, die etwas kleiner sind.

VII. Liv. Juli 1859.

Taf. 1. Cam. Prince Eugène Napoléon. Es ist diese Camellie eine der schönsten, welche seit langer Zeit erzogen worden ist. Aeußerst elegante Form und Regelmäßigkeit zeichnen diese Blume neben einer prächtigen Färbung vor vielen aus. Herr de Coster zu Melle-z-Gand hatte das Glück gehabt, diese Camellie zu gewinnen und gedenkt sie in kürzester Zeit in den Handel zu geben. Die Blume ist groß und besteht aus zahlreichen kleinen Blumenblättern, diese sind abgerundet, gleich, tief zweilappig am oberen Rande, ganz genau dachziegelförmig liegend und vom schönsten lebhaften Kirschroth. Die Blätter sind groß, der Habitus elegant.

Taf. 2. Cam. Carolina Franzini. Herr Amb. Verschaffelt erhielt diese Camellie vor etwa zwei Jahren aus Italien und hat sie seitdem bei ihm mehrere Male geblüht und sich als eine herrliche Varietät bewiesen. Die Blumen sind groß, aus zahlreichen großen, regelmäßig dachziegelförmig gestellten Blumenblättern vom reinsten Weiß bestehend, mit einem leichten Anflug von Schwefelgelb im Centrum der Blume, wie jedes einzelne Blumenblatt mit einem matten rosa Streifen gezeichnet ist.

Taf. 3. Cam. Conte di Soranzo. Diese eigenthümliche Camellie wurde von den Herren Sylvester & Co. zu Florenz 1856 in den Handel gegeben. Die Blumen sind mittelgroß, regelmäßig gebaut nach dem äußern Rande zu, während die im Centrum stehenden Blumenblätter mehr unregelmäßig stehen und ein Herz bilden. Die Grundfarbe der Blume ist schön rosa, nach dem Centrum zu fast weiß werdend, während die ganz im Centrum stehenden Blumenblätter wieder rosafarben sind.

Taf. 4. Cam. Baronessa Colli. Ebenfalls eine Camellie von der größten Regelmäßigkeit und zugleich ausgezeichnet durch die Größe

der Blumenblätter. Letztere sind rosaroth und mit einem weißen Streifen geziert. Herr Verschaffelt erhielt diese Camellie, wie viele andere, von Herrn Franchetti in Florenz.

Gartenbau-Vereine.

Cöln. Der Cölner Verein für Gartenkunde und Botanik wird im Frühjahre 1860 eine öffentliche Ausstellung von Blumen, Pflanzen, Früchten, Gemüsen, Plänen zu Garten-Anlagen, Garten-Instrumenten, Verzierungen, Modellen ꝛc. ꝛc. veranstalten und hat das Comité, bestehend aus den Herren Chr. Hamecher, Vorsitzender, E. Oppenheim, Stellvertreter, Ad. Lesimple, Schriftführer, Dr. Meitzen, Stellvertreter, Adler, Schatzmeister, von Dechen, Horst, M. Kemp, Wächter, Strauß, Stadtgärtner, Frielingsdorff, Maschmeier, Bergmann, Burchartz, Kunstgärtner, unterm 30. August ein Programm veröffentlicht. Nach diesem wird die Ausstellung Sonntag den 8. April, 1860, Morgens 10 Uhr eröffnet und Freitag den 13. April, Abends 7 Uhr geschlossen.

Die Einsender sind ersucht, die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände bis längstens Freitag den 6. April unter Adresse: Herrn Assessor Hamecher, einzuliefern, dieselben deutlich zu bezeichnen und jeder Sendung ein genaues Verzeichniß der Gegenstände in duplo beizufügen. Blumen-Bouquete, Garten-Pläne, Instrumente und sonstige nicht vielen Raum einnehmende Sachen werden noch bis Samstag Mittags 1 Uhr angenommen. Sachen, die nach dieser Zeit eingehen, werden nach Möglichkeit berücksichtigt, jedoch kann ihnen die Zulassung zur Concurrenz nicht mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt werden.

Der Verein wird dahin wirken, daß die Directionen der Eisenbahnen und Dampfschiffe den Transport unentgeltlich übernehmen. Er wird für gute Verpackung zur Rücksendung Sorge tragen, und setzt dieselbe bei der Einsendung voraus; Garantien können nicht übernommen werden.

Am Tage nach der Ausstellung haben die hiesigen Einsender die ausgestellten Gegenstände in dem Ausstellungs-Locale abzuholen.

Die Preisrichter werden besondere Rücksicht nehmen auf Cultur-Vollkommenheit, Blüthenfülle, Neuheit mit blumistischem Werth und geschmackvoller Aufstellung.

Mit dieser Ausstellung soll eine Blumen-Verloosung verbunden werden, worüber das Nähere später bekannt gemacht wird.

Die Preise sind folgende:

1. Sechs der neuesten Einführung von 1859 und 60, von denen wenigstens drei in Blüthe. Erster Preis: Goldene Medaille oder 5 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or.

2. Zwölf der besten cultivirten Pflanzen, von denen wenigstens sechs in Blüthe. Erster Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or.

3. Eine Gruppe seltener und schön blühender Pflanzen in mindestens 25 Species. Erster Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or.

4. Eine Gruppe seltener und schöner Blattpflanzen in mindestens 25 Species. Erster Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or.

5. Eine Collection blühender Rosen in mindestens 25 Sorten. Erster Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or.

6. Eine Collection blühender Rhododendron in mindestens 25 Sorten. Erster Preis: Goldene Medaille oder 4 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or.

7. Eine Collection blühender Azalea indica in mindestens 25 Sorten. Erster Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 2 Friedrichsd'or.

8. Eine Collection blühender Camellia japan. in mindestens 20 Sorten. Erster Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 2 Friedrichsd'or.

9. Für die schönsten getriebenen Gemüse und Früchte. Erster Preis: Goldene Medaille oder 3 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 2 Friedrichsd'or.

10. Die schönste Collection Coniferen. Erster Preis: Goldene Medaille oder 2 Friedrichsd'or. Zweiter Preis: Goldene Medaille oder 1 Friedrichsd'or.

11. Für die schönste Collection blühender Zwiebelpflanzen. Erster Preis (Amaryllis): Goldene Medaille oder 2 Friedrichsd'or. Zweiter Preis (andere Zwiebelpflanzen): Silberne Medaille oder 1 Friedrichsd'or.

12. Die schönste Collection Pensées. Erster Preis: Goldene Medaille. Zweiter Preis: Silberne Medaille.

13. Für die schönste Gruppe Calceolarien, Cinerarien ꝛc. Erster Preis: Goldene Medaille. Zweiter Preis: Silberne Medaille.

14. Für das schönste Bouquet. Erster Preis: Goldene Medaille. Zweiter Preis: Silberne Medaille.

15. Fünf Medaillen, und zwar 3 goldene und 2 silberne, zur Disposition der Preisrichter, wovon 1 goldene und 1 silberne für die schönsten Modelle, Gartengeräth ꝛc.

Hildesheim. Der s. g. Hannoversche Gartenbau-Verein in Hildesheim — warum er sich den Hannoverschen nennt, da Hannover dabei gar nicht vertreten ist, bleibt uns räthselhaft — hat am 18. September d. J. seine gewöhnliche Ausstellung eröffnet. Sie ist indeß unter dem gewöhnlichen ausgefallen, jedoch hat der Verein selbst sie in den hildesheimischen Zeitungen überhinreichend herausstreichen lassen. Wenn der Zweck desselben besonders darauf gerichtet sein soll, daß die Mitglieder ihre Producte ausstellen, zeigen was sie leisten und welche Fortschritte ihre Kunst macht, so ist dieser gänzlich verfehlt, da man von ihren Leistungen nur sehr wenig gesehen hat. Die zur Ausstellung mühsam zusammengeschafften größeren und seltenen Gewächse, Pflanzen und Blumen sind aus den Gärten und Treibhäusern vornehmer Herrschaften der Stadt und Umgegend geliefert, eine vorhandene Auswahl schöner

Gemüse und ein Sortiment Begonien — die von hier aus möglicherweise nicht eingesandt werden konnte — haben sogar die Herren Moschkowitz & Siegling aus Erfurt auf besondere Verwendung überschickt, was man aber begreiflich möglichst verheimlicht hat, so daß die Einsender davon keinen Ruhm ernten.

Bei so bewandter Sachlage verlieren sich die Producte der eigentlichen Mitglieder zwischen diesen Fremdlingen fast gänzlich, und der Verein kann daher in seinen Elogen nicht umhin, die Empfindlichkeit darüber, daß Herr Kunstgärtner Schlauter sich dabei nicht mehr betheiligt, so stark auszudrücken, daß er von dem Umstande, daß dieser seinen Garten Jedermann zur freien beliebigen Ansicht geöffnet hat, wie von einer Mähre aus fremden Landen redet.

Daß Herrn Schlauter aber zu solchem Verfahren erhebliche Gründe bewogen haben, da ihm sonst die allgemeinen Zwecke des Vereins gewiß eben so sehr am Herzen liegen, wie den übrigen Mitgliedern, davon sind wir so fest überzeugt, wie, daß der Besuch seines Gartens hinter dem der Ausstellung gewiß nicht zurückgestanden hat.

Es wird dem Liebhaber daselbst nicht nur mehr und vorzüglicheres geboten, als die Ausstellung bringen konnte, eine seit länger denn 50 Jahren sorglich zusammengebrachte Sammlung von mindestens 600 Species Cacteen, Blattpflanzen, Fuchsien, Neuholländer-Pflanzen, ein reichhaltiges Sortiment schöner Stauden im freien Lande, alles Neueste und Beste, was zur Zeit cultivirt wird, sondern seine vorzügliche Auswahl von mindestens 450 Sorten der besten und neuesten Georginen in den schönsten Musterblumen, wie man sie nach dem trocknen Sommer kaum so üppig erwarten durfte, mußte Jedermann überraschen.

Die Zwecke, welche der Verein, neben der Ausstellung selbst, im Auge gehabt hat, sind bis hieher als mißlungen anzusehen, und kann er es nicht weiter bringen, als daß er die Naturschätze Dritter arrangirt, so wird ihn diese Mühe wahrscheinlich bald verdrießen. G.

(Anmerk. der Redact. Ein zweiter günstiger lautender Bericht über diese Ausstellung nebst Preisvertheilung ging der Redaction aus der Feder eines anderen ihrer geehrten Correspondenten zu, nachdem der obige bereits gedruckt war und wird im nächsten Hefte nachfolgen.)

Maurer's Englische Stachelbeeren,

öffentlich ausgestellt zu Magdeburg am 1. August d. J.

Laut einer Bekanntmachung in Nr. 176 der „Magdeburgischen Zeitung“ hatte Herr Immisch am 1. August d. J. mit Genehmigung des Magdeburger Gartenbau-Vereins eine Ausstellung von mehr als 100 Sorten werthvoller Englischer Stachelbeeren aus dem Garten des Kunst- und Handelsgärtners Maurer in Jena den Freunden des Beerenobstes zur Schau angeboten. Die Sammlung ist von vielen Liebhabern und Freunden dieser Früchte aus der Nähe wie aus der Ferne zahlreich aufgesucht, gründlich geprüft und nicht nur ihrem bedeutenden

Umfange, sondern auch ihrem inneren Werthe nach, von vielen mit großem Beifall in Augenschein genommen, ja man darf wohl sagen bewundert worden. Mir liegt nun, schreibt Herr Immisch, in dem von ihm im Voibl. zur Magd. Ztg. veröffentlichten und uns gleichfalls gütigst mitgetheilten Artikel, allen Freunden dieses Beerenobstes, so wie dem freundlichen Absender desselben gegenüber die Pflicht ob, nachzuweisen, was für Früchte ausgestellt und wie sie beschaffen waren in einem Sommer, der an anhaltender Wärme, wie an trockener Luft, nur wenige seines Gleichen aufzuweisen hat. Wenn ich bedenke, daß in diesem Jahre nicht blos in dem merkwürdig liegenden Berggarten des Lehrers zu Stecklenberg, hoch oben auf einem Plateau des Harzgebirges in der Nähe der ganz verfallenen Stecklenburg, sondern auch tief unten in der Niederung reife Stachelbeeren nicht am Stocke, vielmehr nur unter demselben unreif abgefallen auf der Erde zahlreich zu finden waren, so ist es in der That erfreulich, mit eigenen Augen wahrzunehmen, daß die ganze Sammlung dieser Beerenfrüchte bei der sorgfältigen Cultur derselben durch Herrn Maurer ein Ergebniß erzielt hat, welches nach den vorliegenden Proben nicht etwa in geringer, sondern selbst in beträchtlicher Anzahl (beziehungsweise von 10, 15 bis 20 Stück per Sorte) ein außerordentlich günstiges zu nennen ist, ganz abgesehen davon, was dem Begleitschreiben wörtlich hinzugefügt war: „Die Früchte, von wenigstens zehn Jahre alten Stöcken entnommen, sind in günstigen, nicht so trockenen Jahren, wie das gegenwärtige, um ein Drittel größer und bis 2 Loth schwer geerntet worden, bei sehr einfacher Cultur.“

Es war bei der Veranstaltung dieser Ausstellung von einem einzigen Culturzweige Absicht unseres Vereins, Käufern wie Verkäufern dieser Früchte recht handgreiflich zu beweisen, daß alle im Handel bei uns vorkommenden Früchte der Art wenig Werth haben in Vergleich mit denjenigen, welche man bei sehr einfacher Cultur in Jena und anderwärts in Thüringen gewinnt. Dieser Plan ist vollständig erreicht und hoffentlich wird er zu seiner Zeit auch Frucht bringen, nicht nur für manche Leser d. Ztg., sondern auch für manchen Käufer dieser Frucht.

Die eingelieferten Früchte bestanden der Farbe nach in 4 Sorten, nämlich in rothen, grünen, gelben und weißen, letztere jedoch meist mit grüner oder gelber Hautfarbe versehen, auf deren Oberfläche nur einige weiße oder weißliche Adern sichtbar waren. Innerlich unterschieden sich dieselben durch eine etwas dickere Schale von den drei ersten Arten. Allein da die Grenze zwischen grün und gelb schwer zu finden war, so habe ich gegen die Angabe des Katalogs von 1857, so wie auch des erst nach beendigter Ausstellung eingehenden von 1859 die weiße Abtheilung ganz fallen lassen und nur die drei erstgenannten beibehalten, nämlich die mit rothen, grünen und gelben Früchten, eine Abweichung, durch welche dem Leser die Uebersicht wesentlich erleichtert sein dürfte. Jede der drei Sorten enthielt große, mittlere und kleine Früchte, jedoch alle insgesammt ganz reif, gut ausgebildet und mehr oder weniger feinschalig, einige in Vergleich mit andern wahrhaft süß und gewürzig schmeckend, was bei jeder einzelnen Sorte angegeben werden soll. Wenn ich dabei die den meisten Lesern unverständlichen, ohnehin wenig bezeichnenden englischen Namen ganz außer Acht lasse und blos die Nummer anführe, unter welcher mir jede einzelne zugesendet war, so ist das eine

nicht minder wesentliche Erleichterung für den Leser wie für mich. Am wohlschmeckendsten waren die Früchte am Tage ihrer Ankunft, den 28. Juli, einzelne wenige erhielten sich gut sogar bis zum 6. August; die meisten dagegen gingen bei ihrem großen Vorrathe von Zuckerstoff in den heißesten Tagen des Sommers bald in Gährung über, sprangen in der Oberhaut auf und waren von nun an nicht mehr wohlschmeckend, z. B. Nr. 6 roth, 24, 68 grün und 204 gelb.

Mit Recht stelle ich oben an:

I. Die rothen Sorten,

unter denen die größten, ansehnlichsten, feinschaligsten und schmackhaftesten, d. h. süß und gewürzig zugleich schmeckend, enthalten waren, nämlich: Nr. 2, 6, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 52, 56, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 86, 89, 91, 94, 96, 108, 109, 110, 115, 117 und 181 (36 Stück).

1) Unter diesen waren sehr groß, süß und feinschalig: Nr. 13, 23, 25, 31, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 68, 73, 76, 86, 89, 96, 109, 110 und 181 (19 Stück), besonders Nr. 73, so schön und ansehnlich wie eine große Pflaume (Prunus domestica).

2) Weniger feinschalig, aber eben so groß und süß: Nr. 2, 12, 41, 75, 91, 108 und 115 (7 Stück).

3) Nicht so groß, aber eben so süß und feinschalig wie die unter 1. aufgeführten waren: Nr. 14, 22, 32, 52, 69 und 117 (6 Stück). Davon wirklich ausgezeichnet: Nr. 14 und 69.

4) Weniger gut: Nr. 71 und 94.

5) Klein und feinschalig: Nr. 6 und 56.

II. Grüne Sorten,

und zwar: Nr. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 33, 34, 40, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 72, 77, 81, 85, 95, 98, 100, 102, 105, 106, 112, 113, 116, 119, 123, 134, 158, 224 und Dr. Hiller ?) (44 Stück).

1) Davon groß, süß und feinschalig zugleich: Nr. 1, 5, 7 (besonders schön), 19, 33, 58 (einer großen Pflaume ähnlich), 64 und Dr. Hiller (8 Stück).

2) Weniger feinschalig, aber eben so groß und süß: Nr. 3, 15, 17, 20, 26, 55, 113, 224 (sehr gewürzig). In Summa 8 Stück.

3) Mittelgroß, sehr süß und feinschalig: Nr. 5, 9, 10, 34, 53, 57, 61, 72, 95, 98, 106, 116, 123 (13 Stück).

4) Eben so groß und süß, aber weniger feinschalig: Nr. 16, 59, 113, 158 (4 Stück).

5) Klein, süß und feinschalig: Nr. 18 und 95.

6) Klein und hartschalig: Nr. 40, 100 und 102.

III. Gelbe Sorten,

und zwar: Nr. 4, 5, 10, 21, 27, 28, 34, 39, 43, 47, 48, 51, 58, 65, 72, 74, 85, 97, 105, 111, 114, 197, 204 (23 Stück). Von diesen waren:

1) Groß, süß und feinschalig: Nr. 10, 28, 34, 39 (einer großen Pflaume ähnlich), 48 (ausgezeichnet), 58, 74 und 111 (8 Stück).

2) Etwas weniger groß, aber eben so süß und feinschalig: Nr. 27, 47, 72, 85 und 97 (5 Stück).

3) Von derselben Größe und Güte, aber weniger feinschalig als unter 2: Nr. 4, 21, 51, 65, 105 (5 Stück).

4) Klein, süß und feinschalig: Nr. 114.

5) Klein, herbe und hartschalig: Nr. 48 und 204. *)

Das ist nach sorgfältigster Prüfung und Berathung mit Kennern mein ganz unpartheiisches Urtheil über die ausgestellte Sammlung. Wenn es heute bei völliger Reife der Früchte ein ganz anderes ist, als das, welches ich in Verein mit andern Preisrichtern am 13. Juli 1857 in Gotha über dieselben nicht völlig reifen Früchte abgegeben habe, so spreche ich dies um so lieber hiermit öffentlich aus, nachdem ich mich gründlich und sattsam davon überzeugt habe, was für ein vortrefflicher Geschmack in einer vollkommen reifen und möglichst großen Frucht der Art enthalten ist.

Möchte es nur Herrn Maurer bald gelingen, die Vermehrung dieser Sorten so weit auszudehnen, daß er alle Gesuche mit mäßig großen Exemplaren versehen könnte! Dabei stelle ich jedoch nicht in Abrede, daß ein gut bewurzeltes kleines Exemplar bei guter Pflege eben so leicht anwächst wie ein großes, nur mit dem frühen Ertrage ist es etwas anders.

Uebrigens bemerke ich für etwaige Züchter dieser Frucht, daß man die Kraft des Strauches nicht bis aufs äußerste anstrengen darf, wenn man ein preiswürdiges Product erhalten will. Eine überreiche Ernte giebt viel kleine Früchte, aber eine weniger reiche, welche durch Beschneiden des jungen Fruchtholzes, so wie durch Auspflücken der überflüssigen, unreifen Früchte erreicht wird, ersetzt dem Züchter das reichlich an innerer Güte, was er an der Menge kleiner Früchte verliert.

Die Engländer ziehen nicht selten an einem einzigen Stachelbeerstrauche nur wenig Früchte — etwa 5–10 Stück — um großes Aufsehen mit denselben zu erregen und die ausgesetzten hohen Preise zu gewinnen. Wird nun ein solcher Strauch in der Absicht gekauft, um eben so viel große Früchte zu ernten, so wäre diese Cultur bei uns eben so gut ausführbar, wie in England, aber zur allgemeinen Einführung ist sie durchaus nicht zu empfehlen. Wir verlangen vielmehr (wie ich in meinem Dankschreiben für die erhaltenen Früchte ausdrücklich erklärt habe) bei einer solchen Empfehlung nur Sorten, welche dankbar tragen, und zwar Früchte von ansehnlicher Größe und gutem Geschmack. Große Pflanzungen der Art müssen bei uns die Früchte nicht metzen-, sondern scheffelweise liefern, und als solche sind die hier ausgestellten mir ehrlich bezeichnet. Eben darum nehme ich keinen Anstand für die genannten Sorten das Wort zu ergreifen, nachdem ich mich von dem Werthe der Früchte wie von dem Ertrage der Stöcke vollständig überzeugt habe.

Anhang. Großen Schaden haben in dem verflossenen Sommer bei der Stachelbeercultur die Dürre der Temperatur, so wie die Raupe

---

*) Es sind dies die Nummern, unter denen Herr Maurer die Sorten in seinem Kataloge führt.

Die Redact. der Hambg. Gartztg.

des kleinen Schmetterlings, des sogenannten Harlekins oder Stachelbeerspanners (Geometer grossulariata) angerichtet. Wenn ich in Bezug auf den ersten Schaden das offene Geständniß ablege, daß wir gegen lang anhaltende allgemeine Dürre durch Begießen und Behacken der Pflanzen, durch Belegen des Bodens, um dieselben mit verwesenden Pflanzenstoffen u. dgl. nur wenig thun können, so schweige ich von den verschiedenen zum Theil wenig wirksamen Mitteln und Mittelchen, welche unsere Gartenschriften gegen die zweite Calamität fast täglich in Vorschlag bringen. Am wirksamsten dagegen hat sich mir bisher nur ein einziges Mittel erwiesen, weil es zugleich mit der naturgeschichtlichen Entwickelung des Schmetterlings, eines Nachtfalters, in Verbindung steht. Dieser umflattert die Stachel-, weniger die Johannisbeersträucher, legt seine Eier an deren Blätter, und die bald darauf entstehende Raupe frißt begierig alle Blätter ab. Hierauf verpuppt sie sich unten am Boden in dem Geniste hauptsächlich der alten verwilderten Sträucher und überdauert als Puppe im Schutze derselben unsern Winter, um im Frühjahre, wenn der Strauch vollständig belaubt ist, als Schmetterling hervor zu gehen und eine neue Generation von unersättlichen Fressern ins Leben zu rufen. Man verwehrt ihnen dieß, wenn man zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch grünt, alles Geniste, trockenes Laub und sämmtliche Erde um den Stamm herum einige Zoll tief wegräumt. Die Erde wirft man weit abseits und um den Stamm bildet man einen Kessel, in welchen man einen Eimer voll frischen Harn, unverdünnt aus dem Stalle entnommen, gießt. Der Harn tödtet die noch vorhandenen versteckten Insecten und befördert das Wachsthum des Strauches, der, wie der Himbeerstrauch einen guten, fetten, etwas schweren Boden in einer Lage mit etwas gebrochenem Lichte verlangt. Bei dem alljährlich im Frühjahr vorzunehmenden Geschäfte war einst bei mir ein Strauch aus Versehen übergangen; kaum aber waren sämmtliche Sträucher grün, so kroch die gefräßige Raupe aus ihrem Schlupfwinkel hervor und fing an den Strauch zu entblättern. Man entfernte diesen sammt der Wurzel ganz, reinigte die Erde durch den erwähnten Aufguß von aller Brut, und nun hatte man Ruhe und zugleich eine reichliche Ernte auf lange Zeit.

Dieß als Antwort auf eine von Herrn Th. Denstorff in Schwanebeck an mich brieflich gerichtete Anfrage!

Schließlich mache ich noch einen andern Vorschlag, dessen Wirkung ich zwar noch nicht selbst erprobt habe, der aber von Sachkundigen gegen ähnliche lästige Insecten schon in Anwendung gebracht ist. Ich meine das Persische Insectenpulver, welches gegen grüne und schwarze Aphisarten (Blattläuse), so wie gegen die häßliche graue Raupe der gefüllt blühenden großen Maiblume mit gutem Erfolge hier gebraucht wird. Die Pflanze wird zu dem Zwecke mit der Gießkanne erst besprengt und nachher mit dem Pulver bestreut. Die Stachelbeerraupe wird demselben wahrscheinlich auch unterliegen. Vielleicht ließe sich dieses Mittel auch gegen die Zerstörung des Kohlweißlings, wenn auch nicht im Großen, doch wenigstens im Kleinen anwenden, und sollte es sich hier bewähren, so würde man bald Mittel finden, es selbst in weiteren Kreisen zur Anwendung zu bringen. Vielseitige Versuche der Art, wozu jeder Gartenbesitzer mehr Gelegenheit hat, als ich in diesem

Augenblicke, werden das Nähere darüber bald ergeben. Um gefällige Mittheilung des Erfolgs wird bei der Wichtigkeit der Sache dringend gebeten.

Literatur.

J. F. W. Bosse's (Großherz. Garteninspector a. D. in Oldenburg) vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei, oder genaue Beschreibung fast aller in Deutschland bekannt gewordenen Zierpflanzen, mit Einschluß der Palmen und der vorzüglichsten Sträuche und Bäume, welche zu Lustanlagen benutzt werden, nebst gründlicher Anleitung zu deren Cultur und einer Einleitung über alle Zweige der Blumengärtnerei. Mit besonderer Rücksicht auf Zimmer-Blumenzucht, theils nach eigenen vieljährigen Erfahrungen, theils nach den Angaben der ausgezeichnetsten Pflanzen-Cultivatoren bearbeitet. Erster Band. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. geh. Preis 4 ℳ. Hannover 1859. Hahn'sche Buchhdlg.

Unter allen gründlichen und gediegenen Gartenbüchern, die auf Vollständigkeit Anspruch haben, ist dieses unbedingt das vollständigste und als solches auch allgemein rühmlichst anerkannt worden. Das Werk erscheint in drei Bänden, in welchen nicht allein die seither erschienenen Supplemente zu den früheren Ausgaben, sondern auch alle bis auf die neueste Zeit bekannt gewordenen Zier- und Nutzpflanzen aufgenommen sind. Es wäre anmaßend, ein Urtheil über ein Werk geben zu wollen, in welches ein verständiger, praktischer Gärtner seine Erfahrungen und die anderer ausgezeichneter Pflanzen-Cultivateure niedergelegt hat. Es ist nur unsere Absicht, hierdurch auf das Erscheinen dieser 3. Auflage dieses, für jeden Anfänger, wie für Gärtner von Fach gleich nützlichen und belehrenden Gartenbuches aufmerksam zu machen. Die beiden noch fehlenden Bände werden in kurzer Zeit diesem ersten folgen.

E. O—o.

Die erste Lieferung eines höchst wichtigen Werkes wird in kürzester Zeit erscheinen, nämlich Lehrbuch der schönen Gartenkunst mit besonderer Rücksicht auf die praktische Ausführung von Gärten und Parkanlagen u. s. w. bearbeitet von G. Meyer, Königl. Hofgärtner und Lehrer der K. Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam, ein Werk für Gärtner, Architecten, Guts- und Gartenbesitzer, Gärtner-Lehranstalten, Bau- und Kunst-Akademien, landwirthsch. Vereine, Stadtbibliotheken ꝛc. — Das Werk erscheint in 4 Lieferungen, zu 2 ℳ und da dasselbe im Manuscript ganz vollständig vorliegt, wird die Herausgabe laut Anzeige von Riegel's Verlagsbuchhandlung in Berlin in diesem Jahre bestimmt beendigt werden.

Daß wir mit diesem Werke über die schöne Gartenkunst nur Gediegenes und Zeitgemäßes zu erwarten haben, dafür bürgt schon der Name des Verfassers, es enthält die Früchte einer langjährigen, allseitig

anerkannten Thätigkeit und ernster Studien desselben, die er auf Grund seiner Berufsthätigkeit in den weltberühmten Königlichen Gärten zu Potsdam und seiner anderweitigen, umfangreichen Beschäftigung auf diesem Gebiete der Gartenkunst sich anzueignen wußte.

Das Werk zerfällt dem Inhalte nach in zwei Abtheilungen und zwar:

I. Abtheilung.

Historisch-ästhetischer Rückblick auf die Entwickelung der Gartenkunst in ihren einzelnen Stylarten und besondere Schilderung derselben.

Einleitung.

a) Der arabische und maurische Gartenstyl,
b) der römische und italienische "
c) der französische Gartenstyl,
d) der holländische "
e) der chinesische "
f) der englische "

II. Abtheilung.

Die Grundsätze der neueren Gartenkunst und Anleitung zur Ausübung derselben.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Grundsätze für die Anordnung.

a) Allgemeine Grundsätze für die Anordnung im Großen und Ganzen.
b) Allgemeine Grundsätze für die Anordnung unregelmäßiger Partieen von einem Hauptstandpunkte aus.
c) Allgemeine Grundsätze für die Anordnung regelmäßiger Partieen. Gebäude.

Zweiter Abschnitt.

Von der allgemeinen Anordnung der wesentlichsten Bestandtheile eines verschönerten Landsitzes.

a) Von der Lage des Wohngebäudes.
b) Vom Pleasuregrounds. Blumengarten. Rosarium. Wintergarten.
c) Vom Küchen- und Obstgarten.
d) Vom Park. Wildgehege. Fasanerie.
e) Freie Anlagen.

Dritter Abschnitt.

Ueber Hausgärten in Städten und Vorstädten.

Vierter Abschnitt.

Ueber die Anordnung öffentlicher Plätze und Promenaden in Städten und über öffentliche Gärten.

Fünfter Abschnitt.

Von malerischer Anordnung oder Gruppirung im Einzelnen.

a) Ueber den Grund und Boden.
b) Ueber Gewässer.
c) Ueber Gehölz-Gruppirung oder Pflanzungen.
d) Ueber Rasen und Wiesen.
e) Ueber Wege.

Sechster Abschnitt.

Ueber Anfertigung des Entwurfes zu Papier und die technische Ausführung der Anlagen.

a) Ueber die Ausarbeitung des Entwurfes.
Untersuchung des Platzes oder der Localitäten.
Vorarbeiten für die Wasserausgrabung.
Vorarbeiten für die Ausmuldungen, Aufhöhungen und Terrassirungen.
Anfertigung eines Bepflanzungsplanes.

b) Ueber die Ausführung des Projektes im Freien.
Uebertragung des Planes auf die Lokalität.
Ausführung der Terrainarbeiten.
Wegearbeiten.
Wasserarbeiten.
Pflanzarbeiten.
Anlegung des Rasens und der Wiesen.

Siebenter Abschnitt.

Ueber Anfertigung der Kostenanschläge und einige Bemerkungen über die Unterhaltung der Anlagen.

Wie aus diesem Inhalte und dem diesem Hefte beigegebenen Prospecte ersichtlich, wird mit diesem umfassenden Werke über bildende Gartenkunst eine große Lücke in unserer Literatur auf das Vollständigste und Würdigste ausgefüllt. Das Werk wird 24, mit seltener Meisterschaft gezeichnete Tafeln in gr. 4° und etwa 12 bis 15 Bogen Text in demselben Format mit gegen 100 Holzschnitten umfassen. E. D—o.

Feuilleton.

Pflanzen-Cataloge. Unter den vielen uns in jüngster Zeit zugegangenen Preisverzeichnissen, gültig für diesen Herbst und Frühjahr 1860, sind einige, die unsere Aufmerksamkeit theils wegen ihrer guten Bearbeitung, theils wegen ihres reichen Inhaltes, besonders in Anspruch nehmen und wollen wir deshalb nicht unterlassen, den Lesern dieser Zeitung diese Verzeichnisse zur nähern Durchsicht bestens zu empfehlen. Zu diesen Verzeichnissen gehört denn namentlich auch das Preisverzeichniß No. 26 der Herren **Neubert** und **Reitenbach** zu **Plicken** bei Gumbinnen in Ostpreußen. Uns ist diese Gärtnerei aus eigner Anschauung leider nicht bekannt, wir haben jedoch derselben von Männern, welche dieselbe besucht haben, sehr viel Rühmendes nachsagen gehört, aber auch ohne dieses haben wir von dieser Handelsgärtnerei nach den von ihr alljährlich veröffentlichten Verzeichnissen eine gute Meinung bekommen. Die Verzeichnisse, die alljährlich an Umfang gewinnen, enthalten eine sehr große Auswahl von Bäumen, Stauden und Hauspflanzen, sie sind frei von allen lobhudelnden Anpreisungen einzelner Pflanzenarten und zeichnen sich durch eine sehr große Correctheit der Namen aus, ein Vorzug, den sie vor so vielen anderen deut-

schen Preisverzeichnissen haben. Ebenso finden wir bei den meisten Pflanzenarten den Autor und wo nöthig, auch die Synonymen angegeben. Die hauptsächlichsten Culturen, mit denen sich die so thätigen Besitzer dieser Handelsgärtnerei befassen, sind: Obstbaumschulen, hier sind es neben den verschiedensten Fruchtbäumen und Sträuchern die schönen Sorten englischer Stachelbeeren, von denen die Herren Neubert und Reitenbach die neuesten Sorten aufzuweisen haben. Die Baumschulen bieten eine Auswahl der besten und gangbarsten Zierbäume und Sträucher, dann aber ein reiches Sortiment von Rosen und schönen Staudengewächsen fürs freie Land. — Die Sammlung der Gewächshauspflanzen, sowohl des Kalt- als Warmhauses ist ziemlich bedeutend und besteht aus den beliebtesten Zier- und Modepflanzen.

Daß sich der Absatz aus dieser bedeutenden Gärtnerei hauptsächlich nach den östlichen und nördlichen Theilen von Preußen und dann nach Polen, Rußland ꝛc. erstreckt, ist aus der Lage derselben erklärlich, und deshalb wollen wir ganz besonders die Pflanzen und Blumenfreunde in jenen Gegenden auf die Firma: Neubert und Reitenbach aufmerksam machen. E. O—o.

Das Etablissement des Herrn **Ambr. Verschaffelt** in Gent hatten wir schon einmal (im 7. Hefte der Gartztg.) Gelegenheit genommen, nach Verdienst zu besprechen. Der so eben ausgegebene Catalog (No. 66) für den Herbst 1859 und Frühjahr 1860 über die im genannten Etablissement vorräthigen Gewächse, rechtfertigt vollkommen das, was wir über diese Handelsgärtnerei gesagt haben. Wir finden in demselben eine Auswahl der vorzüglichsten Pflanzenarten des Warm- wie Kalthauses. Unter den Pflanzen des Warmhauses ist eine große Sammlung von Aralien, Begonien, Caladien, ein sehr großes Sortiment von den herrlichen Gloxinien, Hoya-, Rhopala- und Theophrasta-Arten, dann die so schönen Tydaea-Sorten und eine reiche Sammlung von Palmen, Cycadeen und Pandaneen zu sehr mäßigen Preisen.

Reicher noch als die Sammlung der Warmhauspflanzen ist die der Kalthauspflanzen, wir finden hier viele, in anderen Sammlungen fast in Vergessenheit gekommene Arten, aus den Gattungen **Boronia, Brachysema, Eriostemon, Grevillea, Lomatia, Protea** ꝛc. ꝛc. Am reichsten vertreten finden wir nun aber in dieser Gärtnerei die Camellien und zwar in den allerneuesten und schönsten Sorten. Dieselben sind nach den Jahrgängen, wie sie in der vorzüglichen „Nouvelle Iconographie“ des Herrn Amb. Verschaffelt abgebildet sind, geordnet, von welchem Prachtwerke nun fast der 11. Jahrgang vollendet ist. Es wird den Camellien-Freunden vermittelst dieses Werkes die Auswahl von Camellien ungemein erleichtert und da nur wirklich gute Sorten darin abgebildet worden sind, so hat man auch nicht zu fürchten, Sorten zu erhalten, die nicht gefallen.

Araucaria excelsa, Cookii, Bidwilli ꝛc. sind zu jedem Preise vorräthig, ebenso eine gute Auswahl der schönsten Coniferen, dann **Berberis, Ilex, Rhododendron** von Himalaya, von Assam und Bhootan und solche fürs freie Land, von letzteren ein sehr großes Sortiment, wie noch viele andere Gewächse, die hier anzuführen der Raum nicht gestattet. Herr Verschaffelt hatte die Güte, der Redaction dieser Zeitung eine Anzahl seines neuesten

reichen Catalogs zu überſenden und iſt dieſe gern bereit, denſelben Jeden auf Verlangen franco zuzuſenden.

E. D—o.

Ueber Blumenliebhaberei. Die Griechen ſind Freunde der Blumen, dieſe ſind das Feſtgeſchenk der Liebe, verherrlichen Hochzeit, Geburtstag und andere Feſte, ja Blumen ſind die letzte Gabe ins Grab. Jeder Grieche, ſo arm er auch iſt, pflanzt ſich in einer Ecke ſeines Häuschens einen Nelkenſtock und eine Roſe und vor allen iſt ihm das Ocymum Basilicum die liebſte Pflanze.

Eine Zierde der Blumenbouquete, um ſelbe beſonders auf den Tiſch zu ſtellen und für viele Tage im friſchen und grünenden Zuſtande zu haben, ſind die mit den ſchön roth gefärbten Früchten reichlich behangenen Zweige von Pistacia Terebinthus, um die ſich die ſchönſten Trauben gleich den rothen Weinträubchen von Smilax gewunden finden. Stehen in deren Mitte noch die ſchönen grünen Myrthenzweige mit ihren weißen und ſchwarzen Früchten, ſo bildet dieſes Bouquet eine langdauernde Zierde auf dem Tiſch des Reichen und des Armen, dem das ſchönſte Blumenbouquet nicht an die Seite zu ſtellen iſt. Auch der Arme in Griechenland findet ſonach ein Mittel, ſich an den Blumen zu ergötzen, denn die genannten Pflanzen finden ſich in allen waſſerreichen Gegenden in ganz Griechenland. Dieſe Pflanzen zierten gewiß auch die Kränze und Blumenſträuße bei den Feſten der Alten, bei Hochzeiten und den Feſten des Bachus, der Tesmophorieen und andern von den Alten den Gottheiten geweihten Feſten. Dieſe Pflanzen hatten auch bei den Alten eine hohe Bedeutung, ſo war die Myrthe der Aphrodite heilig; denn als dieſe Göttin dem Schaume der Wogen entſtiegen war, ſuchte ſie ſich zu verſtecken und das nächſte Gebüſch war ein Myrthenſtrauch, der nun der Göttin zum Schutze diente.

Die Piſtacie (Pistacia) gilt für ein ſicheres Wundheilmittel, wie ſolches erhellt aus der Etymologie des Wortes *Πισσα*, Harz, und *ἀκεόμαι*, heilen, ein Gewächs mit heilſamem Harze. Aus dem Holze der Smilax ſollen die Alten Götterbilder geſchnitten haben, und in Bezug auf den mit ſtarken Stacheln beſetzten Stengel erhielt dieſe Pflanze ihren Namen Smilax von dem Worte *Σμιλη*, Kratzeiſen, oder dem Zeitworte *σμαεσν*, kratzen, ſchaben.

(Dr. Lauberer in der Flora.)

Ueber das orientaliſche Roſenöl. Zu den ſeltenſten Producten des Orients gehört das im Orient erzeugte Roſenöl. Daß daſſelbe in verſchiedenen Theilen Kleinaſiens auf die verſchiedenſte Weiſe gewonnen wird, iſt bekannt. In Damaskus wird daſſelbe durch Deſtillation gewonnen, in andern Orten mittelſt Auspreſſen der friſchen Roſen und Abnehmen des in der Kälte erſtarrten Oeles.

In frühern Zeiten konnte man zu allen Zeiten des Jahres auf den Bazars von Smyrna, von Conſtantinopel und beſonders in Adrianopel Roſenöl finden, ſeit ein paar Jahren iſt jedoch daſſelbe im Oriente ſelbſt ſo theuer und ſelten geworden, daß man ſich daſſelbe aus Europa zurück nach Smyrna u. ſ. w. kommen laſſen muß. In allen dieſen Plätzen, wo das Roſenöl erzeugt wird, finden ſich Kaufleute, die ſich mit dieſem Handel, als einem ſehr einträglichen, beſchäftigen und alles, was ſich findet, zuſammenkaufen, dann noch verfälſchen, höchſt ſelten unverfälſcht laſſen, in kleine Gefäße

einschließen und nach Rußland und Wien versenden.

Der größte Theil des Rosenöls kommt durch den Schleichhandel nach Europa und ganz besonders durch die Chatzides, so nennt man die Pilger, die das heilige Land besuchen. Jeder dieser Pilger bringt seinen Freunden etwas aus dem heiligen Lande mit und nebst Rosenkränzen, Jericho-Rosen-Seife von Jerusalem findet sich auch dieses Oel auf den Bazars in Jerusalem in kleinen Gläsern eingeschlossen.

Um nun dieses Oel leichter einzuschwärzen, werden diese kleinen Gläser in die Seifenmasse eingedrückt, so daß sich in dem Innern dieser Seife die kleinen mit Rosenöl gefüllten Gläschen befinden. Findet nun auch die Douane beim Pilger solche Seifenstücke, so denkt man gewiß nicht daran, solche auf einen Schleichhandel weiter zu untersuchen und Hunderte von Gläschen mit Rosenöl passiren sonach die Douane, ohne dieser die Mauth zu bezahlen.

In der Nähe von Adrianopel und besonders in dem Dorfe Kysanlen wird das Rosenöl, das die Türken Giul Jagh nennen, mittelst Destillation bereitet und von da versendet. Die Rosencultur geschieht daselbst mit allem Fleiße. Die Rosenstöcke, die man ihrer Größe wegen Rosenbäume nennen kann, werden in Reihen gleich den Alleen gepflanzt, sorgfältig vom Unkraute gereinigt, fleißig beschnitten und alle Sorgfalt verwendet, um viel Rosenblüthen und wenig Blätter zu erzeugen. Die ganze Umgegend dieses Dorfes ist ein Rosenwald zu nennen und das meiste im europäischen Handel sich finde Giul Jagh kommt aus Adrianopel und seiner Umgegend. Da diese Rosensorte, deren Blüthen mehr weiß als roth sind, aus Persien stammt und zwar von einem Districte, der Wan heißt, so heißt auch diese Rosensorte Wan-Giul- oder Wan-Rose.

(Dr. Lauberer in der Flora.)

Oelzweig-, Gras- und andere Kronen. Bekannt ist es aus den Schriften der Alten, daß man die Sieger in den olympischen Spielen mit den Zweigen des wilden Olivenbaumes, Oleaster, bekränzte, in Athen gab man dem Sieger einen Kranz aus Oelzweigen, als von dem der Minerva geheiligten Baume. Der Olivenbaum stand auch beim römischen Volke in großen Ehren und mit seinen Zweigen bekränzten sich die Ritterschaaren. Zu Nemea in Achaja wurden die Sieger in den heiligen Kampfspielen mit Sellerie, Apium, bekränzt, obwohl die Sellerie die Pflanze der Trauer, der Krankheit und des Todes war. Bei den isthmischen Spielen wurden die Sieger mit einem Pinienkranze geschmückt. Sehr interessant ist es, daß in einigen Theilen von Epirus die Gewohnheit noch herrschen soll, Personen, die sich durch eine wohlthätige Handlung, durch ein Verdienst, daß sie dem Demos darbringen, einem Arzte, der sich für die Menschheit aufopfert, eine Krone aus Grashalmen darzubringen, und eine solche soll alle andern Kronen an Werth übertreffen. Interessant nun ist, was sich über die Graskrone in den Schriften der Alten findet und was ich aus denselben entlehne. Die Graskrone nannte man Corona graminea und keiner der Kränze ist so ehrenvoll als diese aus Gras geflochtene Krone. Sie wurde nach Plinius vom römischen Volke als Belohnung ruhmvoller Thaten zuertheilt. Kränze, die mit Edelsteinen besetzt sind, goldene Kränze, Wall-, Mauer-, Schiffsschnabel-, Bürger- und Triumphkränze standen von jeher der

Graskrone nach. Alle andern Ruhmes-Kränze wurden von Heerführern, von siegreichen Feldherren oder vom Senate, die Graskrone aber nur von ganzen Heeren, die gerettet worden sind, gegeben. Man nennt sie auch Belagerungskrone, Corona obsidionalis, wenn ein im Lager stehendes Heer von der Belagerung oder vom schimpflichen Abzuge befreit wurde. Diese Krone wurde aus grünem Grase, von daher, wo die Rettung vollbracht wurde, geflochten. Aus diesem ist zu ersehen, daß die Graskrone den höchsten Werth unter den Kronen besaß.

Es gab auch Kampfspiele, wo ein Kranz von Dattelpalmen der Preis war und dem Sieger als Belohnung ein Blatt der Dattelpalme in die Hand gegeben wurde. Diese Sitte rührt von Theseus her. Als dieser von Kreta kam, stellte er auf der Insel Delos ein Kampfspiel an und krönte den Sieger mit Palmenzweigen. Schon Homer gedenkt der Dattelpalmen zu Delphi, indem er erzählt, wie Ulysses bei der Tochter des Alcinous Hülfe suchte.

(Dr. Landerer in der Flora.)

***Brunsvigia Josephinae Gawl. β minor.** Ansehnliche Sammlungen der sogenannten Cap-Zwiebeln sind in jetziger Zeit ziemlich selten geworden, trotz dem sich unter diesen Gewächsen eine große Menge Arten befinden, die sich durch prächtige Blüthen auszeichnen und einer allgemeinen Cultur werth sind. Zu den schönsten Pflanzen des Cap's gehört auch die Brunsvigia oder Amaryllis Josephinae, die wir unlängst in dem Gewächshause des Herrn F. Worlée in Hamburg in schönster Blüthenpracht zu sehen Gelegenheit hatten. Der allgemeine Blüthenschaft hatte eine Höhe von 18 Zoll und trug an der Spitze eine Dolde von 19 großen brillant blutrothgefärbten Blüthen. Nach genauer Untersuchung der Pflanze mit der Beschreibung in Kunth's Enum. Plant. V. p. 608 war es die schöne Varietät β minor oder Bruns. Josephinae β angustifolia des Bot. Reg. tab. 192 und 193. Möge diese kurze Notiz Veranlassung geben, daß diese prächtige Pflanze wieder mehr cultivirt werde, als es bisher in einer Reihe von Jahren geschehen ist.

Pflanzen-Auctionen fanden Ende September mehrere in London statt und ist es erstaunend, wie hoch manche Pflanze bezahlt worden ist. So wurden auf der Auction, welche die Actionaire des Krystall-Palastes zu Sydenham über mehrere denselben gehörende Pflanzen abhielt, eine 9 Fuß hohe Araucaria excelsa im Topfe mit 3 £ 10 s bezahlt, andere von 3–6 Fuß Höhe mit 1 £ 15 s bis 2 £ 10 s, für eine Araucaria Bidwilli, 8 Fuß hoch, zahlte man 4 £ 10 s. Außerdem wurde eine große Menge Camellien, Rhododendron ꝛc. verkauft.

Eine andere Auction hielt der bekannte Herr Stevens zu Cooper's Hill über eine ausgezeichnete Sammlung von Azaleen und andern Kalt- und Warmhauspflanzen ab. Für eine Azalea Sunning Hill, 3 Fuß 6 Zoll hoch und eben so breit, zahlte man 11 £, für A. Murrayana 9 £, Perryana 7 £ 10 s, optima 6 £ 10 s, Gledstanesii 5 £ 15 s ꝛc. ꝛc. Für das hübsche Acrophyllum venosum, 3 Fuß hoch und fast eben so breit, zahlte man 7 £ 10 s, für Ixora salicifolia 6 £, Genethyllis macrostegia 5 £ 10 s, für Aphelexis macrantha rosea, wohl das schönste Exemplar in England, wurde 9 £ bezahlt, für Tetratheca ericoides

3 £ 7 s, Erica jubata 2 £ 4 s, Maranta zebrina 2 £ 10 s, Pandanus javonicus varieg. 3 £ 10 s, Epacris miniata grandiflora 3 £ 10 s. — Im Ganzen wurden 202 Cabelinge unter den Hammer gebracht, für die über 300 Pfund eingingen.

(G. Ch.)

Personal-Notizen.

Der Garten-Inspector Herr **E. Lucas**, bis dahin Vorsteher der Gartenbauschule und Lehrer des Gartenbaues in Hohenheim, verläßt zum Frühjahr k. J. seine bisherige Stellung, um die Direction der in Reutlingen zu gründenden Landesbaumschule zu übernehmen.

Der Russische Gartenbau-Verein in St. Petersburg hat den Garteninspector **E. Otto** in Hamburg zu seinem ordentlichen Mitgliede ernannt.

---

*Für die von Seiten des preußischen Staates nach den ostasiatischen Gewässern ausgerüstete und im November d. J. abgehende Expedition behufs Anknüpfung von Handelsbeziehungen hat sich in Erfurt unter den dortigen Handelsgärtnern eine Vereinigung gebildet, welche bei dem K. Handelsministerium den Antrag einreichte und die Genehmigung nachsuchte, für diese Expedition die in Europa bekannten land- und forstwirthschaftlichen wie gärtnerischen Cultur-Producte aller Art mitsenden zu dürfen, ohne Rücksicht auf materiellen Gewinn. Wie wir hören, so hat der Herr Handelsminister von der Heydt diesen Antrag bereitwilligst genehmigt und haben sich folgende Häuser dabei betheiligt: **Carl Appelius, E. Benary, F. A. Haage jun., Heinemann** und **J. C. Schmidt.** Die Summe der abgesendeten Arten und Abarten beträgt weit über 7000

Von der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin ist der Herr Regierungsrath **Wichura** in Breslau als Botaniker für die genannte Expedition vorgeschlagen und bestätigt worden.

Der bisherige Königl. Garten-Conducteur und Lehrer der K. Gärtnerlehranstalt zu Potsdam Herr **G. Meyer** ist zum K. Hofgärtner ernannt und ihm als solcher die Verwaltung des Marly-Gartens so wie die der Ananas-Treibereien übertragen worden.

Correspondenz-Notizen.

Hrn. J. F. W. B. in Delmenhorst. Das mir übersandte Buch habe ich dem Vereine übergeben.

Hrn. A. W. E. in Charbus. Schon glaubte ich Sie ganz verschollen; es freute mich um so mehr wieder von Ihnen einige Notizen erhalten zu haben, die bestens benutzt werden sollen.

Georginenfreunden.

Ermuthigt durch die so zahlreiche Theilnahme an der Subscription auf meine „Deutsche Sonne" vor 2 Jahren, worüber mir von allerwärts die erfreulichsten Nachrichten zugingen, erlaube ich mir hiermit abermals Georginenfreunden ein Anerbieten zu machen, was vielleicht noch mehr Freude und Genuß darbieten dürfte, da ich dießmal 5 Matadore gewählt, für die ich ebenfalls Garantie leiste, daß sie den Erwartungen gewiß ebenso entsprechen werden, als die Deutsche Sonne, die jedenfalls heuer schon in vielen Gärten Europa's und Amerika's zur Freude jedes Kenners und überhaupt aller patriotischen Blumenfreunde blühen wird.

Ich offerire demnach unten beschriebene, 2 Jahre nach einander approbirte 4 resp. 5 Georginen in Pflanzen für den Subscriptionspreis von Rthlr. 10 —

resp. 12 pränumerando, welcher gelten soll, wenn bis zum 2. März 1860 60 Subscribenten sich gefunden. **Sammlern gebe ich das 7. Exemplar frei.** Die Lieferung kann alsdann schon Anfangs März in Knollen beginnen, später in gut bewurzelten kräftigen Pflanzen. **Für Knollen** jedoch ist der Preis um 5 resp. 6 Rthlr. erhöht. Für Handelsgärtner dürfte Letzteres dennoch von Vortheil sein.

3491. **Deutscher Großmeister.** „Sieckmann". Brillant kupferscharlach, große Prachtblume. 5'.

3566. **Teutonia.** „Sieckmann". Zart blaßisabellenrosa, bei weiterm Blühen dunkler werdend, später lillarosa, groß und reichblühend. 5'.

3670. **Kleiner Hermann.** „Sieckmann". Blaßkirschroth, mit weißen Spitzen, sehr reichblühender. **ächter Liliput.** 4'.

4029. **Wacht am Rhein.** „Sieckmann". Schwarzbrauner Grund in dunkelfeurigcarmoisin übergehend, mit leuchtend hellviolettcarminen, nach Außen lillablauem, oft fast weißgesäumten Rande. Unstreitig die prachtvollste aller bis jetzt erzeugten **Georginen.** 4'.

Um allen Geschmacksanforderungen zu entsprechen, erlaube ich mir auch noch eine gestreifte als Reserve anzubieten. Es steht nun den Liebhabern frei, davon 4 für 10 Thlr. zu wählen oder auch alle 5 für 12 Thlr. zu verlangen.

3858. **Striata germanica.** „Sieckmann". Carminviolett, rosa und carmoisin, sowie grünlich canariengelb und blaßpaille gegenseitig gestreift, bandirt und gespritzt. Die bunteste **Georgine**, die mir bis jetzt zu Gesicht kam. Bei neuester schönster Rosenform. 4'.

Von allen 5 Sorten ist jede in ihrer Art gleich ausgezeichnet und liefert den Beweis, wie stets die Vervollkommnung meiner Georginen-Zucht ihren sichern Fortgang nimmt.

So möge denn auch diese meine Offerte recht zahlreiche Aufnahme finden und das Vertrauen genießen, was mir nun bereits seit mehr als 20 Jahren in diesem Fach zu Theil wurde. Dieß zu erkennen und zu würdigen, werde ich mich stets bemühen.

Köstritz, an der Weißenfels-Geraer Eisenbahn,
im October 1859.

J. Sieckmann.

Kalt flüssiges Baumwachs.

Dieses unübertreffliche BAUMWACHS, zum Bedecken der Brandwunden, Veredeln etc. etc., wird kalt aufgetragen, verhärtet sich in der Luft, als auch im Wasser und wird bei einer Temperatur von 45 ° nicht flüssig. In 1/4, 1/2 und 1 Pfund Blechdosen, grössere Quantität billigst berechnet. Wiederverkäufern angemessenen Rabatt, pr. Comptant zahlbar, Briefe franco.

Darmstadt. **Georg Liebig Sohn.**

Hiesigen Gärtnern steht die Redaction dieser Zeitung mit kleinen Proben dieses Baumwachses zu Versuchen zu Diensten.

Hierbei: Prospectus über **G. Meyer's** Lehrbuch der schönen Gartenkunst.

Berichtigung.

Seite 478, erste Spalte, Zeile 15 von unten lese man statt Lorenz Braun: Lorenz Booth.

Bemerkungen über einige Drosera-Arten Australiens.

Die Drosera-Arten Australiens kommen daselbst nicht wie unsere deutschen Arten auf Moorboden vor, sondern sie wachsen auf trocknen Hügeln, in Thälern oder auf trocknen Wiesen. Nur eine Art, die auch die meiste Aehnlichkeit mit unsern einheimischen Drosera-Arten hat, fand ich in der Nähe von Sidney an den nassen, sandigen Ufern eines kleinen, beständig fließenden Baches.

Drei Arten, die Drosera stolonifera, D. Wittakeri und D. cirrhosa (?), sind durch das ganze südliche Australien verbreitet; ich fand sie sowohl in Süd-Australien, als auch auf den Goldfeldern Victorias. Alle drei Arten haben kleine Knollen von der Größe einer Haselnuß, die 3—6 Zoll unter der Oberfläche des Erdbodens liegen. Nur auf eine kurze Zeit entfalten sie ihre so äußerst zierlichen Blätter und hübschen Blüthen. Mit dem ersten Regen sprossen sie aus dem, bis dahin steinharten Boden empor, was gewöhnlich zu Anfang des Maimonats stattfindet. Die Pflanzen entwickeln sich dann schnell während der Regenzeit und schon im September sterben sie nach den ersten heißen, trocknen Tagen wieder ab, wo sich dann ihr Standort nur noch an den zurückgebliebenen kohlenschwarzen, vertrockneten Stengeln und Blättern erkennen läßt.

Drosera stolonifera Endl. (siehe deren Beschreibung Hamburg. Gartenztg. S. 6 dieses Jahrg.) liebt ganz besonders ein flaches Hügelland, wo sie in den sandigen, im Winter sehr nassen Thälern in großer Menge vorkommt und mit ihren lichtgrünen Blättern und röthlich-weißen Blüthen einen lieblichen Anblick gewährt.

Dracaena (cirrhosa?) ist die schönste und ansehnlichste von allen mir bekannten Arten. Sie treibt einen 1—2 Fuß hohen, fadenförmigen Stengel, der sich an dem niedrigen Gestrüpp in die Höhe rankt, an dem sich die Blattstengel förmlich festklammern. Die Blätter sind dunkelgrün, mit braunrothen Drüsen besetzt. Der Kelch ist mit schwarzen Härchen bekleidet, die Blüthen sind schön weiß und stehen in einer dünnen Rispe an der Spitze des Stengels beisammen. Diese Art wächst hauptsächlich zwischen Steinen auf Bergen und in den Vorwaldungen, weniger in Ebenen. Sie kommt nicht wie die vorhergehende Art in Massen, sondern meist nur vereinzelt vor.

Von diesen beiden hier genannten Arten habe ich noch Samen vorräthig.

Drosera Wittakerii Planch. (Siehe deren Beschreibung der Pflanze auf S. 6 des 1. Heftes dieses Jahrg. der Hamburg. Gartenztg.) Diese Art kommt meistens mit der vorhergehenden vereint vor und zeichnet sich namentlich durch ihre großen weißen Blumen aus. Die Eng-

länder in Australien nennen sie daisy (Marienblümchen), wie sie überhaupt es lieben, die Namen englischer Pflanzen auf australische zu übertragen, wodurch sehr häufig Mißverständnisse stattfinden. So bezeichnen sie z. B. eine Art Exocarpus (pyramidalis?) mit cherry (Kirsche), die Banksien mit honey suckle (Lonicera Caprifolium) u. s. w.

In Bezug auf die Cultur dieser drei Species würde ich rathen, dieselben nur bis nach den ersten Blüthen im Wachsthum zu erhalten und die Pflanzen dann durch allmähliges Entziehen des Wassers zum Einziehen zu nöthigen, da sie sich sonst durch zu langes Treiben und zu reiches Blühen sehr schwächen.

Mit der Mischung des Bodens, wie solche auf S. 6 des 1. Heftes der Hamburger Gartenzeitung von diesem Jahre angegeben worden ist, bin ich vollkommen einverstanden. Hatte man Gelegenheit Samen zu erhalten, so säe man diesen in einen flachen Napf und bedecke denselben mit einer Glasscheibe, auch ist es wegen der Feinheit der Samen anzurathen die Samengefäße nur von unten zu bewässern, indem man sie in einen flachen Untersatznapf mit Wasser stellt.

Eine vierte Art, Drosera (phoenicea), meinem Vermuthen nach eine nur einjährige Pflanze, fand ich auf der Ebene zwischen Adelaide und Gawlertown in Süd-Australien, wo sie in Vertiefungen, die im Winter unter Wasser stehen, vorkommt. Die Blätter stehen rosettenförmig, wie bei D. rotundifolia, der Blüthenstengel ist blattlos und trägt an der Spitze eine kurze Rispe kleiner, niedlicher, scharlachrother Blüthen. Die Blüthezeit dieser Art fällt später als die der vorher genannten Arten, nämlich im September und October.

J. G. Ausfeld.

Der botanische Garten zu Hamburg erhielt im Mai v. J. durch die Güte des Herrn J. G. Ausfeld, seit einiger Zeit jetzt als Handelsgärtner in Arnstadt in Thüringen etablirt, die im Januar-Hefte dieses Jahrg. der Hamburger Gartenzeitung erwähnten Drosera stolonifera und Wittakerii, die, wie auch gesagt, bereits im Juli zu blühen anfingen. Erst im Januar dieses Jahres scheinen die Pflanzen gänzlich in den Ruhestand getreten zu sein und wurden sie deshalb auch ziemlich trocken gehalten. Im Monat April oder Mai wurden die Knollen wieder verpflanzt und erhielten sie dieselbe Behandlung wie im Jahre vorher, aber vergebens wartete ich bis jetzt (Ende October), daß die Knollen kräftig austreiben sollen, obgleich die meisten noch gesund und fest sind. Sehr begierig bin ich nun zu sehen, ob die Knollen noch im nächsten Jahre austreiben werden.

E. D—o.

Einige Mittheilungen und Notizen über die Gärten Dresdens.

Daß es der Boden, je nach dem Gehalte und dem Vorkommen seiner Bestandtheile vorzüglich ist, welcher uns den Pflanzenwachsthum in seinen verschiedenen Formen erscheinen läßt, und uns bald anmuthige, wohlgefällige, bald aber auch wieder dürftige, mangelhafte Gruppirungen vorführt, ist längst erwiesen.

Fassen wir nun aber auch noch besonders die Lage, und die damit verbundenen Temperaturverhältnisse näher ins Auge, so geben sie im Verein, wenn alle Bedingnisse für das Pflanzenreich erfüllt werden, die so lieblichen, anmuthigen und wohlgefälligen Formen des Pflanzenwachsthums, in denen uns manche Gegenden erscheinen. Wie prächtig kleidet die Natur die in günstiger Lage befindlichen Landschaften; wie wohlgefällig bildet sie die romantischen Seenerien, die uns oft Stunden lang zur Bewunderung und zum Staunen hinziehen, und nur immer wieder dazu antreiben, neue Gemälde der Natur aufzusuchen.

Hier erblicken wir, auf dem dürren, der Sonnenhitze ausgesetzten Gestein, eine Menge dürftiger Coniferen (wie z. B. in der sächsischen Schweiz) wo man glauben sollte, der Lebensproceß müßte trotz der wenigen Feuchtigkeit des Gesteins und des wenigen hingewehten Sandes in Bälde aufhören; jedoch mag auch besonders die kühle und feuchte Atmosphäre dazu beitragen, das Leben so vieler Tausenden von Bäumen und Gesträuchen auf solchen ungünstigen Positionen zu erhalten.

Wie ganz anders gestalten sich uns dagegen die Thäler und tiefer geschützt liegenden Gegenden (wie z. B. Tetschen in Böhmen), wo theilweise von Gebirgs- und Felsenwänden umgeben, das Thal gegen Süden offen liegt. Dem ganzen Einfluß der Sonnenstrahlen ausgesetzt, vegetirt hier auf meist fruchtbarem Boden von der durchströmenden Elbe begünstigt, der Pflanzenwachsthum in den üppigsten Formen. Wer den dortigen Park besucht, und die besonders an den Elbufern angelegten Baum- und Strauchpartien näher beobachtet hat, der wird gefunden haben, welche erstaunlichen Dimensionen, sowohl in den Gehölztrieben als auch in der Blätterform, sich dem Auge darbieten.

Hier ein günstiger Sommer, und es entwickelt sich eine Vegetation, im Freien sowohl als auch in den Glashäusern*), die anderwärts mit

*) Die Glashäuser liegen hier auf und an einem, gegen Süden sich abdachenden, terrassenförmig angelegten Hügel. Das Schloß liegt auf einem hohen Steinfelsen, durch welchen hart an der Elbe ein 14 Schritt langer Tunnel durchgehauen ist, und so den einen Theil des Parkes mit dem andern verbindet. Beiläufig sei hier bemerkt, daß, wer die sächsische Schweiz bereist, derselbe sich durchaus so einrichten sollte, in Herrnskretschen das nach Böhmen fahrende Dampfschiff zu benützen, um so zwischen den böhmischen Gebirgen bis Leitmeritz oder Theresienstadt zu fahren. Bis nahe hierher zieht das Gebirge von beiden Seiten, und bietet dem Besucher auf der Elbe, welche in verschiedenen Krümmungen das Gebirge durchfließt, eine Menge interessanter Gegenstände.

So z. B. zwischen Aussig und Leitmeritz, den hier hart an der Elbe, auf einem hohen schroffen Steinfelsen gelegenen, geschichtlich berühmten „Schreckenstein"; und weiter unten vor Leitmeritz die in Ruinen liegende „Kamaldburg". Wie überhaupt sich diese ganze Tour durch romantisch gelegene Landschaften und Dörfer interessant macht.

größter Kunst und auch mit großem Kostenaufwande kaum zu erzielen ist.

So nimmt auch Dresden unter den Städten, denen die Natur durch eine kräftige, anmuthige Vegetation, durch eine vortreffliche Lage begünstigt hat, mit den ersten Rang ein. Nicht allein seine wahrhaft romantische Umgebung, sondern auch seine Kunstwerke, seine Gärten, alles das, wird gewiß von einem Jeden wohl empfunden, und als beachtenswerth und lehrreich, nicht sobald der Vergessenheit überliefert.

Dresdens Gärten waren es, die der veredelten Camellie mit zuerst die weiteste Verbreitung verschafften; und jetzt noch stehen sie, in Bezug auf Handelspflanzen mit oben an. Vorzüglich sind es Camellien, Azaleen und die beliebte Rose, welche Gattungen reichlich und in Tausenden von verschiedenen Exemplaren vorhanden sind. Aber auch den tropischen und anderen gangbaren Handelspflanzen ist Aufmerksamkeit geschenkt, und erblickt man in den Glashäusern und Kästen viele beliebte Gattungen und Arten, die sich theilweise durch gute Cultur auszeichnen. In den Königlichen Gärten sowohl, als auch in denen der Privaten, befinden sich mitunter recht sehenswerthe Exemplare, sowie ansehnliche Collectionen von verschiedenen Schmuck- und Schaupflanzen.

Um nun aber eine mehr wissenschaftlich und zugleich auch geschichtlich interessante Mittheilung über die Gärten Dresdens geben zu können, mögen folgende, dem „Dresdener Anzeiger" entnommene Notizen hier ein Plätzchen finden.

Der prinzliche Garten in der pirnaischen Vorstadt (Anton's-Garten).

Am Eingange einer, auf dem offenen Platze vor dem Schlosse beginnenden schönen Kastanien-Allee stehen zwei Bildsäulen (von Matielli) Herkules und Omphale darstellend, und am Ausgange zwei andere, von demselben Meister, Rom und Athen. In dem nach der pirnaischen Gasse gelegenen Theile des Gartens befinden sich die Gewächshäuser. Das schöne Gartenschloß ist in dem edlen Style des Chevalier de Saxe, nach dem Plane des Landbaumeisters Krubsacius 1764 erbaut; jedoch in neuerer Zeit mehrfach verändert worden. Das Vorhaus ist mit Wandmalereien des Hofmalers Müller und die Decke des Hauptsaales mit Gemälden von demselben Künstler, geziert.

Der Königl. Garten vor dem pirnaischen Thore.

Derselbe nimmt mit seinen Wald- und Parkanlagen einen Flächenraum von 250 Aecker Landes ein, und wurde zuerst 1678 unter Georg II. wesentlich verschönert, mit einer Mauer umgeben und mit 1500 Alabaster-Statuen geschmückt, die jedoch im Kriege 1760 bis auf wenige Ueberreste entführt wurden; in jener Zeit wurden auch die Mauern zerstört. Im Jahre 1813 litt der Garten besonders am 26. August, wo sich die Preußen hinter den hier angelegten Verhauen tapfer gegen die Franzosen vertheidigten. Aber schon im folgenden Jahre wurde eine besondere Commission zu dessen Wiederherstellung berufen, deren unermüdlichen Bemühungen, sowie der Pflege des Hofgärtners Mieth, er seinen jetzigen trefflichen Zustand verdankt.

Die beiden, den Haupteingang zierenden Marmorvasen, mit halberhabenen allegorischen Figuren, die 4 Jahreszeiten und die 4 Welttheile

darstellend, ebenfalls die 2 Marmorgruppen (den die Dejanire entführenden Centaur Nessus darstellend) am Eingange des, das Schloß umgebenden, mit Blumenanlagen verzierten Freiplatzes, sind von dem Venetianer Balestra. Die Zeit, welche die Schönheit entführt, und hinter dem Palais, am Ende des 1715 angelegten, 326 Ellen langen und 113 Ellen breiten Teiches, eine Vase mit Scenen aus Alexander dem Großen sind von Corradini. Das Palais, im Mittelpunkt der sich durchschneidenden Hauptwege, wurde im Jahre 1679–80, durch den Landbaumeister Karger, im Renaissancestyl und aus verschiedenen farbigen Sandsteinen erbaut, und von August dem II. und III. verschönert. Es hat die Gestalt eines H, ist 80 Ellen lang, 60 Ellen breit, drei Stockwerke hoch, und mit Säulen, Basreliefs, Büsten und anderen Verzierungen versehen, sowie mit Kupfer gedeckt. Vor der vordern Freitreppe stehen die Marmorstatuen des Herkules und Silen; das Innere enthält im zweiten Stockwerke einen sehenswerthen Saal, der auf freistehenden Säulen von röthlichem Gypsmarmor ruht, und sich durch akustische Bauart auszeichnet. Die Räume des Erdgeschosses enthalten das Alterthumsmuseum. Zu beiden Seiten des Palais liegen 8 geschmackvolle Pavillons, die als Sommerhäuser vermiethet werden, sowie die Wohnung des Hofgärtners und die Glashäuser. Auf der rechten Seite sind noch Spuren eines ehemaligen Theaters im Freien zu finden, wo früher, als der Garten noch geschlossen war, gespielt wurde. Ein neues Sommertheater ist unmittelbar hinter der großen Wirthschaft, 1856, im geschmackvollen Style erbaut worden, in welchem die Gesellschaft des hiesigen zweiten Theaters, Vorstellungen giebt.

Der Herzogin Garten (an der Ostra-Allee).

Derselbe ist ausgezeichnet durch ein großes Orangenhaus und durch reichhaltige Sammlungen ausländischer Pflanzen. Er verdankt seine Entwickelung und Vervollkommnung in botanischer Hinsicht vorzugsweise dem Hofgärtner Seidel.

Außer dem erwähnten Orangenhause, in welchem die während des Sommers im Zwinger aufgestellten Orangenbäume überwintert werden, enthält dieser Garten noch mehrere Gewächshäuser und eine bedeutende Ananastreiberei. Die stärksten der Orangenbäume wurden von den Professoren Ludwig und Hebenstreit in Leipzig, die im Auftrage August des II. eine naturwissenschaftliche Reise nach Afrika unternahmen, von den nordafrikanischen Küsten als Ballast, und angeblich für des Königs Drechselbank bestimmt, 1730 nach Dresden gebracht, wo von den 400 Stämmen 300 wieder zu grünen begannen. In freier Erde stehen mehrere alte Feigenbäume (Ficus Carica), einen kleinen Hain bildend, die früher bei der Schloßkirche gestanden haben sollen, von denen einer gegen 400 Jahre alt sein kann, da ihn angeblich Herzog Albrecht aus Palästina heimbrachte; die Bäume werden im Winter mit einem leichten Hause überdeckt. Das 400′ lange und 64′ breite, im Innern 14 Ellen hohe, im reichen Renaissancestyl erbaute große Orangenhaus, entstand 1841 nach dem Plane des Hofbaumeisters v. Wolframsdorf. In zwei Nischen am Eingange auf der Ostra-Allee stehen die aus Cottaer Sandstein gefertigten Bildsäulen der Flora und Pomona, (von Hänel). Der

Hofgärtner Seidel besorgt zugleich die geschmackvolle Ausschmückung der parkartigen Zwingeranlagen.

Maximilian's Garten.

Liegt mit dem Palais am Ende der Ostra-Allee, ist von dem Prinzen Maximilian angelegt, und zieht sich bis zum kleinen Gehege. Er ist von bedeutendem Umfange, mit schattigen Parkanlagen versehen, und enthält außer einem reichen Gewächshause, ein Vogelhaus in gothischer Bauart, ein Taubenhaus und eine Einsiedelei. Er ist nur nach vorher erlangter Erlaubniß zugänglich. Das Palais ist 1783 von dem Prinzen Maximilian erbaut, mit einer thurmähnlichen Warte verziert und im Innern mit einer Kapelle versehen. Im Jahre 1838 ging dasselbe nach dem Tode des Prinzen an dessen Haupterben in der Secundogenitur über.

Der Palaisgarten (in Neustadt, hinter dem japanischen Palais).

Derselbe ist Jedermann täglich geöffnet, und gewährt nächst der Brühl'schen Terrasse, von allen Gärten Dresdens die anmuthigste Aussicht. Er zeichnet sich nur durch reichhaltige Baum- und Blumenanlagen und umfängliche Treib- und Gewächshäuser für theilweise seltenere Pflanzen aus, und hat in neuester Zeit unter der Pflege des Hofgärtners Terscheck an geschmackvollen Anlagen bedeutend gewonnen. In der Mitte eines freundlichen Blumengartens, rechts am Eingange vom Kohlmarkte, erhebt sich die Bildsäule einer Flora (von Pettrich).

Der Hoffmannsegg'sche Garten (in Neustadt am Elbwiesenthore).

Dieser ist von dem als Entomologen und Botaniker berühmten Grafen Johann Centurius von Hoffmannsegg 1816 angelegt, und mit besonderer Liebe gepflegt. Er zeichnet sich namentlich durch Reichthum an seltenen, besonders Topfgewächsen, und durch wissenschaftlichen Plan seiner Anordnungen, aus. Der Zutritt zum Garten ist, durch vorherige Meldung bei dem Gärtner, gestattet.

Der Marcolinische Garten (in Friedrichsstadt, Friedrichsstraße).

War früher einer der großartigsten Gartenanlagen; wurde von dem Fürsten von Teschen angelegt, und hatte ehedem einen Flächeninhalt von 30 Scheffeln Aussaat. Er zeichnet sich noch jetzt durch prächtige Baumgruppen aus, und enthält noch eine herrliche Kaskade (von Matielli), Neptun seine Gattin Amphitrite bekreuzend, die ursprünglich 80,000 Thaler gekostet haben soll. Gegenwärtig gehört er zu dem Stadtkrankenhause, das sich jetzt in dem ehedem Marcolinischen Palais befindet, welches 1813 von Napoleon bewohnt wurde.

Obgleich die hier gegebenen Notizen mehr das Ursprünglich-geschichtliche der Gärten in sich fassen, so sind sie dennoch um so schätzenswerther, da nicht einem Jeden, der die Gärten besucht, ein Commentar zur Hand liegt, um sich die hier gegebenen Mittheilungen deutlich zu machen.

Zu einer specielleren Darstellung der vorzüglichsten Pflanzen der Glashäuser und des Freilandes, sowie überhaupt der ganzen Situation insbesondere, bedarf es allerdings, bei so vielen Gärten, eines längeren

Aufenthaltes, der aber nicht von einem Jeden nach Wunsch ausgedehnt werden kann, besonders wenn eine Weiterreise den Besucher auf fernere Punkte hindeutet.

So scheiden wir denn mit einem herzlichen Gruß von dem schönen Dresden, wohl wünschend, daß noch so mancher Naturfreund, wie es schon so Viele vor uns gethan haben, einige Tage oder Wochen in seinen Gärten, in seinen Kunstwerken und in seinen es so prächtig umgebenden Landschaften, eine freudige Erholung finden möge.

Gulden.

Winke zur Orchideen-Kultur.

Herrn Fendler's Bemerkungen zu den von ihm in Venezuela gesammelten Orchideen haben Herrn Dr. Lindley zu einem kleinen Leitartikel in No. 41 des Gard. Chronicle Veranlassung gegeben, der so viel Beachtenswerthes enthält, daß wir nicht anstehen, denselben im Auszuge auch den Lesern unserer Zeitung mitzutheilen, um so mehr, da die Kultur der Orchideen in vielen deutschen Gärten noch sehr viel zu wünschen übrig läßt.

Der Erfolg, heißt es in jenem Artikel, den englische (wir glauben aber auch eben so gut deutsche) Gärtner in der Kultur der Orchideen, die in tropischen oder subtropischen Ländern auf Bäumen oder Felsen wachsen, erzielt haben, liefert einen Beweis von ihrer großen Geschicklichkeit. Pflanzen, die man im Jahre 1820 noch für unmöglich hielt zu kultiviren, hat man jetzt ebenso in seiner Gewalt wie die Eriken und Farrnkräuter. Vor etwa 40 Jahren befanden sich im Königl. Garten zu Kew, an den die britischen Colonien seit länger denn ein Viertel-Jahrhundert ihre Pflanzenschätze einsendeten, mit Ausnahme von Cymbidium sinense und aloifolium, Epidendrum cochleatum, Rodriguezia secunda, Oncidium altissimum und einigen wenigen anderen gewöhnlichen Arten, keine Orchideen. Diese hier genannten waren aber auch schwerer todt zu machen als sie am Leben zu erhalten, während es jetzt überall, man mag hinkommen, wohin man will, Orchideen in Massen giebt.

Jederzeit kann man sich überzeugen, daß bei einigen Gärtnern die Orchideen musterhaft gedeihen, während sie sich bei anderen in einem höchst traurigen Zustande befinden und es läßt sich nicht läugnen, daß die epiphytischen Orchideen mit weit mehr Aufmerksamkeit behandelt werden müssen, als es Viele für nöthig erachten und daß man hauptsächlich auf gewisse Verhältnisse Rücksicht nehmen muß, unter denen sie in ihrer Heimath wachsen. Es genügt nicht, die Orchideen an einem Holzklotz zu befestigen oder sie in Töpfe mit Heideerde, Moos und Holzkohle ꝛc. zu pflanzen, oder die Atmosphäre des Hauses, in dem sie wachsen sollen, beständig feucht zu halten, wie sich viele einbilden. Es ist noch etwas mehr, das gehörig beachtet und studirt sein will, je nach der Natur der Pflanzenart.

Einige Arten wachsen auf Bäumen, einige auf Steinen, andere wieder auf dem Erdboden selbst. Einige sonnen sich in der brennendsten Sonne, andere wuchern an frei gelegenen Stellen der dichtesten Waldungen oder hängen an den Zweigen der Bäume herab. Dann giebt es aber auch noch Arten, die, wie unsere Alpenpflanzen, nur auf den Hochgebirgen existiren können, woselbst ein beständiger feuchter Niederschlag stattfindet, wie z. B. das Epidendrum frigidum, das nur auf feuchten Felsen gedeiht, in einer kleinen Entfernung von der ewigen Schneeregion. Eine kaum angenehmere Region bewohnen auch die Pleurothallis-, Odontoglossum-, Stelis-, Pachyphyllum-, Epidendrum- und Pelipogon-Arten.

Einige interessante Beobachtungen über das Vorkommen verschiedener Orchideenarten sind von dem Autor der „Orchidaceae Lindenianae" gesammelt worden, namentlich über Arten, die in Columbien vorkommen. So soll ein Epidendrum in einer Gegend gefunden worden sein, wo die mittlere Temperatur während des ganzen Jahres nur 40° Fahrh. ist (etwa 3½° R.). Bäume fehlen in dieser Gegend gänzlich, nur Wiesenland ist vorherrschend und Schneefall sehr häufig. Herr Professor Jamieson hat ein Oncidium (nubigenum) in Peru, etwa 14,000 Fuß über der Meeresfläche, gefunden, sehr selten niedriger. Herr Linden erzählt, daß das von ihm gefundene Epidendrum, das, wie bemerkt, nur in geringer Entfernung von der ewigen Schneeregion wächst, beständig mit einem Ueberzuge, die Blume nicht ausgenommen, bekleidet ist, der vielleicht zu Erhaltung dieser Pflanze beiträgt. Es ist eigenthümlich, daß alle Epidendrum-Arten mit nur einer Ausnahme erst in einer Höhe von 5000 Fuß und höher über der Meeresfläche vorkommen und daß die vielen Arten dieser Gattung eine förmliche Reihenfolge bilden bis zum Standorte des E. frigidum nahe der Schneeregion. In gleich hohen Regionen wachsen aber noch eine Menge Pleurothallideae, von denen die Arten der Gattungen Masdevallia, Restrepia, Stelis und Pleurothallis die hervorragendsten Formen bilden, bis zur Höhe, wo die mittlere Temperatur 56° Fahrh. (circa 10° R.) beträgt, wo sie dann anfangen zu verschwinden. Die Arten der Gattung Odontoglossum scheinen mit weniger Wärme fürlieb zu nehmen als die derselben nahe stehende Gattung Oncidium, denn eine Art Odontoglossum wächst in einer Gegend, wo die mittlere Temperatur nur 49° Fahrh. beträgt und wo es selbst zuweilen friert. Alle übrigen Arten sind auf den Gebirgsabhängen vertheilt und erstrecken sich bis zu einer Höhe, wo es nie kühler als 55° Fahrh. (10,4° R.) wird, und gedeihen in keiner heißeren Region als von 80° Fahrh. (21° R.). In einer trocknen, heißen Temperatur von 80° hat man bisher nur eine Odontoglossum-Art, eine Schomburgkia, eine Burlingtonia und eine Jonopsis gefunden. In heißen Ebenen, die mit dem Meere in gleichem Niveau liegen, scheinen Orchideen nicht gut fortkommen zu können.

Wer demnach Orchideen mit Erfolg kultiviren will, muß neben einer praktischen Kenntniß auch noch einen guten Theil Intelligenz besitzen; ohne eine solche ist es unmöglich Orchideen gut zu kultiviren, wie wir dies an so vielen werthvollen Orchideensammlungen sehen.

Mag nun aber das Klima, in dem die Orchideen im natürlichen Zustande vorkommen, noch so verschieden sein, so bleibt die Art und

Weise, die Orchideen zu behandeln in einer Beziehung dennoch bei allen gleich, wovon die unzähligen Massen importirter Orchideen den besten Beweis liefern, und diese gleiche Behandlungsweise besteht darin, daß man die Wurzeln der Pflanzen nie unter die Oberfläche des Materials vergrabe, in dem oder auf dem sie wachsen sollen. Die Wurzeln der epiphytischen Orchideen kriechen auf der Erde oder auf Blättern oder Baumstämmen, worauf sie wachsen, unveränderlich fort. Ihre eigenthümliche schwammige Oberfläche gestattet ihnen nicht anders zu wachsen. Tausende von Beispielen haben dies während der letzten 40 Jahre hinlänglich erwiesen. Daß hier natürlich nicht von Orchideenarten die Rede sein kann, die mit ihren Wurzeln in der Erde zu wachsen angewiesen sind, versteht sich von selbst.

Das Herbarium der Orchideen, die Herr Fendler in Venezuela gesammelt hat, liefert so vortreffliche Beweise dieser richtigen Thatsache, daß es gewiß geeignet erscheint, das Vorkommen der auffälligsten Arten hier zu besprechen.

Gongora Jenischii. Die Wurzeln dieser Art bilden ein schwammiges Stück von 36 Quadrat-Zoll, einige derselben sind so stark wie Krähenfedern, viele sehr lang, andere sehr dünn, eine verwickelte Masse bildend, flach auf einer Baumrinde anliegend, untermischt mit Hypnum und Jungermannia.

Liparis, einige noch unbeschriebene Arten! Der Stamm schlank, mehr als 18 Zoll lang, ohne Blätter, flach gegen irgend einen Gegenstand gelehnt, an dem sich gleich dem Epheu unzählige kleine conische Wurzeln festgesogen haben, die aus der Oberfläche eines jeden Theils des Stammes zum Vorschein kommen. Ein jeder Stamm trägt nicht mehr als 6 oder 7 Blätter.

Maxillaria sp. Die Wurzeln derselben bilden eine schwammige Masse, vermischt mit Jungermannia und dehnen sie sich etwa 6 Zoll weit nach allen Richtungen hin von dem Mittelpunkte der Wurzelmasse aus.

Eine andere Maxillaria, nur 4 Zoll hoch, inclusive der Blätter, hat unzählige drahtartige Wurzeln, die sich nach allen Richtungen von der Pflanze aus 5 Zoll weit verlaufen, theilweise verflochten mit Jungermannia, Trichomanes und vertrockneten Blumen einer Inga-Art. Die Wurzeln der Maxillarien breiten sich in fast allen Fällen auf der Rinde eines Baumstammes, oder Astes, oder zwischen Moos 5—6 Zoll weiter aus, als die Pseudo-Bulben der Art hoch sind.

Eine Warscewiczella, einen Rasen von nur 7 Zoll Höhe bildend, wird durch, sich 10 Zoll weit hinstreckenden Wurzeln festgehalten, die sich fest an der Rinde eines Baumstammes angesogen haben.

Auf gleiche Weise wächst eine herrliche Chondrohyncha, deren Wurzeln sich zwischen Stückchen verrotteten Holzes befinden, an denen sie sich fest angesogen haben.

Zahlreiche Beispiele gleicher Art bietet die Sammlung des Herrn Fendler dar, die alle aufzuzählen nutzlos wäre. Noch eine Stelis purpurascens mag erwähnt werden, deren Wurzeln sich über 3 Yards im Umkreise der Pflanze ausbreiten. Dies sind die Mittel, mit denen die Natur diese tropischen Gewächse zu ihrem Gedeihen ausgerüstet hat, und nach denen sich jeder Kultivateur richten sollte.

Jeder, der Orchideen kultiviren will, sollte erstens bedenken, ob eine

so trockene Atmosphäre, wie sie Fettpflanzen zu ihrem Gedeihen verlangen, sich für Pflanzen eigne, die zu ihrer Erhaltung und Fortkommen eine so feuchte Atmosphäre verlangen, als die in einem Weintreiblasten im Monat Februar ist, und dann zweitens, ob es nicht widernatürlich ist, die Orchideen mit ihren Wurzeln so fest als möglich in einen Topf zu zwingen, deren Wurzeln in den meisten Fällen durchaus keinen Druck vertragen können, sondern frei der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt sein wollen. In sehr vielen Fällen ist das sogenannte »feste Einpflanzen« der Orchideen in Töpfe Ursache des Nichtgedeihens derselben.

Die Gärtnerei in China.

Von Herrn Rodigas.

Nach der Belgique horticole übertragen von F. W. Klatt.

Der glänzende Triumph, den die Diplomatie im Orient erfochten hat, hat lebhaft die Aufmerksamkeit der Industrie und des Handels in Europa erregt und tausend Stimmen haben sich überall in der Presse erhoben, um wetteifernd die Verständigen zu jenen weiten Gegenden zu führen, welche sich mit dem Namen des himmlischen Reiches zieren und deren Bewohner, den dritten Theil des menschlichen Geschlechts bildend, seit Jahrhunderten, ungeachtet der vollständigsten Absperrung von der übrigen Welt, sich selbst genug gewesen sind.

Eine befremdende Sache ist es, daß unter den zahllosen Erwartungen, welche die Eröffnung der chinesischen Häfen auf allen Seiten hat entstehen lassen, der Landbau seine Stelle nicht gefunden hat und seine gewöhnlichen Organe das tiefste Stillschweigen bewahrt haben. Man müßte indessen die wenigen geschichtlichen Bemerkungen absichtlich vergessen, um nicht zu wissen, daß es der Landbau ist, dem China seine lange Dauer verdankt; daß es dieser für das öffentliche Wohl so wichtige Zweig ist, dem beinahe der größte Theil dieses Volkes seinen Geist und seine Arme gewidmet hat; daß diese Wissenschaft, die es die höchste Wissenschaft nennt, bei ihm vor allen andern Wissenschaften geehrt wird und daß endlich er der Gegenstand der beständigen Sorge der Herrscher aller Dynastien geworden und als der Grund des Glücks für das Kaiserreich betrachtet worden ist. Dieser Grundsatz, dessen Wahrheit man bei uns in der That in der Stunde der für den Unterhalt kritischen Fälle nicht geläugnet hat, ist für China alle Augenblicke eine überzeugende Wirklichkeit gewesen; seine gehäufte Bevölkerung hat zu erlangen gewußt, was die Sorglosigkeit ihr nicht zugeführt hätte. Es ist also gar nicht erstaunlich, daß dieses Volk, weit entfernt so stillstehend zu sein, wie man es wohl malen möchte, vielmehr alle Zeit eifrig das gesucht hat, was die Erde fruchtbarer machen könnte, indem es ohne Verzug von dem Unterricht der Erfahrung, der köstlichsten Rathgeberin bekanntlich, Nutzen zu ziehen gesucht hat. —

Wir fragen nur, ob wir nicht eine nützliche Belehrung bei diesem Volk, welches so alt wie die Erde ist, schöpfen könnten. Aber vielleicht wird man uns sagen, es sei vorauszusetzen, daß es da nichts als Stoppeln zu sammeln gäbe, daß wir nichts mehr zu lernen hätten und Meister in dem Landbau geworden wären, daß wir ein Recht hätten, stolz auf die Fortschritte des Pflanzenbaues bei unsern Cultivateuren in Flandern, Brabant und in andern Gegenden zu sein und daß wir endlich jeden Tag Fremde unsere Felder und Gärten mit pompösen Lobsprüchen erwähnen hören? Aber, muß man deshalb sagen, daß künftig alle Veränderungen als unnütz betrachtet werden müßten? Muß man glänzen mit einem unvollendeten Werk, weil man es für vollkommen hält? Wir denken es nicht und wir sagen nur, daß, so lange es eine einzige Verbesserung zu erlangen giebt, die Ruhe eine Schuld sein würde und der Stolz nur Eitelkeit wäre, die sich den Blicken gegenüber in das Geleise kleidet, welches man Routine nennt.

Und in Wahrheit, unser Landbau hat noch viele Verbesserungen zu verwirklichen: die beträchtlichen Fortschritte, welche wir ihn in weniger als einem Vierteljahrhundert haben machen sehen, sind der beste Beweis für diese Behauptung, denn diese Fortschritte sind noch weit entfernt davon, allgemein angenommen zu sein. Denn auf dem Punkt, wo wir angelangt sind, läßt uns der Stillstand rückwärts schreiten und wir möchten gerne glauben, daß der Anstoß, der seit einigen Jahren gegeben ist, fortfahren wird, jeden Tag bessere Erfolge zu erzielen.

Der Landbau, welcher so lange eine Art Handwerk geblieben, das den Gebrauch als Grund hatte, wird sich bald über das Niveau der Kenntnisse erheben, die der Geist mit Vergnügen entwickelt. Es wird nicht mehr der Arm allein sein, welcher arbeitet, es wird auch ganz besonders der Verstand sein, der den andern Wissenschaften und Künsten seine mächtigere Hülfe zu entlehnen verstehen wird. Kommt die Stunde, wo unsere Cultivateure sich nicht mehr zu erniedrigen glauben, wenn sie ein Ohr dem Weisen und Erfahrenen weniger ungläubig neigen, so werden wir auch nicht betrübt sein, wie jetzt, daß man nicht früher daran gedacht hat, den Land- und Gartenbau China's kennen zu lernen und von dem Unterricht eines Volkes Vortheil zu ziehen, welches wesentlich aus Cultivateuren besteht.

Wir setzen uns nun vor, in den engsten Gränzen einige Mittheilungen über den Acker- und Gartenbau China's zu geben. Indem wir wünschen, auf diesen Punkt die Aufmerksamkeit der competenten Leute zu ziehen, werden wir uns anstrengen, die Vortheile sehen zu lassen, die aus einer wissenschaftlichen Darlegung der Erzeugnisse und der Anbaumethoden dieses Landes in Hinsicht unsrer eigenen hervorgehen würden.

Die Quellen, aus denen wir unsere Belehrungen schöpfen können, sind nicht zahlreich, wir führen in erster Linie das gelehrte in Paris 1850 veröffentlichte Memoire von Hervey-Saint-Denys und seine Analyse der großen Encyclopädie Chöou chi thong Khao an, welche letztere aus 78 Büchern besteht, die zusammen 55 Bände in Quarto bilden. Wir nennen dann die Erzählungen des berühmten botanischen Reisenden Herrn Robert Fortune und die Noten, welche so voll des Interesses sind und die in den Garten-Journalen London's, mit Bemerkungen von dem Doctor Lindley veröffentlicht sind, dann einige bota-

nische Werke, welche sich leider nur darauf beschränken, die Pflanzen zu beschreiben und zu classificiren. Das sind fast die einzigen Führer, die wir fragen können.

In der That, wenn auch seit längst vergangenen Zeiten das himmlische Reich in mehr oder weniger nahen Zwischenräumen von kühnen Reisenden, die oft ihre Kühnheit mit dem Leben bezahlten, durchstreift worden ist, wie von den Missionären und unter ihnen ganz besonders von den ebenso gelehrten als eifrigen Vätern der Mission des berühmten Mathieu Ricci; wenn die philosophischen Werke des Confucius (Khong-tseu) übersetzt, kritisirt und zergliedert worden sind; wenn Herr Stanislaus Julien unter andern die Werke des zweiten Philosophen China's, des Mencius (Meng-tseu), veröffentlicht haben wird; wenn Herr Bazin, Professor der chinesischen und orientalischen Sprachen, dem Herrn Baron im Studium der dramatischen Kunst bei den Chinesen vorangegangen ist; wenn endlich die physischen und historischen Wissenschaften, sowie die schönen Künste dieses Volkes den Vorzug erlangt haben werden, die Aufmerksamkeit zu fesseln, so wird es doch immer noch nicht weniger wahr sein, zu sagen, daß andere Interessen als diejenigen des Weisen, fast immer die erste Stelle eingenommen haben. So lange als die handeltreibenden Engländer nur immer auf ihren Handel sehen, die Missionäre, welche von Europa dahin gesandt werden, das Christenthum zu verbreiten, nur an die religiösen Ideen denken, wird der Garten- und Feldbau, diese einfache nützliche Kunst, gar nicht die Blicke derjenigen auf sich ziehen, die nur einen erhabeneren Zweck oder andere Studien, welche auf irgend eine Art den ganzen Geist einnehmen, kennen. Die Erzählungen der Missionäre enthalten wirklich ziemlich zahlreiche Notizen über eine gewisse Anzahl Vegetabilien, merkwürdige Einzelheiten über das Aussehen der Felder im Allgemeinen, Bemerkungen über den Ackerbau; besonders unterhaltend ist in dieser Hinsicht ein Memoire 1654 von dem Jesuiten Boym veröffentlicht, so wie die Schriften des Pater Du Halde, die ganz besonders angeführt zu werden verdienen. Aber diese zerstreuten Bemerkungen, selbst wenn es möglich wäre, sie zu sammeln, sind noch sehr unvollständig. Leicht ist es endlich zu begreifen, daß die einzelnen Mittheilungen fast immer mangelhaft gemacht sind. Denn der wahrhafte Agronom ist seiner Natur nach an den Ort gefesselt, gebunden, so zu sagen genietet an den Boden, den er bebaut, dem er seine Sorgen alle Augenblicke widmet; und die Regierungen, die alles aufbieten, wie es der Fall in Belgien ist, die Cultivateure zu belohnen und zu ehren, die sich in der Ausübung ihrer Kunst auszeichnen, denken nur sehr selten daran, die Männer zu ermuthigen, die weit von ihrem Vaterlande neue Pflanzen suchen, die man benutzen könnte; ganz besonders aber geben sie nicht gern solche Leute ihren diplomatischen Gesandtschaften bei. So hatte die französische Gesandtschaft nach China im Jahre 1844, unter der Regierung Ludwig Philipp's, nur den Auftrag, die Arten der Färbung zu erforschen, um diese Art der Fabrikation wo möglich in Frankreich anzuwenden und ganz neulich noch scheinen die Mächte, welche mit einander vereinigt gegen das himmlische Reich gewirkt haben, nur als einzigen Zweck die Oeffnung der chinesischen Häfen für Jedermann gehabt zu haben. Nur Amerika allein hat bei dieser Gelegenheit an die Agri-

cultur gedacht und die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts Dringenderes gewußt, als aus England den besten seiner botanischen Reisenden, Herrn Fortune, zu entführen und ihm das Geschäft anzuvertrauen, die Anzahl Theepflanzen zu sammeln, welche für die von der amerikanischen Union im Süden seiner Provinzen anzulegende Theepflanzung nöthig sind. Man hat von gewissen Seiten behauptet, daß diejenige Regierung, welche am meisten für die Bebauung des Bodens sorgt, die von Großbritannien wäre. Unsere Meinung ist das nicht, China geht vielmehr in dieser Hinsicht allen andern Regierungen voran. Freilich ziehen diejenigen Staatsmänner, welche die britische Regierung leiten, vor, ohne ihren Schutz dem zu verweigern, was die Landbauinteressen berührt, jene Sorge den Privatpersonen zu überlassen. Wenn Morrison, der Verfasser eines englisch-chinesischen Wörterbuchs, von der Indisch-orientalischen Gesellschaft eine Unterstützung von 250,000 Franken erhält, so ist solches unzweifelhaft in diesem Falle eine Ermuthigung zum Studium der Landbaukunst, weil die meisten chinesischen Bücher sich mit der Kultur beschäftigen, doch ist das nicht die Absicht der Gesellschaft gewesen. Wenn ferner die englische Regierung vor einigen Jahren Herrn Fortune mit einer Bereisung China's beauftragt hat, so hat er besonders den Auftrag gehabt, Pflanzen und Culturfortschritte zu suchen, die man einführen oder anwenden konnte, nicht in England, sondern in Australien und Indien, denn die Hauptstadt will, daß ihre Colonien für sie eine Quelle der größten Reichthümer werden, daß sie Thee, Reis, Seide, Baumwolle im größten Ueberfluß liefern. Indem sie sich vorsetzte, so das Schicksal ihrer unfreien und freien Ansiedler zu verbessern, dachte sie vor allem Andern an ihre Industrie und ihren eignen Handel; der Schutz, den sie der Agricultur bewilligte, lieferte ihr also in derselben Zeit das Mittel, ein beträchtliches Resultat für den Handel zu erlangen.

Es ist hier vielleicht nicht der Ort, daß wir uns noch weiter auf diesen Punkt einlassen, wir fügen indessen hinzu, wie wir beklagen, daß die Leute der Politik so wenig daran gedacht haben, die so häufigen Gelegenheiten, welche sich ihnen darbieten, für die Acker- und Gartenbaufrage auszubeuten. Wir wissen, daß es unmöglich ist, alles zugleich zu erfassen, aber wir gehören zu denjenigen, welche die Agricultur in die reinsten verwaltenden und örtlichen Grenzen einschränken möchten: sie ist eine der größten Interessen des Volkes, das Alles zu gewinnen hat, wenn ihr Horizont sich erweitert.

Jetzt, wo unsre Regierung die Absicht zu haben scheint, eine Gesandtschaft nach China und Japan zu senden, wird es erlaubt sein, die Aufmerksamkeit auf die Zweckmäßigkeit zu lenken, dieser Gesandtschaft einen besondern Mann mitzugeben, der Agronom und Botaniker und beauftragt wäre, die Kultur dieser entfernten Länder zu studiren und dort angebaute, so wie wilde Pflanzen, die man mit Nutzen einführen könnte, zu sammeln, damit Belgien und das westliche Europa aus dem Anbau wo möglich Nutzen ziehen könnte.

Hier stößt uns ein Einwurf auf, der uns wesentlich scheint: die Klimafrage. Wir sind weit entfernt davon, dieser Frage keine Wichtigkeit beizumessen, denn Jedermann weiß in der That, daß jedes Klima seine eigene Vegetation hat, die sich nicht für ein anderes paßt. Es

handelt sich also darum, zu bestimmen, ob ein Theil China's Aehnlichkeit mit uns hinsichtlich des Klima's hat. Ob, um diese Frage zu entscheiden, es hinreiche, die Breiten zu vergleichen, solches verneint uns ein einfacher Blick auf die Karte Asiens. Glücklicherweise bestimmt der gleiche Breitengrad nicht die Gleichheit des Klima's. „Man hat bemerkt, sagt Hervey, daß Peking, beinahe auf derselben Breite wie Neapel, eben so strenge Winter hat, wie Upsala in Schweden; das Thermometer steht da während 3 Monate unter Null und es ist gar nicht selten, es unter 20° zeigen zu sehen, während die Milde der Winter in Neapel sprichwörtlich ist.“

„In Canton selbst, sagt ein englischer Reisender, Herr Ball, obwohl schon in der intertropicalen Zone, giebt es keinen Winter, in dem es nicht während einiger Tage fröre und die Oberfläche der stillstehenden Gewässer sich nicht mit einer Eisrinde von beträchtlicher Dicke belege.“ Ausführlichere Einzelheiten sind unnütz, da die eben angeführten Mittheilungen hinreichen, uns zu zeigen, wie das weite China außerordentlich verschiedene Klimate einschließt und eine Zone hat, die der unsrigen ähnlich ist, wenigstens was die Resultate anbetrifft. Wenn die eben mitgetheilten Belehrungen uns gefehlt hätten, würden wir nicht gezögert haben, unser obiges Urtheil zu fällen, denn wir würden aus verschiedenen Thatsachen, die uns nun beschäftigen sollen und die ausschließlich der Horticultur angehören, eben so geschlossen haben.

Das himmlische Reich umschließt verschiedene Breiten und besitzt daher, wie wir schon gesagt haben, sehr verschiedene Klimate; in gewissen Zonen kann das Klima vielleicht mit dem Belgiens verglichen werden. Um diese Behauptung zu beweisen, werden wir Hülfe bei der Blumencultur suchen, und wir werden das um so lieber thun, als wir da nicht nur gegeben finden, was in den Gegenstand eingreift, der uns beschäftigt, sondern weil auch die Blumencultur sich so fest an andere Culturzweige anschließt, weil sie mit ihnen, so zu sagen, unzertrennlich verbunden ist, daß sie mitarbeitet am Glück der Völker. Dieser Gedanke hat schon Zeit und Erfahrung zur Stütze, und die meisten Geographischen Gesellschaften, auch die der fremden Länder, haben solches wohl begriffen und in ihren Arbeiten und Abhandlungen Früchte und Blumen unter dem Titel Feld und Gartenproducte vereinigt. Glücklicher als ihre Verwandte ist die Gartenkunst, das geschmeichelte Kind des Glücks geworden. Sie ist wunderbar von dem Zufall beglückt geworden, denn der Luxus hat sie zur Bundesgenossin angenommen, die schönen Künste haben sie bis in ihre Tempel zugelassen und demzufolge hat sie einen wichtigen Platz in dem Handel erlangt. Um den unersättlichen Wunsch nach Neuem und Schönem zufrieden zu stellen und zugleich zu erregen, haben die Vorsteher der Garten-Etablissements von einiger Ausdehnung sich in die Nothwendigkeit versetzt gesehen, in die entferntesten Gegenden unermüdliche Sammler zu senden, denen wir die Wiedererscheinung von verlornen Typen schulden, welche die Botaniker früher gekannt haben, so wie die Einführung einer großen Zahl köstlicher Pflanzen, von der Wissenschaft bis dahin übersehen. Der Geschmack an Blumen ist tief in die Sitten unserer Jetztzeit gedrungen und wir sind nicht mehr gezwungen, wie früher, unsere Bewunderung den glänzenden aber wenig zierlichen Tul-

pen von Haarlem, oder den undankbaren Ranunkeln oder den einförmigen Cactusarten zu widmen, welche jetzt in das Hinterzimmer eines niedern Kaufmanns und in die ärmliche Kammer des Künstlers verbannt sind.

Wir sind weit entfernt daran zu glauben, daß unsere Zeit oder unsere botanischen Gärten erst das einzige Privilegium hätten, einige Exemplare von chinesischen Pflanzen zu besitzen. Wohl seit vielen Jahren schon haben einige Arten begonnen, sich allgemein auszubreiten. Die Hortensien (Hydrangea hortensis DC.) haben seit längst den Liebhabern Vergnügen gewährt, dasselbe ist der Fall mit der großblüthigen Lichtnelke (Lychnis coronata Thbg.), mit der japanischen Birne (Chaenomeles japonica Pers., Pyrus japonica Hort.) und sehr vielen andern Pflanzen gewesen, deren Ausdauer in unserm Klima hinreichenden Beweis liefern, daß man nicht des italienischen Himmels für diese exotischen Gewächse bedarf. Unsere persönliche Erfahrung hatte uns das längst gelehrt. Wir bemerkten nämlich schon in unserm ersten Pflanzenkatalog, in Saint-Trond 1838 veröffentlicht, „Es ist nicht ohne Interesse zu bemerken, daß mehrere schöne Pflanzen, die man nicht als fürs freie Land gehörend kennt, sehr gut der strengen Kälte des letzten Winters bei einer Laubbedeckung von nur 3 Zoll widerstanden haben. Es sind: Agrostemma Bungeana, Rehmannia sinensis, Nuttallia grandiflora, Lilium longiflorum, Epimedium macranthum u. s. w.“ Die meisten Pflanzen, welche wir damals anführten, haben China und Japan als Vaterland.

Wie viele Arten, die eine schöner als die andere, sind nicht seitdem gewonnen? Wer kennt nicht wenigstens jetzt einige dieser Pflanzenerzeugnisse, die Sensation in der Gartenwelt gemacht haben und deren Einführung eine der schönsten Erinnerungen dieser 20 letzten Jahre bildet? Gewiß, keine Periode ist fruchtbarer für die belgische Gartenkunst gewesen!

Mit welcher erstaunlichen Schnelligkeit hat man nicht sich diese Muster der Flora Japans, die reiche Schiffsladung eines berühmten Reisenden, in Gent 1830 ausgeladen, verbreiten sehen!

Von der niederländischen Regierung, wie so viele Andere vor ihm, beauftragt, die holländische Flotte in der Eigenschaft eines Arztes, der die Freiheit hatte, in Japan zugelassen zu werden, zu begleiten, hatte von Siebold mit seinen besondern Kenntnissen in der Botanik Vortheil zu ziehen gewußt und sich mit Ausdauer befleißigt, alle die Gewächse aufzusuchen, die sich vortheilhaft nach den vereinigten Provinzen senden ließen. So brachte er von seiner Reise eine Ausbeute von einer großen Reichhaltigkeit und bemerkenswerther Mannigfaltigkeit.

Unglücklicherweise hatten mehrere Kisten während der Reise ins Meer geworfen werden müssen und als dann der Rest in Belgien ankam, war die Revolution in vollem Gange und von Siebold, der so vielen Gefahren anderer Art die Stirn geboten hatte, wagte es nicht, seine Zukunft unserer National-Unabhängigkeit anzuvertrauen.

Er zog sich eiligst nach Leiden zurück, indem er seinen Schatz, die Frucht so vieler Arbeit, dem botanischen Garten in Gent ließ. Unter den Händen der Gärtner, welche durch übertriebene Sorgfalt vielleicht, Alles unberührt, aber auch ohne Sorgfalt in den Speichern des Etablissements ließen, überlebten nur einige Arten dem neuen Mißgeschick.

einige vermehrten und verbreiteten sich von selbst und kamen, man weiß nicht wie, bis nach England, zum großen Nachtheil des wahren Einführers.

Die Gärtnerei schuldet Herrn von Siebold eine tiefe Erkenntlichkeit. Sie wird nicht vergessen, daß er es war, der die schönsten Lilien einführte: das Lilium speciosum Thunb., mit lanzettlichen Blättern, und großen, wohlriechenden, weißen oder rosarothen, roth oder purpurfarbig punctirten Blüthen; die japanische Lilie, Lilium Japonicum Thunb., mit großen Rispen weißer Blüthen; die japanische Tagblume, Funckia subcordata Spr. und mehrere andere Arten dieser niedlichen Lilien mit dichtem Laub und reizenden Blüthen. Dann die schönen Zaunreben, Clematis florida Thb., mit großen, weißen, einfachen oder doppelten Blüthen; Clematis Sieboldii Don, deren Blüthen an die Passiflora erinnern; Clematis patens Dne., deren Blüthen vom schönsten Azurblau bis zu dem zartesten Blau und reinstem Weiß variiren. — Dazu kommen noch die Formen von Camellia japonica L., unter andern die C. Donkelaarii und die C. ochroleuca, welche die Samenzüchter erweckt und die Reihe jener prächtigen Varietäten, mit so gefüllten und verschieden gefärbten Blüthen eröffnet haben, die von der Kunst noch alle Jahre vervollkommnet werden, obgleich man glauben möchte, daß das Ideal schon erreicht wäre.

Wir könnten dieß Verzeichniß verlängern und Pflanzen des Kalthauses, des Warmhauses und des freien Landes aufzählen, Orchideen, Palmen, Ahorn, Feigen, Ulmen und endlich Pflanzen allerlei Art, die ungeachtet ihrer japanischen Abstammung, häufig in China angetroffen werden. Wir würden unterhaltende Entdeckungen, von anderen Reisenden gemacht, in das Gedächtniß zurückrufen können, aber zahlreichere Anführungen würden uns zu weit abziehen, wir würden auch nicht fertig werden, sollten wir uns selbst nur auf eine Uebersicht der Expeditionen der bekanntesten Reisenden beschränken wollen.

Wirklich haben die reisenden Botaniker in andern Gegenden ähnliche Excursionen und Nachsuchungen gemacht, wie von Siebold und Thunberg in Japan. Europa hat nach verschiedenen Punkten der Erdkugel nach Kenntnissen strebende Menschen geschickt, die in allen Klimaten solche Pflanzen gesucht haben, welche die Botaniker bewundern und vor denen sie ausrufen: Die Werke des Herrn sind groß! Während Watson, Vogel, Boissier u. s. w. in Africa landeten, haben van Houtte, Galéotti, Kegel, Linden, Hartweg, Ghiesbrecht und andere die beiden America durchstreift; J. D. Hooker und Campbell Indien durchreist und auch China hatte seine Forscher, unter andern Abel Clarke, W. Griffith und besonders Robert Fortune, die eine specielle Besprechung verdienen.

Wir haben in dem Vorhergehenden 3 oder 4 Pflanzenarten angeführt, welche unsere Gärten seit einer gewissen Zeit schon China entlehnt haben, wir müssen jetzt noch dazu bemerken, daß es dieses Land ist, dem wir einen beträchtlichen Theil unserer schönsten Zierpflanzen schulden. Wir begnügen uns einfach einige der bekanntesten unter denen, welche wir vorzüglich erziehen, anzuführen. Wir erinnern, daß es China ist, das uns die baumartige Gichtrose gab, (Paeonia moutan Sims), diese Perle in der Krone Flora's, die Belgien vervollkommnet hat und von der wir so glücklich gewesen sind, ausgezeichnete Varietäten,

mit außerordentlichen Blüthen von der reichſten Färbung zu erhalten. Dann die krautartigen Gichtroſen, wie die chineſiſche Gichtroſe (Paeonia sinensis Hort.) mit faſt unübertrefflichen Farben und in den Blumengärten ſo große Wirkung erzeugend. Dann kommt die großblumige Wucherblume (Pyrethrum sinense Sieb.), deren Varietäten unendlich ſind; die blaublüthige Tagblume (Hemerocallis coerulea And.); der Herbſt-Sturmhut (Aconitum autumnale Paxt.), deſſen große Riſpen mit zahlreichen weißen und blaßblauen Blüthen den ſchönſten Schmuck der ſpäten Jahreszeit bildet; die bemerkenswerthe Dicentra (Dielytra) spectabilis DC., deren zarte roſa Blüthen, mit Violett und gelblichem Weiß gemiſcht, eine gerechte Bewunderung erregen und allgemein beliebt geworden ſind, wobei ihre Dauer und die Leichtigkeit ihrer Vermehrung noch hervorzuheben ſind; die japaniſche Diervilla (Weigelia rosea Lindl.), deren roſa Blüthen, in Bouquets von der Natur vereinigt, in Belgien vom Mai an mit unſern Lilien ſich öffnen; die chineſiſche Glycine (Wisteria sinensis DC.), deren Zweige mit zartem Laub zweimal im Jahre lange Trauben von azurblauen, blaßblauen oder weißen Blüthen tragen, welche einen lieblichen Duft verbreiten; die Bleiwurz der Dame Larpent (Plumbago Larpentae Lindl.), welche durch ihre herbſtlichen Blüthen in zahlreichen achſel- und gipfelſtändigen Büſcheln vom ſchönſten Kobaldblau mit einem violetten Uebergang zu unſern ſchönſten Errungenſchaften für das freie Land geworden iſt.

Nennen wir endlich die Aster sinensis L., die ſo edel ihren gemeinen Namen Königin Margarethe trägt, und die man alle Jahre mit Vergnügen ſäet, weil ſie immer eine überreiche Ernte ausgezeichneter und verſchiedenartiger Blüthen giebt.

Wir begnügen uns mit dieſen Arten, ſo zu ſagen zufällig unter tauſend andern eben ſo verdienſtlichen, ohne dabei auf die Rückſicht zu nehmen, die nur in der Temperatur der Gewächshäuſer aushalten können und mit denen wir uns gar nicht beſchäftigen wollen. Es wird das, was wir geſagt haben, hinreichen, um zu zeigen, daß China Pflanzen erzeugt hat, die ſchon bei uns naturaliſirt ſind, die ſich vollkommen der Temperatur unſerer ſo veränderlichen Jahreszeiten angepaßt haben, ohne daß es nöthig geweſen wäre, ſie dem zu unterwerfen, was einige von uns die Fortſchritte der Acclimatiſirung genannt haben. Die Reihe der Zierpflanzen, welche wir aufzählten, ſo unvollkommen ſie iſt, wird uns doch eine Idee von dem Reichthum der chineſiſchen Flora geben können.

Um das, was wir über die Blumencultur China's geſagt haben, zu endigen, halten wir es für nützlich, einige Zeilen über die Gärtnerei hinzuzufügen.

Alle europäiſchen Reiſenden haben, nach Harvey, nicht umhin können, ihre Bewunderung den Blumengärten Cantons und anderer Städte zu zollen. Chambers malt uns in ſeinem Buch über die Gärtnerei im Orient (Disertation on oriental Gardening, London 1772) dieſe Gärten als im Kleinen die Landſchaften des Landes darſtellend. Wenn die Chineſen, ſagt er, eine Art Schönheit in der Anordnung ihrer Gärten heraus gefunden haben, ſo iſt ſie nur daher entſtanden, weil ſie genau eine ſonderbare aber maleriſche Natur copirt haben. Die ſchroffen Felſen, welche zu ſtürzen drohen, die über Abgründe führenden

Brücken, die verkrüppelten Fichten, welche einzeln an den Seiten der abschüssigen Berge stehen, weite Seen, reißende Ströme, schäumende Wasserfälle, einige sich senkrecht in diesem Chaos erhebende Pagoden, das sind chinesische Landschaften im Großen und chinesische Gärten im Kleinen. Andere Reisende sind indessen weit entfernt, diese wilde Schönheit anzuerkennen, mehrere von ihnen erklären, daß man sich nicht leicht in Europa eine Idee von der kleinlichen Sorgfalt, die die Chinesen nicht allein auf jeden Theil ihres Gartens und auf jede Pflanze insbesondere, sondern auf jeden Zweig und jedes Blatt verwenden, machen kann. Folgt man ihnen, so bietet jeder Garten unveränderlich dieselben gleichförmigen Alleen, dieselben Beete von Buchsbaum umgeben, dieselben Bäume und Sträucher, übereinstimmende Blumen, ja dieselbe Anordnung der Verzierungen und wenig zahlreich endlich dieselben Steinbänke. Die Einzelheiten, welche sie uns geben, können uns diese Gärten in gewisser Hinsicht mit den presbyterianischen Land-Gärten in Belgien vergleichen lassen, wenn wir davon im ausgedehntesten Maße die kleinliche Sorgfalt abziehen, mit der wir hier im allgemeinen sehr geizig sind. — Demungeachtet gestehen wir nicht begreifen zu können, wie man in der Regelmäßigkeit der chinesischen Blumengärten etwas Lächerliches hat finden können: man hat die Schultern über ihre Bambus mit spiralförmig gedrehten Zweigen gezuckt; man hat eine Verachtung ohne Grenzen darüber gezeigt, daß ihre Ulmen sich nicht über einen Metre erheben und daß sie im Kleinen ihnen ihren eigentlichen Habitus zu erhalten wissen, man hat gesagt, daß ein System, welches in einer Art Mißhandlung der Pflanzen existire, und darin bestehe, sie zu verkleinern, sie verkrüppelt zu halten, ihre Blüthe vor der gewöhnlichen Blüthezeit herauszulocken, glänzendere und sonderbare Farben bei den Blüthen zu erzeugen, eine mangelhafte und schlechtverstandene Culturmethode anzeige.

Ohne eine starke Bewunderung für diese praktischen Verschiedenheiten auszusprechen, geben wir doch zu, daß wir in ihnen nicht so gar Abweichendes finden, und daß wir uns wohl hüten werden, sie als lächerlich darzustellen, in der Furcht, daß irgend ein solcher Ausdruck indirect auf die Werke und Arbeiten unserer Gärtner zurückfallen möchte.

Hat man schon die mathematische Gleichförmigkeit der Irrgänge vergessen, die man französische Gärten nannte? Stellt sich weniger Gleichförmigkeit in den chinesischen Gärten dar? Bieten die Orangen mit spiralförmig gedrehten Zweigen nicht ein schlagendes Gegenstück zu den chinesischen Bambus? Glaubt man, daß die genau abgerundeten Köpfe einer Menge Sträucher und Bäume, welche unsere Gärten schmücken, daß die absonderlichen Formen, welche den Lorbeeren, Buchen, Cypressen, dem Buchsbaum gegeben wurden, sich nicht auch von den ursprünglichen Formen der Natur und dem Wachsthum dieser Pflanzen entfernen?

Man lacht über die kleinen mit Citronen beladenen Bäumchen, welche die Chinesen in Töpfen kultiviren; ohne Belgien zu verlassen, kann man bequemer dasselbe Schauspiel haben. Man gehe nach Gent und da wird man bei einem einzigen Gärtner zu Ledeberg zwei große Treibhäuser voll dieser kleinen Citronenbäume finden. Und gar nicht zu seinem alleinigen Vergnügen erzieht dieser Handelsgärtner diese Pflanzen zu Hunderten, sondern weil er in dem Verkauf derselben seinen

Vortheil findet. Sind die kleinen Ahorn, welche die Chineſen zu Kugeln ſchneiden, befremdender als die Zwerg-Acacien, die alle Jahre geſchoren werden und mit denen der gewöhnliche Mann ſeinen kleinen Garten zieren kann? Die Formen, welche man ſeit einiger Zeit nach einer Art Uebereinkommen ſich zwingt, den Camellien, Azaleen ꝛc. zu geben, ſind ſie ſo natürlich und lieblich, daß man ſich gerechterweiſe über die practiſche Gärtnerei des himmliſchen Reiches luſtig machen dürfte?

Nein, es iſt ungerecht dieſelbe ins Lächerliche zu ziehen und gewiſſe gärtneriſche Kunſtgriffe der Chineſen zu verdammen. Was vielmehr am meiſten in Erſtaunen ſetzen muß, iſt, auf ſo beträchtlichen Entfernungen und bei ganz andern Völkern Sachen zu finden, die mit unſeren ſo viele Aehnlichkeit haben. Dieſe Bemerkung konnte dem berühmten und unglücklichen Lapéroufe nicht entgehen, als er an den Küſten von Mandehourie, eine der größten Provinzen des chineſiſchen Kaiſerreichs landete. „Wir begegneten, ſagte er, bei jedem Schritte Roſen, Lilien, Maiblümchen; wir pflückten in großer Menge Zwiebeln, Sellerie, Sauerampfer und andere Pflanzen, die denen auf den Wieſen Frankreichs ähnlich waren; die Fichten ſchmückten die Gipfel der Berge, die Eichen wuchſen an den Seiten; die Ufer der Flüſſe waren mit Weiden, Birken, Ahorn bepflanzt und an dem Saum der großen Wälder ſah man Apfelbäume und Azerolenbäume in Blüthe, dicht umgeben mit Nußſträuchern, Kohl und andern Gemüſen in Blüthe“, Alles ſtellte ihren Blicken eine lebhafte Erinnerung an ihr Vaterland dar, das weder er noch ſeine Gefährten jemals wieder ſehen ſollten.

Gartenbau-Vereine.

Hildesheim. Die Ausſtellung des hannoverſchen Gartenbau-Vereins zu Hildesheim am 18., 19., 20. und 21. September d. J.

Wir müſſen vorab dem hannoverſchen Gartenbau-Vereine das rühmliche Zeugniß ertheilen, daß er während der kurzen Zeit ſeines Beſtehens Beweiſe großer Lebensfähigkeit und Energie gegeben hat, indem er trotz der geringen Geldmittel, welche ihm zu Gebote ſtehen, bereits fünf Ausſtellungen veranſtaltete, die immer das ſchöne Bild einer umfaſſenden Thätigkeit gewährten und mancherlei wohlthätig nachwirkende Anregungen, ſelbſt nach entfernten Gegenden hin, hervorriefen. Dieſe lebendige Thätigkeit verdient gewiß um ſo mehr hervorgehoben zu werden, als der Verein lediglich und allein auf ſich ſelbſt angewieſen und ihm bislang regierungsſeitig keinerlei Unterſtützung zu Theil geworden iſt, während den land- und forſtwirthſchaftlichen Vereinen aus den Staatsmitteln reiche Gaben zufließen, ohne daß es gerade erſichtlich geworden wäre, daß die Wirkſamkeit der letztgedachten Vereine die des Gartenbau-Vereins übertroffen hätte. Von unſerm Standpunkte aus hegen wir auch gar nicht den Wunſch, den thätigen Gartenbau-Verein durch fremde Elemente unterſtützt zu ſehen, eben weil ein Verein um

so lebensfähiger wird, je mehr er auf eignen Füßen steht und je weniger er sich seiner Selbstständigkeit entäußert, was doch mehr oder weniger dann eintritt, wenn ihm aus den sogenannten Agriculturfonds regierungsseitig Mittel zufließen. Wir glaubten diese Bemerkung um so weniger unterdrücken zu dürfen, als einmal eines Theils einige Mitglieder des hannoverschen Gartenbau-Vereins die Lust anwandelte, Anträge auf öffentliche Unterstützung auf die Tagesordnung zu bringen, andren Theils es Vereine genug giebt, die, statt auf sich und die Ihrigen zu sehen und alles Heil von der innern Entwicklung und Kräftigung zu erwarten, nach oben schielen und ganz gegen die naturgemäße Regel, da ernten möchten, wo sie nicht gesäet haben. — —

Auch die diesmalige Ausstellung im hiesigen Schauspielhaussaale bot des Interessanten und Wichtigen genug dar. Indem wir uns indeß enthalten, zu speciell in unserem Referate zu verfahren und namentlich das Exterieur, das beiläufig den Anordnern alle Ehre machte, auszumalen, wollen wir, ehe wir die verschiedenen Branchen der Ausstellung durchgehen, nur bemerken, daß die, in den 3 vom Vereine gewählten Preisrichtern constituirte Jury in der That nichts zu wünschen übrig ließ; sie bestand aus dem selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus weithin gefeierten Pomologen, Superintendenten Oberdieck aus Jeinsen, Königreich Hannover, aus dem thätigen Hofgartenmeister Erblich zu Herrenhausen und unserm trefflichen Nelkenisten, Waisenhaus-Inspector Palandt. Wir notiren hier sogleich, daß diese Triumvirn, nach einer sehr ins Detail gehenden Inspicirung der Ausstellung im Allgemeinen ihr Verdict dahin abgaben, daß der Gesammteindruck der Ausstellung ein höchst befriedigender gewesen und letztere sich ebenbürtig den bessern Exhibitionen des Vaterlandes anreihen könne.

Mit Recht verdient besonders betont zu werden, daß sich die Königliche Wegbau-Inspection Hildesheim, wie bei frühern Ausstellungen, so auch diesmal durch eine zahlreiche und wohlgewählte Collection Obst betheiligt hatte. Sie war durch den um den Obstbau in hiesiger Gegend so verdienten und für die Zwecke des Gartenbau-Vereins so überaus thätigen Vereins-Secretär, Wegbau-Aufseher Butterbrodt ausgelegt worden und bestand aus 55 Sorten Aepfel und Birnen, — unstreitig das Schönste und Gediegenste, was die Ausstellung aufzuweisen hatte. Nach Ansicht der Kenner, namentlich nach einstimmigem Urtheile der Preisrichter, hätte dieser Collection zweifelsfrei der erste Preis gebührt, schon weil das Obst zu einer recht vollkommnen Ausbildung gelangt war, was um so mehr hervorzuheben ist, als die Temperatur-Verhältnisse des abgewichenen Sommers der Obstentwickelung bekanntlich durchaus ungünstig waren. Inzwischen erschien es nach den Principien des Vereins unthunlich, einer Behörde — der Wegbau-Verwaltung — einen Preis zuzuerkennen.

Eine zweite Collection, aus 60 Sorten bestehend, von unserm Pomologen, Superintendent Oberdieck ausgestellt, zog schon nur deshalb die vollste Aufmerksamkeit namentlich aller Kenner auf sich, weil alle Sorten durch jenen Meister der Obstcultur ihre richtige Bezeichnung gefunden. Den ihm zugedachten Preis hatte Oberdieck abgelehnt.

Ein fast nicht geringeres Interesse erregte das von dem Gärtner Bürger aus dem Garten des Klostergut Marienrode bei Hildesheim

angebrachte, an Spalieren gezogene, feine, kostbare Tafelobst, das schon durch sein Exterieur anzog und von dem Oberdieck erklärte, daß dasselbe demjenigen Obste vollkommen ebenbürtig sei, welches Frankreich, der Sitz des feinsten Obstes, aufweisen könne.

Eine vierte größere Obstcollection stammte aus dem Garten des Baumzüchters Borges zu Rössing im Fürstenthum Hildesheim und bestand aus 25 Sorten gut ausgebildeter Aepfel und Birnen, die von dem Fleiße Kunde gaben, den auch der hiesige Landmann auf die Obstcultur zu verwenden sich beeifert.

Indem wir minder Wichtiges übergehen, erwähnen wir noch der Pfirsiche des Kunstgärtners Enger und des Inspectors Palandt zu Hildesheim; namentlich waren dieselben vortrefflich ausgebildet und die Palandt'schen boten nach Ansicht der Kenner eine angemessene Auswahl für das hiesige Klima dar.

Außerdem war, wie man in diesem Jahre wohl erwarten konnte, die Ausstellung sehr reich mit Wein beschickt. Interessant war es, durch die seitens des Waisenhaus-Inspectors Palandt eingeschickten sieben Sorten Trauben die verschiedenartigsten Weine vertreten zu sehen. Diese Trauben waren nicht allein sehr perfect, sondern auch in solcher Fülle gewachsen, daß wir an einer nicht großen Rebe deren 28 in dicht besetzter Reihe zählten. Neben diesen Trauben zeichneten sich die des Dr. phil. Michelsen (Diamant) durch merkwürdig dicke Beeren aus, was in gleichem Maße von den durch den Fabrikanten Thormeyer in Hildesheim ausgelegten Trauben, namentlich von dessen Muscat rouge Geltung hat.

Auch an Gemüsen fehlte es nicht und wir freuen uns bemerkt zu haben, daß das Publikum dem Gemüse eine gleiche, ja man darf sagen eine größere Aufmerksamkeit zuwandte, als den das Auge doch immerhin stärker anziehenden Kindern Floras. Wir finden darin eine Bestätigung mehr, daß die Ausstellungen angefangen haben, ihr Gala- und Paradekleid auszuziehen und das zu werden, was sie eigentlich sein sollen und müssen, — eine Schule des Guten, Nützlichen und Schönen, das sich dann auch immerhin in das Gewand einer entsprechenden Decoration hüllen mag. — Wir erwähnen hier zunächst der Einsendungen der Herren Moschkowitz & Siegling zu Erfurt, die sich durch besondere Nettigkeit und Gediegenheit auszeichneten. Wir zählten u. A. 8 verschiedene und mit Nomenclatur versehene Sorten Salatbeete. Daneben hatten Gärtner und Private aus hiesiger Stadt und Provinz ein so reichhaltiges, gut gewähltes und kräftiges Material angebracht, daß es den Preisrichtern offenbar Mühe machte, das Beste vom Besten zu krönen.

Gehen wir raschen Schrittes zu den Blumen über, von denen an Topfgewächsen folgende hervorstechende Pieces aufgestellt waren:

Von dem Kunst- und Handelsgärtner Sperling in Hildesheim außer Warmhauspflanzen eine große Anzahl blühender Pflanzen, als: Lantanen, Eriken und Fuchsien, letztere in mehr als 40 der neuesten Sorten vertreten; an englischen Sorten: British Sailor, eine elegante Varietät von graciösem Bau, Guiding Star, Kitty Tyrell, Masaniello, eine in Bezug auf Farbe und Form besonders hervorzuhebende Varietät, Prince Frederic William of Prussia, Queen of the Sea, Rose of Cu-

stille, letztere von entschiedenem Effect; an französischen Sorten: Agnes Sorel, atropurpurea, Béranger, cheiranthiflora, Madame Miellez, tricolor ꝛc.; deutsche Sorten: Peter der Große, schöne Mecklenburgerin, sowie endlich verschiedene Sorten aus dem Vorjahre. Daneben prangten die Begonien desselben Ausstellers sowohl durch Schönheit, als auch durch Zahl und Cultur. Besonders hervorzuheben waren: Begonia Rex, xanth., Reichenheimi, splendida, splend. argentea, Lazuli, Miranda, Mad. Wagner, Prince Trubetskoy, rutilans, picta vera, annulata.

Zogen diese Collectionen die Augen der Laien und Kenner gleich stark auf sich, so fesselten die durch den Kunstgärtner Enger aus dem Garten des Fräulein Lunzel zur Ausstellung gebrachten Warmhauspflanzen sehr kräftigen Aussehens Aller Blicke. Auch hier waren es wieder besonders die Begonien, die den Vorrang einnahmen und von denen wir folgende Sorten notirten: argentea, guttata, Madame Verschaffelt, Rex, Regina, xanthina splendida, xanth. Reichenh., xanth. gundavensis, splendida argentea, picta vera ꝛc. Von den übrigen Pflanzen verdienen noch hervorgehoben zu werden: Solanum discolor, Musa paradisiaca, ornata, rosacea, Cavendishii, Dacca und zebrina. Ferner erwähnen wir noch einerseits einer ausgezeichneten Gruppe Cultur- und Warmhauspflanzen des Kunstgärtners Marheinecke, welcher in kurzer Zeit seinem jungen Etablissement einen Ruf zu verschaffen verstand, und der sehr kräftigen Warmhauspflanzen aus dem funfzig Morgen großen Garten des Grafen von Benningsen-Bautelu, die der thätige und umsichtige Gartenmeister Heicke von dort angebracht hatte: Musa, Begonien, Dracaena, Colocasia. Auch ist nicht zu übersehen, daß die Herren Moschkowitz & Siegling in Erfurt durch 16 Begonien, worunter zum Theil das allerneueste, durch eine Achimenes Roezlii und eine Tydaea Eckhautii; von Begonien splendida var. Knerckii, argentea und Victoria die Aufmerksamkeit erregten; wie denn diese Herren unsere Ausstellungen bereits mehrfach mit ihren werthvollen Producten beschickt haben.

Mit besonderer Genugthuung erwähnen wir nun noch die Georginen, welche aus der großen und berühmten Sammlung des Buchdruckers Kircher vorlagen, deren schöner, vollkommener Bau, so wie ihre Farbenpracht Bewunderung erregte. Man konnte an diesen Blumen deutlich wahrnehmen, welche hohe Stufe die Georginenkultur erreicht hat; wir fanden in dieser Collection die neuesten Sorten von der Größe eines Viergroschenstückes bis zu einem halben Fuß im Durchmesser und dies veranlaßte viele Besucher der Ausstellung, den Kircher'schen Garten in Augenschein zu nehmen, wo der Blüthenreichthum besonders der Bouquet- oder Liliputgeorginen, die selbst für den kleinsten Garten sich eignen, das Auge fesselte, abgesehen von der Farbenpracht, ja man kann sagen dem Farbenmeer, das dem Beschauer entgegenleuchtete und sich vom reinsten Weiß bis zum schönsten Rosa, vom brillantesten Scharlach bis zum tiefsten Schwarzbraun, vom leuchtendsten Gold bis zum tiefsten Orange spiegelte.

Nach dem Programm sollten ausgezeichnete und vom Aussteller selbst kultivirte oder angefertigte Gegenstände vom Vereine durch Diplome in drei Classen: 1. für Gemüse, 2. für Obst und Obstbäume, 3. für Blumen und Pflanzen und 4. für Gartengeräthe und Ornamente

prämirt werden. Die drei vom Vereine erwählten Preisrichter haben nun ihr Urtheil dahin abgegeben, daß Preise erhielten:

I. Für Gemüse: den ersten Preis die aus dem Garten der Frau Amtsräthin Meyer zu Marienrode von Herrn Gärtner Bürger eingelieferte Collection Gemüse; den zweiten Herrn Färber Schliecker zu Hohenhameln für eine Collection Kartoffeln und Gemüse, und den dritten Preis Herrn Gartenmeister Schmidt zu Söder für Gurken und Kürbisse u. s. w., wobei jedoch die vom Herrn Sanitätsrath Dr. Meyer in Hildesheim eingesandte Collection Kürbisse, so wie die von den Herren Moschkowitz & Siegling in Erfurt eingeschickten 11 Sorten Salatbeete, 16 Sorten Carotten und 6 neue Sorten Gurken und 3 Sorten neue Flachsarten gleiche Anerkennung verdienten.

II. Für Obst: den ersten Preis der genannte Herr Gärtner Bürger aus Marienrode; den zweiten Herrn Baumzüchter Borges zu Rössing; der dritte Preis hat wegen Mangels geeigneter Obstarten nicht vertheilt werden können, wobei jedoch ausdrücklich hervorgehoben wurde, daß die Königl. Wegbauverwaltung wegen der durch Herrn Wegbauaufseher Butterbrodt eingesandten großen Collection von Obst, das bei dem fehlenden Raume nur zum Theil ausgelegt ist, wohl der erste Preis gebührt, jedoch principmäßig nicht zu ertheilen gewesen sei, und außerdem bemerkt wurde, daß dem Herrn Superintendent Oberdieck für eine Collection ausgezeichneter Aepfel, Birnen, Pflaumen und Pfirsiche unzweifelhaft der erste Preis und dem Herrn Inspector Palandt für Weintrauben und Pfirsiche der dritte Preis gebühre, wenn sie die Preise nicht abgelehnt hätten; so wie, daß die von den Herren Director Kuhlgotz, Dr. Michelsen und Fabrikant Thormeyer eingeschickten vorzüglichen Weintrauben, unter welchen der von Herrn Thormeyer eingelieferte Muscat rouge besonders hervorzuheben sei, gerühmt sind.

III. Für Blumen: den ersten Preis Herrn Kunst- und Handelsgärtner Sperling in Hildesheim für seine zahlreichen Gewächshauspflanzen, insbesondere Begonien, Philodendron, Palmen, Dracänen, Fuchsien u. s. w.; den zweiten Preis Herrn Kunstgärtner Enger aus dem Garten des Fräulein Lüntzel für die schönsten Blattpflanzen, als Musa, Begonien, die mit denen des Herrn Sperling in gleicher Pracht stehen, und viele andere Gewächshauspflanzen; den dritten Preis Herrn Factor Kircher in Hildesheim für seine herrlichen Georginen; den vierten Preis, drittes Diplom, Herrn Kunstgärtner Marheinecke in Hildesheim für seine gut cultivirte Collection verschiedener Gewächshauspflanzen, als: Cyperus, Canna discolor, Centaurea ragusina u. s. w.

IV. Für Gartengeräthe: den ersten Preis Herrn Klempnermeister Schulze zu Hildesheim; den zweiten Herrn Mechanikus Becker daselbst; der dritte Preis für Ornamente fällt aus.

Daneben darf das allgemeine Urtheil der Preisrichter und vornehmlich der Herren Superintendent Oberdieck und Hofgartenmeister Erdlich nicht unberührt bleiben, daß nicht nur die ganze Anordnung der Ausstellung ihre volle Anerkennung habe, sondern auch vorzüglich zu loben sei, daß verschiedene Theilnehmer derselben durch Kultur einzelner Zweige, wie die Wegbauverwaltung durch die Obstbaumzucht, der Factor Kircher durch seine Georginenflor, Inspector Palandt durch seine

Nelkenflor, die möglichſte Vollkommenheit der Zwaige erzielen, wie dieſes auch auf die Obſtplantagen des Herrn J. C. Lucke hierſelbſt Anwendung finde, und daß endlich ſo viele Privaten durch ihre Mitwirkung, durch Mittheilung der ſchönſten Blumen und Gewächſe u. ſ. w. zur Ausführung und Ausſchmückung der Ausſtellung wohlwollend beigetragen haben.

Frankfurt am Main. Die Gartenbau-Geſellſchaft **Flora** zu Frankfurt a/M hat ſo eben den 11. Jahrgang ihrer Protokollauszüge und Verhandlungen (pro 1858) herausgegeben (Selbſtverlag der Geſellſchaft, Frankfurt a/M, J. Ch. Hermann'ſche Buchhandlung. Preis 14 Sgr.) 1859. — Wie die vorhergehenden Jahrgange enthält auch dieſer wiederum unter den Protokollauszügen der einzelnen Verſammlungen eine Menge belehrender und beachtenswerther Notizen, wie am Schluſſe ſehr ſchätzbare Abhandlungen von verſchiedenen praktiſchen Gärtnern eingeliefert, ſo z. B. über die Erziehung der Champignons von Herrn **Alois Keller**; eine Tabelle über die Zucht der Seidenraupen vom Auskriechen aus dem Ei bis zum Einſpinnen, von demſelben Autor; dann von Herrn **E. Ibach** über Vermehrung der Roſen durch Stecklinge; von Herrn **A. Neder jun.** über die Cultur der **Primula chinensis fl. pl.** Herr **J. G. Schmidt** berichtet über: wie wachſen Stecklinge von Mooſroſen ꝛc. am beſten. Dieſen Abhandlungen folgen Berichte über das Abſterben der Bäume und Sträucher durch den trockenen Sommer in verſchiedenen Gegenden unweit Frankfurt's, wie mehreres andere. Zu bewundern bleibt es aber, daß trotz der großen Anzahl von praktiſchen Gärtnern, die der Verein unter ſeinen Mitgliedern zählt — denn über die Hälfte derſelben ſind Gärtner — nicht mehr ſchriftliche Arbeiten für die Verhandlungen des Vereins im Laufe eines Jahres eingehen, was auch mit Bedauern von dem derz. Vorſitzenden deſſelben im Jahresberichte hervorgehoben wird. Es herrſcht aber nun einmal bei den meiſten deutſchen Gärtnern eine gewiſſe Scheu, ihre gemachten praktiſchen Erfahrungen zu Papier zu bringen. Um wie viel belehrender würde nicht auch jede deutſche Gartenzeitung ſein, wenn nur ein kleiner Theil der vielen Hunderte von tüchtigen, erfahrenen Gärtnern jährlich ſeine Erfahrungen den Redactionen verſchiedener Gartenſchriften oder den Gartenbau-Vereinen für deren Verhandlungen mittheilen wollte, ſo ſind aber die Herausgeber von Gartenſchriften faſt nur auf ſich ſelbſt angewieſen. —

Die Gartenbau-Geſellſchaft **Flora** hat ſich in jeder Beziehung eines frohen Gedeihens zu erfreuen, das Vermögen derſelben, das hier wie überall die Hauptrolle ſpielt, hat, wie man aus dem Jahresberichte erſieht, ſich nicht unerheblich vermehrt, ebenſo die Zahl der Mitglieder. Möge der Verein, der nur klein aber praktiſch begann, jetzt ſchon geſtärkt durch Einigkeit und Eintracht feſt und ſicher daſteht, auch fernerhin gedeihen und eine immer größere Ausdehnung erlangen.

Einen Uebelſtand dürfen wir jedoch nicht ſtillſchweigend übergehen, der uns leider beim Durchleſen der ſonſt ſo intereſſanten Verhandlungen dieſer Geſellſchaft ſtörend in den Weg getreten iſt, nämlich die höchſt fehlerhafte Schreibart einer ſehr großen Menge der lateiniſchen botani-

schen Pflanzennamen, von denen mehrere selbst so entstellt sind, daß nur ein Geübter im Stande ist sie zu entziffern, wie z. B. Cunyllus avellana, soll heißen Corylus Avellana u. dergl. m. Statt der am Schlusse des Heftes angeführten 4 Druckfehler könnten wir mindestens 4 Seiten voll aufführen. Jeder Gartenbau-Verein sollte es sich mit zu seiner Hauptaufgabe machen, nach Kräften beizutragen, daß die zu ihren Ausstellungen eingehenden Pflanzen nur unter richtig geschriebenen Namen aufgestellt werden dürfen, es ist dann aber auch unbedingt nothwendig, daß die Herren Aussteller die Namen ihrer ausgestellt gewesenen Gewächse in den von dem Vorstande des resp. Vereines herauszugebenden Berichten richtig geschrieben lesen. E. D—o.

Magdeburg. Der Magdeburger Gartenbau-Verein wird am 15. April 1860 eine Ausstellung von Blumen, Pflanzen und Gemüsen eröffnen und hat derselbe zu diesem Zweck in seiner 160. Versammlung nachstehendes Programm genehmigt, das vom Vorstande unterm 7. September veröffentlicht worden ist. Es lautet:

§ 1. Die Eröffnung der Ausstellung ist auf Sonntag den 15. April 1860 Morgens 11 Uhr, der Schluß auf Dienstag den 17. April Abends 7 Uhr festgesetzt.

§ 2. Der Eintrittspreis beträgt an den beiden ersten Tagen 5 Sgr. für die Person und am letzten Tage 2½ Sgr.

§ 3. Es ist ein Jeder ohne irgend eine Ausnahme berechtigt Blumen, Pflanzen, Gartenwerkzeuge, Vasen, Modelle ꝛc. einzusenden und zu concurriren; es wird jedoch vorausgesetzt, daß die einzusendenden Gegenstände der Art sind, daß solche sich für den beabsichtigten Zweck eignen. Sollte dies namentlich bei Pflanzen nicht der Fall sein, so sind die Ordner berechtigt, die Annahme derselben zu verweigern.

§ 4. Alle einzusendenden Gegenstände — mit Ausnahme von besonders empfindlichen Pflanzen — müssen bis zum Schlusse der Ausstellung dort verbleiben und am 18. April wieder abgeholt werden, da an diesem Tage die Garantie des Vereins aufhört. Sämmtliche Pflanzen- und Ausstellungsgegenstände sind gegen Feuersgefahr bis zu diesem Tage versichert.

§ 5. Jeder Einsender hat 8 Tage vor der Ausstellung dem Vorstande Anzeige zu machen, wie viel er an Pflanzen oder sonstigen Ausstellungsgegenständen einzuschicken gedenkt, um danach die benöthigten Räume bemessen zu können.

§ 6. Die Gegenstände der Preisbewerbung bleiben Eigenthum der Besitzer. Sind ausgestellte Pflanzen oder sonstige Gegenstände verkäuflich, so ist der Preis derselben dem nach § 7 erforderlichen Verzeichnisse beizufügen, und wird der Vorstand die Vermittlung übernehmen, wenn der Besitzer den Verkauf nicht selbst bewirken will.

Die zur Preisbewerbung beigebrachten Pflanzen müssen in Gefäßen gezogen sein und mindestens seit drei Monaten sich in dem Besitze des Ausstellers befinden, was auf Verlangen nachzuweisen ist.

§ 7. Die deutlich zu etiquettirenden Pflanzen und sonstigen Gegenstände sind, von einem doppelten Verzeichnisse begleitet und mit Namen und Wohnort versehen, abzuliefern.

Unter diesem Verzeichniß ist auch der Werth der Feuerversicherung anzugeben.

Nur Gemüse und abgeschnittene Blumen werden noch am ersten Ausstellungstage bis früh 8 Uhr angenommen.

Nicht rechtzeitig eingehende Gegenstände sind von der Preisbewerbung ausgeschlossen. Auf verspätete Einlieferung von Auswärtigen soll jedoch billige Rücksicht genommen werden.

§ 8. Das Arrangement der Ausstellung übernehmen die von dem Verein ernannten Ordner, welche allein berechtigt sind die einzuliefernden Gegenstände anzunehmen, die dazu erforderlichen Räume anzuweisen und den Empfang in dem Duplikat des Verzeichnisses zu bescheinigen. — Die Aufstellung der Ausstellungsgegenstände kann jeder selbst übernehmen oder auch den Ordnern überlassen.

Wer sich nicht rechtzeitig meldet, muß den Platz nehmen, der noch übrig ist resp. ihm angewiesen wird.

§ 9. Für Transportkosten kann keine Entschädigung gewährt werden.

§ 10. Das Preisrichteramt wird aus sieben von dem Verein zu erwählenden Personen bestehen, unter welchen sich kein Aussteller, der auf einen Preis für sich reflectirt, befinden darf, und können dieselben eine Gruppe oder Pflanzen ꝛc. nur einmal prämiiren. — Zu einem gültigen Beschlusse müssen mindestens fünf Preisrichter anwesend sein.

§ 11. Die Preisrichter werden am ersten Ausstellungstage früh zusammentreten, ihr fassen aber erst Beschluß bei Eröffnung der Ausstellung. Nach Mittheilung desselben an den Vorstand werden die gekrönten Gegenstände besonders bezeichnet. — Kein Preisrichter kann wegen der Preisvertheilung von einem Aussteller zur Verantwortung gezogen werden.

§ 12. Preise, welche die Preisrichter nicht zu vertheilen in den Fall kommen, fließen in die Vereinskasse zurück; die Preisrichter haben aber auch das Recht, die ausgefallenen Prämien auf andere Ausstellungsgegenstände zu übertragen, falls genügende Veranlassung dazu vorhanden ist. — Eben so sind dieselben berechtigt, ehrende Anerkennungen über Leistungen auszusprechen.

§ 13. Mit dieser Ausstellung soll gleichzeitig mit Genehmigung der betreffenden Behörden eine Blumenverloosung verbunden werden, über welche, so wie über die Räume, in denen die Ausstellung stattfindet, die Namen der Ordner und der Preisrichter, und eine etwaige Veränderung der Tage der Ausstellung eine spätere Bekanntmachung vorbehalten wird.

§ 14. Nachbenannten Gegenständen sollen, **jedoch nur im Falle wirklicher Preiswürdigkeit**, nebenbezeichnete Preise zuerkannt werden:

A. Gruppen.

1) a. Für die schönste Gruppe blühender oder nicht blühender Pflanzen ein Preis von 8 ℳ, b. für die nächstbeste 7 ℳ, c. für die nächstbeste 6 ℳ, d. für die nächstbeste 5 ℳ, für die nächstbeste 4 ℳ, für die nächstbeste 3 ℳ.

2) Für eine Zusammenstellung blühender Rhododendron in mindestens 12 Sorten oder Varietäten 5 ℳ.

3) Für eine Aufstellung blühender Cinerarien in mindestens 12 Spielarten 4 ℳ.

4) a. Für eine Zusammenstellung blühender Azaleen in mindestens 12 Sorten 4 ℳ, b. ein Accessit 3 ℳ.

B. Neue Einführungen.

5) a. Für eine neue oder zum ersten male hier ausgestellte Pflanze, gleichviel ob blühend oder schöne Blattform 4 ℳ, b. ein Accessit 3 ℳ.

6) Für eine neue, zum ersten male hier blühende Abart oder Blendling 3 ℳ.

C. Schaupflanzen.

7—11) Fünf Preise für Einzelpflanzen, welche blühen oder sich durch schöne Blattform auszeichnen, à 3 ℳ.

D. Getriebene Pflanzen.

12) a. Für die bestgetriebenen Pflanzen oder Sträucher irgend welcher Familie oder Gattung 3 ℳ, b. ein Accessit 2 ℳ.

13) Für die beste Aufstellung getriebener Zwiebelgewächse 2 ℳ.

E. Gemüse.

14) a. Ein Preis für das beste Gemüse in mindestens 5 bis 6 Sorten 5 ℳ, b. ein Accessit 3 ℳ.

F. Obst.

15) a. Für das schönste und reichhaltigste Sortiment gut aufbewahrten Obstes eigener Zucht 4 ℳ, b. ein Accessit 2 ℳ.

G. Abgeschnittene Blumen.

16) Für den am geschmackvollsten geordneten Blumentisch 3 ℳ.

17) Für die beste Zusammenstellung abgeschnittener Blumen 2 ℳ.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet oder beschrieben in anderen Gartenschriften.

Richardia albo-maculata *Hook.*

Aroideae.

Kunth trennte die Aroideengattung Richardia der südlichen Hemisphäre von der Gattung Calla L., größtentheils heimisch in Europa und Amerika der nördlichen Hemisphäre. Bisher war nur eine Art der ersteren Gattung bekannt, nämlich die alte Calla aethiopica des Bot. Mag. t. 832 (Richardia africana Kth. des Vorgebirges der guten Hoffnung). Die hier genannte Art ist nun die zweite Art, die Sir W. Hooker zu gleicher Zeit von den Herren Backhouse in York und von den Herren Veitch erhielt, von Natal stammend. In Folge der weißgefleckten Blätter hat sie Hooker albo-maculata genannt, ob diese Flecke nun von Beständigkeit sein mögen, läßt Hooker noch dahingestellt sein. Der Habitus der Pflanze ist von dem der alten Calla aethiopica sehr wenig verschieden.

Bot. Mag. tab. 5140.

Evelyna Caravata *Lindl.*

(Serapias Caravata Aubl., Cymbidium hirsutum W., Sobralia? Caravata Lindl., Evelyna lepida Rchb. fil.)

Orchideae.

Eine mehr botaniſch intereſſante als ſich durch Schönheit auszeichnende Orchidee, die von Dr. Poeppig auf ſeinen Reiſen in Peru vor vielen Jahren entdeckt worden und die zu Ehren des John Evelyn, eines ſehr großen engliſchen Patrioten des 17. Jahrhunderts, benannt worden iſt.

Wir ſahen dieſe Pflanze mehrfach blühend in der Sammlung des Herrn Conſul Schiller, wo ſie unter dem Namen Evelyna Caravata kultivirt wird. (Vergl. Hamburg. Gartenztg. pag. 56.)

Bot. Mag. tab. 5141.

Pentstemon centranthifolius *Benth.*

(Chelone centranthifolia Benth.)

Eine ſehr hübſche Art aus Neu-Californien, von wo ſie von dem verſtorbenen Douglas eingeführt worden iſt. Die Blumen ſind von brillanter ſcharlachrother Farbe und etwa einen Zoll lang.

Bot. Mag. tab. 5142.

Spraguea umbellata *Torr.*

Portulaceae.

Dieſe ſehr ſonderbare Pflanze iſt eine Bewohnerin von Californien, und zuerſt von Colonel Frémont an der Mündung des Rozah-Fluſſes an dem Fuße der Hügel der Sierra Nevada des nördlichen Californiens entdeckt worden. Dr. Torrey nannte ſie zu Ehren des Herrn Iſaac Sprague in Cambridge, Maſſachuſetts, eines wohlbekannten Botanikers und Droguiſten, auch bekannt durch die ſchätzbaren Illuſtrationen der Genera der Vereinigten Staaten von ihm ſelbſt und Herrn Aſa Gray.

Herr Veitch erhielt dieſe Art neuerdings durch ſeinen Reiſenden Herrn W. Lobb und war ſie von ihm in der Juli-Ausſtellung ausgeſtellt geweſen. Die Pflanze empfiehlt ſich als ein elegant blühendes, zwergig wachſendes Gewächs und dürfte ſie ſich namentlich zu Felſenpartien empfehlen. (Siehe auch S. 506 der Hamburg. Gartztg.)

Bot. Mag. tab. 5143.

Laelia xanthina *Lindl.*

Eine neue und ſchöne Orchidee aus Braſilien mit großen gelben Blumen und weißer roth geſtreifter Lippe. Sie hat viel Aehnlichkeit mit L. flava des Bot. Reg. 1842, tab. 62, jedoch iſt ſie viel ſchöner und größer.

Bot. Mag. tab. 5144.

Momordica mixta *Roxb.*

(Momordica Cochinchinensis Spr., Murica cochinchinensis Lour.)

Cucurbitaceae.

Erſt in neuerer Zeit iſt dieſe Pflanze von Moulmain in Kew durch den Herrn Rev. Pariſh eingeführt worden. Die männlichen Blumen ſind ſehr groß, mehr als 4 Zoll im Durchmeſſer, von ſtrohgelber Färbung. Die Früchte groß, oval-gerundet, roth, mit weichen Stacheln beſetzt, mehrere große Samen enthaltend. Bot. Mag. tab. 5145.

Cochliostema odoratissimum *Lem.*

(Tradescantia odoratissima Hort.)

Die Illustration horticole, die auf Taf. 217 eine Abbildung dieſer recht hübſchen Pflanze giebt, ſagt, daß Herr Amb. Verſchaffelt in Gent dieſelbe von Herrn Veitch in Chelſea erhalten habe und ſoll ſie während zwei Monaten ununterbrochen in großer Fülle und Pracht bei ihm geblüht haben. Die Blumen ſind groß, violett-blau und ebenſo geſtrichelt auf weißlichem Grunde nach dem untern Theile der Blumenblätter zu. Jede einzelne Blume währt einen Tag, ſich am Morgen öffnend und am Abend ſchließend, da jedoch die ganze Blüthenrispe aus einer Menge Blumen beſteht, ſo währt die Blüthezeit der Pflanze trotz der kurzen Dauer der einzelnen Blumen dennoch wie angegeben über zwei Monate. Außerdem verbreiten die Blumen noch einen angenehmen Duft.

Von wo dieſe Pflanze ſtammt, darüber konnte Herr Verſchaffelt nichts erfahren, Herr Veitch will ſie vor einigen Jahren auf dem Continent unter dem Namen Tradescantia odoratissima gekauft haben; ein Name, den dieſe Pflanze jedoch nicht führen kann noch darf, indem ſie nichts mit einer Tradescantia noch mit irgend einer andern Gattung dieſer Familie gemein hat, weshalb Herr Profeſſor Lemaire ſich genöthigt ſah, derſelben obigen Namen beizulegen. Beſchreibung und Analyſe der Pflanze ſiehe Illust. hortic. VI, 9. Liv.

Herr Verſchaffelt kultivirt die Cochliostema odoratissimum in einem mäßigen Warmhauſe, etwas ſchattig in einer compacten Erdmiſchung, gut drainirt. Die Vermehrung geſchieht ſehr leicht durch Seitenausläufer.

Begonia Charles Wagner (*hybrida*).

Taf. 218 der Illustr. hortic. bringt eine Abbildung dieſer recht hübſchen Begonie, eine der jetzt in faſt allen bedeutenden Gärten ſo zahlreich vertretenen, wenig von einander verſchiedenen Formen. Herr Verſchaffelt erzog ſie durch künſtliche Befruchtung der Begonia Rex mit B. Miranda, letztere eine auf ähnliche Weiſe erhaltene Hybride.

Rose Impératrice Eugénie (*hybrid. remont.*).

Eine Roſe von vorzüglicher Schönheit, die der berühmte Roſenzüchter Pierre Oger zu Caen gezüchtet und die auf der Ausſtellung

der Central-Gartenbau-Gesellschaft von Caen und Calvados die Medaille erhalten hat. Auf dieser Ausstellung fiel diese Rose der Kaiserin von Frankreich bei ihrem Besuche besonders durch ihre Schönheit auf und in Folge dessen wurde ihr auch mit der Erlaubniß der Kaiserin deren Namen beigelegt.

Der Strauch ist sehr reichblühend; die Blume mittelgroß und ganz gefüllt, kugelrund, von zartem Weiß im Centrum, mit rothem Anflug beim Oeffnen der Blume, später schneeweiß werdend. Die Knospen sind von außen roth punktirt. (Illust. hortic. Taf. 219.)

Dianthus Verschaffeltii *(hybridus)*.

Eine hübsche hybride Nelke mit einfachen in Bouquets stehenden Blumen, deren Blumenblätter weiß mit einem brillanten carminrothen Fleck nach dem Schlunde zu gezeichnet sind und deren Saum fein gefranzt ist. 10—12 solcher Blumen bilden immer ein Bouquet. Die Pflanze hat den Habitus des D. arboreus von der Insel Kreta, oft erreicht sie selbst die Höhe von 3 Fuß. (Illust. hort. Taf. 220.)

Pilocarpus pennatifolius *Lem.*

Dioscoreae.

Ein Strauch von 8—10 Fuß Höhe, verästelt, der Stengel grasgrün, bedeckt mit kleinen weißen Warzen und dreieckigen Markirungen der abgefallenen Blätter. Die zusammengesetzten Blätter sind zuweilen dreipaarig gefiedert, zuweilen aber auch vierpaarig, dann giebt es aber auch andere, die nur aus einem Blatte bestehen, das am Ende eines langen Stengels steht.

Herr Professor Lemaire ist der erste, der in seinem Jardin fleuriste (1852) diesen Strauch, den Herr Libon im Jahre 1847 in einem Walde bei Villa Franca (Brasilien) entdeckt hatte, erwähnte und ihn damals als eine sehr seltene Pflanze empfahl. — Seitdem hat nun der Pilocarpus pennatifolius im Jahre 1850 im bot. Garten zu Leiden geblüht und da es eine sehr empfehlenswerthe Pflanze ist, ließ sie Herr Garteninspector Witte in seinen Annales d'Horticulture T. Liv. 8 sehr gut abbilden, zugleich eine ausführliche Beschreibung gebend. — Die Blüthenrispe ist endständig, sehr lang, oft 1—2 Fuß, bedeckt mit unzähligen kleinen purpurrothen Blüthen. — Es ist eine Pflanze, die wohl einer baldigst größeren Verbreitung werth wäre.

Laelia Casperiana *Rchb. fil.*

Orchideae.

Eine eigenthümliche Neuigkeit, die in der Mitte zwischen der Laelia crispa und L. purpurata steht. Die Blüthe ist milchweiß, die Säule vorn mit Purpurflecken, die Lippe vorn purpur vorgestaßen. Diese Art blühte im Garten des Herrn Geh. Obermedizinalrath und Professor Casper in Berlin, dem sie gewidmet ist, kultivirt von Herrn Obergärtner Schmidt. (Wochensch. f. Gartn. u. Pflanzenk.)

Cattleya Isabella Rchb. fil.

Ebenfalls eine Neuigkeit. Die dicken Bulben, die kleinen festen Blätter und dazu eine ganz neue Farbenzusammenstellung von Gelb mit Purpur zeichnen diese Art aus.

Unter Kultur des Herrn Obergärtner Boysen blühte dieselbe im Garten der Herren James Booth & Söhne in Flottbeck.

(Wochensch. f. Gartb. u. Pflanzenk.)

Cordyline indivisa *Kunth.*

Cordyline indivisa Kth. ist, wie Dr. Hooker in seiner Flora of New Zealand angiebt, eine ganz verschiedene Pflanze als die, welche unter diesem Namen oder auch als Dracaena indivisa in den Gärten geht, und jetzt durch die Herren Lee zu Hammersmith zum ersten Male eingeführt worden ist.

Dr. Hooker sagt, er hätte nur einen einzigen Baum in der Nähe der Niederlassung von Canterbury gefunden und beschreibt ihn als einen der schönsten Bäume der dortigen Wälder, er trage eine schirmartige Krone, bestehend aus mehreren Köpfen langer (oft 3 Fuß) Blätter. Die Farbe der letzteren ist ein bronzenes Gelbgrün und die hervortretende Mittelrippe, an der Basis des Blattes ziemlich breit, leuchtet durch ihre carmoisine Färbung. Ueber 100 Meilen weit im Umkreise wurde das Land nach anderen Exemplaren dieser Art durchsucht, allein kein zweites wurde gefunden.

In der Beschreibung dieser schönen Art in der Flora of New Zealand I, 258 heißt es: „Sie bewohnt die nördlichen und mittleren Inseln, Dusky-Bay nach Forster; den Fuß der Gebirge Ruahine nach Colenso; Thomson's Sund nach Lyall. Die Eingeborenen nennen den Baum: Tikapu. — Der Stamm wird 10 Fuß hoch, nach Colenso 20 Fuß hoch, der Mittelfaser, fast 1 Fuß im Durchmesser, ungetheilt. Blätter sehr dick und lederartig, 4—5 Fuß lang, 5 Zoll breit, oft bläulich auf der unteren Seite. Blüthenrispe 4 Fuß lang, straff, hängend. Die einzelnen Zweige 8—10 Zoll lang, sehr steif, dicht besetzt mit gestielten Blumen. Die Blüthenhülle weiß, glockenförmig; die Segmente oblong, ⅛ Zoll lang, zurückgebogen. Herr Colenso sagt, daß die Faserit des Stammes dieses Baumes viel gebraucht werden zu Matten und Decken, Toii genannt, von denen eins im Museum zu Kew ausgestellt ist.

(Gard. Chron.)

Rhododendron Fortunei *Lindl.*

Herr Glendinning, der bekannte Handelsgärtner zu Turnham Green, besitzt seit einigen Jahren ein ausgezeichnetes Rhododendron, verschieden von allen bis jetzt bekannten Arten. Obgleich es noch nicht geblüht hat, so zeigen die Blätter schon, daß diese Art in den Gärten nicht bekannt ist. Diese sind genau oblang, völlig flach, etwa 6 Zoll lang und 2½ Zoll breit, eher herzförmig und zugespitzt. Sie sind dunkelgrün, haben keinen Glanz auf der Oberseite und sind weiß auf der unteren. Der Blattstiel ist dick, purpurn und etwa ¾ Zoll lang. Der

es noch nicht geblüht hat, so kann über die Blumen noch nichts gesagt werden, dennoch hat es Dr. Lindley benannt, damit es nicht mit andern verwechselt werden möge, da es ohne Zweifel bald in den Handel gegeben wird. Am nächsten steht diese Art wohl dem Rh. campanulatum, obschon sie völlig verschieden von diesem ist, hat aber den Vorzug, daß sie so hart ist wie das Rh. ponticum.

Herr Fortune, dem zu Ehren Dr. Lindley diese Art benannt hat, giebt folgende Notizen über dieselbe: »Als ich mich auf einer meiner langen Reisen in der Provinz Chekiang (westlich von Ningpo) befand, fand ich zufällig dieses schöne Rhododendron auf den Gebirgen 3000 Fuß über der Meeresfläche. Die Entdeckung kam ganz unerwartet, denn, obschon die unseren Gebirgsgegenden mit andern Gattungen der Rhodoraceen, namentlich Azaleen, bewachsen sind, so ist bisher kein Rhododendron in diesem Theile China's gefunden worden. Ich fand Pflanzen in allen Größen bis zu 12 Fuß Höhe. Die großen Exemplare hatten kurz vor meiner Ankunft voll von Blüthen gesessen, die abgefallenen Blumen waren jedoch bereits so vergangen, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte. Nach Aussagen der Eingebornen soll es aber eine Pracht sein, diese Pflanze in Blüthe zu sehen. Nach meiner Rückkehr im Herbste fand ich in jener Gegend reifen Samen, von dem ich reichlich nach England einsandte und aus dem Herr Glendinning das Glück hatte eine Anzahl Pflanzen zu erziehen.« Die einzige bekannte Rhododendron-Art in China außer Rh. Fortunei ist Rh. Championae Hook., von dem Colonel Champion auf den Hongkong-Gebirgen entdeckt.

(Gard. Chron.)

Ueber Baumwunden und deren Heilung.

Der von der Sektion für Obst- und Gartenbau der Schlesischen Gesellschaft veröffentlichte Bericht über deren Thätigkeit während des Jahres 1858, vom derzeitigen Sekretair derselben, Herrn Dr. K. Fickert, ist so reich an schätzenswerthen und lehrreichen größeren wie kleineren Abhandlungen und Notizen, daß wir einige davon, um denselben eine noch größere Verbreitung zu verschaffen, in unsere Zeitung übergehen zu lassen für Pflicht halten, so z. B. den vom Secretair der Section gehaltenen Vortrag über Baumwunden und deren Heilung, dessen wesentlicher Inhalt sich auf folgende Punkte bezieht.

1. Alle Baumwunden sind entweder absichtlich verursacht oder zufällig entstanden. Diese letzteren sind die gefährlichsten und machen eine besonders sorgfältige Behandlung nothwendig. Doch darf man im Allgemeinen den Grundsatz aufstellen, daß überhaupt keine Baumwunde ohne Verband bleiben sollte.

2. Die nicht vom Gärtner selbst gemachten Wunden rühren meist von Thieren, Vierfüßern oder Insekten her; sie fallen entweder sofort in die Augen, oder sie sind, wie die von den Insekten am alten Holze verursachten Verletzungen, unter der Rinde verborgen und erfordern, um

zeitig genug entdeckt zu werden, eine aufmerksame Beobachtung. Solche Stellen werden oft verrathen durch die Goldkäfer (Scarabaeus auratus L., Cetonia aurata Fabr.), welche den anfänglich für das bloße Auge unbemerkbar durch die Rinde sickernden Saft lecken. Solche Stellen müssen sofort geschnitten werden, um die Larve zu entfernen, ehe sie tiefer in das Holz eindringt oder überhaupt weiter nagt. Die dadurch entstandene Wunde ist, wie alle während des Sommers vorkommenden Wunden, besonders sorgsam zu verbinden.

3. Zum Verbinden oder Bedecken der Wunden bedient man sich entweder solcher Stoffe, welche in Wasser lösbar sind (Baumkitt), oder solcher, welche sich durch Wasser nicht auflösen lassen (Baumwachs, Baumharz). Für beide giebt es eine Menge Rezepte, deren keinem es an Empfehlungen mangelt. Indeß sind die meisten sehr zusammengesetzt und dadurch kostbarer als nöthig, da sie Bestandtheile enthalten, welche füglich wegbleiben können.

4. Um größere Wunden, Löcher und Höhlungen auf die Dauer auszufüllen, ist besonders der Cement zu empfehlen, der zu diesem Zweck ebenso zubereitet wird wie zum Mauern.

Zur Bedeckung leichterer Wunden auf kürzere Zeit nimmt man Lehm, der, um ihn haltbarer zu machen, mit dünnem Leimwasser angefeuchtet wird. Um das Aufreißen beim Trocknen zu verhindern, mischt man etwas Kuhhaare, Kaff oder Schewe unter.

5. Das Baumwachs wurde früher so zubereitet, daß es schon in der Hand erwärmt, weich genug wurde, um sich aufkleben zu lassen; oder man erwärmte eine etwas härtere Masse, welche man Baumharz zu nennen pflegt, in einer Pfanne über einer Lampe oder über Kohlen. In neuerer Zeit hat man nun ein kaltflüssiges Baumharz herzustellen versucht, das sich an der Luft verdickt, und zu diesem Zweck Harz (Weißpech) in Alcohol absolutus aufgelöst. Wenn das Harz fein gestoßen und die Flasche mit der Mischung auf einen warmen Ofen gestellt, auch öfter geschüttelt wird, so geht die Auflösung ziemlich schnell und vollständig vor sich. Doch läßt sich das Harz noch leichter in Schwefeläther auflösen, und diese Art verdient insofern den Vorzug, als sie billiger ist und der Schwefeläther schneller verdunstet als Alkohol. Der Schwefeläther ist zwar an sich theurer als Alkohol (das Verhältniß des Preises ist 6 zu 5), aber er besitzt auch eine stärkere Lösungskraft (3 zu 2). Nun sind aber alle Fettharze dem Einfluß der Temperatur unterworfen und schmelzen bei starker Sonnenhitze, so daß sie herablaufen. Dies ist bei den Federharzen nicht der Fall; ihre Verwendung für den Verband von Baumwunden würde also vorzuziehen sein, wenn man sie auf leichte Weise flüssig machen könnte. So würde z. B. Guttapercha, die sich in Chloroformium leicht löst — eine Lösung, welche in der Chirurgie unter dem Namen „Traumaticinium“ angewendet wird — unbedingt zu empfehlen sein, zumal die Masse sich sehr schnell verdichtet und dehnbar ist, ohne Risse und Sprünge zu bekommen, wenn nicht das Pfund Chloroformium 1½ Thlr., das Pfund Guttapercha 14½ Sgr. kostete, und man nicht, um 1 Pfund Guttapercha aufzulösen, mindestens 1 Pfund Chloroformium bedürfte. Es werden nun Proben gemacht mit Auflösungen von Harz in Alkohol und Schwefeläther und von Guttapercha in Chloroformium. Am schnellsten verdichtet sich die

letzte Masse, dann die zweite, am langsamsten die erste. — Herr Hauptturnlehrer Rödelius bemerkt, daß das von ihm bei einer Temperatur von — 2° R. aufgetragene kaltflüssige Baumharz abspringe, also bei Kälte nicht anwendbar sei. — Herr Inspector Neumann empfiehlt als sehr billiges Baumwachs eine Mischung aus Harz und Leinölfirniß. Herr Rödelius findet dieselbe aber zu klebrig, was auch der Secretair bestätigt, der sich seit langer Zeit zum Bestreichen von Pfropf- und Kopulirbändern einer Mischung von Harz und Rindstalg bedient. Herr Neumann entgegnet, daß der Zusatz von ein wenig Baumöl dem an seinem Baumwachs gerügten Uebelstande vollkommen abhelfe. Um das Ankleben des Baumwachses an die Hände zu verhindern, solle man diese vorher mit Oel einreiben.

6. Der Secretair bemerkt noch, er glaube, daß statt der Guttapercha auch das Harz von Kirsch- und Pflaumenbäumen sich zu einem kaltflüssigen Baumharz werde verwenden lassen; nur handele es sich um ein billiges Lösungsmittel. Er werde Versuche anstellen.*)

Zum Schluß seines Vortrages erinnert derselbe noch daran, daß man bei bedeutenderen Wunden am Stamme eines Baumes das Zurückschneiden der Aeste nicht versäumen darf. Dies hat einen entschiedenen Einfluß auf das Verwachsen der Wunde, indem die Säfte, welche sonst in die Zweige gehen würden, nun auf die Heilung der Wunde verwendet werden können.

---

*) Dies Harz löst sich in siedendem Wasser, noch leichter in flüssigem Kali oder Natron. Doch ist dasselbe für den vorliegenden Zweck weniger zu empfehlen, da sich die Auflösung zu langsam verdichtet. Eher eignet es sich zum Ueberziehen von Etiquetten.

Fortune's gelbe Camellia.

Schon im 6. Jahrgange der Hamburger Gartenzeitung (1850) S. 140 brachten wir die Mittheilung, daß Herr Fortune eine gelbe Camellie entdeckt habe, deren Existenz uns dennoch nicht sogleich einleuchten wollte, bis dann zwei Jahre später Herr Fortune in seinem damals so eben veröffentlichten Werke „A Journey to the Tea Districts of China etc." eine ausführliche Beschreibung der von ihm entdeckten Camellie gab (S. Hamburg. Gartenztg. VIII, S. 286., nach welcher wohl an dem Vorhandensein einer gelben Camellie kaum mehr zu zweifeln war, aber eigenthümlich genug, die verheißene Seltenheit blieb eine Seltenheit und ist unsers Wissens bis jetzt nicht in den Handel gekommen.

Jetzt nun erhalten wir über diese fragliche Camellie in dem Leitartikel zu No. 19 der Bonplandia von Herrn Dr. Berthold Seemann eine genügende Aufklärung, nach der eine wirkliche gelbe Camellie aber nicht als Art existirt. Doch lassen wir den Verfasser des Leitartikels in der Bonplandia selbst reden, um so mehr, da er seinen Artikel mit so schönen Worten eingeleitet hat. Herr Dr. Seemann schreibt

Blumistische Neuigkeiten erfahren Seitens der Botaniker von Fach selten mehr als vorübergehende Beachtung. Der Blumist mag sich noch so viele Mühe gegeben haben, seine Pelargonien, Stiefmütterchen, Rosen, Nelken, Marienblümchen, Georginen und sonstige Lieblinge durch alle ihm zu Gebote stehenden Mittel auf den Gipfel höchster Vollkommenheit zu bringen, ihm wird von Seite Derjenigen, welche am besten im Stande wären, seine Bestrebungen zu würdigen, weder Lob noch Dank. Ja Manche, denen der „Zopf nach hinten hängt", sehen sogar alle blumistischen Bestrebungen mit feindlichem Auge an, und selbst wenn ihnen die Natur Schönheitssinn verliehen hat, so sind sie doch so von Vorurtheilen verblendet, daß sie ein vollkommenes, in höchster Farbenpracht strahlendes blumistisches Erzeugniß nicht schöner finden können, als die vielleicht unansehnliche Stammpflanze desselben. Es müßte schon ganz etwas Außerordentliches auftauchen, wenn es von ihrer Seite Anerkennung finden sollte, — eine pechschwarze Hyacinthe ohne die allerleiseste Spur von Blau, eine himmelblaue Georgine, eine Rose, die alle Regenbogenfarben in sich vereinigte, oder sonstige Thatsachen, die allgemein angenommenen Theorieen geradezu Hohn sprächen. Der von Fortune entdeckten gelben Camellia wird nachgesagt, daß sie diese Bedingung erfülle. Sie bedarf daher keiner weiteren Empfehlung und wir keiner ausführlichen Entschuldigung, wenn wir sie hier vorziehen.

Als Robert Fortune im nördlichen China war, besuchte er verschiedene in der Umgegend von Shanghai befindliche Handelsgärten.

„Einer derselben," schreibt er in seiner Journey to the Tea Districts of China (London, 1852. 8.) p. 339, „enthielt eine höchst merkwürdige Pflanze, die ich nicht unerwähnt lassen darf. Wer meine „Wanderings in China" gelesen, wird sich vielleicht der dort erzählten Geschichte meiner Bestrebungen, eine gelbe Camellia zu finden, erinnern, wie ich 5 Dollars für eine auslobte, — wie ein Chinese zwei statt einer fand, wie er das Geld bekam und wie ich angeführt wurde! In einem dieser Handelsgärten traf ich jedoch eine gelbe Camellia, und zwar in voller Blüthe, als ich sie kaufte. Sie ist gewiß eine sehr merkwürdige Pflanze, wenngleich nicht sehr schön. Die Blume gehört zu der Classe der anemonen- oder warratahblüthigen. Die äußeren Blumenblätter sind milchweiß, die inneren primelgelb. Dem Laube nach scheint sie eine ganz besondere Art zu sein, und dürfte sich vielleicht als härter wie ihre Stammverwandten erweisen."

Wäre diese gelbe Camellia eine Spielart der Camellia Japonica, so wäre der Fund in mehr als einer Beziehung gewiß ein höchst werthvoller gewesen. Gardeners' Chronicle sah sie als eine solche an, und ließ sich (April 1852, p. 259) zu folgender gewagten Betrachtung verleiten:

„Das Geheimniß der gelben Camellia ist endlich gelöst, und wir müssen uns endgültig entschließen, De Candolle's Farbentheorie als werthlos zu betrachten! Es war ein genialer Gedanke, alle Pflanzen in die eine oder die andere von zwei Reihen zu bringen: die gelben niemals in die blauen und die blauen niemals in die gelben übergehenden. Aber der Ausnahmen giebt es bei dieser Regel zu viele, und wir müssen nicht erstaunen, von einer blauen Dahlia zu hören, obgleich die Dahlia der gelben Series angehört; seit wir eine gelbe Camellia be-

ſitzen, obwohl die Camellia zu der blauen zählt. Herr Fortune ſah dieſe ſeltſame Varietät.«

Leider, oder vielmehr glücklicher Weiſe ſind dieſe Schlüſſe nicht gerechtfertigt, denn die gelbe Camellia ſtellt ſich nicht als Varietät der C. Japonica heraus. Camellia Japonica blüht gegen den Frühling zu, hat kahle Zweige, Blattknospen, Blattſtiele und Ovarien, die gelbe Camellia dagegen blüht im Herbſt (September, October), und hat ſchwach flauhaarige Blattknospen, Blattſtiele und Blattadern, nebſt einem wolligen Ovarium, — Charactere, die ſich bei Camellia Sasanqua finden, der in der That Fortune's gelber Camellia als Varietät „anemonaeflora“ ſich anſchließt. Daß Camellia Sasanqua geneigt iſt, eine gelbliche Färbung anzunehmen, geht aus der auf Taf. 942 des Bot. Regiſters gegebenen Abbildung von C. oleifera Abel (ein Synonym von C. Sasanqua) hervor, wo die äußeren Reihen der Staubfäden an der Baſis ganz daſſelbe Primelgelb zeigen, das bei der in Frage ſtehenden Varietät auftritt. Auch nähert ſich die dort abgebildete Form im Blatte mehr der gelben Camellia als die gewöhnlich in den Gärten angetroffene.

Obgleich nun die gelbe Camellia nicht das iſt, wofür man ſie ausgegeben, und zur Varietät einer alten Gartenſpecies herabſinkt, ſo bleibt ſie doch eine neue beachtenswerthe Erſcheinung. Wir kannten bisher nur anemonenblüthige Spielarten von Camellia Japonica, und die gelbe Farbe der in kurze ſpatelförmige Blumenblätter verwandelten Staubfäden iſt jedenfalls eine Erſcheinung, die der Aufmerkſamkeit der Camelienzüchter ſicher nicht entgehen wird. Auch dürfte die Identificirung der gelben Camellia mit C. Sasanqua den practiſchen Nutzen haben, daß man die erſtere nicht wie bisher auf C. Japonica veredelt, wo ſie nur ein kümmerliches Daſein friſtete, ſondern auf die Art, der ſie als Varietät angehört. Einen ähnlichen Vortheil werden aufmerkſame Cultivateure aus dem Identificiren der irrthümlich Camellia Sasanqua fl. pleno in den Gärten genannten Pflanze mit Thea rosaeflora (Camellia rosaeflora, Hook. Bot. Mag. t. 5044, C. euryoides Hort. nicht Lindl.!) zu ziehen wiſſen, indem ſie dieſe ſchöne Pflanze, bisher in den meiſten Gewächshäuſern in faſt kränklichem Zuſtande angetroffen (da man ſie meiſtens auf Camellia Japonica oder C. Sasanqua brachte), auf die üppig wachſende Urpflanze bringen, der ſie als gefüllte Varietät zugehört, und auf der ſie jedenfalls am beſten gedeihen dürfte.

Zweite Traubenblüthe im Jahre 1859.

Von Med.-Rath Dr. Mohr.

Das Factum, wie es vorliegt, iſt nicht zu verwechſeln mit dem in heißen Jahren jedesmal vorkommenden zweiten Blühen, wenn Reben unrichtig gekürzt werden. Es läßt uns einen Blick thun in die Oeconomie des Weinſtockes, welche von ſehr Wenigen richtig begriffen wird.

Unter Reben verſteht man das einjährige Holz, welches im vergangenen Herbſte noch grün war, und durch Verholzen im Winter zu Reben wurde.

Aus dieſen Reben brechen im Frühjahr die Augen aus und bilden grüne Fruchtruthen, von denen jede zwei oder drei Trauben trägt. Die Seitenzweige dieſer Fruchtruthen nennt man Geiz. Alle Augen an den Reben haben denſelben Werth. Sie tragen ſämmtlich Früchte, wenn das vorhergegangene Jahr warm genug war, ſie in Fruchtaugen zu verwandeln. Sie tragen keine Früchte oder wenige, wenn das Vorjahr kalt und naß war. Frucht- und Holzaugen ſind alſo ganz daſſelbe, und es hängt blos von der Witterung ab, ob ſie im folgenden Jahr das eine oder das andere ſind.

Die Trauben erſcheinen nur an den grünen Fruchtruthen, die aus den Reben, die im Vorjahre grün waren, hervorbrechen. Augen an dem Stock, der älter als ein Jahr iſt, ſind immer Holzaugen, und deren Augen können erſt im folgenden Jahre Früchte tragen.

Wenn man einen Weinſtock ganz ungeſchnitten läßt, ſo blüht er nur einmal und trägt nur einmal Früchte im Jahre, ſelbſt in den heißeſten Ländern und Sommern.

Die grüne Fruchtruthe, welche 2 Trauben trägt, wird vor oder gleich nach der Blüthe drei Blätter über der oberſten Traube gekappt. Die drei Augen an den drei Blättern wachſen nun heraus und bilden den ſogenannten Geiz, nämlich grüne Ruthen, welche im folgenden Jahre Früchte tragen. Wenn man im Auguſt dieſen Geiz auf der Hälfte abbricht oder ſchneidet, ſo treiben die an ihm befindlichen Augen aus. War der Sommer warm, ſo ſind ſie bereits zu Fruchtaugen für das kommende Jahr organiſirt und ſie treiben in dieſem Jahre Blüthen, welche eigentlich dem folgenden Jahre gehören. Es iſt dies die gewöhnliche Erſcheinung, welche in Zeitungen als eine Merkwürdigkeit vorgeführt wird. Sie iſt aber gar nicht merkwürdig, ſondern beweiſt nur, daß der Gärtner die Natur der Rebe nicht verſteht, indem er die für das nächſte Jahr beſtimmten Fruchtaugen durch falſches Kappen zum Hervortreiben gezwungen hat, während ſie doch nicht reifen können.

War aber der Sommer nicht warm, ſo treiben die drei Augen (über den diesjährigen Trauben) ebenfalls hervor, ſie haben aber, dann auch gekappt keine Blüthen, und kein Menſch bemerkt ſie. Die diesjährige Erſcheinung iſt eine ganz andere. Von den drei Augen an der gekappten Rebe ſind die beiden oberſten ſtark ausgetrieben und haben, heute den 17. Juli 1859, jede zwei Traubenblüthen, ohne daß ſie gekappt ſind. So wie denn auch in dieſem Jahre der Weinſtock faſt 14 Tage den beiden heißen Vorjahren voraus iſt, weil er im Mai reichlichen Regen empfangen hat, ſo zeigt auch dieſe Erſcheinung, daß die Entwickelung des Weinſtocks weit höher gediehen iſt. 1857 und 1858 blühten die drei oberen Augen der gekappten Reben zum zweitenmal, wenn ſie verkürzt wurden, wodurch der zur Verlängerung beſtimmte Saft in die Augen ſtieg, und dieſe heraustrieb. In dieſem Jahre blühen an demſelben Stocke und ſchon einen Monat früher die ganz unverletzten Triebe der drei oberen Augen.

Es tritt hier die merkwürdige Erſcheinung ein, daß dieſe Blüthen zweimal am grünen Holze ſitzen, nämlich erſt an dem grünen Zweige,

der aus den drei oberen Augen hervorgebrochen, und zweitens dieser auf der grünen Fruchtruthe, welche zwei schon sehr entwickelte Trauben trägt; und diese Fruchtruthe sitzt erst auf dem braunen Holze der Rebe, welche im Herbste 1858 noch grün war und im Winter verholzte. Da wir heute erst den 17. Juli haben, so ist die Möglichkeit vorhanden, daß diese Blüthen noch reif werden, und man würde dann im September 1859 reife Trauben von 1860 haben.

Ich muß noch bemerken, daß meine obige Aufstellung, ganz ungeschnittene Weinstöcke blühten nie zum zweitenmale, durch obige Thatsache nicht beeinträchtigt wird. Es ist im vorliegenden Falle die Fruchtruthe, welche auf der Rebe von 1858 saß, allerdings gekappt worden, allein die Zweige, die aus den drei über den Trauben sitzenden Augen hervorbrachen, sind nicht gekappt worden.

Daß es nicht die Wärme allein ist, welche den Weinstock zur zweiten Blüthe bringt, geht aus seinem Verhalten in wärmeren Klimaten hervor. Auch auf Madeira macht der Weinstock seine ganze Entwickelung durch, ohne zweimal zu blühen. Es ist auch nicht die Kälte des Winters, welche die Vegetation des Weinstocks unterbricht, sondern das Bedürfniß nach Ruhe und Erholung. Selbst im Winter geht eine beständige Veränderung in dem Stocke vor, welche ihn vorbereitet, im Frühjahre wieder hervorzutreiben. In Madeira, wo der Winter noch fast so warm ist, wie bei uns der Sommer, schüttelt der Weinstock nach der Fruchtreife, Ende October, seine Blätter ab und versinkt in den Winterschlaf bei derselben Temperatur, welche ihn in unserm Klima daraus erweckt. Er verharrt inmitten eines ununterbrochenen Frühlings und einer immergrünen Vegetation 160 Tage im tiefsten Schlummer; erst im März erwacht er wieder und belaubt sich aufs Neue. Sein Vaterland ist nämlich ein gemäßigtes Klima, in dem der Charakter der Jahreszeiten scharf ausgeprägt ist, und diese seine Natur behauptet er in den wärmsten Gegenden, wohin ihn der Mensch verpflanzt hat.

Die Weinrebe ist eine Pflanze, die einer colossalen Entwickelung fähig ist. Im natürlichen Zustande wird sie 1000 Jahre alt und der Stamm kann einen Durchmesser von 10 bis 12 Zoll erhalten. Der große Weinstock in Hampton Court, von Cardinal Wolsey unter Heinrich VIII. gepflanzt, trägt noch jedes Jahr 4000 bis 5000 Trauben, die in Güte nichts verloren haben, wenigstens hat die lebende Generation in den letzten 60 bis 70 Jahren keine Abnahme der Güte bemerkt. Der Zucker der Traube entsteht durch die Wirkung von Licht und Wärme auf der Blattfläche und wird nur in der Rebe gesammelt. Die Natur hat die Traube und alle Früchte dem directen Sonnenlicht entzogen und es ist ein bloßes Vorurtheil, daß man den Stock entblättert, um die Traube blos zu legen, weil man glaubt, der Zucker entstünde in der Beere. Schwach mit Blättern versehene Pflanzen haben immer kleine, harte, saure Früchte. Nur auf der Blattfläche tritt der Sauerstoff aus, wodurch die Kohlensäure in Weinsäure und dann in Zucker verwandelt wird. Die Güte einer Traube hängt, bei gleicher Art und Witterung, von dem Verhältnisse der Menge der Trauben zu der Wurzel und Blattfläche ab. Ein großer Weinstock kann zwanzigmal so viel Trauben von derselben Güte wie im jungen Zustande tragen, wenn dieses Verhältniß nicht ungünstig geändert wird. Je mehr Saft die Wurzel zuführt, desto

mehr Trauben können wachsen, aber auch desto mehr Laub muß vorhanden sein, um die Traube süß zu machen. Alles Laub dient aber nicht dazu, um Zucker zu bilden, sondern nur dasjenige, was mit den Trauben an derselben Ruthe und in ihrer Nähe sitzt. Die Blattfläche muß aber auch die Holzfaser erzeugen, und diese nimmt einen Theil des Saftes in Anspruch, der der Traube entgeht. Will man also süße Trauben ziehen, so muß man das Wachsthum des Holzes beschränken, das der Blätter aber begünstigen. Hierauf gründet sich das schöne System von Kecht. Derselbe läßt an jeder Fruchtruthe nur 3 Blätter über der obersten Traube sitzen, die unterste Fruchtruthe läßt er aber ungekappt wachsen, damit sie die Fruchtaugen für das nächste Jahr erzeuge. Die erwähnten 3 Blätter sind nothwendig, um die oberste Traube zur Reife zu bringen. Wird das Jahr nicht sehr warm, so würden 4 Blätter denselben Dienst thun. Damit aber kein Saft zur ferneren Holzbildung verwendet würde, muß man die in den Winkeln der 3 Blätter sitzenden Augen mit dem Nagel ausbrechen. Es kann dann die oben besprochene Erscheinung des Nachblühens gar nicht eintreten. Die Rebe, welche in diesem Jahre Trauben getragen hat, wird im Herbste abgeschnitten, und nur die Fruchtruthe aus dem untersten Auge für das nächste Jahr gelassen. Diese systematische Behandlung der Rebe liefert zugleich die meisten und die süßesten Trauben. Es ist einleuchtend, daß Quantität und Qualität der Trauben zu einander in einer gewissen Beziehung stehen, und daß man durch eine zu große Quantität die Qualität beeinträchtigt, indem nun die Wurzel nicht Nahrung genug zuführen kann. Beide zusammen sollen ein Maximum betragen, und das ist allerdings, soweit der Mensch dazu thun kann, sehr schwer zu treffen, da man die Beschaffenheit des Wetters nicht voraus wissen kann. Im zweifelhaften Falle richtet man sich auf eine größere Menge Früchte ein und nimmt, wenn das Wetter ungünstig wird, nachher einen Theil derselben weg. Daß unsere Rebenkultur, wobei man den Stock zu einem Zwerg und Krüppel erzieht, die naturgemäße sei, kann nach den obigen Darstellungen nicht einleuchten. (Zeitsch. d. l. Ver. f. Rheinpr.)

Abgebildete Camellien

in Amb. Verschaffelt's Nouvelle Iconographie des Camellias.

(VIII. Liv. 1859.)

Taf. 1. Cam. Scipione l'Africano. Diese Varietät erhielt Herr Verschaffelt vor etwa 4 Jahren von Herrn Luzzati in Florenz, der sie aus Samen gewonnen hat.

Die Blumen sind mittelgroß, schön rosa gefärbt und jedes Blumenblatt fein weiß gestrichelt oder bandirt. Die Blumenblätter liegen regelmäßig dachziegelförmig, sind eiförmig, abgerundet oder wenig gekerbt am obern Rande, die am äußersten Rande der Blume stehenden sind fast rund. Die Blätter sind klein, aber äußerst elegant.

Taf. 2. Cam. Pirzio secondo. Eine prächtige Varietät aus derselben Quelle als die eben genannte stammend. Die Blume ist

mittelgroß und zeichnet sich außer ihrer äußerst zarten rosa Färbung noch besonders durch die genaue Form einer großen Theerose aus, wodurch sie mit den vielen ganz regelmäßig gebildeten Formen einen sehr angenehmen Contrast bildet. Die sehr zahlreichen Blumenblätter, aus denen die Blume besteht, sind beinahe kreisrund, fast aufrecht stehend, kappenförmig und bilden im Centrum der Blume ein Herz. Die Färbung ist zart rosa, sich nach dem Rande eines jeden Blumenblattes hin in weiß verlaufend. Es ist diese Camellie mit einem Worte eine sehr empfehlenswerthe Varietät.

Taf. 3. Cam. Frederici. Eine Blume von 6 Zoll Durchmesser, mit großen abgerundeten, kappenförmigen Blumenblättern, von denen die im Centrum befindlichen jedoch nur ganz klein sind und dicht gedrängt aufrecht stehen, wie bei den sogenannten anemonenblüthigen. Die Farbe der Blume ist ein glänzendes dunkeles Blutroth.

Taf. 4. Cam. Cosmopolitana. Im Jahre 1856 erhielt Herr A. Verschaffelt diese schöne Camellie von Herrn B. Lechi in Brescia, und zeichnet sie sich durch ihre Größe und schöne rosa Färbung aus. Die Blumenblätter im Centrum der Blume sind matt weiß gestreift. Es ist eine sehr empfehlenswerthe Form.

(X. Liv. 1859.)

Taf. 1. Cam. Prince de Salerne. Schon vor einigen Jahren erhielt der Herausgeber der vortrefflichen Iconographie des Camellias diese Varietät von dem Herrn Prudent Basson, Gärtner zu Turin, und hat sie mehrere Male mit großer Leichtigkeit und Schönheit bei Herrn Verschaffelt geblüht.

Die Blumen sind mittelgroß, zwischen den ganz regelmäßig geformten und den rosenblüthigen stehend. Die Blumenblätter sind groß, abgerundet und liegen dachziegelförmig, namentlich nach dem Rande zu, während die im Centrum mehr aufrecht stehend sind und eine Rosenform bilden. Die Grundfarbe ist lebhaft rosa-carmoisin, und jedes Blumenblatt weiß gestrichelt.

Taf. 2. Cam. compacta alba. Eine Blume erster Größe, ganz regelmäßig gebaut und rein weiß mit einem leichten schwefelgelben Anflug im Centrum und sich durch leichtes Blühen auszeichnend.

Herr Verschaffelt erhielt sie von Herrn Gaines, Gärtner in London, der sie aus Samen gewonnen hat. Eine herrliche Blume.

Taf. 3. Cam. Spineo var. rosea. Eine Varietät mit kleinen Blumen von großer Regelmäßigkeit und äußerst zarter rosa Färbung. Die Entstehung dieser Camellie ist ein Lusus Naturae (Spiel der Natur), denn sie zeigte sich auf einem Zweige der Camellia Spineo, deren Blumen weiß sind. Durch Abpfropfen wurde die Varietät rosea gewonnen. Auf ähnliche Weise sind die Cam. Comte de Paris, Duc de Chartres, de la Reine rosea ꝛc. entstanden.

Taf. 4. Cam. Trackir. Diese prächtige Camellie stammt aus Florenz von Herrn Sangalli und blühte sie zum erstenmale bei Herrn Verschaffelt im Frühjahre 1859. Es ist eine große Blume, lebhaft rosafarben nach dem Rande zu, heller im Centrum. Die großen, zahlreichen Blumenblätter sind oval, ganzrandig, mit einem matten weißen Streifen in der Mitte.

Literatur.

Lehrbuch der schönen Gartenkunst. Mit besonderer Rücksicht auf die praktische Ausführung von Gärten und Park-Anlagen u. s. w. bearbeitet von **G. Meyer**, bisherigem Königl. Garten-Conducteur, jetzigem Hofgärtner zu Sanssouci und Lehrer an der Königl. Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam.

Bereits im vorigen Hefte machten wir auf ein Werk aufmerksam, das jedenfalls in der Gartenkunst eine große Epoche machen wird. Von mehreren uns zugesagten und eingesandten Kritiken über dieses Werk lassen wir hier die zuerst erhaltene folgen, eine andere noch ausführlichere uns vorbehaltend, sobald mehr Lieferungen erschienen sind.

Daß die schöne Gartenkunst in den letzten zwei Decennien in Deutschland und ganz besonders in Preußen sehr bedeutende Fortschritte gemacht hat und die Ansichten über die zweckmäßige Anordnung von Gärten, wie über Auswahl und Anordnung einzelner Objecte derselben, sich in vielen Punkten geändert haben, dürfte Jedem bekannt sein, der sich mit dieser unterhaltenden und nützlichen Kunst etwas näher vertraut gemacht hat. Eben so bekannt dürfte es aber auch sein, daß die Literatur den Fortschritten dieser Kunst nicht nach allen Richtungen hin ebenmäßig gefolgt ist, und aus den über schöne Gartenkunst vorhandenen Werken im Punkte der Anordnung meist wenig Raths zu erholen ist, und daß insonderheit kein Werk vorhanden ist, in welchem der Gegenstand in umfassender und zeitgemäßer Weise, sowohl nach seiner rein ästhetischen wie praktischen Seite hin, behandelt worden wäre. Es ist uns daher sehr erfreulich, das sich dafür interessirende Publikum auf obiges Werk aufmerksam machen zu können, welches diese Lücke in unserer Literatur auf die würdigste und vollständigste Weise ausfüllen wird.

Es erscheint, 12—15 Bogen gr. 4. stark, und mit 24 Tafeln Abbildungen und 80 bis 100 in den Text eingedruckten Holzschnitten illustrirt, in der rühmlichst bekannten Riegel'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin zu dem Preise von 8 Thlrn. und wird in schnell auf einander folgenden Lieferungen ausgegeben, so daß es noch vor Ablauf dieses Jahres in den Händen der Subscribenten ist.

Der Verfasser hat, um das Studium dieser Kunst dem Leser möglichst zu erleichtern und um auch diejenigen der Leser, welche nur an der rein ästhetischen Seite des Gegenstandes Interesse nehmen, zu befriedigen, Theorie und Praxis, soweit es irgend thunlich erschien, von einander getrennt und besonders abgehandelt, wodurch zugleich die größte Uebersichtlichkeit in der Eintheilung des bearbeiteten Stoffes erzielt wurde. Das Werk zerfällt in zwei Abtheilungen, von denen uns die erste kleinere Abtheilung als erste Lieferung vorliegt. Wir dürfen diese Abtheilung als den vorbereitenden Theil zu der nächstfolgenden größeren Abtheilung betrachten, in welcher die Grundsätze der neueren Gartenkunst und eine Anleitung zur Ausübung derselben in sieben besonderen Abschnitten gegeben werden. Wir begnügen uns für jetzt, die Eintheilung des in dieser Abtheilung behandelten Stoffes nach dem Inhaltsverzeichnisse hier kurz anzuführen, um die Reichhaltigkeit derselben und deren zweckmäßige Anordnung erkennen zu lassen. 1. Abschnitt: Allgemeine

Grundsätze für die Anordnung: a) im Großen und Ganzen; b) unregelmäßiger Partieen von einem Hauptstandpunkte aus, und c) regelmäßiger Partieen. Gebäude. 2. Abschnitt: Von der allgemeinen Anordnung der wesentlichsten Bestandtheile eines verschönerten Landsitzes: a) von der Lage des Wohngebäudes; b) vom Pleasureground. Blumengarten. Rosarium. Wintergarten; c) vom Küchen- und Obstgarten; d) vom Park. Wildgehege. Fasanerie; und e) freie Anlagen. 3. Abschnitt: Ueber Hausgärten in Städten und Vorstädten. 4. Abschnitt: Ueber die Anordnung öffentlicher Plätze und Promenaden in Städten und über öffentliche Gärten. 5. Abschnitt: Von malerischer Anordnung oder Gruppirung im Einzelnen; a) über den Grund und Boden; b über Gewässer; c) über Gehölz-Gruppirung oder Pflanzungen; d) über Rasen und Wiesen, und e über Wege. 6. Abschnitt: Ueber Anfertigung des Entwurfs zu Papier und die technische Ausführung der Anlagen; a) über die Ausarbeitung des Entwurfs und b) über die Ausführung des Projectes im Freien. 7. Abschnitt: Ueber Anfertigung der Kostenanschläge und einige Bemerkungen über die Unterhaltung der Anlagen.

Der Verfasser macht in der ersten Abtheilung und Lieferung in einem historisch-ästhetischen Rückblicke auf die Entwickelung der Gartenkunst in ihren einzelnen Stylarten und in einer besonderen Schilderung derselben den Leser mit der Einrichtung der Gärten derjenigen Völker bekannt, bei denen die Gartenkunst mit Vorliebe kultivirt wurde, und deren Charakter, Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten ihren Gärten einen gewissen Grad von Eigenthümlichkeit aufgeprägt haben. Der Verfasser schildert zunächst in ungemein fesselnder Weise die Eigenthümlichkeiten der Gärten arabischen und maurischen Gartenstyls, wie sie beschaffen waren zur Zeit der alten persischen Könige bis zur Zeit Mehemed Ali's von Aegypten; hierauf den Gartenstyl der alten Römer und jetzigen Italiener, und endlich den französischen, holländischen, chinesischen und englischen Gartenstyl, damit der Leser sich mit den Vorzügen oder Mängeln eines jeden Styls bekannt mache und seine Ideen über Gartenkunst und Gärten bereichere oder erweitere. Auf die reiche Literatur, aus welcher der Verfasser geschöpft, oder durch welche er seine Ansichten näher begründet hat, ist an den betreffenden Stellen verwiesen, und überall ist zu erkennen, daß der Verfasser sehr gründliche Studien gemacht hat und es ihm stets in der Darstellung um objective Wahrheit zu thun gewesen ist.

Die verschiedenen Arten von Gärten sind durch höchst charakteristische Zeichnungen erläutert. Die erste Tafel stellt die Anordnung eines arabischen Vorhofes mit seinen zierlichen Pflasterungen und der gartenmäßigen Bepflanzung dar, und läßt uns den Geschmack des Arabers, zugleich aber auch den Umstand erkennen, daß wir ihm in der Verschönerung unserer nächsten Umgebung manches nachahmen könnten. Die zweite Tafel führt uns einen kleinen arabischen Blumengarten mit seinen arabeskenförmigen Blumenbeeten und der übrigen Einrichtung vor; auch hieraus ließe sich unzweifelhaft manches auf unsere Gärten übertragen, und wer sich gar einen Theil seines Gartens zu einem arabischen Blumengarten einrichten wollte, was gewiß einen besondern Reiz haben würde, dem ist hierin eins der schönsten Vorbilder gegeben. Am meisten interessirt uns jedoch die Doppeltafel III. und IV., welche die

Einrichtung der Gärten um die Villen der alten Römer, insonderheit die der Gärten des jüngeren Plinius um seine Tuscische Villa darstellt, die von dem Verfasser nach der uns von Plinius in seinem bekannten Briefe an seinen Freund Apollinaris hinterlassenen Beschreibung entworfen worden ist. Die organische Gliederung in dem Ganzen und der Reichthum in der Ausschmückung des Einzelnen in diesem Arrangement ist im höchsten Grade musterhaft. Die Tafeln V. und VI. enthalten die Grundpläne der Gärten um die Villa Mattei zu Rom und Aldobrandini zu Frascati als Beispiele italienischer Gartenkunst zur Zeit des Mittelalters in der mehr freien und der streng regelmäßigen Form; für den Architecten und Gartenkünstler nicht minder instructiv als das Tuscum des Plinius. Auf die übrigen zur ersten Abtheilung gehörigen Tafeln VII. bis XII., die charakteristische Proben des französischen, holländischen und chinesischen Gartenstyls enthalten, machen wir schon im Voraus aufmerksam; sie werden erst mit der zweiten Lieferung ausgegeben.

Wir können, der hier gebotenen Raumersparniß wegen, dem genialen Verfasser, so groß die Versuchung auch ist, in das Einzelne des Gegenstandes nicht folgen, sprechen aber nach genauer Prüfung schließlich die Ueberzeugung aus, daß die Schrift, welche das ganze Gebiet der schönen Gartenkunst umfaßt, durch Begründung vieler neuer Ansichten und durch große Kürze und Klarheit in der Darstellung sich in hohem Grade vortheilhaft auszeichnet, dem sich für schöne Gartenkunst interessirenden Publikum — den gebildeten Gärtnern, den Guts- und Gartenbesitzern, Architecten u. s. w. — als ein sicherer Führer in der Anordnung und der practischen Ausführung von Gärten und allen anderen hierher gehörigen Arrangements auf das Beste empfohlen werden kann. Nach Vollendung des Werks, das zweifelsohne Epoche machen wird in der Literatur der schönen Gartenkunst, kommen wir auf dasselbe noch ein Mal zurück. A. B.

Die **Flore des serres** des Herrn L. van Houtte, unstreitig eins der besten botanischen Journale, scheint leider zum Bedauern vieler Garten- und Pflanzenfreunde aufgehört zu haben, zu erscheinen. Schon seit einigen Jahren mit der Herausgabe der einzelnen Hefte im Rückstande, versprach der Herausgeber, daß bis ultimo März 1859 sämmtliche bis dahin fehlende Hefte nachgeliefert sein sollten. Jetzt stehen wir am Schlusse des Jahres 1859 und noch fehlen 9 Hefte des Jahrganges von 1858, denn das März-Heft pro 1858 erschien am 15. April 1859, mithin sind, wenn das Werk fortgeführt werden soll, was gewiß allseitig gewünscht wird, bis zu Ende dieses Jahres noch 21 Hefte nachzuliefern. Die in diesen nachzuliefernden Heften erscheinenden Pflanzen-Abbildungen haben jedoch, da die Pflanzen schon mehr oder weniger bekannt sind, für die meisten Pflanzen- und Blumenfreunde nicht mehr den Werth, Nutzen und das Interesse, als wenn die Abbildungen vor der allgemeinen Verbreitung der Pflanzen selbst erscheinen. Eine Menge von Pflanzen findet man in den neuesten Pflanzenverzeichnissen des Herrn van Houtte mit der Bemerkung: „abgebildet in der flore des serres (flore)“ aufgeführt, bis man nach langem Suchen, wenn man sich erst ein Bild von der Pflanze nach der Abbildung verschaffen will, ehe man sich dieselbe bestellt, dahinter kommt, daß dies Heft der

Flore des serres, in dem die Pflanze abgebildet und beſchrieben ſein ſoll, noch gar nicht erſchienen iſt.

Im Intereſſe des Journals und zum Nutzen der vielen Abonnenten deſſelben wollen wir wünſchen, daß das Fehlende recht bald nachgeholt und daſſelbe dann recht regelmäßig forterſcheinen möge.

Ueber einige practiſche Geſichtspunkte bei der Samen-Probe als Merkmal für die Güte des Samens. Ein Beitrag zum ſicheren Erfolg des Keimens bei Ausſaaten im Garten und Ackerbau vom Garten-Inſpector F. Jühlke, Inhaber der Firma: Carl Appelius in Erfurt. Berlin 1859. 12. 38 S.

Dieſe kleine Schrift iſt ein extra Abdruck aus dem verbeſſerten landwirthſchaftlichen Kalender pro 1860 von S. O. Mentzel und von Lengerke und ſoll den von der Firma C. Appelius zu verſendenden neuſten Samenverzeichniſſen als Erläuterungen beigefügt werden.

Wir wollen für heute hier nur die Aufmerkſamkeit unſrer Leſer auf dieſe kleine Schrift lenken. Es iſt abermals eine mit ſo vieler Kenntniß und Umſicht bearbeitete Schrift, wie wir ſie aus der Feder des ſich um den landwirthſchaftlichen Gartenbau ſo verdient machenden Verfaſſers zu erhalten gewohnt ſind. Da der Inhalt des Buches die allgemeinſte Verbreitung verdient, ſo werden wir wohl ſpäter im Auszuge Mittheilungen daraus geben. E. O—o.

Feuilleton.

Die vegetabiliſche Hydra. Von Bettzich Beta. Noch vor zwei Jahren war Mr. Rivers Topper, Vicar zu Stickton, dem Centrum der berühmten Feengegend, der harmloſeſte Geiſtliche und Botaniker in der Welt. Jetzt iſt er tauſend Mal verflucht und verwünſcht, gerichtlich angeklagt, und nur wegen mangelnder Form in den betreffenden Geſetzen nicht leibhaftig verbrannt oder echt engliſch gehenkt in Folge ſeines Eifers in der Botanik. Sein Steckenpferd waren die Waſſerpflanzen, welche von den blühenden Sümpfen und Kanälen um ihn her reichlich genährt und bald ſehr fett wurden, was man Steckenpferden ſonſt nur ſelten nachrühmen kann; Mooſroſen und Zwergtulpen, womit er begonnen, wurden bald von Lotos-Nymphen des Nil (Nymphaea Lotus), Conferva, Hydrodictyon, Mougeotia, Tyndariden und Oscillatorien verdrängt. Immer mehr blühende Nixen und Nymphenhäupter ſteckten ihre Köpfchen aus ſeinem Fiſchteiche hervor, den er ſich hinter dem Hauſe hatte anlegen laſſen und der durch eine Eiſenröhre aus dem benachbarten Kanale geſpeiſt ward. Aber die Lotus-Nymphe des Nil hatte es ihm angethan. Sie klagte, wie es ihm ſchien, aus ſeinem Fiſchteiche heraus, daß ſie ſich einſam und kalt fühle unter den reizloſen Waſſer- und Sumpfpflanzen Englands und ſich nach Schweſtern des heiligen alten Nil ſehne. Mr. Rivers Topper lernte etwas koptiſch, um mit dem botaniſchen Profeſſor Redſchild Fellah in Alexandrien correſpondiren zu können und zu leſen, wie gewaltig und zauberiſch

die Blumen des Nils seien und welche sich etwa als ganz Unbekannte in England einführen ließen, mit ihm gelehrte Streitigkeiten über Wasserpflanzen zu führen und endlich durch eine ganz neue, in England völlig unbekannte Wasserpflanze des Nil überrascht zu werden. In dem koptischen Begleitschreiben hieß es: „Sie erhalten hiemit eine Wurzel der Growkerva aquatilis, ganz unbekannt in England, wie in Europa überhaupt. Möge deren Schatten niemals kleiner werden und mögen Sie tausend Jahre leben, deren Wuchs und Blüthe zu bewundern, dankumgeben von der Nation.“

Mr. Topper war ein gelehrter Wasserpflanzen-Botaniker, aber kein Held im Koptischen, so daß er die Ironie dieses Briefes nicht merkte.

Die Wurzel der Growkerva aquatilis kam in einem kleinen, starken, luftdichten Steingefäß an, versiegelt mit Professor Fellah's eigenem Petschaft. Als es geöffnet ward, sprang wie aus gewissen Spielzeug-Vexir-Kästchen eine üppige Masse von peitschenstielartigen Stengeln und Blättern heraus, nicht von einer Wurzel sondern von Tausenden, die sich mit furchtbarer Hartnäckigkeit an die innern Wände des Steinkruges angesogen hatten. Es war ihm bekannt gewesen, daß diese Pflanze ungemein rasch und luxuriös wachse, aber dies überstieg seine Erwartungen. Ein botanischer Freund erklärte, herbeigerufen, man sähe sie faktisch und förmlich wachsen. Topper hielt es für Illusionen des Enthusiasmus, aber er hatte Recht.

Der Steinkrug mußte mit einer Axt zerschlagen werden, um die Pflanze herauszuziehen. Sie ward in den kleinen Fischteich neben die Lotos-Nymphe gesetzt, die sich nach einigen Minuten schon fest und zärtlich umarmt fand. Nach 35 Minuten lag sie auf der Wasserfläche, ein zerdrückter Leichnam. Andern Wasserpflanzen ging es bald nicht besser. Die Growkerva aquatilis nahm nach einigen Stunden den großen Teich ein und machte Miene, den ganzen grünen Platz umher mit Sturm zu erobern.

Der botanische Freund war nach London abgereist. Mr. Topper schlief während der Nacht sehr unruhig und träumte von vegetablischen Boa Constrictors, die ihn, Haus und Hof umschlangen und so lange drückten, bis er schreiend aufwachte, um hinaus zu stürzen und die furchtbare Pflanze schwellen und mit dicken Peitschenstielstengeln nach allen Seiten drohen zu sehen.

Gegen Mittag kam ein Brief von dem botanischen Freunde aus London, der die Ankunft der seltsamen Pflanze sofort der Royal Botanical Society gemeldet hatte. Er las:

„Lieber Topper! In aller Eile bitte ich Sie die Growkerva wohl zu hüten, daß sie nicht um sich greife. Vom Director der Botanischen Gesellschaft ernstlich ermahnt, sage ich Ihnen, daß diese Pflanze der größte Fluch im ganzen Reiche der Vegetation ist. Ihr fabelhaft schneller Wuchs, ihre entsetzliche Generationskraft und ihre Hartnäckigkeit der Existenz vereinigen sich, sie überall, wo sie einmal Wurzel gefaßt, unvertilgbar zu machen. Unter-Aegypten ist von ihr auf Tausende von Meilen zerstört worden. Der Nil wird nur durch die ungeheure Menge Alligatoren (welche deshalb in Aegypten göttlich verehrt wurden) schiffbar gehalten, weil sie just diese Pflanze leidenschaftlich gern fressen und eben so schnell verzehren als sie wächst.

Vergessen Sie vor allen Dingen nicht, die Eisenröhre, durch welche Ihr Teich versorgt wird, fest zu schließen. Näheres mündlich u. s. w.

Kaum hatte Mr. Topper diese

Schreckensnachricht gelesen, als ihm ein Kanalschiffer gemeldet ward. Mit diesen Leuten stand er im besten Vernehmen, da sie ihm öfter vegetabilische Curiositäten brachten, wofür er stets anständig bezahlte.

„Ich und mein Freund fanden dies heute Morgen im Kanal,“ sagte der Schiffer, „haben es vorher nie gesehen, aber heute fanden wir sehr viel davon. Ich verstehe nichts davon, aber Watumecallum commune, wie Sie es nennen (gewöhnliche englische Wasserpflanze) ist es nicht, so viel sehe ich.“ —

Mr. Topper stürzte mit der Verzweiflung eines Selbstmörders in den Garten an den Fischteich, aber ersäufen hätte er sich nicht können, wenn es seine Absicht gewesen wäre: der ganze Teich war von der entsetzlichen Pflanze an- und ausgefüllt. Er arbeitete mit der Hand hinunter nach der Eisenröhre, welche Wasser aus dem Kanale lieferte, sie war von einem Wurzelschoß verstopft und ausgefüllt. „Aber sie kann doch unmöglich in einer Nacht bis in den Kanal selbst geschossen sein,“ dachte er mit noch einiger Hoffnung, und eilte mit einem tüchtigen Stopfer nach der andern Oeffnung der Röhre im Kanale. Das Ungeheuer war wirklich nicht nur durchgeschossen, sondern streckte seine Wurzelarme auch bereits nach allen Seiten aus. Mehrere derselben hatten sich schon am Ufer entlang festgesogen. Er schnitt die Hauptwurzel an der Oeffnung der Röhre zwar ab, aber die Schößlinge zeigten überall schon selbständige Lebenskraft, wie sich bald zu allgemeinem Schrecken der ganzen Umgegend erwies.

Am dritten Tage darauf stand es in der Zeitung, daß der Sticktonkanal plötzlich mit einer ganz neuen Art von Wassergewächs gesegnet worden sei, welches die besten Botaniker überrascht habe. Eine Woche später erschien als Aufklärung von Topper's botanischem Freunde die Nachricht, daß England dem berühmten Botaniker Mr. Topper die Einbürgerung der seltsamen, bisher noch ganz unbekannten Crowferva aquatilis aus Aegypten zu verdanken habe.

Nicht lange und es erschienen Klagen und Angriffe, daß der ganze Kanal von der furchtbaren Pflanze so durchwuchert worden sei, daß kein Kahn mehr fahren könne. Kanalschifffahrt und Wassermühlen Meilen weit umher standen still, hieß es später.

Nach vier Wochen begannen gerichtliche Vorladungen auf Klagen der Wassermüller-Association von den Commissionären der Sticktonschifffahrt, von der Canalcompagnie u. s. w.; auch ein Brief kam von einem Künstler, der versicherte, daß man von den Blattstielen der Crowferva aquatilis Papier machen könne.

Die erste Anklage lief zwar auf eine Freisprechung hinaus, weil, wie der Richter anführte, leider kein Gesetz für diesen bestimmten Fall existire, „aber Ihr Name, Mr. Topper,“ setzte der Richter hinzu, „wird ewig geschändet bleiben, weil sich daran ein entsetzliches Beispiel knüpft, daß alle Uebel, welche aus Unwissenheit und Brutalität entspringen, von den Thaten und Bestrebungen übertriebenen Dilettantismus übertroffen werden können. Die entsetzliche Schlange, welche bereits Tausende von Menschen brotlos gemacht, hat sich binnen 8 Wochen über 75 Meilen durch den Kanal und Fluß Sticton ausgedehnt.“

Zwei Jahre sind seitdem verflossen. Es fährt und fließt wieder im Sticton, aber nur unter fortwährendem Kampfe mächtiger Dampfbaggermaschinen, die alle 8 Tage den Kanal und Fluß durchrasen, um

mit Riesenkraft die Köpfe und Hälse der furchtbaren Wasserpflanzen-Hydra wegzureißen. Einführung von Alligatoren schlug fehl, eine Sendung fraß sich unterwegs gegenseitig selbst auf, eine zweite kam während des Winters um.

Mr. Topper wurde gerichtlich freigesprochen, aber die botanische Gesellschaft hat ihn auf ewig bestraft und für Growserva aquatilis den officiellen Namen Topperonia pestifera festgesetzt und beibehalten. (Dr. Ule, Natur.)

Wellingtonia gigantea. Ein Herr Glen Eyre bei Southampton theilt in der Gard. Chron. mit, daß er ein 4 Fuß 6 Zoll hohes Exemplar der Wellingtonia gigantea besitzt, das drei kleine Fruchtzapfen trägt, und fragt an, ob auch anderswo dies der Fall sein möge?

Collodium, Anwendung bei Stecklingen. So günstig auch die Resultate schienen, die durch die erste Anwendung von Collodium bei Stecklingen anfänglich erzielt wurden, so scheint man sich desselben doch wohl nur wenig oder gar nicht zu bedienen, wenigstens ist uns bisjetzt nichts Neues darüber zu Gehör gekommen. Schon glaubten wir jedoch in No. 17 des Erfurter General-Anzeiger eine Reihe von neuen Resultaten über „Anwendung von Collodium bei Stecklingen“ zu lesen zu bekommen, sahen uns jedoch sehr bald getäuscht, indem die in gedachter Zeitschrift angeführten Resultate ganz dieselben sind, welche vor etwa fünf Jahren in England gemacht und schon damals (1854) in der hamburger Gartenzeitung (Jahrgang 1854, pag. 208) mitgetheilt wurden.

Rosenkohl. Im Winter 1858/59 hat Herr Inspector Neumann in Breslau mit Rosenkohl, der, weil er zu spät gepflanzt, keine Rosen angesetzt hatte, den Versuch gemacht, ob er im Keller solche treiben würde. Der Versuch ist gelungen, nur blieben die Rosen kleiner, waren aber auch desto zarter. Einige Stengel, welche ihrer Rosen beraubt, über Winter 1857/58 unter Laub und Bohnenstroh zufällig im Freien liegen geblieben waren und neue Rosen angesetzt hatten, hatten Herrn N. auf den Gedanken gebracht. Auf Grund dieser Beobachtung glaubt Herr N. mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß man von dem Rosenkohl eine doppelte Ernte haben kann, wenn man im Herbst die Rosen abbricht und die Stengel in Erdgruben mit Laub bedeckt durchwintert. (Bericht d. Sect. für Obst- u. Gartb. d. Schl. Gesellsch.)

Gurken-Reichthum. Ein Correspondent berichtet im Gard. Chron., daß er auf einer Reise in den Vereinigten Staaten mehrere Marktgärtner auf Long Island besuchte, von denen einer 13, ein anderer 18 Acres Land mit Gurkenpflanzen bebaut hatte. Von einem Felde von 3½ Acre waren 60,000 Stück Gurken an einem Tage gepflückt worden, wofür über 1000 Dollars gelöst wurden. — Die Gurkenpflanzen werden auf Hügeln, 4 Fuß von einander entfernt, gepflanzt und zwar läßt man 5 Pflanzen auf je einem Hügel wachsen. Zwischen den Hügeln befinden sich keine anderen Gemüsesorten. Gewöhnlich werden 4 oder 5 Pflanzungen in wöchentlichen Zwischenräumen vorgenommen, so daß, wenn die eine erfrieren sollte, die andere gesichert ist.

Personal-Notizen.

Der bisherige K. Hofgärtner Herr **Mayer** zu Monbijou in Berlin ist zum Hofgärtner am Neuen Garten bei Potsdam ernannt; der bisherige Obergehülfe Herr **Kühne** in Sanssouci dagegen zum K. Hofgärtner in Monbijou in Berlin.

Herr **Th. Nietner**, welcher bisher als Obergärtner und Planteur in der Königl. Meierei-Baumschule zu Sanssouci functionirte, wird als K. Obergehülfe nach dem Neuen Garten und der Obergehülfe Herr **L. Brasch** in gleicher Stellung nach Sanssouci (Revier des Herrn Hofgärtner H. Sello) versetzt.

An die Stelle des, als Botaniker die Niger-Expedition begleitenden, leider verstorbenen Herrn **Charles Barter** ist Herr **G. Mann**, einer der intelligentesten hannoverschen Gärtner im K. Garten zu Kew, ernannt worden. Er ist bereits am 24. November d. J. nach Lagos abgereist, um von dort nach Rabba zu gehen, woselbst Herr Barter am 15. Juli gestorben ist und wo ihn Dr. Baikie, der Befehlshaber der Nil-Expedition, erwartet.

(G. Ch.)

---

† Am 11. October d. J. starb im Neuen Garten bei Potsdam der Königl. Hofgärtner Herr **Kransnick**.

Correspondenz-Notizen.

Dr. S. in London. Den angeregten interessanten Artikel in No. 15 war ich schon so frei, für die Ztg. zurückgelegt zu haben. Camellia Kissii blüht im Frühjahre! Brieflich mehr darüber. Für den Artikel und die Samen den verbindlichsten Dank.

Kalt flüssiges Baumwachs.

Dieses unübertreffliche BAUMWACHS, zum Bedecken der Brandwunden, Veredeln etc. etc., wird kalt aufgetragen, verhärtet sich in der Luft, als auch im Wasser und wird bei einer Temperatur von 45 ° nicht flüssig. In 1/4, 1/2 und 1 Pfund Blechdosen, grössere Quantität billigst berechnet. Wiederverkäufern angemessenen Rabatt, pr. Comptant zahlbar, Briefe franco.

Darmstadt. **Georg Liebig Sohn.**

Hiesigen Gärtnern steht die Redaction dieser Zeitung mit kleinen Proben dieses Baumwachses zu Versuchen zu Diensten.

J. F. G. Kircher

in Hildesheim (Königreich Hannover).

Mein **Georginen-Catalog** pro 1860 (32ster Jahrg.), enthaltend: 101 Sorten Liliputen (Bouquet-Georginen), 190 neueste (darunter 39 eigene Zöglinge, die zum Erstenmal in den Handel kommen), 149 neue, 135 ältere und 162 gute alte Sorten, ist fertig gedruckt und wird auf frankirtes Abfordern gern zugesandt.

3 2044 103 109 179

J. HOLZER BINDER BOSTON MASS